



أساسيات تربية النبات

تأليف

أ. د. أحمد عبد المنعم حسن




دار العربية للنشر والتوزيع
الإصدار الثاني
٢٠١٢

الدار العربية للنشر والتوزيع

* في مجال علوم النبات وأمراض النبات

أ. د. أحمد عبد المنعم	التكنولوجيا الحيوية وتربية النبات
أ. د. أحمد عبد المنعم	الممارسات الزراعية لمكافحة أمراض وآفات وحشائش الخضر
أ. د. أحمد عبد المنعم	تطبيقات تربية النبات في مكافحة الأمراض والآفات
أ. د. أحمد عبد المنعم	تطبيقات تربية النبات في مكافحة الأمراض والآفات
أ. د. أحمد عبد المنعم	الأسس العامة لتربية النبات
أ. د. أحمد عبد المنعم	تحسين الصفات الكمية
أ. د. أحمد عبد المنعم	طرق تربية النبات
أ. د. أحمد عبد المنعم	تربية النباتات لمقاومة الأمراض والآفات
أ. د. أحمد عبد المنعم	أساسيات تربية النبات
أ. د. الشحات نصر أبو زيد	الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية
أ. د. الشحات نصر أبو زيد	النباتات والأعشاب النباتية
أ. د. الشحات نصر أبو زيد	زراعة وإنتاج نباتات الزهور والزينة
أ. د. الشحات نصر أبو زيد	الطب التكميلي بالعلاج العشبي من النباتات الطبية والعطرية
أ. د. الشحات نصر أبو زيد	المنتجات الطبية للمستحضرات التجميلية من النباتات الطبية والعطرية
أ. د. الشحات نصر أبو زيد	المنتجات الطبيعية للوصفات العلاجية من النباتات الطبية والعطرية
د. عبدالعزيز السعيد	أساسيات علم النبات
د. قاسم السحار	مقدمة في علم تقسيم النبات
د. محمد أبو عرقوب	منظومات النمو وعلاقتها بأمراض النبات
د. دانيال هوف تس	أساسيات أمراض النبات
	فسيولوجيا النبات
	مورفولوجيا النبات
	أمراض النبات الفيروسية ومسبباتها ج 1 - ج 2
	حقائق البحث والتطبيق في تغذية النبات
	النبات العام



للدار إدارات أخرى في مجالات علوم التربة والأراضى والحشرات والوراثة وعلوم تكنولوجيا الأغذية والعلوم الهندسية والبيئة وال...

أساسيات تربية النبات

أساسيات تربية النبات

تأليف

أ. د. أحمد عبد المنعم حسن

أستاذ الخضراوات

كلية الزراعة — جامعة القاهرة

٢٠١٢



الدار العربية للنشر والتوزيع
الطبعة الثانية

حقوق النشر
أساسيات تربية النبات

الطبعة الأولى: ١٩٩١
الطبعة الثانية: ٢٠١٢
ISBN 977-258-013-6
رقم الإيداع: ٧٣٩٢

حقوق النشر محفوظة
للدار العربية للنشر والتوزيع
٣٢ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة
ت: ٢٢٧٥٣٣٣٥ فاكس: ٢٢٧٥٣٣٨٨
E-mail: aldar_alarabia1@yahoo.com

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي وجه، أو بأي طريقة، سواء أكانت إلكترونية، أو ميكانيكية، أو بالتصوير، أو بالتسجيل، أو بخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة، ومقدمًا.

مقدمة الناشر

يتزايد الاهتمام باللغة العربية في بلادنا يوماً بعد يوم ، ولاشك أنه في الغد القريب ستستعيد اللغة العربية هيبتها التي طالما امتنعت وأذلت من أبنائها وغير أبنائها ، ولا ريب في أن إذلال لغة أية أمة من الأمم هو إذلال ثقافتها وفكرها للأمة نفسها ، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود أبناء الأمة رجالاً ونساءً ، طلاباً وطلابات ، علماء ومتقفين ، مفكرين وسياسيين في سبيل جعل لغة العروبة تحتل مكانتها اللائقة التي اعترف المجتمع الدولي بها لغة عمل في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها في أنحاء العالم ؛ لأنها لغة أمة ذات حضارة عريقة استوعبت — فيما مضى — علوم الأمم الأخرى ، وصهرتها في بوتقتها اللغوية والفكرية ؛ فكانت لغة العلوم والآداب ، ولغة الفكر والكتابة والمخاطبة .

إن الفضل في التقدم العلمي الذي تنعم به دول أوروبا اليوم يرجع في واقعه إلى الصحوة العلمية في الترجمة التي عاشتها في القرون الوسطى . فقد كان المرجع الوحيد للعلوم الطبية والعلمية والاجتماعية هو الكتب المترجمة عن العربية لابن سينا وابن الهيثم والفارابي وابن خلدون وغيرهم من عمالقة العرب . ولم ينكر الأوروبيون ذلك ، بل يسجل تاريخهم ما ترجموه عن حضارة الفارعة والعرب والإغريق ، وهذا يشهد بأن اللغة العربية كانت مطوعة للعلم والتدريس والتأليف ، وأنها قادرة على التعبير عن متطلبات الحياة وما يستجد من علوم ، وأن غيرها ليس بأدق منها ، ولا أقدر على التعبير . ولكن ما أصاب الأمة من مصائب وجود بدأ مع عصر الاستعمار التركي ، ثم البريطاني والفرنسي ، عاق اللغة من النمو والتطور ، وأبعدوا عن العلم والحضارة ، ولكن عندما أحس العرب بأن حياتهم لا بد من أن تتغير ، وأن جهودهم لا بد أن تدب فيه الحياة ، اندفع الرواد من اللغويين والأدباء والعلماء في إنماء اللغة وتطويرها ، حتى أن مدرسة قصر العيني في القاهرة ، والجامعة الأمريكية في بيروت درّستا الطب بالعربية أول إنشائهما . ولو تصفحنا الكتب التي ألقت أو تُرجمت يوم كان الطب يدرس فيها باللغة العربية لوجدناها كتباً ممتازة لا تقل جودة عن أمثالها من كتب الغرب في ذلك الحين ، سواء في الطب ، أو تحسين التعبير ، أو براعة الإيضاح ، ولكن هذين المعهدين تنكرا للغة العربية فيما بعد ، وسادت لغة المستعمر ، وفرضت على أبناء الأمة فرضاً ، إذ رأى الأجنبي أن في خنق اللغة مجالاً لمزلة تقدم الأمة العربية . وبالرغم من المقاومة العنيفة التي قابلها ، إلا أنه كان بين المواطنين صنائع سبقوا الأجنبي فيما يتطلع إليه ، فتفتنوا في أساليب التعلق له اكتساباً لمرضاته ، ورجال تأثروا بمحاملات المستعمر الظالمة ، يشككون في قدرة اللغة العربية على استيعاب الحضارة الجديدة ، ورغاب عنهم ما قاله الحاكم الفرنسي لجيشه الزاحف إلى الجزائر : « علموا لغتنا وانشروها حتى نحكم الجزائر ، فإذا حكمت لغتنا الجزائر ، فقد حكمناها حقيقة . »

فهل لى أن أوجه نداءً إلى جميع حكومات الدول العربية بأن تبادر — فى أسرع وقت ممكن — إلى اتخاذ التدابير ، والوسائل الكفيلة باستعمال اللغة العربية لغة تدرىس فى جميع مراحل التعليم العام ، والمهنى ، والجامعى ، مع العناية الكافية باللغات الأجنبية فى مختلف مراحل التعليم لتكون وسيلة الاطلاع على تطور العلم والثقافة والانفتاح على العالم . وكلنا ثقة من إيمان العلماء والأساتذة بالتعريب ، نظراً لأن استعمال اللغة القومية فى التدريس يسر على الطالب سرعة الفهم دون عائق لغوى ، وبذلك تزداد خصيلته الدراسية ، ويرتفع بمستواه العلمى ، وذلك يعتبر تأصيلاً للفكر العلمى فى البلاد ، وتمكيناً للغة القومية من الازدهار والقيام بدورها فى التعبير عن حاجات المجتمع ، وألفاظ ومصطلحات الحضارة والعلوم .

ولا يغيب عن حكومتنا العربية أن حركة التعريب تسير متباطئة ، أو تكاد تتوقف ، بل تُحارب أحياناً ممن يشغلون بعض الوظائف القيادية فى سلك التعليم والجامعات ، ممن ترك الاستعمار فى نفوسهم عقداً وأمراساً ، رغم أنهم يعلمون أن جامعات إسرائيل قد ترجمت العلوم إلى اللغة العبرية ، وعدد من يتخاطب بها فى العالم لا يزيد على خمسة عشر مليون يهودياً ، كما أنه من خلال زياراتى لبعض الدول ، واطلاعى وجدت كل أمة من الأمم تدرس بلغتها القومية مختلف فروع العلوم والآداب والتقنية ، كاليابان ، وإسبانيا ، ودول أمريكا اللاتينية ، ولم تشكك أمة من هذه الأمم فى قدرة لغتها على تغطية العلوم الحديثة ، فهل أمة العرب أقل شأنًا من غيرها ؟!

وأخيراً... وتمشيًا مع أهداف الدار العربية للنشر والتوزيع ، وتحقيقاً لأغراضها فى تدعيم الإنتاج العلمى ، وتشجيع العلماء والباحثين فى إعادة مناهج التفكير العلمى وطرائقه إلى رحاب لغتنا الشريفة ، تقوم الدار بنشر هذا الكتاب المتميز الذى يعتبر واحداً من ضمن ما نشرته - وستقوم بنشره - الدار من الكتب العربية التى قام بتأليفها نخبة ممتازة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية المختلفة .

وبهذا ... ننفذ عهدنا قطعناه على المضى قلنا فيما أردناه من خدمة لغة الوحى ، وفيما أراده الله تعالى لنا من جهاد فيها .

وقد صدق الله العظيم حينما قال فى كتابه الكريم ﴿ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

محمد درباله

الدار العربية للنشر والتوزيع

المقدمة

(الحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله)

بعون الله وفضله .. أمكن إنجاز هذا المؤلف الذى يعد باكورة إنتاجى فى مجال تربية النبات ، والذى أتقدم به إلى المكتبة العربية ؛ ليكون - بإذن الله - عوناً للدراسين والباحثين فى هذا المجال . لقد أعد هذا الكتاب ؛ ليكون مرجعاً شاملاً للأسس العامة لتربية النبات ، وليكون ملبياً لاحتياجات كل من طالب مرحلة البكالوريوس ، وطالب الدراسات العليا فيما يتعلق بأساسيات التربية - التقليدية منها والمتقدمة - على حد سواء - دون التطرق إلى تطبيقات تلك الأسس فى مختلف أوجه تحسين النباتات ، التى تعد فروعاً أخرى لهذا العلم .

يشتمل الكتاب على عشرين فصلاً ، موزعة على أربعة أقسام . يتضمن القسم الأول خمسة فصول ، تتناول القواعد العامة والقواعد الوراثة التى تعتمد عليها تربية النبات ، وهي ما درج على تسميتها " قواعد التربية " ويتضمن القسم الثانى أحد عشر فصلاً ، تتناول كافة طرق التربية ، متدرجة من أبسطها إلى أكثرها تقدماً ، وخصص منها ثلاثة فصول لطرق التربية غير التقليدية ، وهي التربية بالطفرات ، والتضاعف ، والهجن النوعية . ويتضمن القسم الثالث فصلين ، خصصا لأساسيات مزارع الأنسجة ، وأوجه الاستفادة منها فى تربية النبات . وقد أعدت المادة العلمية فى هذا القسم بحيث يمكن استيعابها ، دونما حاجة إلى خلفية أخرى غير الخلفية النباتية العامة التى يحتاج إليها مربى النبات . وكانت خاتمة هذا القسم نبذة عن الهندسة الوراثية : ماهي ؟ وما دورها المرتقب فى مجال التربية ؟ ، أهي - فعلاً - بديل لتربية النبات ، أم أنها مجرد أداة فى يد المربى ؟ أما القسم الرابع .. فقد تضمن فصلين ، خصصا للجوانب العملية والإجرائية فى تربية النبات ، والتى

تعد مكملة لموضوع الكتاب .

وقد اعتمد تأليف هذا الكتاب علي مئات المراجع ، التي لخص المؤلف بعض أجزائها ، واقتبس منها كثيراً من الأفكار ، ونقل عنها عديداً من الأشكال ، ولقد أشير إلى جميع هذه المصادر في متن الكتاب ، وذكرت تفصيلاً في نهايته . ولئن كانت بعض المصادر قد تكررت الإشارة إليها عدة مرات في فصول مختلفة من هذا الكتاب .. فإن ذلك يعني أن إسهامها كان بقدر أكبر من غيرها . وأرجو أن يكون هذا التنويه شكراً وامتناناً لمؤلفي جميع هذه المصادر وناشريها .

وأخيراً فلا يسعني - مع صدور هذا الكتاب - إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدار العربية للنشر والتوزيع ، ومديرها العام الأستاذ / محمد درباله . وجميع العاملين بها على جهودهم المخلصة من أجل إخراج هذا الكتاب علي أفضل وجه .

جدول المحتويات

القسم الأول : القواعد العامة والوراثية

الفصل الأول : تعريف بعلم تربية النبات

رقم الصفحة

٢٩	تعريف تربية النبات
٣٠	أهمية تربية النبات
٣٢	علاقة تربية النبات بالعلوم الأخرى
٣٢	تربية النبات كعلم ومهارة
٣٣	العلوم ذات الصلة بتربية النبات
٣٤	العلاقة بين تربية النبات والتطور
٣٥	تاريخ تربية النبات
٤٠	الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار قبل بدء برنامج التربية
٤١	الخطوات الأساسية في برنامج التربية
٤٢	مصادر الجيرمبلازم اللازم لبدء برنامج التربية

الفصل الثاني : طرق التكاثر وأهميتها في تربية النبات

٤٧	التكاثر اللاجنسي
٤٧	الانقسام الميتوزي
٥٠	طرق التكاثر الميتوزي
٥١	أهمية التكاثر اللاجنسي
٥٢	حالات التكاثر اللاإخصابي

٥٦	حالات الأجنة الأحادية
٥٧	التكاثر اللاإخصائي الخضري
٥٨	التكاثر الجنسي
٥٨	الانقسام الاختزالي (الميوزي)
٦٢	الزهرة
٦٦	بورة الحياة فى النباتات الزهرية
٦٧	تكوين الجاميطات المذكرة (حبوب اللقاح)
٦٨	تكوين الجاميطات المؤنثة (البويضات)
٧١	الإخصاب
٧٣	تكوين الجنين
٧٣	ظاهرتا الزينيا والميتازينيا
٧٥	التلقيح وأهميته فى تربية النبات
٧٦	التلقيح الذاتى والعوامل المؤثرة عليه
٧٨	التلقيح الخلطى والعوامل المؤثرة عليه
٨٢	تقدير نسبة التلقيح الخلطى
٨٣	الجنس فى النباتات
٨٣	حالات الجنس
٨٤	وراثه الجنس فى النباتات
٨٦	النسبة الجنسية وأهميتها

الفصل الثالث : الأساس الوراثى للعشائر النباتية

٨٩	الاختلافات فى النباتات
٨٩	أنواع الاختلافات وأهميتها
٩١	التفريق بين الاختلافات البيئية والوراثية
٩٣	مصادر الاختلافات الوراثية
٩٥	وراثه الصفات البسيطة

٩٥	قواعد إعطاء الرموز للجينات
٩٧	اختبار الأليلية
٩٨	حدود تأثير العامل الوراثى على الشكل المظهرى
١٠١	الانعزالات الوراثية
١٠٢	العوامل المؤثرة فى الانعزالات الوراثية
١٠٥	طرق معرفة النباتات المرغوبة فى الأجيال الانعزالية
	حساب الحد الأدنى لعدد النباتات التي تلزم زراعتها للحصول علي
١٠٧	التركيب الوراثى المرغوب فيه
١٠٨	اختبار مربع كاي
١١٤	تأقلم العشائر النباتية علي البيئة
١١٥	عشائر النباتات الذاتية التلقيح
١١٦	السلالات النقية
١٢٠	الأصناف البلدية (غير المحسنة)
١٢١	الأصناف المحسنة الثابتة وراثياً
١٢١	الأصناف الهجين
١٢١	عشائر النباتات الخلطية التلقيح
١٢٣	قانون هاردي - فينبرج
١٣٢	الأصناف البلدية غير المحسنة
١٣٢	الأصناف المحسنة المفتوحة التلقيح
١٣٣	السلالات المرباة داخلياً
١٣٣	الأصناف الهجين
١٣٤	عشائر النباتات الخضرية التكاثر
١٣٤	العشائر الطبيعية
١٣٤	الأصناف البلدية غير المحسنة
١٣٥	الأصناف المحسنة
١٣٥	السلالات الخضرية
١٣٥	الهجن

الفصل الرابع : وراثة الصفات الكمية

١٣٧	 خصائص الوراثة الكمية
	تحديد فئات ونسب الانعزالات الوراثية والمظهرية في الجيل الثاني للصفات
١٤٠	 الكمية
١٤١	 المعادلة ذات الحدين
١٤٢	 مثلث باسكال
١٤٣	 توزيع الانعزالات المظهرية في الجيل الثاني
١٤٦	 تقدير عدد الجينات المتحركة في الصفات الكمية
١٤٩	 التقدير الكمي لتأثير الجين على الفرد
١٤٩	 تأثير الجينات على العشائر
١٥٣	 درجة السيادة
١٥٤	 تقدير درجة الجنوح skewness عن التوزيع الطبيعي
١٥٥	 المتوسطات الهندسية
١٥٧	 مكونات التباين في الصفات الكمية
١٥٧	 التباين البيئي
١٥٩	 التباين الوراثي
١٦١	 طرق تقدير مكونات التباين في الصفات الكمية
١٦١	 التقدير علي أساس نسب الآليات وقيمتها الوراثية
١٦٢	 التقدير علي أساس تحليل التباين لعدد من العلائق الوراثية
	التقدير علي أساس تباينات الآباء والجيلين الأول والثاني والتلقيحات
١٦٣	 الرجعية
١٦٦	 Diallel Design تصميم داياليل
١٧٠	 Design I تصميم رقم ١
١٧٢	 Design II تصميم رقم ٢
١٧٤	 درجة التوريث

١٧٥	 درجة التورث على النطاق العريض أو المطلق
١٧٨	 درجة التورث على النطاق الضيق
١٧٩	 طرق تقدير درجة التورث على النطاق الضيق
١٨٥	 درجة التورث المدركة أو الواقعة
١٨٦	 العوامل المؤثرة فى دقة تقديرات درجة التورث
١٨٧	 التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة
١٨٩	 مصادر إضافية

الفصل الخامس : جمع الجيرمبلازم وتقييمه وإكثاره

وحفظه

١٩١	 تطور الأنواع النباتية ومناطق النشوء والارتقاء
١٩٢	 الصفات المميزة للنباتات المزروعة
١٩٥	 موطن المحاصيل الزراعية ومناطق النشوء والارتقاء والاختلافات
٢٠٥	 جمع الجيرمبلازم
٢٠٥	 التعرية الوراثية
٢٠٧	 أوجه الاستفادة من الجيرمبلازم
٢٠٧	 الاستثناس
٢٠٨	 إدخال النباتات فى الزراعة كأصناف جديدة
٢٠٩	 استعمال الجيرمبلازم كمصدر لصفات هامة فى برامج التربية
٢١٥	 استكشاف الجيرمبلازم فى الداخل وفى الخارج
٢١٧	 المنظمات والمؤسسات المهمة باكتشاف الجيرمبلازم وجمعه
٢١٧	 المنظمات الدولية المهمة بالجيرمبلازم
٢٢٠	 شبكات المعلومات الإقليمية
٢٢١	 برامج وبنوك الجينات الوطنية
٢٢٢	 جهاز جيرمبلازم النباتات الوطنى فى الولايات المتحدة (مثال)
٢٢٧	 خطوات عملية إدخال النباتات
٢٣١	 إكثار وتقييم الجيرمبلازم

٢٣٣	 حفظ الجيرمبلازم فى البيئة الطبيعية
٢٣٣	 حفظ جيرمبلازم النباتات الجنسية التكاثر بالتخزين
٢٣٣	 تخزين البنور فى درجات الحرارة المنخفضة
٢٣٥	 حفظ البنور بالتجفيد
٢٣٥	 حفظ البنور وهى مشبعة بالماء
٢٣٥	 حفظ البنور فى النيتروجين السائل
٢٣٧	 حفظ جيرمبلازم النباتات الخضرية التكاثر
٢٤١	 التغيرات الوراثية المصاحبة لتخزين الجيرمبلازم
٢٤١	 مصادر إضافية

القسم الثانى : طرق التربية

الفصل السادس : التحسين الوراثى بالانتخاب

٢٤٥	 انتخاب الصفات البسيطة فى العشائر الذاتية التلقيح
٢٤٦	 تطبيق قانون هاردي فينبرج على الانتخاب فى العشائر الخلطية التلقيح
٢٤٩	 تأثير النسب الأولية للأليلات على كفاءة عملية الانتخاب
٢٥٢	 عدد أجيال الانتخاب اللازمة لإحداث التغيير المطلوب
٢٥٤	 تأثير الطفرات على توازن هاردي - فينبرج
٢٥٦	 تأثير الهجرة إلى العشيرة على توازن هاردي - فينبرج
٢٥٦	 الانتخاب فى الصفات الكمية
٢٦٢	 مثال على التقدم الوراثى بالانتخاب
٢٦٣	 تحسين التقدم الوراثى السنوي فى برامج التربية بالانتخاب

الفصل السابع : طرق التربية بالانتخاب المباشر

٢٧٣	 انتخاب السلالة النقية
٢٧٥	 الانتخاب الإجمالى فى النباتات الذاتية التلقيح
٢٧٦	 الانتخاب الإجمالى فى النباتات الخليطة التلقيح
٢٧٧	 المزايا

٢٧٨	 العيوب
٢٧٨	 العوامل المؤثرة على درجة الاستجابة للانتخاب
٢٧٩	 بعض التعديلات المدخلة على طريقة الانتخاب الإجمالى
٢٨١	 تحسين نسبتي الدهون والبروتين في الذرة بطريقة الانتخاب الإجمالى
٢٨٣	 طرز الاستجابة للانتخاب

الفصل الثامن : الظواهر المستعملة فى إنتاج الهجن :

العقم الذكري وعدم التوافق

٢٨٥	 العقم الذكري
٢٨٥	 مظاهر العقم الذكري
٢٨٦	 العقم الذكري الوراثى
٢٨٨	 العقم الذكري السيتوبلازمى
٢٨٩	 العقم الذكري الوراثى - السيتوبلازمى
٢٩١	 الجينات المُعلّمة
٢٩٢	 العقم الذكري المُحدث صناعياً
٢٩٣	 عدم التوافق
٢٩٤	 تأثير حالة عدم التوافق على إنبات حبوب اللقاح
٢٩٤	 أنواع عدم التوافق
٢٩٥	 حالات اختلاف الوضع النسبى لميسم ومتوك الزهرة
٢٩٧	 عدم التوافق الجاميطى
٢٩٨	 عدم التوافق الاسبوروبى
٣٠١	 فسيولوجيا عدم التوافق
٣٠٣	 طرق التعرف على عوامل عدم التوافق
٣٠٨	 طرق إكثار السلالات غير المتوافقة ذاتياً
٣١٢	 العوامل المؤثرة على شدة حالة عدم التوافق

الفصل التاسع : التربية الداخلية وقوة الهجين

٣١٥	 التربية الداخلية

٣١٦	الهدف من التربية الداخلية
٣١٦	تأثير التربية الداخلية على الشكل الظاهري
٣١٨	تأثير التربية الداخلية على التركيب الوراثي
	تأثير عدد أزواج العوامل الوراثية المنعزلة على سرعة الوصول إلى
٣٢٢	الأصالة الوراثية
٣٢٥	تأثير الارتباط على سرعة الوصول إلى الأصالة الوراثية
٣٢٦	تأثير درجة التربية الداخلية على سرعة الوصول إلى الأصالة الوراثية
٣٢٦	قوة الهجين
٣٢٧	نظرية السيادة الفائقة
٣٣٠	نظرية السيادة
٣٣٢	الأساس الفسيولوجي لقوة الهجين
٣٣٣	حساب قوة الهجين

الفصل العاشر : الأصناف الهجين والأصناف التركيبية

٣٣٥	مقدمة عن الأصناف الهجين
٣٣٧	العوامل التي تجعل الأصناف الهجين مرغوبة ومفضلة
٣٣٨	العوامل المؤثرة على أسعار الهجن
٣٣٩	طريقة إنتاج السلالات المرباة تربية داخلية
٣٤٠	أهمية الانتخاب بالنظر خلال مراحل التربية الداخلية
٣٤٠	القدرة على التآلف بين السلالات المرباة داخلياً
٣٤١	متوسط القدرة على التآلف
٣٤١	القدرة العامة على التآلف
٣٤٣	القدرة الخاصة على التآلف
٣٤٥	طرق تحسين السلالات المرباة داخلياً
٣٤٨	إنتاج السلالات الأصلية من النباتات الأحادية
٣٤٩	مصادر النباتات الأحادية
٣٥٠	مزايا السلالات الثنائية الأصلية المتضاعفة وعيوبها

٣٥١	 أنواع الهجن
٣٥١	 الهجن الفردية
٣٥٢	 الهجن الثلاثية
٣٥٢	 الهجن الزوجية (الرباعية)
٣٥٤	 وسائل الاستفادة من الجيل الثاني للهجن
٣٥٦	 الظواهر التي يستفاد منها في إنتاج الأصناف الهجين
٣٥٦	 العقم الذكري الوراثي
٣٥٨	 العقم الذكري السيتوبلازمي
٣٥٩	 العقم الذكري الوراثي - السيتوبلازمي
٣٦١	 عدم التوافق
٣٦٢	 انفصال الجنس
٣٦٤	 التقارن التفضيلي الكامل
٣٦٤	 النباتات الثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة
٣٦٥	 التكاثر اللاإخصابي
٣٦٥	 استخدام مبيدات الجاميطات في إنتاج الهجن
٣٦٧	 العوامل المؤثرة على كفاءة عملية التلقيح بين سلالات آباء الهجن
٣٦٨	 أصناف الهجن المتعددة السلالات
٣٦٩	 الأصناف التركيبية
٣٦٩	 خطوات إنتاج الصنف التركيبي
٣٧٠	 اختبار القدرة علي التألف بين السلالات المكونة للصنف التركيبي
٣٧٢	 إنتاج بنور الجيل التركيبي الأول Syn-1
٣٧٢	 التنبؤ بمحصول الصنف التركيبي في الأجيال التي تستعمل في الزراعة
٣٧٥	 العوامل المؤثرة على محصول الصنف التركيبي
٣٧٦	 إعادة تكوين الأصناف التركيبية وتحسينها
٣٧٧	 مزايا الأصناف التركيبية
	 مقارنة بين الأصناف الهجين ، وأصناف الهجن المتعددة السلالات ،
٣٧٨	 والأصناف التركيبية

الفصل الحادى عشر : طرق التربية بالتهجين والانتخاب

٣٧٩	 انتخاب النسب
٣٧٩	 اختيار الآباء
٣٨٠	 تهجين الآباء وزراعة الجيل الأول
٣٨٢	 الجيل الثانى
٣٨٤	 الأجيال : الثالث والرابع والخامس
٣٨٥	 زراعة الأجيال من السادس إلى الجيل الثانى عشر
٣٨٧	 التقييم النهائى
٣٨٧	 مزايا وعيوب طريقة التربية بانتخاب النسب
٣٨٨	 طرق التربية المحورة من طريقة انتخاب النسب
٣٨٨	 انتخاب النسب المتكرر
٣٨٨	 انتخاب النسب الرجعى
٣٨٨	 التحدر من بذرة واحدة
٣٩٢	 انتخاب التجميع
٣٩٣	 خطوات برنامج التربية
٣٦٩	 دور الانتخاب الطبيعى في التربية بطريقة انتخاب التجميع
٤٠١	 طرق التربية المحورة من طريقة انتخاب التجميع
٤٠١	 طريقة انتخاب التجميع المحورة
٤٠٢	 طريقة انتخاب التجميع والنسب
٤٠٢	 طريقة انتخاب النسب و التجميع
٤٠٢	 طريقة انتخاب التجميع الرجعى
٤٠٢	 الانتخاب المتكرر
٤٠٣	 الانتخاب المتكرر للشكل الظاهرى
٤٠٤	 الانتخاب المتكرر للقدرة العامة علي التألف
٤٠٦	 الانتخاب المتكرر للقدرة الخاصة علي التألف
٤٠٦	 الانتخاب المتكرر المتبادل

الفصل الثامن عشر : التهجين الرجعى

٤١٠	 برنامج التهجين الرجعى لنقل صفة بسيطة سائدة
٤١٠	 خطوات برنامج التربية
٤١١	 استرداد وتتبع صفات الأب الرجعى
٤١٣	 أهمية تتبع الصفات المنقولة
٤١٤	 مدى الحاجة إلى التلقيح الذاتى بعد كل جيل من أجيال التلقيح الرجعى ..
٤١٤	 عدد التلقيحات الرجعية اللازمة
٤١٥	 أعداد النباتات التي تلزم زراعتها خلال برنامج التربية
٤١٦	 تأثير التلقيح الرجعى على الأصالة الوراثية
٤١٧	 برنامج التلقيح الرجعى لنقل الصفات فى الحالات الأخرى
٤١٧	 نقل صفة بسيطة ذات سيادة غير تامة
٤١٧	 نقل صفة بسيطة متنحية
٤٢٠	 نقل صفة كمية
٤٢٠	 نقل صفتين أو أكثر إلى صنف واحد
٤٢١	 تأثير الارتباط بين الصفة المنقولة وغيرها من الصفات على برنامج التربية ...
٤٢٣	 برنامج التهجين الرجعى مع مختلف العشائر النباتية
٤٢٣	 عشائر النباتات الذاتية التلقيح
٤٢٣	 عشائر النباتات الخلطية التلقيح
٤٢٤	 عشائر النباتات الخضرية التكاثر
٤٢٥	 مزايا وعيوب التربية بطريقة التهجين الرجعى

الفصل الثالث عشر : الطفرات

٤٢٨	 أنواع الطفرات غير العاملة
٤٢٨	 النقص أو الاقتضاب
٤٣٠	 الإضافة
٤٣٠	 الانتقالات الكروموسومية
٤٣٣	 الانقلاب

٤٣٤	 الطفرات الطبيعية
٤٣٥	 الطفرات البرعمية والكيـميرا
٤٣٦	 كيفية ظهور الكيميرا
٤٣٧	 أنواع الكيميرا
٤٣٩	 طرق إكثار الكيميرا
٤٤١	 أمثلة للطفرات الطبيعية في المحاصيل الزراعية
٤٤١	 الطفرات المستحدثة
٤٤١	 أهمية استحداث الطفرات
٤٤٣	 مدى ملاءمة التربية بالطفرات لمختلف المجاميع المحصولية
٤٤٤	 تأثير العوامل المحدثـة للطفرات
٤٤٥	 كيفية حدوث الطفرات
٤٤٦	 الأشعة المحدثـة للطفرات
٤٤٧	 تقسيم الأشعة حسب طريقة تأثيرها
٤٤٧	 وحدات قياس الأشعة المؤينة
٤٤٨	 أنواع الأشعة
٤٥٢	 المركبات الكيميائية المحدثـة للطفرات
٤٥٦	 برنامج التربية باستحداث الطفرات
٤٥٦	 أهداف البرنامج
٤٥٨	 طرق المعاملة بالعوامل المطفرة
٤٦٠	 العوامل المؤثرة على فاعلية العوامل المطفرة
٤٦٢	 تداول أجيال التربية بالطفرات
٤٦٤	 الأمور التي تجب مراعاتها في برنامج التربية بالطفرات
٤٦٥	 مزارع الأنسجة كمصدر للطفرات

الفصل الرابع عشر : التضاعف

٤٦٨	 التعدد الكروموسومى غير التام
٤٦٩	 أحادى الكروموسوم

٤٦٩	 أحادى ثنائى الكروموسوم
٤٧٠	 غائب الكروموسومين
٤٧٠	 أحادى الكروموسوم المزدوج
٤٧١	 ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الأولى
٤٧٥	 ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثانية
٤٧٥	 ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثالثة
٤٧٨	 ثلاثى الكروموسوم المزدوج
٤٧٨	 رباعي الكروموسوم
٤٧٩	 متعدد الكروموسوم
٤٧٩	 تعدد المجموعة الكروموسومية التام
٤٧٩	 أحادية المجموعة الكروموسومية
٤٨٢	 متعددة المجموعة الكروموسومية ذاتياً أو الذاتية التضاعف
٤٨٤	 متعددة المجموعة الكروموسومية الخليطة أو الهجينية التضاعف
٤٨٥	 السلوك السيتولوجي والوراثي للنباتات الذاتية التضاعف
٤٨٥	 السلوك السيتولوجي
٤٨٩	 السلوك الوراثةي
	السلوك السيتولوجي والوراثي للنباتات متعددة المجموعة الكروموسومية
٤٩٧	 الشبيهة بالثنائية
٤٩٧	 السلوك السيتولوجي
٤٩٩	 السلوك الوراثةي
٤٩٩	 تعدد المجموعات الكروموسومية الخلطى كطريقة لمنشأ الأنواع
٤٩٩	 منشأ أنواع القمح
٥٠٠	 منشأ محاصيل زراعية أخرى
٥٠١	 التربية بالتضاعف الذاتي
٥٠١	 أهمية التربية بالتضاعف
٥٠٣	 تأثير التضاعف على النباتات
٥٠٤	 مجالات استخدام التضاعف الذاتي الصناعي في تربية النباتات

٥٠٦	طرق إحداث التضاعف الذاتي في النباتات
٥٠٧	الكولثيسين واستعمالاته في مضاعفة الكروموسومات
٥٠٩	أعداد الكروموسومات في النباتات

الفصل الخامس عشر : الهجن النوعية

٥١٤	الصعوبات التي تعوق نجاح الهجن النوعية
٥١٦	طرق التغلب علي مشاكل إنتاج الهجن النوعية
٥١٩	عقم الجيل الأول للهجن النوعية
٥٢٠	تدهور الهجن النوعية في الجيل الثاني
٥٢١	نقل كروموسومات أو أجزاء كروموسومية من نوع إلى آخر
٥٢٢	أمثلة علي الهجن النوعية وطرق التغلب علي مشاكل العقم فيها
٥٢٢	الهجن النوعية الطبيعية
٥٢٣	الهجين بين القمح والشيلم (التريتكال)
٥٢٤	التهجين بين القمح والجنس <i>Aegilops</i>
٥٢٥	التهجين بين جنس القمح <i>Triticum</i> والجنس <i>Agropyron</i>
٥٢٧	الهجن النوعية في الجنس <i>Lycopersicon</i>
٥٢٨	الهجن النوعية في الجنس <i>Fragaria</i>

الفصل السادس عشر : القواعد المتعلقة بتربية النباتات

الخضرية التكاثر

٥٢٩	مصادر الاختلافات الوراثية
٥٢٩	الانتخاب في العشائر المتوفرة المكثرة خضرياً
٥٣٠	اللجوء إلى التكاثر الجنسي
٥٣١	المعاملة بالعوامل المطفرة
٥٣١	مشاكل تربية النباتات الخضرية التكاثر
٥٣٣	طرق التغلب علي مشاكل تربية الأشجار المعمرة

القسم الثالث : زراعة الأنسجة وأوجه الاستفادة منها في تربية النباتات

الفصل السابع عشر : زراعة الأنسجة

٥٤١	 أمور عامة
٥٤١	 مختبر زراعة الأنسجة
٥٤٤	 بيئات الزراعة
٥٤٩	 مزارع الخلايا
٥٥٣	 تكوين الأجنة الجسمية
٥٥٥	 مزارع المتوك
٥٥٧	 مزارع الإنوسبرم
٥٥٩	 التلقيح في مزارع البويضات ومزارع المبايض
٥٦١	 مزارع الأجنة
٥٦٣	 مزارع البروتوبلازم
٥٦٧	 مزارع القمة الخضرية الميرستيمية
٥٦٩	 مزارع الإكثار الدقيق
٥٧٤	 مصادر إضافية

الفصل الثامن عشر : أوجه الاستفادة من مزارع الأنسجة

في تربية النبات

٥٧٥	 مزارع الأنسجة كمصدر للاختلافات الوراثية
٥٨١	 أهمية تميز الأجنة العرضية
٥٨٢	 أهمية مزارع المتوك وحبوب اللقاح
٥٨٣	 أهمية مزارع الإنوسبرم
٥٨٣	 أهمية مزارع المبايض والبويضات
٥٨٤	 أهمية مزارع الأجنة

٥٨٥	 أهمية مزارع البروتوبلازم
٥٨٦	 اندماج البروتوبلازم وإنتاج الهجن
٥٩٢	 أهمية الإكثار الدقيق ومزارع القعة الميرستمية
٥٩٥	 حفظ الجيرمبلازم
٥٩٦	 حفظ المزارع بالتجميد
٥٩٧	 حفظ المزارع بالتبريد
٥٩٨	 مصادر إضافية لأوجه الاستفادة من مزارع الأنسجة في تربية النبات
٥٩٨	 الهندسة الوراثية

القسم الرابع : الجوانب العملية والإجرائية في تربية النبات

الفصل التاسع عشر : أساسيات وطرق إجراء التلقيحات في

النباتات

٦٠٧	 دفع النباتات إلى الإزهار
٦٠٨	 العوامل التي يجب مراعاتها عند إجراء التلقيحات
٦١٢	 طرق إجراء التلقيحات
٦١٣	 التلقيحات في بعض محاصيل الحقل
٦١٦	 التلقيحات في بعض محاصيل الخضر
٦١٨	 التلقيحات في بعض محاصيل الفاكهة
٦٢٠	 التلقيحات في بعض نباتات الزينة
٦٢٢	 تخزين وحيوية حبوب اللقاح
٦٢٢	 تأثير العوامل البيئية على حيوية حبوب اللقاح المخزنة
٦٢٣	 أسباب تدهور حيوية حبوب اللقاح عند التخزين
٦٢٤	 طرق اختبار حيوية حبوب اللقاح
٦٢٦	 اختبارات استنبات حبوب اللقاح

الفصل العشرون : تقييم وتسجيل الأصناف الجديدة

٦٣٠	 تقييم الأصناف الجديدة

٦٣٠	قواعد إعطاء الأسماء للأصناف الجديدة
٦٣٢	قواعد تسجيل الأصناف الجديدة
٦٣٣	النشر العلمى للأصناف الجديدة
٦٣٣	حفظ حقوق المربي
٦٣٨	وسائل التمييز بين الأصناف والتعرف عليها
٦٣٩	استخدامات الطرز الشبيهة من الإنزيمات
٦٤٠	إكثار تقاوي الأصناف الجديدة
(٦٨٢-٦٤٣)	مصادر الكتاب

القسم الأول

القواعد العامة والوراثية

الفصل الأول

تعريف بعلم تربية النبات

تعريف تربية النبات

يُعرف علم تربية النبات Plant Breeding بأنه : العلم الذي يمكن الإنسان من تحسين نباتاته المزروعة ، واستنباط أصناف وسلالات جديدة ، تتلاءم مع احتياجات منتجى المحصول ، ومستهلكيه ، والقائمين على تصنيعه . فيهم المنتج أن تكون الأصناف الجديدة عالية المحصول ، ومقاومة للآفات الهامة ، ومتلائمة مع الاتجاهات الجديدة في العمليات الإنتاجية التي تطبق لنواع اقتصادية ، وأن تكون أكثر تأقلماً على الظروف البيئية السائدة في منطقة الإنتاج ، ومن البديهي أن يكون للصنف الجديد صفات جودة مقبولة لدى القاعدة العريضة من المستهلكين ؛ من حيث الشكل ، والحجم ، واللون ، والطعم ، والقيمة الغذائية ... إلخ . وتنوع رغبات المستهلك بالنسبة لهذه الصفات من دولة إلى أخرى ، وداخل الدولة الواحدة في بعض الأحيان . كما يجب أن تتوفر في الصنف الجديد الصفات التي تجعله صالحاً لأغراض التصنيع ؛ يمكن امتصاص فائض الإنتاج ، ولكن .. نظراً للفارق الكبير بين متطلبات الاستهلاك الطازج ، ومتطلبات التصنيع .. فإن الاتجاه الغالب هو الاتجاه نحو إنتاج أصناف خاصة بالتصنيع ، تختلف مواصفاتها من محصول إلى آخر ؛ فأصناف طماطم التصنيع مثلاً .. يجب أن تكون ذات نضج مُركز ؛ يمكن قطف المحصول مرة واحدة ، أو حصاده ألياً ؛ بفرض خفض نفقات الحصاد ، ويجب أن تكون ثمارها عالية الصلابة ؛ ليتمكن البقاء على النبات بحالة جيدة - وهي حمراء ناضجة - لمدة أسبوعين أو

ثلاثة ، لحين نضج بقية المحصول ، ويمكن نقلها إلى مصانع الحفظ فى شاحنات كبيرة ،
دونما حاجة إلى استعمال العبوات الصغيرة . كما يجب أن تكون ثمارها مربعة دائرية
square round ، أو بيضاوية الشكل ، أو كمثرية الشكل ؛ لكى تتحمل الضغط الواقع
عليها ، وأن تكون قليلة الحجرات ، حمراء قانية اللون ، ترتفع فيها نسبة المواد الصلبة
الذائبة الكلية ، وأن يكون عصيرها عالى اللزوجة ، ولأ يزداد رقمه الأيدروجينى (pH) على
٤,٠ .

أهمية علم تربية النبات

يعد علم تربية النبات الأساس الذى يعتمد عليه التوسع الرأسى فى الإنتاج الزراعى ،
كما يؤمل عليه كثيراً فى التوسع الأفقى مستقبلاً ، وهما أمران ضروريان لتوفير الطلب
المتزايد على الغذاء اللازم للجنس البشرى ، والحيوانات الزراعية ؛ ذلك لأن تعداد العالم
يزيد بمعدل ٧٠-٩٠ مليون نسمة سنوياً ، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى
حوالى ٦ بليون نسمة بحلول عام ٢٠٠٠ ، كما يُتَوَقَّع أن يكون نحو ٨٠٪ من هذا العدد فى
الدول النامية . ويعنى ذلك أن الزيادة المتوقعة فى الطلب على الغذاء نتيجة للزيادة فى تعداد
سكان العالم تبلغ حوالى ٢/٣ سنوياً ، وتوجد زيادة أخرى متوقعة فى طلب نوعيات أفضل
من الغذاء ؛ نتيجة لتحسُّن مستوى المعيشة . وتقدر الزيادة الإجمالية المتوقعة فى الطلب على
الغذاء بنحو ٣-٤٪ سنوياً ، ولـيُزِيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع
Toenniessen (١٩٨٤) .

ولقد كان لتربية النبات فضل كبير فى التوسع الرأسى فى مجال الإنتاج النباتى ، كما
أسهم بشكل جوهري فى الحد من استعمال مبيدات الآفات، وخفض الحاجة إلى الأيدي
العاملة اللازمة للعملية الإنتاجية ، وتقليل الفاقد بعد الحصاد . وقد تحقق ذلك من خلال
الأصناف الجديدة المحسنة التى تتفوق فى صفاتها الاقتصادية الهامة ، خاصة فيما يتعلق
بارتفاع محصولها كماً وكيفاً ، ومقاومتها للآفات ، وصلاحياتها للحصاد الآلى ، وتحملها
عمليات التداول بعد الحصاد . وكان من نتيجة ذلك أن تحققت فى الدول المتقدمة زيادة كبيرة
فى الإنتاج الزراعى ، مع نقص فى عدد المشتغلين بالزراعة ؛ ففي الولايات المتحدة مثلاً ..
بلغ إجمالى العاملين بالزراعة فى عام ١٩٨٣ نحو ٣,٥ مليون فرد ، أى حوالى ١,٥٪ من
الشعب الأمريكى آنذاك ، وأنتج كل منهم من الغذاء والكساء ما يكفى ٧٩,١ فرداً ، منهم

٦, ٧ هـ فرداً داخل الولايات المتحدة ، و ٥, ٢١ فرداً خارجها . وكان فى مقابل كل فرد يشتغل بالزراعة مباشرة نحو ٥-٦ أفراد آخرين يعملون فى مجالات أخرى ذات صلة بالزراعة : مثل الشحن ، والتسويق ، والتصنيع ... إلخ (عن HortScience - العدد الثانى من المجلد الحادى والعشرين لعام ١٩٨٦) . ويمكن بدراسة الإحصائيات السابقة لذلك (يراجع Turk ١٩٦٤) الاستدلال على أن أرقام الإنتاج الزراعى فى زيادة مطردة ؛ فقد كان الفرد الواحد بالولايات المتحدة ينتج من الغذاء قبل عشرين عاماً خلت مايكفى ٣٠ فرداً فقط .

ولقد كان للتعاون الدولى فى مجال تربية النباتات وتحسينها فضل كبير فى إنقاذ البشرية من المجاعات التى كانت تهددها ، خاصة فى أمريكا اللاتينية ، ودول جنوب شرق آسيا ، من خلال ما أنتجته المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة من أصناف جديدة محسنة ذات إنتاجية عالية . ويمكن الرجوع إلى Stakman وآخرين (١٩٦٧) ؛ للاطلاع على تفاصيل قصة تطوير الإنتاج الزراعى بالمكسيك بواسطة مؤسسة روكفلر ، وكيف عممت التجربة فى آسيا وأمريكا الجنوبية ، مع نبذة عن معهد بحوث الأرز الدولى ، الذى يقوم على أساس من التعاون بين مؤسستى فورد ، وروكفلر ، وهى قصة شائقة للغاية ، تعد مثلاً لما يمكن أن ينجزه الإنسان إذا ما توفرت لديه الرغبة الصادقة فى العمل ، مع تذليل العوائق الإدارية والمادية من طريق الباحثين . كما استعرضت مؤسسة روكفلر The Rockefeller Foundation (١٩٦٦) إنجازاتها بالتعاون مع غيرها من المؤسسات فى مجال تربية وتحسين القمح ، والذرة ، والأرز ، والبطاطس ، والذرة الرفيعة . ويعد Moseman (١٩٦٦) مرجعاً للتقدم الذى أحرزه التعاون الدولى فى مجال تربية النبات ؛ ويسرد Thompson (١٩٧٢) موجزاً لإنجازات التعاون الدولى فى مجال تحسين إنتاجية القمح ، والأرز ، وفول الصويا ، مع نبذة عن المعاهد الدولية المتخصصة فى هذه المحاصيل . ولقد اعترف العالم بفضل تربية النبات فى توفير الغذاء للعالم ، بحصول عالم تربية النبات دكتور بورلاج N.E.Borlag على جائزة نوبل للسلام فى عام ١٩٧٠ ؛ بفضل جهوده فى المركز الدولى لتحسين إنتاج الذرة والقمح (CIMMYT) فى المكسيك ، التى تُوِّجت بإنتاج أصناف عالية الإنتاجية ، ومقاومة للأمراض من هذين المحصولين ، انتشرت زراعتها فى عدد كبير من دول العالم الثالث وأسهمت فى تجنب ويلات المجاعات فيها .

ويمكن الرجوع إلى Burton (١٩٨١) ؛ لمعرفة مزيد من التفاصيل عن بعض مآحقته تربفة النبات للجنس البشري فى مجال إنتاج الغذاء كمأ وكفأ .

أما عن دور تربفة النبات فى مجال التوسع الأفقى فى الزراعة .. فهو دور تعقد علفه آمال كبفرة فى المستقبل القرفب ؛ وذلك من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية ؛ لتشمل الزراعة فى الأراضى العالفة الملوحة ، والرأ بالمياه المالحة ، واستغلال الصحارى الشاسعة المجاورة لسواحل البحار والمحيطات فى الزراعة ، مع الرأ بمياه البحر مباشرة . وفعمل مربو النبات على تحقيق ذلك ؛ بإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية أكثر تحملاً للملوحة واستنباط نباتات محبة للملوحة Halophytes ، واستغلالها لصالح الإنسان ، إما بصورة مباشرة كغذاء له ، وإما بصورة غير مباشرة كغذاء لحيواناته ، وإما باستخلاص مركبات معينة منها (Toenniessen ١٩٨٤) .

علاقة تربفة النبات بالعلوم الأخرى

تربفة النبات كعلم ومهارة

يميل أغلب المشتغلين بتربفة النبات إلى اعتبار أنها تجمع ما بين العلوم Sciences ، والمهارات Arts (وهى ضرب من الفنون) ، وهم يؤيدون هذا الرأ بأن الإنسان الأول قام منذ أقدم العصور بتحسين نباتاته المزروعة ، وأن كثيراً من الهواة أنتجوا أصنافاً محسنة من بعض المحاصيل ، دون أدنى دراية بالقواعد الأساسية للوراثة ، التى لم يعرفها العالم إلا فى عام ١٩٠٠ ، حينما اكتشفت دراسات مندل . ولعل أبلغ الأمثلة على ذلك أصناف القمح التى أنتجها قدماء المصريين ، وأصناف الأرز التى أنتجها قدماء الصينيين ، وأصناف الذرة التى أنتجها الهنود الحمر ، وعديد من أصناف الفاصوليا الخضراء ، والبطاطس ، ونباتات الزينة التى أنتجها الهواة خلال القرن الماضى ، نون دراية بعلم الوراثة . وبهذا .. فإن تربفة النبات بدأت كمهارة ولكنها أصبحت علماً قائماً بذاته ، بعد اكتشاف القواعد الأساسية للوراثة . ويتعين على المربى - لكى يتمكن من تحقيق أهدافه - أن يتبع الطريقة العلمية فى دراسته ، وأن يعتمد على علوم أخرى كثيرة ، سوف يرد ذكرها . ولا يزال مربو النبات يستفيدون من كل تقدم فى العلوم الأخرى ؛ بتطويعها لخدمة أغراض التربية ، وكان آخرها التقدم الهائل الذى حدث فى العقدين الأخيرين فى علم زراعة الأنسجة والخلايا . وبالرغم

من كل التقدم العلمى .. فإن جانب المهارة فى تربية النبات يظل عاملا مهماً ، يؤثر فى قدرة المربى فى انتخاب النباتات ، وتقييم القيمة المحتملة للصفات غير الظاهرة ، والتعرف على الانعزالات الهامة ، وتخيل الصفات العامة للنبات المرغوب فيه ، والتنبؤ بالتغيرات فى رغبات منتجى المحصول ومستهلكيه، ومصنعيه ، وتوجيه برنامج التربية بما يسمح بتحقيق أهدافه على أكمل وجه ، فى أقصر فترة ممكنة .

العلوم ذات الصلة بتربية النبات

يتعين على مربى النبات أن يكون ملماً بعدد من العلوم الأخرى التى تساعد على تحقيق أهدافه ، وهى كما يلى :

١- الوراثة والعلوم المتفرعة منها والمتصلة بها : مثل علم الخلية ، والوراثة ، والوراثة السيتولوجية ، والوراثة الفسيولوجية ، والوراثة الكمية ، والتطور . وهى العلوم التى تقوم عليها الدعائم الأساسية لتربية النبات .

٢- علوم إنتاج المحاصيل الاقتصادية المختلفة : مثل الخضر ، والفاكهة ، ومحاصيل الحقل ، والزهور ونباتات الزينة ، والنباتات الطبية والعطرية ، والغابات : حتى يكون المربى على دراية بالمحصول الذى يعمل على تحسينه ، وبصفاته المهمة ، وطرق زراعته ، ومشاكل إنتاجه .

٣- علم فسيولوجيا النبات : لكى يكون المربى على دراية بفسيولوجيا نمو وتطور النبات ، وبالأساس الفسيولوجى للصفات التى يرغب فى تحسينها .

٤- علوم الحشرات ، وأمراض النبات بفروعه المختلفة ، وهى لاغنى عنها فى حالات التربية لمقاومة الآفات التى تصيب المحصول .

٥- علوم النبات بفروعه المختلفة من تقسيم ، وتشريح ، ومورفولوجى : لأن الفهم الصحيح للتركيب التشريحي والمورفولوجى للنبات ، ووضع التقسيمى الصحيح .. يساعد المربى على تحقيق أهداف التربية بيسر وسهولة .

٦- علم زراعة الأنسجة والخلايا : لما له من استخدامات كثيرة مهمة فى مجال تربية النبات .

٧- علم الهندسة الوراثية الذى يؤمل منه كأداة ووسيلة مهمة فى مجال تربية النبات .

٨- علم الإحصاء وتصميم التجارب ، لكى يتمكن المربى من اختبار الأصناف الجديدة

وتقييمها تحت ظروف الحقل قبل التوصية بإدخالها فى الزراعة .

يتضح مما تقدم أن مربى النبات يجب أن يكون على دراية بعلوم أخرى كثيرة ، ونظراً لأنه لا يمكنه الإلمام بكل دقائق هذه العلوم وتفصيلاتها ؛ لذا فقد ظهرت الحاجة إلى التعاون والتخصص فى مجالات تربية النبات ؛ فنجد - مثلاً - أن كثيراً من مربى النباتات يتعاونون مع المتخصصين فى علوم أخرى (مثل أمراض النبات ، والحشرات ، وفسيولوجيا النبات ، والميكنة الزراعية ... إلخ) ؛ لتحقيق أهداف تربية معينة . ويجب ألا يقتصر دور المربى فى هذه الحالة على إجراء التلقيحات ، بل يجب عليه أن يكون ملماً بالأمر كله ؛ حتى يمكنه توجيه برنامج التربية ، ومن هنا .. كانت الحاجة إلى التخصص فى جوانب معينة من التربية ؛ مثل تربية الخضر لصلاحيتها للحصاد الآلى ، أو تربية المحاصيل الحقلية لتحمل الظروف البيئية القاسية ، أو تربية الفاكهة لمقاومتها للأمراض ... إلخ .

العلاقة بين تربية النبات والتطور

توجد علاقة وثيقة بين تربية النبات والتطور ، إلا أنهما علمان مختلفان يجب عدم الخلط بينهما ؛ فالتطور يحدث - تلقائياً - فى الطبيعة من خلال الطفرات التى تحدث بصورة طبيعية ، والانحرافات الوراثية التى تحدث نتيجة للتلقيح الخلطى الطبيعى بين النباتات المختلفة وراثياً بعضها ببعض ، سواء أكانت من نفس النوع ، أم من أنواع مختلفة ، وما يتبعهما من انتخاب طبيعى للطرز الوراثية الأكثر قدرة على التكاثـر ، والبقاء تحت الظروف الطبيعية . وغالباً ما تكون هذه الطرز بعيدة - كل البعد - عن أن تصلح للزراعة ، كما أن كثيراً من الصفات التى تعمل الطبيعة على الإبقاء عليها لاتناسب الزراعة التجارية . ومن أمثلة الصفات التى تحافظ عليها الطبيعة ، ولاتناسب الإنسان .. مايلى (عن Hawkes ١٩٨٣) :

- ١- البذور الصغيرة ؛ لأن النبات الذى تكون بذوره صغيرة الحجم ينتج - عادة - عدداً أكبر من البذور ، ويكون - من ثَمَ - أكثر قدرة على التكاثـر والبقاء .
- ٢- إنبات البذور البطئ وغير المتجانس ؛ لأن هذه الصفة تعطى النبات الفرصة لأن تنبت بذوره على مدى فترة زمنية طويلة ، فتزيد فرصته للبقاء مما لو أنبتت كل بذوره مرة واحدة ثم تعرضت البادرات الصغيرة لظروف بيئية قاسية ، يمكن أن تؤدى إلى موتها .

٣- الثمار المنشقة وهى صفة تساعد على انتشار البذور على مساحة كبيرة من الأرض؛ مما يعطى فرصة أكبر لحفظ النوع .

٤- الثراكيب الدفاعية ؛ كالشعيرات الغزيرة والأشواك التى تحمى النبات من الآفات المختلفة .

أما علم تربية النبات .. فهو كما ذكر N.Vavilov : «تطور توجهه رغبة الإنسان وقدرته» ، فهو - أى الإنسان - يعمل على تحسين النباتات الاقتصادية وتطويرها (وليس كل الأنواع كما فى التطور) ؛ لتصبح أكثر ملاءمة للزراعة والاستهلاك ، ويتحكم فى ذلك نوعية الصفات التى يرغب فيها الإنسان ، وقدرته على جمعها فى تركيب وراثى واحد . ويستفيد الإنسان عند قيامه ببرنامج التربية لتطوير نباتاته الاقتصادية من صفات كثيرة مهمة ، تعمل الطبيعة على المحافظة عليها دائماً ؛ لارتباطها بالقدرة على البقاء فى البيئة التى تتوطن فيها هذه النباتات ؛ مثل القدرة على تحمل ظروف الحرارة المنخفضة ، أو الحرارة العالية ، والرطوبة الزائدة ، والجفاف ، والملوحة ، والمقاومة للآفات الهامة المنتشرة فى المنطقة ... إلخ . ويتم ذلك من خلال جمع مربى النبات للطرز النباتية المنتشرة فى أماكن نشأة الأنواع النباتية المختلفة ، وتطورها .

وبالإضافة إلى ماتقدم .. فإن مربى النبات يهتم بصفات أخرى ، لاعلاقة لها بالقدرة على البقاء تحت الظروف الطبيعية ؛ مثل النمو الخضرى الغزير ، والألوان غير العادية من الثمار والبذور ، والصفات التى تجعل المحصول مستساغاً عند الأكل ... إلخ ، كما يهتم بصفات لاتتوافق مع متطلبات الانتخاب الطبيعى ؛ مثل الثمار البكرية ، والنمو الحولى إلخ (عن Briggs & Knowles ١٩٦٧) . ولزيد من التفاصيل عن موضوع التطور والتأقلم ومنشأ الأنواع .. يمكن الرجوع إلى Darwin (١٨٥٩) ، و Wallace & Srb (١٩٦٤) ، و Ehrlich وآخرين (١٩٧٤) ، و Dobzhansky وآخرين (١٩٧٧) ، وغيرها من الكتب المتخصصة .

تاريخ تربية النبات

يعد مقال Smith (١٩٦٦) من أفضل ماكتب فى موضوع تاريخ تربية النبات ، وتلخص عنه - فيما يلى - أهم الإنجازات فى هذا المجال ، سلسلة حسب تاريخ حدوثها (علماً بأن

المرجع الأصلي يذكر كثيراً من الإنجازات والأحداث الأخرى الهامة) :

- ١- لاحظ Millington - فى عام ١٦٧٦ - أن المتوك تقوم بعمل أعضاء التذكير فى النبات، واقترح Grew - فى العام ذاته - دور البويضات وحبوب اللقاح فى التكاثر .
- ٢- أوضح Camerarius - فى عام ١٦٩٤ - دور الجنس فى النباتات ، واقترح فكرة التلقيحات .
- ٣- لاحظ Mather - فى عام ١٧١٦ - تأثير التلقيح الخلطى على نبات الذرة .
- ٤- يرجع الفضل فى إنتاج أول نبات هجين إلى Fairchild ، فى عام ١٧١٩ .
- ٥- أنشئت شركة فيلموران Vilmorin للبذور فى فرنسا فى عام ١٧٢٧ ، ويرجع إليها الفضل فى إحداث تقدم كبير فى تربية النبات .
- ٦- نشرت أهم دراسات Linneaus فى أعوام ١٧٣٥ ، و ١٧٣٧ ، و ١٧٥١ ، و ١٧٥٣ وهى التى أرست القواعد الأساسية لتقسيم النباتات .
- ٧- نشر Kolreuter أبحاثه فى عامى ١٧٦١ ، و ١٧٦٦ ، وقد أوضح فيها ظاهرة العقم فى التهجين بين النوعين *Nicotiana paniculata* ، و *N. rustica* ، وتوصل منها إلى أن التهجين لا يكون ناجحاً إلا إذا كان بين النباتات القريبة من بعضها . وقد وصف Kolreuter حبوب اللقاح ، ويرجع إليه الفضل فى اكتشاف طبيعة عملية التلقيح ، ودور الهواء والحشرات فيها .
- ٨- نشرت أبحاث Lamarck عن وراثة الصفات المكتسبة فى عام ١٨٠١ .
- ٩- لاحظ Knight - فى عام ١٨٢٣ - وجود اختلافات بين أصناف القمح فى شدة إصابتها بمرض الصدأ ، وذكر احتمال توريث المقاومة لهذا المرض ، كما أجرى أول تلقيح بين أصناف القمح ، ويرجع إليه الفضل فى تعرف أن الأبوين يشتركان معاً فى تكوين الجيل الأول وتحديد صفاته فى البسلة ، وأن الانعزالات فى الصفات تظهر فى الجيل الثانى .
- ١٠- استعمل Sargaret اللفظ سائد dominat لأول مرة فى عام ١٨٢٦ .
- ١١- تتبع Amici - فى عام ١٨٣٠ - ، و Hofmeister - فى عام ١٨٤٩ - مسار أنبوية اللقاح خلال الميسم والقلم حتى وصولها إلى البويضة ، وكان ذلك فى الجنس *Portulaca* .
- ١٢- اكتشفت نواة الخلية بواسطة Schleiden فى عام ١٨٣٧ ، و Schwann

فى عام ١٧٣٨ .

١٣- لاحظ Hofmeister الكروموسومات فى نواة الخلية فى عام ١٨٤٨ ، إلا أن ملاحظته لم تكتشف إلا فيما بعد .

١٤- قدم Strasburger - فى عام ١٨٧٥- أول شرح صحيح للكروموسومات ، وكان لدراساته المتتالية هو ، و Flemming ، و Bovari الفضل فى اكتشاف ثبات عدد الكروموسومات فى كل نوع من النباتات .

١٥- اقترح Strasburger لفظة جاميطة gamete فى عام ١٨٧٧ ، واقترح Waldeyer لفظ كروموسوم Chromosome فى عام ١٨٨٨ .

١٦- اقترح Weismann موضوع اختزال عدد الكروموسومات خلال الفترة من ١٨٨٥ إلى ١٨٨٨ ، ثم تأكد ذلك من أبحاث Boveri خلال عامى ١٨٨٧ ، ١٨٨٨ .

١٧- شرح Strasburger عملية الانقسام الاختزالى فى النباتات فى عام ١٨٨٨ .

١٨- اكتشف Navashin عملية الإخصاب المزدوج فى النباتات فى عام ١٨٩٨ ، ثم استعان Correns ، و Devris - كل على حدة- بهذه الظاهرة فى تفسير ظاهرة الزينيا Xenia فى النباتات .

١٩- نشر كتاب Darwin عن "منشأ الأنواع بوسائل الانتخاب الطبيعى" Origin of Species by Means of Natural Selection فى عام ١٨٥٩ ، وقد انتشرت آراء دارون وسادت الأفكار الأخرى حتى عام ١٩٠٠ .

٢٠- ظهر الكتاب الثانى لدارون عن "تأثير التلقيح الذاتى والخلطى فى المملكة النباتية" Effect of Self and Cross Fertilization in the Vegetable Kingdom فى عام ١٨٨٩ .

٢١- شرح Hopkins طريقة الكوز للخط ear-to-row لتحسين الذرة فى عام ١٨٩٩ .

٢٢- اكتشفت دراسات Mendel فى عام ١٩٠٠ بواسطة Correns ، و Devris ، و Tschermak كل على حدة .

٢٣- اقترح Bateson فى عام ١٩٠٠ الألفاظ اليلسى allelomorph ، وأصيل homozygote ، وخليط heterozygote ، والجيل الأول F_1 ، والثانى F_2 ، وأضاف إليها اللفظ وراثه genetics فى عام ١٩٠٦ .

٢٤- يرجع إلى Nilsen فى السويد - فى عام ١٩٠١ - الفضل فى تأكيد دور

الانتخاب في تحسين أصناف القمح ، والشعير ، والشوفان .

٢٥- نشرت نظرية Devris عن الطفرات ودورها في التطور في عام ١٩٠٢ .

٢٦- اكتشف Punnet & Bateson أول حالة ارتباط في عام ١٩٠٢ ، وكان ذلك أثناء

دراستهم على البسلة .

٢٧- توصل Johanssen إلى نظرية السلالة النقية Pure Line Theory في عام

١٩٠٣ .

٢٨- نشر Biffen في عام ١٩٠٣ أيضاً نتائج أبحاثه عن وراثة صفة المقاومة للصدأ

المخطط Stripe Rust في القمح ، التي توصل منها إلى أن صفة المقاومة يتحكم فيها عامل

وراثي واحد متنح ، وكانت تلك أول دراسة تنشر عن وراثة المقاومة للأمراض .

٢٩- يرجع إلى Haming - في عام ١٩٠٤ - الفضل في استخدام بيانات الأجنة .

٣٠- اقترح Winkler لفظ "هيئة كروموسومية" Genome في عام ١٩٠٦ .

٣١- اقترح Harris فكرة مربع كاي x^2 في عام ١٩١٢ ، وبين أوجه استعمالها في

التأكد من نسب الانحرافات الوراثية .

٣٢- كتب McFadden عن الهجن بين القمح والشيلم في عام ١٩١٧ ، وقد كان معروفاً

- قبل ذلك بفترة طويلة - أن هذا الهجين يحدث طبيعياً .

٣٣- قسم Sakamura أنواع القمح على أساس عدد الكروموسومات في عام ١٩١٨ ،

ونشرت أبحاث Kihara حول الموضوع نفسه في عامي ١٩٢١ ، و ١٩٢٤ .

٣٤- اشتغل كل من East ، و Shull بالتربية الداخلية في الذرة ، ونشر East نتائج

أبحاثه في عام ١٩٠٤ ثم من عام ١٩٠٧ إلى عام ١٩١٢ ؛ بينما نشر Shull أبحاثه في عام

١٩٠٥ ثم من ١٩٠٨-١٩١١ . وقد توقف Shull عن الدراسة في هذا الموضوع بعد ذلك ،

بينما استمر East في دراساته في محطة الأبحاث بكونيكتكت ، إلى أن خلفه هناك

Hayes ، ثم تلاه Jones . ويرجع إلى هؤلاء العلماء الأربعة الفضل في وضع التفاصيل

الكاملة لتربية الذرة آنذاك .

٣٥- اقترح Shull - في عام ١٩١٦ - الاصطلاح "قوة هجين" Heterosis .

٣٦- قدم Jones - في عام ١٩١٧ - نظريته المعروفة لتفسير قوة الهجين ، وأنتج أول

صنف ذرة هجين في عام ١٩١٧ أيضاً ، واقترح الهجن الزوجية في عام ١٩٢٠ .

٣٧- أوضح كل من Hayes & Stakman في عام ١٩٢١ أهمية اختبار المقاومة للصدأ

فى القمح ، لكل سلالة من الفطر المسبب للمرض على حدة .

٣٨- وصف Stadler التأثير المطفر للأشعة السينية على الشعير فى عام ١٩٢٨ .

٣٩- اكتشف Dustin الكولشيسين فى عام ١٩٣٤ ، واستعمله

Blackeslee & Avery ، و Nebel & Ruttle فى عام ١٩٣٧ فى مضاعفة كروموسومات

عدد كبير من الأنواع النباتية .

٤٠- نشرت دراسات Vavilov عن نشأة الأنواع والتباين وتربية النباتات فى عام ١٩٣٥

فى تقرير من ٢٥٠٠ صفحة تحت اسم "الأساس العلمى لتربية النباتات" ، وترجم هذا

التقرير إلى الإنجليزية بواسطة Chester فى عامى ١٩٤٩ ، و ١٩٥٠ .

٤١- شرح Harlan & Pope - فى عام ١٩٢٢ - طريقة التلقيح الرجعى لتحسين

محاصيل الحبوب الصغيرة .

٤٢- شرح Richey - فى عام ١٩٢٧ - طريقة التحسين المجمع Convergent

Improvement لسلالات الذرة المرباة داخلياً .

٤٣- اكتشف Rhodes العقم السيتوبلازمى فى الذرة فى عام ١٩٢٣ .

٤٤- اقترح Atkins & Mangelsdorf - فى عام ١٩٤٢ - استخدام السلالات ذات

الأصول الوراثية المتشابهة isogenci lines فى دراسة التأثير الكلى للجين فى النبات .

٤٥- شرح Jones & Clarke - فى عام ١٩٤٣ - وراثة العقم الذكرى الوراثى

السيتوبلازمى فى البصل ، وبيناً كيفية الاستفادة منه فى إنتاج البذرة الهجين . ويعد ذلك

أول استخدام للعقم الذكرى فى إنتاج الهجن التجارية .

٤٦- اقترح Stadler - فى عام ١٩٤٤ - طريقة الانتخاب الجاميطى gamete

selection لتحسين سلالات الذرة المرباة داخلياً .

٤٧- اقترح Hull - فى عام ١٩٤٥ - طريقة الانتخاب المتكرر recurrent selection

لتحسين النباتات .

٤٨- اقترح Comstock وآخرون - فى عام ١٩٤٩ - طريقة الانتخاب المتكرر

المتبادل reciprocal recurrent selection .

٤٩- أوضح Chase - فى عام ١٩٤٩ - أيضاً طريقة استخدام النباتات الأحادية فى

الحصول على نباتات ثنائية أصيلة بدلاً من التربية الداخلية .

٥٠- استخدم Sears الإشعاع فى عام ١٩٥٦ كأداة لنقل الجينات المسنولة عن المقاومة

لصدا الأوراق من النوع البرى *Aegilops umbellulata* إلى القمح .

الأشور التى يجب أخذها فى الاعتبار قبل بدء برنامج التربية

يتطلب أى برنامج للتربية مدة لاتقل عن خمس سنوات ، وقد تصل هذه المدة إلى خمسة وعشرين عاماً أو أكثر ، وهو ما يستلزم من المربي التفكير فى بعض الأمور الهامة قبل أن يبدأ فى برنامج التربية ؛ حتى لايقضى سنوات طويلة من العمل بغير داع ، أو فيما لا طائل من ورائه ، ويلخص Munger (١٩٦٦) هذه الأمور فيما يلى :

١- يتعين على المربي أن يتعرف على احتياجات المنتج والمستهك ، ومتطلبات مصانع الحفظ ، وأن يأخذ رأى المزارعين ، والمرشدين الزراعيين ، ومنتجى البنور ، والعاملين فى مجالى الشحن والتسويق بشأن الصفات التى يرونها ضرورية فى الصنف الجديد .

٢- يجب أن يأخذ المربي - فى الاعتبار - المؤشرات الدالة على التغير فى نوق المستهلك ؛ فلا يبدأ برنامج تربية لإدخال صفة معينة ، يعلم - سلفاً - أنه توجد بداية تغير فى نوق المستهلك بشأنها ، كما حدث عندما تغير الطلب على الكرفس الأصفر ، وأصبح المستهلك يفضل الكرفس الأخضر .

٣- وينطبق الشئ ذاته على المؤشرات الدالة على التغيرات المحتملة فى طرق الحصاد ؛ نظرا لأن الدواعى الاقتصادية كثيراً ماتستلزم إجراء الحصاد آلياً ، وهو ما يتطلب أصنافاً ذات مواصفات خاصة .

٤- ويجب على المربي أن يأخذ - أيضاً فى الاعتبار - التغيرات المحتملة فى السلالات الفسيولوجية للمسببات المرضية عند التربية لمقاومة الأمراض ، وهو أمر يختلف من مرض إلى آخر ، ويكون معروفاً سلفاً .

٥- وعلى المربي أن يضيف صفات واضحة ؛ مثل اللون ، والحجم ، والشكل المرغوب فيه من المستهلك ؛ عند التربية لتحسين صفات لايشعر بها المستهلك ؛ مثل القيمة الغذائية العالية.


٦- يتعين على المربي - أيضاً- أن يكون واقعياً بشأن أهداف التربية ؛ فمن الصعب إنتاج أصناف تكون مبكرة ، وعالية المحصول ، وكبيرة الثمار فى آن واحد ؛ لأن الأصناف للعالية المحصول ، الكبيرة الثمار .. غالباً ماتكون متأخرة .

٧- كما يجب أن يفاضل المربي بين الطرق المختلفة للوصول إلى نفس الهدف ، ويختار أيسرها وأسرعها ؛ فمثلاً .. أمن الأفضل التربية لزيادة محتوى ثمار القاوون من السكر ، أم جعل النباتات أكثر مقاومة للأمراض ؟ ، وهو ما يعنى بقاء النباتات نامية بصورة جيدة إلى نهاية موسم الحصاد ؛ مما يؤدي إلى نقص عدد الثمار التي تقل فيها نسبة السكر . ومثال آخر .. فإن المربي يمكن أن يفاضل بين التربية لتحسين صفة الطعم في الطماطم ، والتربية لمقاومة التشقق ، وارتفاع صلابة الثمار ، وهو ما يعنى إكمال تأخير الحصاد ، إلى أن تصبح الثمار أكثر نضجاً ، وأفضل طعماً .

٨- كما يتعين على المربي قبل أن يبدأ برنامج التربية أن يفاضل بين التربية والوسائل الأخرى الممكنة ؛ لتحقيق الهدف نفسه ، وعلى سبيل المثال .. فإنه لا توجد صعوبة كبيرة في مكافحة بعض الأمراض والحشرات بوسائل أخرى غير التربية ، كما أن إنتاج خضروات صغيرة الحجم - بتضييق مسافة الزراعة - أمر أسهل من إنتاج أصناف جديدة أصغر حجماً .

الخطوات الأساسية في برنامج تربية النبات

يلخص Burton (١٩٦٦) الخطوات الأساسية في برنامج التربية فيما يلي :



يربط هذا التلخيص لبرنامج التربية بين العمليات التي يقوم بها المربي ، خاصة بالنسبة للعملية الرابعة ، والتي يقصد بها الانتخاب المتكرر recurrent selection ؛ حيث توضح الأسهم مكان الانتخاب المتكرر من برنامج التربية . وتطور جميع اهتمامات المربي نحو هذه الأمور الستة ووسائل تحقيقها . وقد يعترض البعض على أن الخطوة الخامسة - الخاصة بإكثار النباتات المنتخبة - ليست من اختصاص المربي ، ولكن من الذي يمكن أن تتوفر لديه

الرغبة فى المحافظة على الصنف الجديد وإكثاره أكثر من المربى نفسه الذى يقضى - فى المتوسط - من ١٠-٢٥ سنة فى إنتاج أى صنف جديد ؟

يقوم المربى بجميع الخطوات التى سبق بيانها ، سواء أكان يعمل فى المؤسسات العلمية الحكومية ، أم فى القطاع الخاص كشركات إنتاج البنور ، وهما مجالان يربط بينهما التعاون الوثيق والدعم المتبادل ؛ للوصول إلى الهدف المنشود من التربية . ولزيد من التفاصيل عن دور المربى فى كلتا الحالتين .. يراجع Strosnider (١٩٨٤) ، و Innes (١٩٨٤) ، و Ryder (١٩٨٤) .

مصادر الجيرمبلازم اللازم لبدء برنامج التربية

يعرف الجيرمبلازم germplasm بأنه أى مصدر لصفة معينة ، أو لمجموعة من الصفات الوراثية المحددة ، وهو اصطلاح واسع الاستعمال ؛ فعلى سبيل المثال .. يطلق على المجموعة العالمية لأصناف القمح وسلالاته - وهى تزيد على ٣٥ ألفاً - بأنها جيرمبلازم القمح العالمى ، ويطلق اسم جيرمبلازم الطماطم المقاوم للحرارة العالية على مجموعة الأصناف ، والسلالات التى تتوفر فيها هذه الصفة ، كما تطلق كلمة جيرمبلازم على مجموعة الأصناف والسلالات ، التى تتوفر لدى المربى ؛ الذى يعمل على تحسين صفة ما أو مجموعة من الصفات فى محصول معين . وقد استعمل - فى السنوات الأخيرة - مصطلح تعزيز الجيرمبلازم germplasm enhancement (Ryder ١٩٨٤) ؛ للدلالة على عملية تربية النباتات ذاتها وتحسينها ، وهى - فى جوهرها - عملية تجميع مستمرة لصفات مرغوب فيها فى صنف ناجح ، أو فى مجموعة من الأصناف من محصول ما ، تمثل الجيرمبلازم المرغوب فيه من هذا المحصول .

ويمكن إيجاز مصادر الجيرمبلازم اللازم لبدء برنامج التربية فيما يلى : (عن Fehr ١٩٨٧) :

١- الأصناف التجارية المحسنة :

تعد الأصناف التجارية المحسنة أهم أنواع الجيرمبلازم التى يمكن أن يبدأ بها المربى برنامج التربية . وكلما ازداد اختلاف هذه الأصناف فى صفاتها .. ازدادت الفرصة لحصول المربى على تراكيب وراثية جديدة ، تجمع الصفات المرغوبة فيها معاً . ويفضل

استعمال الأصناف الحديثة المستخدمة فى الزراعة التجارية- سواء أكانت محلية ، أم مستوردة - على الأصناف القديمة التى لم تعد مستخدمة فى الزراعة. ويحصل على الأصناف التجارية من شركات البذور المتخصصة .

٢- صفوة سلالات التربية Elite Breeding Lines :

يمكن أن يبدأ برنامج التربية معتمداً على سلالات التربية الممتازة التى تمثل الصفوة المنتخبة من برامج تربية أخرى ، بعد أن تكون قد قطعت شوطاً طويلاً فى عمليات التقييم ولكنها لم تعتمد بعد أو لا يرغب فى اعتمادها كصنف جديد . يتم تداول هذه السلالات عادة بين مربى المحصول الواحد ، خاصة بعد أن يعلن عنها فى المجلات العلمية المتخصصة؛ مثل HortScience بالنسبة لسلالات المحاصيل البستانية .

٣- سلالات التربية المحسنة الفائقة فى صفة أو أكثر :

يمكن أن يبدأ برنامج التربية بسلالات تربية محسنة لم تصل إلى مستوى الصفوة ، ولكنها تفوق غيرها فى صفة ما ، أو فى صفات قليلة يرغب المربى فى إدخالها ضمن برنامج التربية . ويمكن اعتبار الأصناف التجارية القديمة - التى لم تعد مستعملة تجارياً - من هذه الفئة ؛ لأنها قد تكون مصدراً لبعض الصفات المرغوب فيها . ويطلق على هذه النوعية من الجيرمبلازم اسم الأصول الوراثية genetic stocks ، أو سلالات الجيرمبلازم germplasm lines .

٤- النباتات المدخلة أو المستوردة plant Introductions من الأنواع المزروعة :

تشمل هذه الفئة من الجيرمبلازم كل السلالات التى تُجمَع من مختلف دول العالم، بما فى ذلك السلالات التى تجمع محلياً ، أو تعد مصدراً مهماً لعدد من الصفات ، ويبحث فيها مربو النبات - دائماً - عن مصادر لمقاومة الآفات المختلفة ، التى لا تتوفر فى الأصناف التجارية ، وهى تشمل الأصناف البلدية ، والطرز البرية من المحصول ، وطرز "الحشائش" المحصولية . وقد خُصَّ الفصل الخامس بهذا الموضوع .

٥- الأنواع القريبة :

يلجأ المربى - أحياناً - إلى الأنواع القريبة من المحصول المزروع ؛ لنقل صفات معينة

منه ، لانتوفر فى المحصول الذي يسعى إلى تحسينه. وتُتبع - فى هذه الحالة - طرق شتى لإجراء التهجين النوعى أو الجنسى المطلوب . وسوف نتناول هذا الموضوع - بالتفصيل - فى فصل لاحق .

هذا .. ويعطى Sagaravatti & Beany-Longhi (١٩٨٢) قائمة بأسماء مصادر البذور فى جميع أنحاء العالم وعناوينها .

أما مصادر المعلومات عن الجيرمبلازم - الذى يمكن أن يبدأ به المربي برنامج التربية - فإنها تتوفر فيما يلى :

- ١- البوريات العلمية المتخصصة .
- ٢- كتيبات شركات البذور العالمية .
- ٣- تقارير تعاونيات المهتمين بوراثة مختلف المحاصيل ، وهى جمعيات تضم المشتغلين بوراثة محاصيل معينة، وتحسينها ، وتهتم بجمع جيرمبلازم هذه المحاصيل ، ودراسته وراثياً ، وتُشَرّ تقارير دورية عن نتائج دراساتهم فى هذه المجالات ، ومن أمثلتها .. ما يلى (عن Rick ١٩٧٠) :

- تعاونية مربي التفاح Apple Breeders Cooperative .
- تعاونية تحسين الفاصوليا Bean Improvement Cooperative .
- تعاونية تحسين الصليبيات Crucifer Improvement Cooperative .
- تعاونية وراثة القرعيات Cucurbit Genetics Cooperative .
- مؤتمر مربي العنب Grape Breeders Conference .
- تعاونية برنامج تربية الجزر الوطنية National Cooperative Carrot Breeding Program
- اجتماع عمل الخس الوطنى National Lettuce Workshop .
- مؤتمر مربي الخوخ الوطنى National Peach Breeders Conference .
- رابطة مربي الذرة السكرية الوطنية National Sweet Corn Breeders Association
- تعاونية مربي الكمثرى Pear Breeders Cooperative .
- رابطة وراثة البسلة Pisum Genetics Association .

- المشتغلون بالثمار الصغيرة Small Fruit Workers .
- برنامج تبادل الطماطم الجنوبي Southeren Tomato Exchange Program .
- المائدة المستديرة لمربي الطماطم Tomato Breeders Round Table .
- تعاونية وراثـة الطماطم Tomato Genetics Cooperative .
- الرسالة الإخبارية لتسحين الخضر Vegetable Improvement Newsletter .
- خدمة معلومات القمح Wheat Information Service .

وقد ذكر المرجع عناوين محررى تقارير هذه الجمعيات والتعاونيات ، إلا أنهم يتغيرون من أن لآخر . وبالرغم من أن غالبية الجمعيات التى ورد ذكرها أمريكية ، وتختص بالمحاصيل البستانية .. إلا أنه توجد جمعيات أخرى أوروبية ، وجمعيات تهتم بالمحاصيل الحقلية .

٤- بالاتصال الشخصى مع مربي النبات فى مختلف دول العالم .

الفصل الثاني

طرق التكاثر وأهميتها فى تربية النبات

إن لطريقة تكاثر المحصول أهمية كبيرة للمربي ؛ لما لها من تأثير فى التركيب الوراثى للنبات الواحد ، ومدى التشابه أو الاختلاف الوراثى بين نباتات العشيرة الواحدة ، والطرق المناسبة لتربية المحصول ، والكيفية التى يتم بها تداوله أثناء تنفيذ برنامج التربية ؛ لذا فإن الدراسة المفصلة لطرق التكاثر فى النباتات تعد ضرورية لفهم أساسيات التربية وطرقها . ويمكن - عموماً - تقسيم طرق التكاثر فى النباتات إلى قسمين رئيسين ، هما : التكاثر اللاجنسى ، والتكاثر الجنسى .

التكاثر اللاجنسى

يعنى بالتكاثر اللاجنسى Asexual Reproduction تكوين الأفراد الجديدة بطريقة لاجنسية ، أى دون تلقيح وإخصاب ، ويتبع ذلك أن تكون كل الأفراد الجديدة امتداداً للنبات الأصلى ، الذى نشأت منه ، ومماثلة له تماماً فى تركيبها الوراثى ، وهو ما يعنى أن تكون متجانسة تماماً فيما بينها . وتنمو الأفراد الجديدة من الفرد الأصلى بطريقة الانقسام الميتوزى Mitosis (أو غير المباشر) .

الانقسام الميتوزى

يعد الانقسام الميتوزى وسيلة الانقسام الوحيدة للتكاثر اللاجنسى فى النباتات الراقية

وهو لا يحدث أى تغير وراثى فى الخلايا الناتجة من الانقسام ؛ لذا .. فإن جميع خلايا الفرد الجديد تكون مماثلة تماماً فى تركيبها الوراثى لخلايا النبات الأصلى الذى نشأت منه ، ويتضح ذلك عند تتبع خطوات الانقسام الميوزى ، التى يمكن إيجازها فيما يلى (شكل ١-٢) :

١- الدور التمهيدي Prophase :

تظهر الكروموسومات - فى هذا الدور - على هيئة خيوط رفيعة مُنشقة طولياً ، وملتفة حول بعضها فى النواة ؛ حيث يكون كل كروموسوم منشقاً إلى كروماتيدتين . وكلما تقدم هذا الدور .. ازداد انكماش الكروموسومات ؛ حتى يظهر كل كروموسوم فى نهاية هذا الدور كوحدين أسطوانيين متوازيين متصلين بسنترومير واحد ، هما الكروماتيدات chromatids .

وفى نهاية هذا الدور .. يختفى الغشاء النووى والنوية تدريجياً ، وتبدأ الكروموسومات فى ترتيب نفسها حول المحور الوسطى للخلية equatorial plane .

٢- دور الوضع المتوسط Metaphase :

يبدأ ظهور المغزل spindle عند طرفى الخلية ، ثم ترتب الكروموسومات نفسها على خيوط المغزل ، ويكون اتصالها بالمغزل فى مناطق السنتروميرات .

٣- الدور الانفصالى Anaphase :


ينشق كل سنترومير طولياً ، وبعد ذلك .. تبدأ السنتروميرات الشقيقة فى الابتعاد عن بعضها ، كلٌ ساحباً معه كروماتيدته ؛ ويؤدى ذلك إلى انفصال الكروماتيدتين الشقيقتين عن بعضهما ، وذهاب كل كروماتيدة إلى القطب المضاد . وتعرف كل كروماتيدة بعد ذلك باسم كروموسوم .

٤- الدور النهائى Telophase :

يبدأ الدور النهائى بمجرد وصول مجموعتى الكروماتيدات الصنوية إلى قطبى الخلية ؛ فتبدأ فى التغير من الحالة التى كانت عليها إلى حالة خيطية رفيعة طويلة ؛ حتى يصعب تمييزها ، ويتكون - فى أثناء ذلك - الغشاء النووى حول كل مجموعة من مجموعتى

الكروموسومات ، كما تبدأ النوية في الظهور ،

يلي ذلك .. انقسام السيتوبلازم بتكون صفيحة وسطية cell plate ، ويختفى المغزل ، ثم تدخل الخلية في الدور البيئي interphase قبل الابتداء في انقسام ميتوزي آخر .



شكل (٢ - ١) : خطوات الانقسام الميتوزي (عن Ros وآخرين ١٩٨٤) .

أما الدور البيئي .. فإنه يتكون من مرحلة الانقطاع الأولى gap one phase (أو G_1) الذي يبدأ بعد انقسام الخلية مباشرة ، وتقوم الخلايا خلاله بتمثيل مختلف الأحماض النووية

الريبوزية (RNAs) اللازمة لتمثيل البروتين . كما يتحدد -خلال هذه المرحلة - إذا كانت الخلية سوف تبقى ميرستيمية قادرة على الانقسام ، أم تصبح من الخلايا الدائمة ؛ فإذا احتفظت بقدراتها على الانقسام .. فإنها تدخل فى مرحلة التمثيل synthesis phase (أو S) ، وفيها .. يضاعف الـ DNA نفسه من مواد أولية ، سبق تمثيلها خلال مرحلة الانقطاع الأولى. وتلى ذلك .. مرحلة الانقطاع الثانية (G_2) ، وفيها .. يتم تمثيل بعض مكونات الخلية الضرورية لتكوين خيوط المغزل . وبانتهاء هذه المرحلة .. تدخل الخلية فى الانقسام الميتوزى من جديد .. يتضح مما تقدم أن الدور البينى ليس دورسكون - كما كان يعتقد - بل إن الخلية تكون فى أوج نشاطها ، وتزداد فى الحجم ، وتقوم بتمثيل كل احتياجاتها من المواد والمكونات اللازمة لبدء دورة جديدة من الانقسام .

طرق التكاثر اللاجنسى

توجد ثلاث طرق للتكاثر اللاجنسى هى : التكاثر الخضرى ، والتكاثر اللاإخصابى ، والتكاثر بمزارع الأنسجة والخلايا .

١- التكاثر الخضرى :

يعرف التكاثر الخضرى Vegetative Reproduction بأنه : التكاثر بالأجزاء الخضرية للنبات ؛ مثل التكاثر بالدرنات ، والجذور ، والريزومات ، والأبصال ، والعقل ؛ والتكاثر بالترقيد ، والتطعيم ، والتركيب ... إلخ . ويؤدى الإكثار الخضرى المستمر لنبات واحد إلى إنتاج ما يسمى بالسلالة الخضرية clone .

٢- التكاثر اللاإخصابى :

يعرف التكاثر اللاإخصابى Apomictic Reproduction (أو Apromixis) بأنه : التكاثر بالبذور التى تحتوى على أجنة لإخصابية ، لم تنشأ من إخصاب البويضة بحبة لقاح ، وإنما نشأت من نمو إحدى الخلايا الأمية الثنائية المجموعة الكروموسومية مباشرة ، إلى جنين تتشابه خلاياه - فى تركيبها الوراثى - تماماً - مع النبات الذى نشأت منه . ويتكون - عادة - عدة أجنات لإخصابية فى البذرة الواحدة ، ويؤدى الإكثار اللاإخصابى المستمر لنبات واحد إلى إنتاج ما يسمى بالسلالة اللاإخصابية Apomictic Line .

٣- التكاثر بمزارع الأنسجة والخلايا :

تستعمل مزارع الأنسجة والخلايا Tissue and Cell Cultures فى بعض الحالات كوسيلة للإكثار اللاجنسى غير المحدود للتراكيب الوراثية المرغوب فيها من النباتات : ومن أمثلة ذلك مايلى :

(أ) مزارع القمة الميرستيمية :

تستعمل مزارع القمة الميرستيمية Meristem Culture فى إكثار أصناف الشليك وغيره من المحاصيل الزراعية ؛ لإنتاج نباتات خالية من الفيروس . وتعد هذه الطريقة - فى جوهرها - إحدى طرق التكاثر الخضرى .

(ب) مزارع الخلايا :

تستعمل مزارع الخلايا Cell Cultures - هى الأخرى - فى إكثار بعض النباتات ؛ حيث تعطى بعض الخلايا المفردة - بالزرعة - أجنة لاجنسية Embryoids ، وهى أجسام مكتملة التكوين تشبه الأجنة العادية ؛ تنمو مباشرة إلى نباتات كاملة (Swamy & Krishnamurthy ١٩٨٠) . وتوجد بعض أوجه الشبه للمقارنة بين هذه الأجنة والأجنة المتكونة فى حالات التكاثر اللاإخصابى ؛ إذ إن كليهما لاجنسى .

أهمية التكاثر اللاجنسى

ترجع أهمية التكاثر اللاجنسى - بالنسبة للمربى - إلى ماله من مزايا أو عيوب ، كما يلى :

١- يمكن - بواسطة التكاثر اللاجنسى عامة - المحافظة على أى تركيب وراثى ، يتم التوصل إليه ، وإكثاره فى الحال ، وبصفة مستمرة ، دون أن يحدث أى تغير فى تركيبه الوراثى .

٢- وفى المقابل .. فإن التكاثر اللاجنسى الإجبارى - (أى عندما يكون المحصول غير قادر على التكاثر الجنسى إطلاقاً كما فى الثوم ، والموز ، والعنب البناتى) - هذا التكاثر يقلل من فرصة ظهور تراكيب وراثية جديدة لتحسين المحصول .

٣- لاجدوى من الانتخاب بين النباتات الناتجة من التكاثر اللاجنسى لنبات ما ؛ لأنها

تكون - جميعاً - متشابهة فى تركيبها الوراثى .

٤- كثيراً ما يلجأ المربي إلى الإكثار الخضرى كوسيلة لزيادة عدد النباتات من نفس التركيب الوراثى ، قبل أن يلجأ إلى الإكثار الجنىسى ؛ حتى يحصل على أكبر قدر ممكن من الانغزالات الوراثية ، حينما يبدأ إكثاره جنسياً ، وتتبع طرق خاصة لتحقيق ذلك فى المحاصيل التى لا تتكاثر خضرىاً بصورة طبيعية .

٥- تفيد مزارع القمة الميرستيمية فى إنتاج نباتات خالية من الإصابات الفيروسية ، فى حالة إصابة جميع نباتات سلالة خضرية بمرض فيروسى ، كما لا تنتقل كثير من الأمراض الفيروسية عن طريق الأجنة اللاإخصابية ، ويفيد ذلك فى تجديد السلالات الخضرية التى تتدهور بفعل إصابتها بالأمراض الفيروسية .

٦- يكون التكاثر اللاإخصابى الاختيارى (وهى الحالة التى يتكون فيها جنين جنسى واحد مع الأجنة اللاإخصابية فى البذرة) عائقاً أمام المربي إذا رغب فى الحصول على البادرة الناتجة من الجنين الجنىسى ، ولم يتمكن من التمييز بينها وبين البادرات الأخرى الناتجة من الأجنة اللاإخصابية فى طور مبكر من النمو ؛ يتعين عليه فى هذه الحالة الاستمرار فى زراعتها ، إلى أن يمكنه التمييز بينها ، وقد يستغرق ذلك عدة سنوات .

حالات التكاثر اللاإخصابى

تعد كل حالات التكاثر اللاإخصابى Apomixis توالداً بكرياً Parthenogenesis ولكن العكس ليس صحيحاً ؛ لأن التوالد البكرى يعنى أن النبات يعقد ثماراً بذرية ، تحتوى داخلها - أى داخل البذور - على أجنة بكرية ، تكونت بنمو أحد أنوية أو خلايا المبيض مباشرة ، دونما حدوث تزاوج بين خلية ذكرية وأخرى أنثوية ؛ فإذا تكون الجنين بنمو نواة البويضة الأحادية مباشرة .. فإنه يكون أحادى المجموعة الكروموسومية haploid ، ويعطى هذا الجنين - عند نموه - نباتاً يختلف وراثياً ومظهرياً عن النبات الأصلى الثنائى المجموعة الكروموسومية diploid الذى نشأ منه ، ولا يعد هذا الجنين لإخصابياً . أما إذا تكون الجنين بنمو خلية ثنائية من خلايا المبيض مباشرة .. فإنه يكون ثنائى المجموعة الكروموسومية ، ويعطى عند نموه - نباتاً يتشابه وراثياً ومظهرياً مع النبات الأصلى الذى نشأ منه ، وهذا هو الجنين اللاإخصابى ، أو الخضرى . وترجع أهمية الأجنة الأحادية إلى أنه قد يمكن استخدامها فى الحصول على نباتات ثنائية أصلية ، فى جميع العوامل

الوراثية فى وقت قصير نسبيا (بمضاعفة كروموسوماتها بالمعاملة بالكولشيسين) ، بدلاً من اللجوء إلى التربية الداخلية لعدة أجيال .

ويجب التمييز بين ظاهرة التوالد البكرى التى سبق شرحها ، وظاهرة العقد البكرى parthenocarpy التى تعنى تكوّن ثمار بكرية خالية من البذور seedless ، كما هى الحال فى الجوافة البناتى ، والبرتقال أبو سرة ، والموز . وتحتوى مبايض أزهار هذه الفاكهة على تركيزات عالية من الهرمونات الطبيعية ، التى تعمل على انقسام خلايا المبيض ، وزيادة حجمه ، مع بقاء الثمرة لحين نضجها . وتمثل هذه الظاهرة عائقاً أمام المربى ، الذى يرغب - دائماً - فى الحصول على البذور المحتوية على الأجنة الجنسية ، التى تعد المصدر الرئيسى للتراكيب الوراثية الجديدة ؛ فإذا كانت هذه الظاهرة تحدث بصورة طبيعية .. فإن المربى يلجأ إلى طرق معينة فى تربية المحصول ، لاتعتمد على إجراء التهجينات . أما إذا كانت هذه الظاهرة تحدث تحت ظروف خاصة فإنه يتعين الاحتراس من تجنب وقوعها ؛ لأن تكوين الثمار البكرية يعد عائقاً للمربى . وعلى سبيل المثال .. فإن إجراء التلقيحات فى القرعيات - فى أثناء فترة ارتفاع درجة الحرارة بعد الظهر - يؤدى أحياناً إلى عقد ثمار بكرية ؛ وبذا .. يضيع على المربى موسم زراعى كامل ، وربما لايمكنه الاستفادة من تركيب وراثى مرغوب فيه قام بانتخابه .

ومن المظاهر الأخرى للثمار اللابذرية تلك التى تحتوى على أجنة ضامرة aborted embryos لم يكتمل نموها . ويلزم لتكوين هذه الثمار حدوث عمليتى التلقيح والإخصاب ، اللتين يعقبهما بدء انقسام اللاقحة لتكوين الجنين ، الذى يموت فى مراحل مبكرة من تطوره ، بينما تستمر الثمرة -ذاتها- فى نموها لحين نضجها ؛ حيث تُشاهد داخلها بنور ضامرة ؛ كما فى صنف العنب اللابذرى طومسون سيدلس Thompson Seedless . وقد يضمّر الجنين - فى حالات أخرى - نتيجة لفشل الإندوسبرم فى إمداده بحاجته من الغذاء ، خاصة فى المراحل الأولى من نموه ، أو نتيجة لعدم وجود أى توافق بين الهيئة الكروموسومية للجامطة المذكرة ، وتلك الخاصة بالجامطة المؤنثة فى الزيغوت ، وتعرف هذه الظاهرة باسم Somatoplastic Sterility ، وهى تحدث فى بعض الهجن الجنسية (بين أجناس مختلفة) ، والنوعية (بين أنواع مختلفة) مثل الهجين بين الطماطم *Lycopersicon esculentum* كأم ، والنوع البرى *L. peruvianum* كآب .

أما الأجنة اللاإخصابية .. فإنها تتكون - كما سبق بيانه - نتيجة لنمو خلية أمية ثنائية إلى جنين مباشرة ، تكون جميع خلاياه ثنائية ، ومماثلة في تركيبها للنبات الذي نشأت منه . وتنقسم حالات الأجنة للإخصابية تبعاً للخلية التي يبدأ منها تكوين الجنين كما يلي :

١- التكوين اللابوغي (أبوسبوري) Apospory :

يتكون الجنين اللاإخصابي وأندوسبرم البذرة في هذه الحالة في كيس جنيني ، ينشأ من خلية جسمية ثنائية المجموعة الصبغية ، غير الخلية الوالدة للجرثومة الكبيرة megaspore mother cell (أو الخلية الوالدة للكيس الجنيني) ، مثل إحدى خلايا الأغلفة البويضية integuments ، أو النويوسيلة nucellus . وبينما تدخل هذه الخلية في عمليات انقسام ميتوزية لتكوين الجنين والإندوسبرم .. فإن الخلية الوالدة للجرثومة الكبيرة تبدأ هي الأخرى في الانقسام الميوزي الطبيعي ، إلا أن الكيس الجنيني الذي ينشأ منها .. يضمحل في بداية مراحل تكوينه . ويتميز الكيس الجنيني المتكون في هذه الحالة باختفاء الخلايا السمتية . ويعد هذا النوع من الأجنة أكثر التكوينات اللاإخصابية انتشاراً في المملكة النباتية كما في buffelgrass ، و Kentucky bluegrass .

٢- التكوين الديبلوسبوري Diplospory :


يتكون الجنين اللاإخصابي وإندوسبرم البذرة في هذه الحالة في كيس جنيني ينشأ من الخلية الوالدة للجرثومة الكبيرة ، دون أن تدخل نواتها في عملية الانقسام الاختزالي ، بل تنقسم ميتوزياً مباشرة ، ويزداد حجمها إلى أن تشغل الفراغ الذي كان مفروضاً أن يشغله الكيس الجنيني الطبيعي . يوجد هذا النوع من التكاثر اللاإخصابي في عدة أجناس من الأعشاب النجيلية المعمرة ؛ مثل *Tripsacum* .

٣- الأجنة العرضية Adventitious Embryony :

لايتكون كيس جنيني عندما تتكون بذور تحتوي على أجنة عرضية ، بل تنمو خلية جسمية ثنائية من البويضة ovule أو الأغلفة البويضية integuments ، أو جدار المبيض ovary wall ذاته ، وتنقسم ميتوزياً لتكوّن جنيناً . ويفترض أن أندوسبرم البذور ينشأ في هذه الحالة من الأنوية القطبية لكيس جنيني طبيعي ، يتكون مستقلاً في البويضة . وتكثر

الأجنة العرضية فى بنور بعض أنواع الموالح ، وبعض أصناف المانجو ، وتعرف هذه الظاهرة باسم ظاهرة تعدد الأجنة Polyembryony .

تنشأ الأجنة اللاإخصابية فى الموالح من نسيج النيويسيلة ؛ لذا .. فإنها تسمى أيضاً أجنة نيويسيلية nucellar embryos (شكل ٢- ٢) . وتحمل البذرة الواحدة من ٣-١٢ جنيناً ، منها عدة أجنة لإخصابية ، إلى جانب الجنين الجنسى ، وهى الحالة التى تعرف بالتكاثر الإخصابى الاختيارى Facultative Apomixis ، إلا أن بعضها قد يحمل أجنة لإخصابية فقط ، والبعض الآخر .. يحمل الجنين الجنسى فقط . ويلاحظ - دائماً - أن البادرات الناتجة من الأجنة اللاإخصابية تكون أقوى نمواً من البادرات الناتجة من الجنين الجنسى . وتعرف الحالة التى تحمل فيها بنور النوع أو الصنف أجنة لإخصابية فقط بالتكاثر اللاإخصابى الإجبارى Obligate Apomixis .



شكل (٢- ٢) : تكوين الأجنة النيويسيلية فى الموالح (عن Hartmann & Kester ١٩٨٣) .

وتشاهد ظاهرة كثرة عدد البادرات التى تنمو من البذرة الواحدة فى بعض أصناف المانجو التى توجد بها ظاهرة تعدد الأجنة العرضية النيويسيلية مثلما فى الموالح . وتقسم

أصناف المانجو حسب عدد الأجنة التي توجد في بذورها إلى قسمين كما يلي :

(أ) أصناف لا يوجد في بذورها سوى الجنين الجنسى ؛ مثل ألفونس ، وبائرى ، ومبروكة ، وبشة .

(ب) أصناف تحتوى بذورها على جنين جنسى وأجنة لإخصابية ، وتعطى عند إنباتها من ١-١١ بادرة ، غالباً ماتكون جميعها خضرية ؛ نظراً لضمور الجنين الجنسى ؛ كما في الأصناف هندی بسنارة ، وتيمور ، وقلب الثور ، ولونج .

ويعد التلقيح ضرورياً في معظم الحالات ؛ لتكوين البذور المحتوية على أجنة لإخصابية ، بالرغم من أن النواة الذكرية لاتتحد مع نواة البيضة لتكوين الزيغوت . ويقتصر دور حبوب اللقاح في هذه الحالات على التحفيز stimulation ؛ حيث يبدو أنها تشجع نمو الجنين والكيس الجنينى ، كما أنها قد تخصب النواتين القطبيتين لتكوين نواة الإندوسبرم . وتعرف هذه الظاهرة باسم التكاثر الجاميطى الكاذب Pseudogamy ، وهى شائعة في عدة أنواع نباتية هامة ، مثل الموالح ، والتفاح ، والراسبرى ، والـ guayule (جنس Parthenium) ، وبعض أنواع الأعشاب النجيلية الزرقاء من جنس Poa ، ولكن التلقيح ربما لا يكون ضرورياً لتكوين الأجنة للإخصابية ، سواء أكانت عرضية كما في جنس Opuntia ، أم غير عرضية كما في بعض أنواع الأجناس Crepis ، و Taraxacum ، و Poa ، و Allium .

حالات الأجنة الأحادية

سبقت الإشارة إلى أن الأجنة الأحادية المجموعة الكروموسومية لاتعد أجنة لإخصابية (خضرية) ؛ لأنها تعطى بادرات تختلف وراثياً ومظهرياً عن النبات الذى نشأت منه ، إلا أن بعض المؤلفين (خاصة من غير مربى النبات) يميلون إلى تصنيفها ضمن حالات التكاثر اللإخصابى Apomixis . وتقسم الأجنة الأحادية حسب نشأتها إلى الحالات التالية :

١- التوالد البكرى Parthenogenesis :

إن التوالد البكرى هو تكوين جنين أحادى من خلية البيضة داخل كيس جنينى جنسى وتحدث هذه الظاهرة بصورة اعتباطية في بعض الأنواع النباتية ، إلا أنها تعرف - أيضا - كصفة وراثية في سلالات معينة من أنواع أخرى ، مثلما يكون في Solanum nigrum .

٢- التكوين اللاجاميطى الأحادى Haploid Apogamy :

تتكون الأجنة الأحادية فى هذه الحالة بنمو أحد الأنوية الأحادية - غير خلية البيضة - داخل كيس جنينى جنسى ؛ حيث قد ينشأ الجنين من أحد الأنوية المساعدة synergids أو الأنوية السمتية antipodal nuclei .

٣- التكوين الذكرى المنشأ (أندروجنس) Androgensis :

يتكون جنين البذرة الأحادى فى هذه الحالة بنمو النواة التناسلية ، التى توجد فى حبة اللقاح بعد دخولها الكيس الجنينى . وتحدث هذه الظاهرة - اعتباراً - فى بعض الأنواع ، إلا أنها تعرف أيضاً - كصفة وراثية - فى بعض سلالات الذرة ، وتوصف هذه الظاهرة بأنها androgensis sensu stricto .

٤- التكوين الأحادى الجاميطى المختلط (سيميجامى) Semigamy :

تحدث ظاهرة السيميجامى حينما تصل النواة التناسلية التى توجد بحبة اللقاح إلى الكيس الجنينى ، وتخترق خلية البيضة ، إلا أنها لاتخصب نواة البيضة ؛ لتكوين زيجوت ثنائى ، بل تنقسم كل منهما مستقلة عن الأخرى ؛ ليكونا جنيناً أحادياً ، يعطى عند نموه نباتاً أحادياً ، تكون بعض أنسجته أمية المنشأ ، وبعضها الآخر أبوية المنشأ ، وقد ذكرت هذه الظاهرة فى قطن بيما Pima .

التكاثر اللاإخصابى الخضرى

يعد التكاثر اللاإخصابى الخضرى Vegetative Apomixis (أو Vivipary) حالة خاصة ، تجمع ما بين نوعى التكاثر اللاجنسى ؛ حيث يتكون فى النورات - مكان الأزهار - براعم عرضية يطلق عليها اسم بلابل bulblis . يحدث ذلك - بصورة طبيعية - فى بعض النباتات مثل الثوم (*Allium sativum*) ، والنوع *Allium bulbosa* ، وبعض أنواع الجنس *Agave* . وتشابه هذه البراعم فى حالة الثوم مع الفصوص العادية التى توجد فى البصلة ، إلا أنها تكون أصغر حجماً ، وتعطى عند إنباتها نباتات مماثلة وراثياً ومورفولوجياً للنبات الذى نشأت منه . ولاتعد هذه الطريقة تكاثراً لإخصابياً حقيقياً ؛ لأن الأجزاء المستعملة فى التكاثر ليست بنوراً ، ولاتحتوى على أجنة ، وإنما هى براعم

عرضية ، تكونت مكان البذور (Sneep & Chaudhari ، ١٩٧١ ، ١٩٥٤ Nygren ،
Hendriksen ، ١٩٧٩ ، Hartman & Kester ، ١٩٨٣ ، Fehr ، ١٩٨٧) .

التكاثر الجنسي

يعنى بالتكاثر الجنسي Sexual Reproduction : التكاثر بالبذور التى تحتوى على
أجنة نشأت بطريقة جنسية . ويسبق تكوين الجنين الجنسي خطوات ، تعد غاية فى الأهمية
بالنسبة للمربي ؛ فيحدث -أولاً- الانقسام الاختزالي فى كل من متوك ومبايض الأزهار ،
ومايتبع ذلك من تكوين حبوب اللقاح ، وأنوية الكيس الجنينى الأحادية . وتحدث -أثناء
الانقسام الاختزالي- عمليات الارتباط والعبور ، وانعزال الكروموسومات والعوامل الوراثية .
وبلى ذلك .. عمليتا التلقيح والإخصاب المزدوج ، التى تنتهى بتكوين جنين ، يكون مختلفاً
وراثياً عن أبويه فى حالات التلقيح الخلطى . وتعد هذه الانفصالات الوراثية المصدر الرئيسى
للاختلافات التى يحتاج إليها المربي ؛ لتربية النباتات وتحسينها : كما أن لطريقة التلقيح
السائدة فى محصول ما دوراً كبيراً فى تحديد أنسب الطرق لتربيته ، وكيفية تداوله أثناء
برنامج التربية .

الانقسام الاختزالي (الميووزى)


يعد الانقسام الميووزى Meiosis (أو Meiotic Division) عماد عملية التكاثر
الجنسى ، ويعد الإلمام بخطواته ضرورياً لفهم كثير من الأمور التى تبني عليها قواعد
توارث الصفات ، وقواعد تربية النباتات . ويتضمن الانقسام الميووزى (شكل ٢-٣)
انقسامين ، أولهما .. اختزالي ، وينتج منه خليتان ، تحتوى كل منهما على نصف عدد
الكروموسومات ، وثانيهما .. ميتوزى ، يؤدي إلى مضاعفة عدد الخلايا الناتجة من الانقسام
الأول ، بون أن يؤثر فى عدد الكروموسومات بها . وفيما يلى .. تفاصيل عملية الانقسام
الميووزى (عن طنطاوى وحامد ١٩٦٣) :

١- الانقسام الميووزى الأول :

(أ) الدور التمهيدي الأول First Prophase :

(١) الدور القلادى Leptotene :

تظهر الكروموسومات على هيئة خيوط رفيعة جداً ، غير منشقة طويلاً ، وموزعة فى



شكل (٢ - ٢) : خطوات الانقسام الميوزي (عن Briggs & Knowles ١٩٦٧).

النواة بدون أى نظام .

(٢) الدور التراوجي Zygotene :

يقترّب كل كروموسومين متماثلين من بعضيهما حتى يصبحا زوجاً واحداً ، وتعرف هذه الظاهرة بالاقتران synapsis .

(٣) الدور الضام Pachytene :

تلتف أزواج الكروموسومات المقترنة حول بعضها وتعرف كل وحدة ثنائية الكروموسوم باسم bivalent ، ويكون عددها مساوياً للعدد الأحادي من الكروموسومات . ويزداد قصر الكروموسومات ، كما تزداد في السمك . وفي منتصف هذا الدور .. ينشق كل كروموسوم طولياً ، فيما عدا في منطقة السنترومير ؛ وبذلك .. تصبح كل وحدة ثنائية الكروموسوم مكونة من أربع كروماتيدات ، كل اثنتين متصلتين بسنترومير واحد .

وتعرف الكروماتيدات المتصلة بسنترومير واحد بالكروماتيدات الشقيقة sister chromatids ، كما تعرف الكروماتيدات غير المتصلة بسنترومير واحد في الوحدة الرباعية الكروماتيدات باسم الكروماتيدات غير الشقيقة .

يحدث - بعد الانشقاق الطولي للكروموسوم - أن تتبادل أجزاء متساوية بين كروماتيدتين غير شقيقتين في الوحدة الثنائية الكروموسوم ؛ نتيجة لحدوث كسر في كروماتيدتين غير شقيقتين في نفس المستوى ، ثم حدوث التئام متبادل ، وهي الظاهرة التي تعرف باسم العبور crossing-over .

(٤) الدور الانفراجي Diplotene :

يتنافر الكروموسومان المتماثلان في الوحدة الثنائية الكروموسوم عن بعضهما ، فيما عدا في أماكن حدوث العبور ، التي تعرف باسم كيازومات Chiasmata (المفرد كيازومة chiasma) ، وتتفرج الكروموسومات بين الكيازومات مع نهاية هذا الدور ، كما تتحرك الكيازومات نحو أطراف الكروموسومات ، وهي الحركة التي تعرف باسم الانزلاق terminalization .

(٥) الدور التشتتي Diakinesis :

تظهر الوحدات الثنائية الكروموسوم أقصر وأسمك ، ومنتشرة في السائل النووي ، ويؤدي استمرار ظاهرة الانزلاق إلى أن تبدو الكيازومات طرفية .

(ب) دور الوضع المتوسط الأول First Metaphase :

يتحلل الغشاء النووي والنوية ، ويختفيان ، وتتحرك الوحدات الثنائية الكروموسوم نحو

المحور الوسطى للخلية ، بحيث يكون سنتروميير كل وحدة ثنائية الكروموسوم عموديين على المحور الوسطى .

(ج) الدور الانفصالي الأول First Anaphase :

تنفصل كل كروماتيدتين شقيقتين عن الكروماتيدتين الآخرين فى الوحدة الثنائية الكروموسوم ، وتتجه السنترومييرات نحو القطبين المتضادين . وتعرف كل كروماتيدتين متصلتين بسنتروميير واحد باسم وحدة ثنائية الكروموسوم dyad . ويؤدى ذلك إلى اختزال عدد الكروموسومات - فى كل قطب - إلى العدد الأحادى .

(د) الدور النهائى الأول First Telophase :

بعد وصول الوحدات الثنائية الكروموسوم إلى قطبى الخلية .. تبدأ الكروموسومات فى فقدان الشكل الذى كانت عليه ؛ حيث يفرد الحزون جزئياً ، وتلتف الخيوط الكروموسومية ، وتظهر النوية والغشاء النووى .

(هـ) الدور البينى Interphase :

تتحول الكروموسومات إلى الشكل المعروف فى السكون الكروموسومى ، وفى نوات الفلقة الواحدة .. تنقسم الخلية إلى خليتين ملتصقتين ببعضهما ، ولكن ربما لا يحدث الانقسام السيتوبلازمى ، مع بقاء النواتين الجديدتين فى قطبى الخلية .

٢- الانقسام الميوزى الثانى

(أ) الدور التمهيدي الثانى Second Prophase :

تظهر الوحدات الثنائية الكروماتيدة طويلة نوعاً ، لكنها تنكمش تدريجياً ، ويظهر تنافر واضح بين كروماتيدتى كل وحدة ، ثم تختفى النوية والغشاء النووى .

(ب) دور الوضع المتوسط الثانى Second Metaphase :

يظهر المغزل ، وتترتب الوحدات الثنائية الكروماتيدة فى المستوى الوسطى للمغزل . وفى نهاية هذا الدور .. ينشق السنتروميير - أيضاً - طولياً فى الوحدات الثنائية الكروماتيدة .

(ج) الدور الانفصالي الثانى Second Anaphase :

تتفصل كروماتيدتا كل وحدة ثنائية الكروماتيدة ، ويتجه كل سنترومير إلى القطب المضاد ، ساحباً معه كروماتيدة واحدة ، تصبح بعد ذلك كروموسوماً ؛ وبذلك .. يتم توزيع الكروماتيدات الأربع التى كانت موجودة فى الوحدة الثنائية الكروموسوم على أربع نوايا .

(د) الدور النهائى الثانى Second Telophase :

تفقد الكروموسومات الخاصية التى كانت لها فى الدور السابق ، ويظهر الغشاء النووى والنوية ؛ وبذلك .. تتكون أربع نوايا جديدة ، بكل منها العدد الأحادى من الكروموسومات .
ويحدث بعد ذلك .. الانقسام السيتوبلازمى ، وتتكون أربع خلايا . وتعرف هذه الحالة - التى تكون فيها الخلايا الأربع متصلة ببعضها - باسم الحالة الرباعية quartet ، وتعرف كل خلية بأنها بوغه spore .

الزهرة

تعد الزهرة - بحق - مصنع المربى ، الذى يوجه إنتاجه نحو الغاية التى ينشدها من برنامج التربية ، ويحصل منه على الجيرمبلازم الذى يلزمه فى مراحل تحسين المحصول كلها ؛ لذا .. يعد الإلمام بتركيب الزهرة أمراً ضرورياً للمربى ؛ لكى يحسن تداولها .

يُعرفُ النباتيون الزهرة بأنها : فرع قصير لا تظهر به سلاميات واضحة ، ويحمل أوراقاً متزاحمة ، تحورت لغرض التكاثر . وتنشأ الزهرة - عادة - فى إبط ورقة ، تسمى قنابة bract ، قد تشبه الأوراق العادية ، أو تكون حرشفية ، أو ملونة . وقد تكون الزهرة جالسة sessile (أى بدون عنق) ، أو معنقة . وقد تظهر على عنق الورقة أوراق صغيرة ، تسمى قنبيات bracteoles . وقد يوجد فى قمة العنق جزء متضخم يعرف باسم التخت receptacle ، يحمل الأوراق الزهرية التى تنتظم فى محيطات . وهى : الكأس ، والتويج ، والطلع ، والمتاع .

١- الكأس والتويج :

يشكل الكأس والتويج - معاً - الأعضاء غير الأساسية للزهرة . ويعد الكأس calyx المحيط الخارجى للزهرة ، وهو يتركب من أوراق صغيرة خضراء تعرف باسم السبلات

sepals ووظيفته حماية الأجزاء الزهرية الأخرى فى البرعم الزهرى ، وقد يكون الكأس متساقطاً - حيث تسقط السبلات بعد عقد الثمرة - أو مستديماً - حيث تنمو أوراقه مع الثمرة كما فى الطماطم - كما قد تكون السبلات منفصلة ، أو ملتحمة ، ويوجد - أحياناً - محيط آخر خارج الكأس ، يتركب من أوراق تشبه السبلات ، ويعرف باسم فوق الكأس epicalyx : أما التويج corolla .. فإنه يتركب من عدد من الأوراق الملونة التى تعرف باسم البتلات petals ، تفيد فى جذب الحشرات فى حالات التلقيح الخلطى بالحشرات . وقد تكون البتلات هى الأخرى منفصلة ، أو ملتحمة ، وتأخذ أشكالاً عدة عند التحامها . وقد تتشابه أوراق الكأس والتويج معاً بدرجة كبيرة فى بعض النباتات - خاصة فى نوات الفلقة الواحدة - ويعرفان - معاً فى هذه الحالة باسم الغلاف الزهرى perianth .

وقد أوضحت الدراسات الحديثة - نسبياً - أن الكأس والتويج يؤديان دوراً جوهرياً - غير مباشر- فى التطورات التالية للإخصاب ، وأن إلحاق الضرر بهما - قبل تفتح الزهرة - يؤثر تأثيراً سيئاً فى عضو التائث gynecium بها : ذلك لأنهما يفرزان بعض المركبات ، التى تعد مبادئ حيوية أساسية للتطورات التالية للإخصاب (Swamy & Krishnamurthy ١٩٨٠) .

٢- الطلع :

يعد الطلع androecium عضو التذكير ، وهو يتكون من عدد من الأسدية stamens . تتركب كل سداة من جزء رفيع ، يعرف بالخيط filament ، يحمل فى قمته جزءاً منتفخاً هو المتك anther . وقد تكون الأسدية منفصلة ، أو ملتحمة بخيوطها ومتوكها سائبة ، أو العكس . كما قد تكون الأسدية ملتحمة مع البتلات ، وتعرف بأنها فوق بتلية epipetalous ، أو تكون منفصلة عنها .

يتركب المتك من فصين lobes طويلين ، يحتوى كل منهما على تجويفين طويلين ، يطلق على كل منهما اسم كيس لقاح pollen sac . يحتوى كل كيس على عدد من حبوب اللقاح pollen grains . وبالفحص المجهرى للقطاع المستعرض فى المتك .. نجد أن جدار المتك يتركب من طبقة البشرة الخارجية ، ثم طبقة ليفية fibrous layer ذات خلايا عمادية بجدرها تغليظ ليفى ، ثم عدد من الطبقات المتوسطة intermediate layers ، ثم الطبقة

الطرازية tapetal layer التي تحيط بالتجوييف المشتمل على حبوب اللقاح ، وخلاياها غنية بالمواد الغذائية ، ووظيفتها مد حبوب اللقاح بالغذاء أثناء اكتمال تكوينها ، وعند تكون حبوب اللقاح تمر الخلايا الوالدة اللقاحية pollen mother cells بانقسام اختزالي ؛ فينشأ من كل منها أربع حبوب لقاح ، كل منها أحادية المجموعة الكروموسومية . وعند اكتمال نضج المتك يختفى الجدار الفاصل بين تجوييف كيس اللقاح فيصبح كل فص مشتملاً على تجوييف واحد .

يعتمد تفتح المتك على أمرين : الأول هو أن التغليظ الليفي في خلايا الطبقة الليفية لا يوجد بالجدر الخارجية ، والثاني هو أن الطبقة الليفية ينعدم وجودها على طول الخط الذي يفصل بين كيسى اللقاح في الفص ؛ فعندما تنضج حبوب اللقاح .. تجف طبقة البشرة الخارجية ، وكذلك الطبقة الليفية ؛ بسبب رقة جدرها الخارجية ، وتنكمشان ، ولكن نتيجة لتليف جدرها الأخرى .. فإنه يتولد ضغط ، يؤدي - في النهاية - إلى انشقاق المتك في منطقة الضعف ، وهي الخط الفاصل بين كيسى اللقاح في كل فص على الجانبين ، ويتبع ذلك التواء جدر الفص إلى الخارج ، بقوة تشبه قوة انكماش اللولب ؛ مما يؤدي إلى تحرير حبوب اللقاح .

يوجد لكل حبة لقاح جداران ، أحدهما خارجي exine سميك ، والآخر داخلي intine رقيق . يوجد بالجدار الخارجى عدد من المواقع الرقيقة ، تعرف باسم ثقبوب الإنبات pores . وتختلف الأنواع النباتية في شكل حبة اللقاح ، إلا أنها تكون - غالباً - كروية كما تختلف في شكل سطحها الخارجى .

وتنقسم نواة حبة اللقاح إلى نواتين تكون إحداهما كبيرة وتسمى النواة التناسلية generative nucleus ، والأخرى صغيرة وتسمى نواة الأنبوبة tube nucleus .

٣- المتاع :

يعد المتاع gynoecium هو عضو التأنيث ، وهو يتكون من كربلة واحدة ، أو عدد من الكرابل ، تتركب كل منها من المبيض ovary ، الذى يحتوى على البويضات ovules ، والقلم style الذى ينتهى بالميسم stigma ، وهو الجزء المعد لاستقبال حبوب اللقاح وتنشأ البويضات على نتوءات تبرز من السطح الداخلى للمبيض ، ويطلق على كل

منها اسم المشيمة placenta . وقد يتركب المتاع من كربلة واحدة ، أو من عدة كرابل منفصلة أو متحدة . وعندما يتركب المتاع من عدة كرابل متحدة .. فإنه يسمى متاعاً بسيطاً .

وقد يكون المبيض وحيد الغرفة وإن تعددت كرابل المتاع ، ويحدث ذلك عندما يكون اتحاد الكرابل عند حوافها المتجاورة خارجياً ، دون أن تلتقى فى المركز . وقد يتكون المبيض من عدة غرف locules عند التحام الجدر الداخلية للكرابل مع بعضها ، ويتساوى عدد الغرف فى هذه الحالة مع عدد الكرابل ، لكن الغرف قد تنشأ -أحياناً- نتيجة لنمو حواجز داخلية كاذبة من جدار المبيض ، كما فى ثمرة الكرنب .

تعرف طريقة توزيع المشيمات فى المبيض باسم الوضع المشيمى Placentation ، ويتساوى - غالباً - عدد المشيمات مع عدد الكرابل فى المتاع . ويتراوح عدد البويضات فى المبيض من بويضة واحدة إلى عدة مئات . وتتصل البويضة بالمشيمة بواسطة الحبل السرى funicle ، وهى تتركب من الكيس الجنينى embryo sac فى المركز يحيط به نسيج النيويسيلة nucellus . ويغطى نسيج النيويسيلة بغلافين بويضيين integuments ، ينفذ خلالهما ثقب ، يصل ما بين سطح البويضة الخارجى و سطح النيويسيلة ، ويعرف باسم النقير micropyle . ويلتحم الغلافان البويضيان مع النيويسيلة عند قاعدة البويضة فى منطقة تعرف باسم الكلازا chalaza .

يتوقف شكل البويضة على شكل الكيس الجنينى وموضع النقير كما يلى :

(أ) البويضة المستقيمة Orthotropus : يقع فيها الحبل السرى ، والكلازا ، والنقير على استقامة واحدة (ويكون الكيس الجنينى مستقيماً) ، ويكون النقير أبعد أجزاء البويضة عن المشيمة ، ويكون اتصال البويضة بالمشيمة عند الكلازا .

(ب) البويضة المقلوبة Anatropus : يقع فيها الحبل السرى ، والكلازا ، والنقير على استقامة واحدة كذلك ، إلا أن اتصال البويضة بالمشيمة يكون عند أحد جوانب الغلاف البويضى الخارجى ، ويقع النقير على جانب الحبل السرى مواجهاً للمشيمة .. وتلك هى أكثر أنواع البويضات شيوعاً .

(ج) البويضة الكلوية Campylotropous : يكون فيها الكيس الجنينى منحنيًا ، ويكون

اتصال البويضة بالمشيمة عند الكلازا ، ويقع التقير على جانب الحبل السرى مواجهها للمشيمة .

توصف الزهرة حسب وضع المتاع بالنسبة للمحيطات الزهرية الأخرى كما يلي :

(أ) تحت متاعية Hypogynous : يكون فيها التخت الزهرى محدباً قليلاً ، ويحمل المبيض على قمته ، بينما توجد بقية المحيطات الزهرية فى مستوى منخفض عن مستوى المبيض ؛ أى يكون المبيض علوياً .

(ب) محيطية المتاعية Perigynous : يكون فيها التخت الزهرى مفلطحاً ، وتترتب عليه الأجزاء الزهرية فى مستوى واحد تقريباً ، كما قد يكون التخت الزهرى مقعراً ، ويضم المبيض داخله ، ويكون مستواه منخفضاً عن مستوى بقية المحيطات الزهرية ، وتبقى الزهرة - بالرغم من ذلك - محيطية المتاعية ؛ لأن جدار المبيض لا يكون ملتصقاً مع التجويف الداخلى للتخت الزهرى .

(ج) فوق متاعية Epigynous : يكون فيها التخت الزهرى مقعراً ، ويحتوى على المبيض داخله ، ويكون الالتحام بينهما كاملاً ، أما بقية المحيطات الزهرية .. فإنها تكون فى مستوى مرتفع عن مستوى المبيض ؛ أى يكون المبيض سفلياً (عن عبد العزيز وآخرين ١٩٧٦) .

دورة الحياة فى النباتات الزهرية

تمر دورة حياة النباتات الزهرية بطورين ، هما :

١- الطور البوغى :

يعد الطور البوغى Sporophytic Generation الطور السائد فى النباتات الزهرية ، وهو يبدأ بالزيجوت ثنائى المجموعة الكروموسومية ، وينتهى بتكوين الأبواغ spores التى تكون أحادية المجموعة الكروموسومية .

٢- الطور الجاميطى Gametophytic Generation :

يُحمل هذا الطور على الطور البوغى فى كل من متوك الأزهار وأمتعتها ، وهو يبدأ بالأبواغ الأحادية المجموعة الكروموسومية ، وينتهى بالجاميطات gametes التى تكون

أحادية المجموعة الكروموسومية كذلك .

ونتناول - فيما يلي - خطوات عمليات تكوين الجاميطات المذكرة ، والمؤنثة ، والإخصاب ، وتكوين الجنين بشئ من التفصيل ؛ لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لتربية النبات .

تكوين الجاميطات المذكرة (حبوب اللقاح)

تتكون الجاميطات المذكرة - أى حبوب اللقاح - داخل الأكياس البوغية المذكرة microsporangia التى يوجد أربعة منها فى كل متك ، بواقع اثنين فى كل فص من فصى المتك. وتحتوى هذه الأكياس على خلايا النسيج البوغى archesporium ، التى تنقسم كل منها إلى خليتين بالانقسام الميتوزى . تستمر إحدى الخليتين الناتجتين فى الانقسام الميتوزى ، وتضم نواتج انقسامها إلى جدار الكيس البوغى المذكر ، بينما يتكون من الخلية الأخرى ومثيلاتها الخلايا البوغية المذكرة microspore mother cells (أو الخلايا الوالدة اللقاحية pollen mother cells) وهى ثنائية المجموعة الكروموسومية. ونظراً لأن نمو أنسجة جدار المتك يكون أسرع من نمو النسيج البوغى ؛ لذا .. يتكون فراغ داخلى يطلق عليه اسم كيس اللقاح pollen sac (يوجد منها أربعة أكياس فى كل متك) ، يكون مبطناً من الداخل بالخلايا الطرازية المغذية .

يبدأ تكوين حبوب اللقاح بانقسام كل خلية من الخلايا الوالدة المذكرة الموجودة فى كيس اللقاح انقساماً ميوزياً ؛ لتعطى أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية ، يطلق عليها اسم الأبواغ المذكرة . تبقى الأبواغ الأربعة الناتجة من كل خلية والدة مذكورة متصلة ببعضها بجدر دقيقة لفترة قصيرة ثم تستدير ، وتنفصل عن بعضها ؛ وبذلك .. ينتهى الطور البوغى ، ويبدأ الطور الجاميطى المذكر .




يلاحظ أن كل خلية بوغية مذكرة (حبة لقاح) تحاط بجدارين ، يكون الخارجى منهما سميكا ، وبه ثقب ، يختلف عددها تبعاً للنوع النباتى ، أما الجدار الداخلى .. فيكون غشائياً رقيقاً . وتتكون أنبوبة اللقاح pollen tube بنمو الجدار الداخلى ، من خلال أحد الثقوب التى توجد بالجدار الخارجى . ويسبق ذلك انقسام نواة الخلية البوغية المذكرة انقساماً ميوزياً ، معطيه نواتين ، تكون إحدهما صغيرة ، وتعرف باسم النواة

التناسلية generative nucleus ، والأخرى كبيرة ، وتعرف باسم النواة الخضرية vegetative nucleus ، أو نواة أنبوبة اللقاح pollen tube nucleus . كما تنقسم النواة التناسلية - بدورها - انقساماً ميتوزياً إلى نواتين تناسليتين ، لكن ذلك لا يحدث - فى كثير من النباتات - إلا بعد تكوين أنبوبة اللقاح . ويعنى ذلك أنه يوجد دائماً ثلاث أنوية أحادية المجموعة الكروموسومية فى حبة اللقاح عند إنباتها . وتكون النواة الخضرية فى المقدمة دائماً ؛ لأنها تنظم نمو أنبوبة اللقاح ، وإذا حدث لها أى ضرر .. يتوقف نمو أنبوبة اللقاح (شكل ٢- ٤) .


تكوين الجاميطات المؤنثة (البويضات)

تظهر النيوسيلة - عند بداية تكوين البويضة - على هيئة نتوء من المشيمة ، يتكون من مجموعة من الخلايا المتشابهة ، ثم تظهر عند قاعدة هذا النتوء حلقتان نسيجيتان ، تنموان لتكونا الغلافين البويضيين . تكبر إحدى خلايا النيوسيلة الواقعة تحت البشرة عند قمة النيوسيلة ، وتصبح خلية بوجية أمية archesporial cell . تنقسم هذه الخلية - ميتوزياً - إلى خليتين ، إحداها خارجية وتكوّن النسيج المغذى ، والأخرى داخلية .. وتصبح الخلية الوالدة للجرثومة الكبيرة megaspore mother cell ، وهى ثنائية المجموعة الكروموسومية ، وتدخل فى انقسام ميوزى ؛ لتعطى أربع خلايا مرتبة رأسياً ، تكون كل منها أحادية المجموعة الكروموسومية (شكل ٢- ٥) ؛ وبذا .. ينتهى الطور البوغى ، ويبدأ الطور الجاميطى المؤنث .

يبدأ الطور الجاميطى بكبر الخلية الأحادية الموجودة عند القطب الكلازى (المتجه إلى داخل النيوسيلة) ، بينما تتحلل الخلايا الثلاث الأخرى ، وتستنفذ محتوياتها بواسطة الخلية الطرفية ، التى تعرف - حينئذ - بالجرثومة الكبيرة Megaspore ، وهى التى يتكون منها الكيس الجنينى embryo sac . وتنقسم نواة الجرثومة الكبيرة (تسمى أيضاً نواة الكيس الجنينى) إلى ثلاثة انقسامات ميتوزية متتالية ، دون تكون جدر خلوية . يعطى الانقسام الأول نواتين ، تتحركان إلى القطبين المتضادين ؛ حيث تنقسم كل منهما مرتين ؛ بذا .. يتواجد عند كل قطب من قطبي الكيس الجنينى أربع أنوية ، مغمورة فى سيتوبلازم الكيس الجنينى ، تكون كل منها أحادية المجموعة الكروموسومية . تتحرك - بعد ذلك - نواة واحدة من كل مجموعة ، نحو وسط الكيس الجنينى ، ويكون الكيس - فى ذلك الوقت - محاطاً



شكل (٦-٤) : خطوات تكوين الجاميطات المذكرة (من Rost وآخرين ١٩٨٤).




شكل (٢ - ٥) : خطوات تكوين الكيس الجنيني والإخصاب المزدوج وتكوين الجنين : (١ - ٥) الخطوات من بداية ظهور الخلية الوالدة للجرثومة الكبيرة ومرورها بانقسام ميوزي إلى حين تكون الجرثومة الكبيرة ، (٦ - ١٢) تكوين الكيس الجنيني بثلاثة انقسامات ميتوزية متتالية ، (١٣ - ١٤) الإخصاب ، (١٥) انقسام اللاقحة إلى خليتين ، وانقسام نواة الإندوسبرم الابتدائية إلى عدة أنوية حرة (١٦) تكوين الجنين .. يظهر بالشكل جنين الذرة (عن Briggs & Knowles ١٩٧٦) .

بغلافين بويضيين ، توجد بهما فتحة دقيقة ، وهى النقيير ، تصبح إحدى الأنوية الثلاث الموجودة عند القطب النقيري البيضة egg الناضجة ، بينما تعرف النواتان الأخريان باسم النواتين المساعدتين synergids . وتعرف الأنوية الثلاث الموجودة فى القطب الآخر (القطب الكلازى) باسم الخلايا السمتية antipodal cells ، بعد أن تحاط كل منها بطبقة من السيتوبلازم وجدار خلوى . أما النواتان المركزيتان .. فإنهما تعرفان بالنواتين القطبيتين polar nuclei .

الإخصاب

تصبح البويضة مهيئة للإخصاب Fertilization عندما يكتمل تكوين الكيس الجنينى ، ويصاحب ذلك استعداد المياسم للتقليح ، بإفرازها سكريات ، ومواد غذائية أخرى ، وهرمونات ، وتبدأ أولى خطوات الإخصاب بعد وصول حبة اللقاح إلى الميسم (وهى العملية التى تعرف باسم التلقيح Pollination ، بامتصاصها لحاجتها من المركبات التى يفرزها الميسم ، ثم تنمو منها أنبوبة لقاح ، تنتقل إلى نهايتها النواة الأنبوبية وتليها النواة التناسلية ، التى تنقسم إلى نواتين ذكريتين male nuclei ، إن لم تكن قد انقسمت قبل ذلك . تنمو أنبوبة اللقاح خلال أنسجة الميسم والقلم (إما بين الخلايا ، وإما داخلها ، ويختلف ذلك من نوع نباتى إلى آخر) ، حتى تصل إلى البويضة . وتتراوح هذه المسافة من ٢, ٥ مم إلى ٤٠-٥٠ سم كما فى الذرة ، ويستغرق نموها من ساعات قليلة - فى معظم النباتات - إلى يوم ونصف فى الذرة ، إلى عدة أسابيع كما فى البلوط (رغم أن طول الميسم والقلم فيه لايتعدى ٣مم) . تشق أنبوبة اللقاح طريقها بعد ذلك نحو النقيير ، مستجيبة لجاذبية مادة تفرزها البويضة ، ويكون نموها أثناء ذلك على امتداد الجدار الداخلى للمبيض ، إلى أن تصل إلى الكيس الجنينى ، (شكل ٢-٦) . حينئذ .. تتلاشى النواة الأنبوبية ، ويتمزق طرف أنبوبة اللقاح التى تفرز محتوياتها من سيتوبلازم ونواتين ذكريتين داخل الكيس الجنينى . وتتحد إحدى النواتين الذكريتين مع نواة البيضة ؛ لتكونا اللاقحة zygote ، التى تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية ، وتتحد النواة الذكرية الثانية مع النواتين القطبيتين لتكوّن نواة الإندوسبERM الأولية ، التى تكون ثلاثية المجموعة الكروموسومية . وتعرف هذه العملية بالإخصاب المزدوج double fertilization . يلى ذلك .. اختفاء النواتين المساعدتين والخلايا السمتية ، ثم ينشأ الجنين ؛ بانقسام اللاقحة ، بينما تستنفذ النيوسيلة أثناء تكوين الجنين ، ويعمل الأنوسبERM على تغذية الجنين فى المراحل الأولى لتكوينه .




شكل (٦-٢) : أجزاء الزهرة وعملية الإخصاب .

تكوين الجنين

يبدأ تكوين الجنين (شكل ٢ - ٧) بعد عملية الإخصاب مباشرة ؛ حيث تنقسم اللاقحة إلى خليتين غير متساويتين ، تكون كبراهما هي الأقرب إلى النقيير ، وتسمى الخلية القاعدية ، وهي التي تعمل على تثبيت الجنين في بداية تكوينه ، أما الأخرى الصغيرة فإنها تنقسم عدة مرات ؛ لتكون صفاً من الخلايا . تعرف الخلية التي تقع في نهاية هذا الصف - أي أبعد الخلايا عن النقيير - بالخلية الجنينية embryonic cell ، وهي التي ينشأ منها الجنين الأصلي embryo proper ، بينما تتشرك بقية الخلايا مع الخلية القاعدية في تكوين المعلق suspensor ، الذي يدفع الخلية الجنينية في نسيج الإندوسبرم . وتتميز الخلايا العليا - البعيدة عن النقيير - الناشئة عن انقسام الخلية الجنينية إلى فصين ، يمثلان الفلقتين في نباتات نوات الفلقتين ، ويظهر بينهما تجويف ، تخرج منه الريشة plumule فيما بعد . أما الخلايا السفلية القريبة من النقيير .. فينشأ منها الجذير radicle ، والسويقة تحت الفلقة hypocotyl (السويقة الجنينية السفلى) . أما في النباتات نوات الفلقة الواحدة .. فإن الجنين يتكون من فلقة واحدة ، تقع على الجانب الملاصق للإندوسبرم ، ويحيط بكل من الجذير والريشة غمد . ويتكون الإندوسبرم - في الوقت نفسه - بانقسام نواة الإندوسبرم انقسامات سريعة متوالية ، يعقبها تكون جدر تغلف الأنوية ، وما يحيط بها من سيتوبلازم .. وإما أن يبقى الإندوسبرم خارج الجنين شاغلا جزءاً من البذرة فتوصف بأنها إندوسبرمية endospermic ، وإما أن يستنفذ أثناء تكوين الجنين - خاصة في تكوين الفلقات - فتوصف البذرة بأنها لإندوسبرمية . أما قصرة البذرة seed coat .. فإنها تتكون من الغلافين البويضيين (عبد الغزيز وآخرون ١٩٧٦) . ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتقدمة ، الخاصة بمراحل النمو النباتي ، من الزهرة إلى الثمرة ، من جوانبها التشريحية والتكوينية في Swamy & Krishnamurthy (١٩٨٠) .

ظاهرتا الزينيا والهيتازينيا

تعرف الزينيا Xenia بأنها : ظاهرة تأثير حبوب اللقاح على صفات البذور . ومن أبرز الأمثلة على ذلك .. تأثير حبوب اللقاح على صفات الإندوسبرم في الذرة . وتفسر هذه الظاهرة من خلال فهمنا لعملية الإخصاب المزدوج ؛ حيث تخصب إحدى النواتين الذكورتين



شكل (٧-٢) : خطوات مقارنة البذرة في كاسيات البذور (عن Weier وآخرين ١٩٨٤).

النواتين القطبيتين ؛ لتكون نواة الإندوسبرم . ويظهر تأثير حبة اللقاح عندما تحتوى النواة الذكرية على جين سائد لإحدى صفات الإندوسبرم ، بينما تكون النواتان القطبيتان متحتيتين فى تلك الصفة ؛ حيث تظهر الصفة السائدة فى الإندوسبرم المتكون . ولهذه الظاهرة أهمية خاصة فى حقول إنتاج المحصول التجارى ، وإنتاج البنور فى كل من الذرة السكرية ، والذرة الشامية ؛ فيؤدى تلقيح نباتات الذرة السكرية - التى تكون أصلية فى الجين المتنحى su ، الذى يجعل الإندوسبرم سكرياً - بحبوب لقاح من حقل ذرة شامية مجاور - تحمل الجين السائد Su الخاص بالإندوسبرم النشوى - إلى إنتاج حبوب يكون فيها الإندوسبرم ذا تركيب وراثى Su su su ، ونشويلاً لا يصلح للاستعمال كذرة سكرية ، بينما يكون جنين البذرة ذا تركيب وراثى خليط Su su ؛ وبذا .. لاتصلح البنور هى الأخرى كتنافى ذرة سكرية . ويحدث الشئ ذاته عند تلقيح صنف من الذرة (الشامية أو السكرية) ذى بنور بيضاء بحبوب لقاح من صنف ذى بنور صفراء ؛ لأن جين اللون الأصفر سائد على جين اللون الأبيض . ومن الأمثلة الأخرى لظاهرة الزينيا .. تأثير حبة اللقاح على لون طبقة الأليرون alerone layer فى الذرة ؛ حيث يكون اللون القرمزى هو السائد ، وعلى شكل نواة ثمرة التمر ، وعلى صفات الجنين فى بعض الأحيان .

أما الميتازينيا Metaxenia فتعرف بأنها : ظاهرة تأثير حبة اللقاح على صفات أنسجة الثمرة ، وهى أنسجة أمية كلية ، ومن أمثلتها .. تأثير حبوب اللقاح على شكل الثمار فى التمر ، وحجمها ، وموعد نضجها . ومن الطبيعى أنه لا يمكن تفسير هذه الظاهرة على أساس الإخصاب المزدوج ، بصورة مباشرة ؛ لأن أنسجة الثمرة تكون أمية . إلا أن W.Swingle عزاها إلى ذلك - ولكن بصورة غير مباشرة - بالنظر إلى أن الجنين والإندوسبرم ربما يفرزان - أثناء نموهما وتطورهما - هرمونات أو مواد شبيهة بالهرمونات ، يمكن أن تنتشر فى الأنسجة المحيطة بهما ؛ لتحداث التأثير المشاهد (بغدادى ١٩٥٥ ، Elliott ١٩٥٨) .

التلقيح وأهميته فى تربية النبات

تتحدد كثير من الأمور فى برنامج التربية ، كما تتحدد طريقة التربية ذاتها بطريقة التلقيح الشائعة فى الطبيعة للمحصول المراد تربيته ؛ لذا .. فإن دراسة هذا الأمر - بشئ من التفصيل - يعد أمراً ضرورياً للمربى .

تقسم المحاصيل الاقتصادية التي تتكاثر جنسياً - حسب التلقيح السائد - إلى ثلاث مجموعات كما يلي :

- ١- ذاتية التلقيح Self-pollinated .. وهي التي تقل فيها نسبة التلقيح الخلطي غالباً عن ١٪ ، وإن كانت تصل -أحياناً- إلى ٥٪ .
- ٢- خلطية التلقيح جزئياً Partially cross-pollinated .. وهي التي تزيد فيها نسبة التلقيح الخلطي على ٥٪ ، وقد تصل إلى ٩٠٪ .
- ٣- خلطية التلقيح بدرجة عالية .. وهي التي تزيد فيها نسبة التلقيح الخلطي على ٩٠٪ .

وقد جرى العرف على تقسيم النباتات إلى نباتات ذاتية التلقيح ، ونباتات خلطية التلقيح ، إلا أن تمييز فئة النباتات الخلطية التلقيح جزئياً ذو أهمية خاصة للمربي ؛ لأنها لاتتأثر كثيراً - وربما لاتتأثر مطلقاً - بالتربية الداخلية inbreeding (وهي عملية التلقيح الذاتي الصناعي الذي يقوم به المربي) ، بينما تتدهور النباتات التي تزيد فيها نسبة التلقيح الخلطي على ٩٠٪ ، بدرجة متوسطة إلى شديدة بالتربية الداخلية ، ولكل ذلك اعتبارات ، لها أهميتها عند اختيار طريقة التربية المناسبة للمحصول ، كما سيأتى بيانه فى فصول لاحقة.

التلقيح الذاتى والعوامل المؤثرة عليه

يعرف التلقيح الذاتى self-pollination الطبيعى (أو autogamy) بأنه انتقال حبوب اللقاح من متوك الزهرة إلى ميسم الزهرة نفسها . أما من وجهة نظر المربي .. فإن التلقيح الذاتى يتسع ليضم - أيضاً - حالات انتقال حبوب اللقاح ، من متوك الزهرة إلى ميسم أية زهرة أخرى على نفس النبات ، (تعرف هذه الحالة باسم geitonogamy) ، أو أية زهرة من أى نبات آخر من السلالة الخضرية ذاتها ؛ لأن جميع نباتاتها تكون متماثلة تماماً فى تركيبها الوراثى . ويبدو أن حالات التلقيح الذاتى تعد أكثر تطوراً من حالات التلقيح الخلطى . يتطلب حدوث التلقيح الذاتى أن تحتوى الزهرة على أعضاء التذكير وأعضاء التأنث مبعاً ، وهو ما يعرف باسم bisexuality ، وأن تنضج أعضاؤها الجنسية فى وقت واحد ، وهو ما يعرف باسم homogamy .

إن التلقيح الذاتى التام لأمر نادر الوجود ؛ حيث تحدث -غالباً- نسبة من التلقيح

الخلطى ، قد تصل إلى ٥ ٪ ، وأهم الظواهر التى تساعد على حدوث التلقيح الذاتى ما يلى :

١- عدم تفتح الزهرة إلا بعد حدوث التلقيح والإخصاب ، وهى الظاهرة التى تعرف باسم Cleistogamy . وتعد هذه الظاهرة قليلة الانتشار ، وهى توجد فى أزهار النورات القاعدية لنبات عشب كاليفورنيا الأزرق California blue grass (واسمه العلمى *Danthonia californica*) ، وهى النورات التى تختفى - كلية - تحت غمد الورقة ، إلى أن تنضج البنور .

٢- حدوث تطورات معينة فى الأزهار - أثناء عمليتى التلقيح والإخصاب - ، تحدث بموجبها عملية التلقيح الذاتى ، وتعرف هذه الحالات باسم Effective Cleistogamy ، وهى أكثر شيوعاً من الحالة السابقة . وهى توجد - على سبيل المثال - فى القمح حيث تفرغ المتوك محتوياتها من حبوب اللقاح ، قبل أن تبرز من الزهرة ؛ وبذا .. فإنها تكون فارغة ، ولا تتوفر - من ثم - أية فرصة لحدوث تلقيح خلطى . كما يكون التلقيح الذاتى شبه مؤكد فى الطماطم ، على الرغم من أنه لا يحدث إلا بعد تفتح الزهرة ؛ ذلك لأن المتوك تلتحم معا وتكون أنبوبة متكية ، تحيط بالقلم والميسم إحاطة تامة ، وتمنع بموجبها أية فرصة للتلقيح الخلطى . إلا أن استطالة القلم ، ووصول الميسم إلى قمة الأنبوبة المتكية ، أو بروزه منها (وهو ما يحدث بصورة طبيعية فى بعض السلالات البرية من الطماطم ، وبعض الأنواع القريبة من الجنس *Lycopersicon* ، ونتيجة لتأثير بعض العوامل البيئية فى الأصناف التجارية) تؤدي إلى حدوث نسبة من التلقيح الخلطى عند توفر الحشرات الملقحة . وأهم وسائل انتقال حبوب اللقاح - فى حالات التلقيح الذاتى - هى التلامس بين المياسم والمتوك المتفتحة ، وقوة الجاذبية الأرضية ، عندما تكون المياسم فى مستوى أدنى من مستوى المتوك .

تتأثر نسبة التلقيح الخلطى فى النباتات الذاتية التلقيح بالعوامل التالية :

- ١- مدى توفر الحشرات الملقحة ودرجة نشاطها .
- ٢- مدى وجود التيارات الهوائية ، التى تساعد على انتشار حبوب اللقاح فى بعض النباتات .
- ٣- درجة الحرارة السائدة ؛ حيث قد يؤدي انخفاض الحرارة إلى أقل من درجة التجمد بقليل إلى موت حبوب اللقاح دون التأثير على البويضات ؛ مما يزيد من فرصة حدوث التلقيح الخلطى .

وترجع أهمية التلقيح الذاتي التام إلى مايلي :

- ١- يمنع التلقيح الذاتي التام حدوث خلط وراثي بين التراكيب الوراثية المرغوب فيها ، وغيرها من التركيب الوراثية ؛ وبذا .. يساعد على حفظ صفات الأصناف ، والسلالات ، والنباتات المنتجة .
 - ٢- يؤدي التلقيح الذاتي إلى الإبقاء على الطفرات الضارة ، محصورة في نسل النبات الذي ظهرت فيه الطفرة فقط .
 - ٣- كما يؤدي التلقيح الذاتي المستمر إلى سرعة اختفاء الطفرات الضارة المتنحية ، وسيأتى شرح الأساس الوراثي لذلك في فصل لاحق .
- ومن أمثلة النباتات الذاتية التلقيح ما يلي :

- ١- محاصيل الحقل : القمح - الأرز - الزمير - الشعير - الكتان - الدخان - الفول السوداني - فول الصويا .
- ٢- محاصيل الخضر : الخس - الهندباء - الطماطم - البسلة - الفاصوليا العادية - اللوبيا - فاصوليا المنج .
- ٣- الفاكهة : الأصناف المحلية من التفاح والكمثرى والخوخ - معظم الأصناف الأجنبية من الخوخ- بعض أصناف البرقوق الأوروبي واللوز - أصناف قليلة من البرقوق الياباني - معظم أنواع الموالح - السفرجل - النكتارين - المشمش - الكرز المر - العنب الأوروبي - العنب الأمريكي - الرمان - الجوافة - البشملة (Allard ١٩٦٤ ، Chaudhari ١٩٧١ ، عبد العال ١٩٧٧) .

التلقيح الخلطي والعوامل المؤثر عليه

يعرف التلقيح الخلطي cross-pollination أو allogamy بأنه انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة على نبات آخر . وتوجد أربع وسائل رئيسية لانتقال حبوب اللقاح من المتوك إلى المياسم في حالات التلقيح الخلطي ، هي : الانتقال بالماء hydrophily في النباتات المائية ، وبالحيوانات zoophily ، وبالهواء anemophily ، وبالحشرات entomophily . وتعد الوسيلتان الأخيرتان أهم وسائل التلقيح الخلطي في النباتات الاقتصادية ، ولكل من النباتات الهوائية التلقيح والحشرية التلقيح خصائصها المميزة .

تتميز النباتات الهوائية التلقيح بأنها تنتج أعداداً ضخمة من حبوب اللقاح الصغيرة الجافة ، كما تتميز بأن أزهارها صغيرة وغير مميزة ، كما تكون مياسمها طويلة ، ومتفرعة ، أو ريشية ؛ بغرض زيادة فرصة وصول حبوب اللقاح إليها ، ومن أمثلتها .. نباتات البكان ، والجوز ، والفسق ، والزيتون ، والكستنا (أبوفرو) ، والبندق ، والسبانخ ، والبنجر والسلق ، والذرة . يعتمد نجاح التلقيح في هذه النباتات على إنتاجها أعداداً هائلة من حبوب اللقاح ؛ فنجد - مثلاً - أن نبات الذرة الواحد ينتج نحو ٢٥ مليون حبة لقاح ، أو حوالي ٢٥ ألف حبة لقاح لكل بويضة في النورة المؤنثة ، أو حوالي ٦٨٠٠ حبة لقاح لكل سنتيمتر مربع من سطح الأرض بالحقل .

أما النباتات الحشرية التلقيح .. فإما أن تكون أزهارها ذات بتلات كبيرة ملونة ، وإما أن تكون لها قنابات كبيرة ملونة لجذب الحشرات ، كما أنه توجد بها غدد رحيقية ، تفرز سكريات ، ومواد أخرى لجذب الحشرات . توجد هذه الغدد في مكان معين من الزهرة ، يسمح بأن يلامس جسم الحشرة ميسم الزهرة ، عندما تقوم الحشرة بجمع حبوب اللقاح التي تكون كبيرة غالباً ، ولزجة أحياناً ، ومن أمثلتها : عباد الشمس ، والقرطم ، والقنب ، والخرشوف ، والبقدونس ، والروبارب ، والكرنب ، والبصل ، والجزر ، والقرعيات ، ومعظم أصناف البرقوق اليابانية والأمريكية ، والأزاليا ، والبنفسج ، وبعض أصناف الخوخ ، والكاكي ، والسابوتا .

يتأثر التلقيح الحشري بعدة عوامل ، من أهمها ما يلي :

- ١- مدى تواجد الحشرات الملقحة ، وأعدادها بالنسبة للأزهار .
- ٢- العوامل البيئية التي تؤثر في درجة نشاط الحشرات الملقحة . وتعد درجة الحرارة أهم هذه العوامل ؛ حيث ينخفض نشاط النحل بشدة في درجة حرارة ١٠°م ، ولا يمكنه الطيران في درجة حرارة ٤°م ، بينما يزداد نشاطه -تدريجياً- بارتفاع الحرارة عن تلك الحدود .
- ٣- العوامل الوراثية التي يكون لها تأثير مباشر في نسبة التلقيح الخلطي من خلال تأثيرها في موضع الأزهار ، والحجم النسبي للأعضاء الجنسية في الزهرة ، وسرعة الإزهار ووقت تفتح الزهرة ، ومدى جاذبيتها للحشرات (عن Fryxall ١٩٥٧) ؛ فنجد - على سبيل المثال - أن نسبة التلقيح الخلطي تختلف في أصناف فاصوليا الليما من أقل من ١٪

لتصل إلى ١٠٠٪ ؛ ويرجع ذلك إلى الاختلافات الوراثية بين الأصناف ، كما تتأثر النسبة في الصنف الواحد باختلاف الظروف البيئية . كذلك يعرف جين واحد مُتَنَحٍ في فول الصويا ، يقلل من حيوية حبوب اللقاح ؛ مما يؤدي إلى زيادة نسبة التلقيح الخلطي من أقل من ١٪ ليصل إلى نحو ١٠٪ (Bernard & Jaycox ١٩٦٩) .

ويحدث التلقيح الخلطي في النباتات ؛ نتيجة لتمييزها بظواهر معينة ، تزيد بعضها من فرصة حدوث التلقيح الخلطي ، ويحتم البعض الآخر حدوثه كما يلي :

١- الظواهر التي تحتم حدوث التلقيح الخلطي :

يكون من المحتم حدوث التلقيح الخلطي في الحالات التالية ؛ نظرا لاستحالة حدوث التلقيح الذاتي في أى منها :

- (أ) عندما يكون المحصول وحيد الجنس ثنائى المسكن dioecious ، أى توجد منه نباتات مذكرة ، وأخرى مؤنثة كما فى نخيل التمر ، والسبانخ ، والهليون .
- (ب) عندما توجد ظاهرة العقم الذكري male sterility ؛ حيث لا يكون النبات قادراً على إنتاج حبوب لقاح ، أو أنه ينتج حبوب لقاح ضامرة ، وعديمة الحيوية .
- (ج) عندما توجد ظاهرة عدم التوافق الذاتى self-incompatibility ؛ حيث ينتج النبات حبوب لقاح خصبة ، إلا أنها تكون غير قادرة على إخصاب بويضات الزهرة نفسها أو أية زهرة أخرى على النبات نفسه .

٢- الظواهر التي تزيد من فرصة حدوث التلقيح الخلطي :

تزيد الظواهر التالية من فرصة حدوث التلقيح الخلطي ، ولكنها لا تحتم حدوثه :

- (أ) ظاهرة استعداد المياسم للتلقيح ، وانتثار حبوب اللقاح بعد تفتح الزهرة Chasmogamy .

(ب) ظاهرة اختلاف مواعيد نضج أعضاء الزهرة الجنسية Dichogamy ، كأن تنضج المتوك ، وتنتثر حبوب اللقاح قبل استعداد المياسم لاستقبالها ، وهى الظاهرة التى تعرف باسم Protandary ، كما فى الجزر والبنجر ، أو أن تستعد المياسم لاستقبال حبوب اللقاح قبل تفتح المتوك ، وهى الظاهرة التى تعرف باسم Protogyny ، كما فى الأفوكادو . وعلى

الرغم من أن التلقيح الذاتى للزهرة الواحدة غير ممكن فى كلتا الحالتين .. إلا أنه لا يوجد ما يمنع من حدوث التلقيح بين أزهار مختلفة من النبات نفسه .

(ج) عندما يختلف مستوى الميسم ، بالنسبة لمستوى المتوك فى الزهرة الواحدة ، وهى الظاهرة التى تعرف باسم Heterostyly .

(د) عندما يكون المحصول وحيد الجنس ، وحيد المسكن Monoecious ، وهى الحالة التى يحمل فيها نفس النبات أزهاراً مذكرة ، وأخرى مؤنثة ، وهو الأمر الذى يزيد -كثيراً- من فرص حدوث التلقيح الخلطى ، ولكنه لا يمنع حدوث التلقيح الذاتى بين الأزهار المختلفة على النبات ذاته .

(هـ) وجود ظواهر خاصة ، أو عوامل وراثية معينة ، فى أصناف دون غيرها ، كما سبق بيانه بالنسبة لفاصوليا الليما ، وفول الصويا . ومن أمثلة الظواهر الخاصة بالمحصول .. أن ميسم الزهرة فى البرسيم الحجازى لا يمكنه استقبال حبوب اللقاح ، إلا بعد أن يتمزق الغشاء الذى يحيط به ؛ حيث تنمو الأسدية والمتاع داخل ورقة زهرية غشائية ، تحيط بهم تحت ضغط كبير ، إلى أن يتمزق هذا الغشاء بفعل حركة النحل عليه . حينئذ .. يندفع الميسم والأسدية نحو الخارج ؛ مما يؤدى إلى التصاق بعض حبوب اللقاح بجسم النحلة ، وهو ما يساعد على حدوث التلقيح الخلطى حينما يزور النحل أزهاراً أخرى . يعد التلقيح الخلطى أكثر شيوعاً فى المملكة النباتية من التلقيح الذاتى ، وفيما يلى .. أمثلة لحالات التلقيح الخلطى المختلفة :

١- محاصيل خلطية التلقيح جزئياً ، وهى التى تتراوح فيها نسبة التلقيح الخلطى من ٥ إلى ٩٠٪ ، ومن أمثلتها القطن و الذرة الرفيعة و الفلفل والباذنجان والكرفس والفول الرومى و فاصوليا الليما والخيار والكوسة والشمام والبطيخ والشليك (وتعد المحاصيل الخمسة الأخيرة وحيدة الجنس ؛ وحيدة المسكن) .

٢- محاصيل خلطية التلقيح بدرجة عالية ، وهى التى تزيد فيها نسبة التلقيح الخلطى على ٩٠٪ ، ومن أمثلتها ما يلى :

(أ) نباتات وحيدة الجنس ثنائية المسكن ؛ مثل : السبانخ والهليون والفسق والباباؤ والنخيل .

(ب) نباتات وحيدة الجنس وحيدة المسكن ؛ مثل : الذرة والبكان والبندق وأبو فروة والعنب والجوز .

(ج) نباتات غير متوافقة ذاتياً أو كلياً ؛ مثل : الزيتون ومعظم الأصناف الأمريكية من التفاح والكمثرى ومعظم أصناف البرقوق اليابانى والأوروبى والكريز الحلو وبعض أصناف اللوز والمانجو والزبدية (الأفوكادو) واللوز والكرب والقنبيط وكرنب بروكسل والبروكولى والكولارد والكرب الصينى والكيل وكرنب أبوركبة والفجل واللفت والروتاباجا والبنجر والشيكرى والبطاطا والشليم .

(د) نباتات يوجد فيها تفاوت فى موعد نضج الأعضاء الجنسية بالزهرة ؛ مثل : الجزر والبصل .

وتوجد - بالإضافة إلى ماسبق بيانه - محاصيل يعتمد إنتاجها الاقتصادى على الإنسان الذى يقوم بعملية التلقيح الصناعى لها ؛ مثل النخيل ، والقشطة ، وبعض أصناف الجوز والبكان ، وبعض أصناف التين (وهو وحيد الجنس ثنائى المسكن) . كما توجد فواكه تتوالد بكرياً ، ولا تحتاج إلى تلقيح ؛ مثل الموز (وهو وحيد الجنس وحيد المسكن) وبعض أصناف التفاح والكمثرى والكاكى و الجميز و الأناناس (Allard ١٩٦٤ ، Bleasdale ١٩٧٣ ، عبد العال ١٩٧٧) . ولزيد من التفاصيل عن طرق التكاثر وأسباب حدوث التلقيح الخلقى فى النباتات المزروعة .. يراجع Fryxall (١٩٥٧) .

تقدير نسبة التلقيح الخلطى

يتطلب الأمر لتقدير نسبة التلقيح الخلطى فى محصول ما .. أن تفحص الأجزاء الزهرية للنباتات - أولاً - لتعرف إن كان بها أية ظاهرة من الظواهر التى تحتم التلقيح الذاتى ، أو تشجع عليه ، أو تلك التى تحتم التلقيح الخلطى ، أو تشجع عليه . كما تفيد زراعة النباتات التى تكون أزهارها كاملة (أى التى تكون بها أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث) مفردة فى معزل ، أو تكييسها ؛ لمنع وصول الحشرات الملقحة إليها ؛ لأنها إن لم تعقد بنوراً تحت هذه الظروف .. فإن ذلك يعنى أنها خلطية التلقيح فى الطبيعة ، أما إذا عقدت بدوراً .. فإن ذلك يعنى أن التلقيح الذاتى ممكن ، ولكنه ربما لا يكون هو القاعدة تحت الظروف الطبيعية . وأفضل الأمثلة على ذلك .. النباتات الوحيدة الجنس ، الوحيدة المسكن الهوائية التلقيح ؛ فهذه النباتات قد تعقد بنوراً إذا زرعت فى معزل عن بعضها ، رغم أنها تكون خلطية التلقيح فى الطبيعة .

وتقدر نسبة التلقيح الخلطى فى محصول ما باختيار صنفين ، يتفقا فى موعد إزهارهما ، ويختلفان فى إحدى الصفات الوراثية البسيطة ، التى تعطى تأثيراً مظهرياً واضحاً فى طور البادرة ، ويزرعان متجاورين فى خطوط متبادلة . وتفضل أن تكون زراعتهما بالتبادل فى نفس الخط ، وفى الخطوط المتجاورة ؛ بحيث يكون كل نبات - من أى من الصنفين - محاطاً من الجهات الأربع بنباتات من الصنف الآخر . وتحصد البنور فى نهاية الموسم من نباتات الصنف الذى يحمل الصفة المتنحية ، ثم تزرع فى الموسم التالى ؛ فتكون كل النباتات الحاملة للصفة السائدة قد جاءت بذورها من تلقيح خلطى . وتحسب نسبة التلقيح الخلطى على حساب أنهما ضعف نسبة النباتات ، التى تكون حاملة للصفة السائدة ؛ ذلك لأن نباتات كل صنف تمثل نصف عدد النباتات فى الحقل ؛ فإذا وصل نبات معين من الصنف الذى يحمل الصفة المتنحية (aa) ١٠٠ حبة لقاح من الصنف الذى يحمل الصفة السائدة (AA) .. فمن المتوقع أن يصل إليه - أيضاً - ١٠٠ حبة لقاح من النباتات الأخرى التى تحمل الصفة المتنحية (وهو ما يعد تلقيحاً خلطياً كذلك) ، إلا أن التلقيح الخلطى مع النباتات التى تحمل الصفة السائدة .. يعطى نسباً ذات تركيب وراثى Aa ، تظهر به الصفة السائدة ، بينما يعطى التلقيح الخلطى - مع النباتات التى تحمل الصفة المتنحية - نسباً ذات تركيب وراثى aa ، لا يمكن تمييزه عن النسل الناتج من التلقيح الذاتى .

الجنس فى النباتات

حالات الجنس

إن الأزهار إما أن تكون خنثى hermiphraditic (أيضاً bisexual ، و perfect و monoclinous) ، وإما أن تكون مذكرة staminate (أيضاً : male) ، وإما تكون مؤنثة pistillate . (أيضاً : female ، و carpellate) . أما النباتات .. فإنها تقسم - حسب حالة الجنس - إلى الفئات التالية :

١- نباتات تحمل أزهاراً كاملة فقط ؛ مثل : التفاح والكمثرى والخوخ والبرقوق والليمون والبرتقال واللوز والكرونب والفجل والجزر والكرفس والبطاطا والطماطم والفلفل والباذنجان والفول والبامية والبسلة والورد والأراولا والقرنفل والبنفسج والقمح والأرز .

- ٢- نباتات وحيدة الجنس وحيدة المسكن monoecious ، أى تحمل أزهاراً مذكرة ، وأخرى مؤنثة ؛ مثل : البكان والجوز والبندق وأبو فرودة والخيار والكوسة والذرة .
- ٣- نباتات تحمل أزهاراً كاملة ، وأخرى مذكرة andromonoecious ، كما فى بعض أصناف القاوون والبطيخ .
- ٤- نباتات تحمل أزهاراً كاملة وأخرى مؤنثة gynomonoecious كما فى بعض سلالات القرعيات .
- ٥- نباتات تحمل أزهاراً كاملة ، وأزهاراً مؤنثة ، وأزهاراً مذكرة trimonoecious كما فى بعض سلالات القرعيات .
- ٦- نباتات تحمل أزهاراً مذكرة فقط ، كما فى بعض سلالات الخيار .
- ٧- نباتات تحمل أزهاراً مؤنثة فقط ، كما فى بعض أصناف الخيار .

وبالإضافة إلى ماتقدم .. فإن العشائر النباتية لمحصل ما .. قد تكون من أى من الفئات السابقة الذكر (من ١-٧) ، أو قد تتكون العشيرة من نباتات مذكرة ، وأخرى مؤنثة أى تكون وحيدة الجنس ثنائية المسكن dioecious (كما فى السبانخ والهليون ونخيل التمر والكاكى وبعض أصناف عنب البسكات) ، أو قد تتكون من نباتات مذكرة ، ونباتات تحمل أزهاراً كاملة ؛ أى تكون androdioecious ، أو تتكون من نباتات مؤنثة ، ونباتات تحمل أزهاراً كاملة ؛ أى تكون gynodioecious (Frankel & Galun ١٩٧٧) .

وراثة الجنس فى النباتات

تتنوع حالات تعيين ووراثة الجنس فى النباتات كما يلى :

١- السبانخ :

يتحدد الجنس فى السبانخ بكموسومى الجنس X ، و Y ؛ حيث تكون النباتات المؤنثة XX و المذكرة XY . كما توجد جينات محوذة على الكروموسومات الأخرى للنبات (وهى الكروموسومات الجسمية autosomes) ، يؤدى وجودها إلى ظهور حالات جنسية وسطية بين النباتات المذكرة والمؤنثة (عن Duvic ١٩٦٦) .

٢- الخيار المؤنث gynoecious cucumber :

يؤدى وجود عامل وراثى واحد سائد إلى تحويل الخيار من نبات وحيد الجنس وحيد

المسكن إلى نبات ينتج أزهاراً مؤنثة فقط .

٢- الهليون :

يعد الهليون من النباتات الوحيدة الجنس الثنائية المسكن . وتبعاً لدراسات Rick & Hanna (عن Ellison ١٩٨٦) .. فإن جنس الهليون يورث كما لو كان محكوماً بعامل وراثي واحد سائد لصفة الذكورة . كما أمكن التعرف على اختلافات سيتولوجية فى زوج الكروموسوم الخامس للنبات ، ترتبط بحالة الجنس ؛ وبذا .. تعرف النباتات المؤنثة بأنها XX ، بينما تعرف النباتات المذكرة بأنها XY .

٤- الذرة :

تعد الذرة نباتاً وحيد الجنس ، وحيد المسكن . وقد ظهرت طفرة متنحية ، يؤدى وجودها فى حالة أصيلة bs bs إلى أن تصبح القولحة خالية من البذور barren stalk ، وتكون النورة المؤنثة خالية من الحرية ، ومبايض أزهارها عقيمة ، ولا تنتج بها حبوب ؛ وبذا .. يصبح النبات مذكراً . كما ظهرت طفرة متنحية أخرى ، يؤدى وجودها فى حالة أصيلة كذلك ts ts إلى استبدال الأزهار فى النورة المذكرة بأزهار مؤنثة ، وينتج فيها حبوب ؛ وبذا .. يصبح النبات مؤنثاً ، وينتج حبوباً فى النورتين : الجانبية ، والطرفية . ويتفوق الجين ts فى تأثيره على الجين bs ؛ بحيث يمكن تمييز التراكيب الوراثية والأشكال المظهرية التالية :

الشكل المظهر	التركيب الوراثي
وحيد الجنس وحيد المسكن	Bs - Ts -
مذكر	bs bs Ts -
مؤنث	Bs - ts ts
مؤنث	bs bs ts ts

ويعنى ذلك .. أنه يمكن إنتاج سلالة من الذرة وحيدة الجنس ثنائية المسكن ، تكون فيها النباتات المذكرة bs bs TS ts ، والمؤنثة bs bs ts ts ، ويكون النبات المذكر هو المسئول عن تعيين الجنس ؛ لأنه ينتج نوعين من الجاميطات . ويؤدى الإكثار من هذه السلالة إلى

المحافظة على نفس النسبة الجنسية فى النسل بشكل دائم (عن Burns ١٩٨٢) .

ويمكن الرجوع إلى مزيد من التفاصيل عن وراثة الجنس فى النباتات الوحيدة الجنس
الثانية المسكن فى Westergaard (١٩٥٨) .

النسبة الجنسية وأهميتها

يعد عدد العقد على الساق - حتى ظهور أول زهرة مؤنثة ، أو خنثى فى القرعيات - من الصفات الوراثية الثابتة لكل صنف ، وكلما قربت أول عقدة تحمل زهرة مؤنثة ، أو خنثى من قاعدة الساق .. دل ذلك على ارتفاع نسبة الأزهار المؤنثة ، أو الخنثى إلى الأزهار المذكرة . وكل العوامل التى تزيد نسبة الأزهار المؤنثة تؤدى بطبيعة الحال إلى ظهور أول زهرة مؤنثة على عقدة أقرب لقاعدة الساق . وعلى العكس من ذلك .. فإن كل العوامل التى تزيد من نسبة الأزهار المذكرة .. تؤدى إلى ظهور أول زهرة مؤنثة على عقدة بعيدة عن قاعدة الساق . وترجع أهمية النسبة الجنسية إلى أن الأزهار المؤنثة هى التى تنتج الثمار ، وهى تتأثر بحالة النبات ، وبالظروف البيئية ، ومعاملات منظمات النمو .

فكلما كثر عدد الثمار التى يحملها النبات فى وقت واحد .. اتجه النبات نحو تكوين أزهار مذكرة . ونجد - بصفة عامة - أن ظروف الحرارة المنخفضة ، والإضاءة الضعيفة ، والنهار القصير .. تؤدى إلى زيادة نسبة الأزهار المؤنثة ، بينما تؤدى ظروف الحرارة المرتفعة ، والإضاءة العالية ، والنهار الطويل إلى زيادة نسبة الأزهار المذكرة .

وتؤدى معاملة نباتات القرعيات - فى طور مبكر من النمو بالماليك هيدرازيد بتركيز ٢٥٠ - ٥٠٠ جزء فى المليون ، أو بالأوكسينات مثل نفثالين حامض الخليك NAA بتركيز ١٠٠ جزء فى المليون ، و ٢ ، ٣ ، ٥ - ثلاثى يوديد حامض البنزويك triiodobenzoic acid - 2,3,5 بتركيز ٢٥ جزء فى المليون - إلى زيادة نسبة الأزهار المؤنثة ، إلا أن أكثر منظمات النمو تأثيراً فى هذا الشأن هو الإيثيفون Ethephon ؛ حيث تؤدى رشته واحدة أو عدة رشات منه - بتركيز ١٢٥ - ٢٥٠ جزء فى المليون فى مراحل نمو وتكوين الورقة الحقيقية الأولى حتى الخامسة - إلى إحداث زيادة جوهرية فى نسبة الأزهار المؤنثة أو الكاملة ، بينما يقل - أو ينعدم - ظهور الأزهار المذكرة على العقد الخمس عشرة الأولى ، ثم تعود النباتات إلى حالتها الطبيعية بعد ذلك .

وتؤدى هذه المعاملة إلى زيادة المحصول المبكر ، والمحصول الكلى فى القرعيات ، خاصة فى المحاصيل التى تقطف ثمارها وهى صغيرة ؛ مثل الكوسة والخيار ، كما يمكن الاستفادة من التأثير الذى تحدثه هذه المعاملة عند إنتاج هجن القرعيات ؛ حيث تعامل نباتات خطوط الأمهات ، وتتخذ البنور من الثمار التى تعقد أولاً (de Wilde ١٩٧٨)

وعلى العكس من التأثير الذى تحدثه منظمات النمو الى سبق ذكرها .. فإن معاملة القرعيات بحامض الجبريلليك GA₃ ، وبعض الجبريلينات الأخرى .. يؤدى إلى إحداث زيادة كبيرة فى نسبة الأزهار المذكرة . وتفيد هذه المعاملة عند إكثار بذور الأصناف المؤنثة gynoeceious ؛ حيث تؤدى إلى جعل هذه الأصناف وحيدة الجنس وحيدة المسكن فى مراحل نموها الأولى ؛ وبذلك .. يمكن أن تعقد الثمار ، وتتكون فيها بنور تحمل أجنثتها الصفة الوراثية للنباتات المؤنثة لزراعتها تجارياً . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأصناف ، إما أنها تعقد بكرياً ؛ فلاتحتاج إلى ملقحات فى الحقول التجارية ، وإما أن بذورها تخلط بنسبة ١٠-١٢٪ ببذور سلالة أخرى من الصنف نفسه ، ولكنها تكون وحيدة الجنس وحيدة المسكن ؛ لتوفير حبوب اللقاح اللازمة للتلقيح .

الفصل الثالث

الأساس الوراثى للعشائر النباتية

تعرف العشيرة Population بأنها أية مجموعة من الكائنات تنتمى إلى نوع واحد وتعيش مجتمعة ، أو تشترك فيما بينها فى صفة أو أكثر ؛ فتطلق - مثلاً - كلمة عشيرة على جميع الأسماك التى تنتمى إلى نوع واحد ، وتوجد مجتمعة فى بحيرة ، وعلى جميع النباتات التى تنتمى إلى نوع معين ، وتنمو برياً فى منطقة جغرافية معينة ، وقد كانت تلك أمثلة للعشائر الطبيعية natural populations . كما تطلق كلمة عشيرة على أفراد الجيل الأول ، أو الأجيال التالية له فى تهجين ما ؛ فيقال عشيرة الجيل الأول F_1 population (ترمز F إلى كلمة filal التى تعنى تتابعاً بعد جيل الآباء) ، وعشيرة الجيل الثانى F_2 population .. إلخ . وقد تكون العشائر لنباتات ذاتية التلقيح ، أو خلطية التلقيح ، أو خضرية التكاثر ، كما قد تكون لجيرمبلازم محسن بوسائل التربية مثل العشائر التركيبية (المخلقة) synthetic populations .. إلخ .

يهتم المربي - بطبيعة الحال - بوصف العشيرة مظهرياً ، أو مورفولوجياً ؛ كما يتعين عليه أن يكون ملماً بالأساس الوراثى للتباينات المظهرية المشاهدة ، وهو ما يقودنا إلى دراسة طبيعة الاختلافات ، أو التباينات فى النباتات .

الاختلافات فى النباتات

أنواع الاختلافات وأهميتها

تعد الاختلافات المشاهدة بين أفراد النوع الواحد الأساس فى استمرار بقائها ، وفى

تطورها ، وفي تحسينها بالتربية ؛ فلولاً هذه الاختلافات - لهلكت الأنواع النباتية منذ أمد بعيد ، لدى تعرضها لظروف بيئية قاسية ، أو إصابتها بآفات ، يمكن أن تقضى عليها ، ولما ارتقت وتطورت ؛ لأن التطور لا يحدث إلا مع الانتخاب الطبيعي ، الذى يعتمد على توفر الاختلافات ، ولما أمكن تحسينها بالتربية التى لا تجرى هى الأخرى إلا فى وجود الاختلافات ؛ ويعنى بذلك كله الاختلافات الوراثية *genetic variations* وهى الاختلافات التى تؤثر للنسل ، ويتحكم فيها عوامل وراثية (جينات أو مورثات) معينة أما الاختلافات التى ترجع إلى تأثير البيئة على الشكل المظهرى للفرد - أو الاختلافات البيئية *environmental variations* - فإنها لا تؤثر ، ولا يكون لها أى دور فى تطور النوع أو فى تحسين المحصول بالتربية ، ومن أمثلتها .. كافة التأثيرات المظهرية التى تحدثها أى من العوامل البيئية فى النباتات ، سواء أكانت تلك العوامل مناسبة للنمو ، أم غير مناسبة . ويطلق على الحالات التى تغير فيها البيئة من الشكل المظهرى للفرد - بحيث يصبح مماثلاً تماماً مظهرياً للأفراد الحاملة للعوامل الوراثية التى تتحكم فى هذه الصفات المظهرية - اسم المظاهر النسخية *phenocopies* . ومن أمثلتها نباتات البسلة القصيرة ، التى تصبح طويلة لدى معاملتها بالجيريلايين ؛ فهى تعد مظاهر نسخية للنباتات التى تحمل العامل الوراثى الخاص بصفة الطول ، ويكون نسلها قصيراً .

وتقسم الاختلافات المشاهدة - كذلك - إلى اختلافات وصفية *qualitative variations* ، واختلافات كمية *quantitative variations* . ويعنى بالاختلافات الوصفية تلك التى يمكن تقسيمها إلى أقسام ، توجد بينها حدود واضحة مثل صفة المقاومة للآفات حينما يكون النبات مقاوماً أو غير مقاوم ، وصفة اللون حينما تكون الثمرة صفراء أو حمراء ، وصفة الطول حينما يكون النبات طويلاً ، أو قصيراً ، وتكون هذه الصفات بسيطة فى وراثتها - عادة - وقليلة التأثير بالعوامل البيئية . أما الاختلافات الكمية .. فإنها تشمل الصفات التى تظهر تدرجاً كبيراً ، بحيث يستحيل تقسيم النباتات إلى فئات مميزة توجد بينها فواصل واضحة. وتقاس هذه الصفات - عادة - بالطرق الكمية (مثل مقاييس الطول ، والحجم ، والوزن ... إلخ) ، وتتضمن أكثر الصفات الاقتصادية الهامة ؛ مثل كمية المحصول ، وقوة النمو ، وموعد التضرع ، ويتحكم فى كل منها - عادة - أكثر من عامل وراثى واحد ، ويكون تأثيرها بالعوامل البيئية كبيراً . ويمثال على اختلاف تأثير

الصفات الوصفية والكمية بالعوامل البيئية .. نجد أن لون الزهرة - وهي صفة وصفية - لا يختلف باختلاف الظروف البيئية التي ينمو فيها النبات (إلا في حالات قليلة ، يمكن أن يتفاعل فيها أحد العوامل البيئية مع التركيب الوراثي للفرد ، لإظهار لون معين) ، بينما نجد أن قوة النمو - وهي صفة كمية - تتأثر بشدة بالعوامل البيئية السائدة ، سواء أكانت جوية ، أم أرضية .

هذا .. ولاتوجد - أحيانا - حدود مميزة بين ما يمكن اعتباره صفات وصفية ، وما تعد صفات كمية . فصفة اللون .. قد تظهر بها كل التدرجات ؛ من الأبيض الناصع إلى الأسود القاتم ، وصفة المقاومة للأمراض .. قد تتدرج من القابلية التامة للإصابة إلى المقاومة التامة . وإذا كان الأمر كذلك .. فإن هذه الحالات تعد - من وجهة نظر المربي - من الصفات الكمية ؛ لأنها تتماثل مع الصفات الكمية في متطلباتها . كما يمكن - في كثير من الأحيان - تقسيم النباتات حسب موعد النضج - وهي صفة كمية - إل مبكرة ، ومتوسطة ، ومتأخرة ، ولكنها تبقى - بالرغم من ذلك - صفة كمية من وجهة نظر المربي . ويطلق على مثل هذه الصفات الكمية ذات التوزيع غير المستمر اسم Threshold characters وقد تكون الصفة وصفية ، ولكنها تقاس - كمياً - مثل صفة الطول في البسلة ؛ حيث يمكن تقسيم النباتات إلى فئتين متميزتين : قصيرة وطويلة .. ورغم وجود تدرج في أطوال النباتات في كل فئة منهما .. إلا أنه يوجد - دائماً - حد واضح ، يفصل بين أطول النباتات القصيرة ، وأقصر النباتات الطويلة ؛ ولذا تظل الصفة وصفية من وجهة نظر المربي .

التفريق بين الاختلافات البيئية والوراثية

يتعين على المربي - دائماً - أن يميز بين الاختلافات البيئية والاختلافات الوراثية في برامج التربية ؛ لأن الاختلافات الوراثية فقط هي التي تُورث إلى النسل ، وهي التي يمكن الاستفادة منها في تحسين المحصول . وقد يضيع على المربي موسم زراعي كامل ، أو انحرالات قيمة ، إن لم يمكنه التمييز بين الاختلافات التي ترجع إلى تأثير البيئة ، وتلك التي يتحكم فيها التركيب الوراثي للفرد ، ومن أمثلة ذلك .. انتخاب نبات خال من الإصابة بمرض ما ، على اعتبار أنه مقاوم ، بينما هو قد أقلت من الإصابة ، لأسباب بيئية مثل عدم وصول المسبب المرضي إليه ، أو عدم توفر الظروف البيئية المناسبة لظهور الإصابة ،

أو انتخاب نبات قوى النمو يوجد فى آخر الخط على اعتبار أنه يحمل العوامل الوراثية الخاصة بقوة النمو ، بينما قد ترجع قوة نموه إلى توفر مجال أوسع لنموه حيث يوجد فى نهاية الخط .

يعد اختبار النسل Progeny test الوسيلة الوحيدة المؤكدة للحكم على نوعية الاختلافات المشاهدة ، من حيث كونها بيئية ، أو وراثية . ويجرى الاختبار بتلقيح النباتات المنتخبة ذاتياً ، وحصاد بنورها كل على حدة ، ثم زراعة نسل كل نبات منها فى الموسم التالى فى خط واحد ، أو فى ٣ - ٥ خطوط قصيرة موزعة عشوائياً ، ويُعد ظهور الصفة التى انتخب النبات على أساسها - فى نسله - دليلاً مؤكداً على أنه يتحكم فيها عوامل وراثية ، ولا ترجع إلى أسباب بيئية ، ولكن نظراً لأن اختبار النسل يعد اختباراً مكلفاً ويتطلب كثيراً من الوقت والجهد ؛ لذا .. كان على المربي أن يعتمد على المنطق الاستدلالي لاستبعاد أكبر قدر من الاختلافات التى تدل الشواهد على أنها اختلافات بيئية ، وأن يقصر اختبار النسل على الاختلافات التى تجمع الأدلة على أنها اختلافات وراثية . ومن أهم هذه الشواهد والأدلة - التى يجب أخذها فى الحسبان عند التمييز بين الاختلافات الوراثية والبيئية - طبيعة الاختلافات المشاهدة ، وتوزيعها فى الحقل ، ومدى تأثير الصفة المعنية بالعوامل البيئية ؛ وذلك لأن الاختلافات النوعية تكون أقل تأثراً بالعوامل البيئية عن الاختلافات الكمية ، ولأن تجمع النباتات التى تظهر بها الصفة المعنية فى مكان واحد من الحقل .. يكون دليلاً قوياً على أن الاختلافات المشاهدة بيئية وليست وراثية . كما أن توفر الاختلافات الوراثية يعتمد - إلى حد كبير على طريقة تكاثر المحصول ، وعمر الصنف ، ومدى العناية التى يعطاها ؛ ذلك لأن أهم مصادر الاختلافات الوراثية هى الطفرات والانحرافات الوراثية ، وتكون الطفرات - وهى بنسبة منخفضة - المصدر الوحيد للاختلافات الوراثية فى المحاصيل التى تتكاثر خضرياً ، بينما يتوفر كلا المصدرين للاختلافات الوراثية فى المحاصيل التى تتكاثر جنسياً ؛ والتى تزيد فيها فرصة ظهور الاختلافات الوراثية عما فى المحاصيل التى تتكاثر خضرياً . وكلما ازداد عمر الصنف .. ازداد تراكم الطفرات به وازداد - من ثم - احتمال ظهور الاختلافات الوراثية فيه . وأخيراً فإن فرصة ظهور الاختلافات الوراثية تكون أكبر فى الأصناف غير المحسنة ، وفى الزراعات القديمة غير المعنى بتقاوتها من النباتات المخالفة للصنف (من نفس النوع المحصولي) مما فى الزراعات الحديثة ، أو المعنى بها .

وغنى عن البيان .. أنه توجد اختلافات يعرف المربي - سلفاً - أنها اختلافات بيئية ؛ لأنها تحدث عند تعريض النبات لمعاملات خاصة ؛ مثل : تحول نبات الخيار الانتوى إلى وحيد الجنس وحيد المسكن لدى معاملته بالجبريللين ، وقوة النمو غير العادية التى تظهر فى نباتات الجيل الأول M_1 لمعاملات الإشعاع ، والتغيرات التى تنشأ أحياناً نتيجة للتطعيم ، والتى من أمثلتها (Briggs & Knowles ١٩٦٧) نباتات الدخان الخالية من النيكوتين ، التى تكون مطعمة على أصول من الطماطم ، ونباتات الطماطم المحتوية على النيكوتين التى تكون مطعمة على أصول من الدخان ؛ لأن النيكوتين يصنع فى الجنور ، ثم ينتقل منها إلى النموات الخضرية . كما يعرف - أيضاً - أن تطعيم البطاطس المزروعة على أصول من النوع البرى *Salonun demissum* يؤدى إلى زيادة محصول درنات النوع البرى (الأصل) من ١٧-١٠ جم أصيص إلى ١٣٠ - ١٤٢ جم/ أصيص ، وقد تحدث زيادة أكبر فى محصول درنات النبات البرى لدى تكرار تطعيم البطاطس المزروعة عليه مرة أخرى - كما أن الدرنات الناتجة من هذا التطعيم .. تثبت بسرعة أكبر ، وتعطى نباتات أبكر إزهاراً من النباتات التى تنتج من زراعة الدرنات العادية للنوع البرى ، التى انتجت دون تطعيم ، ولكن محصولها يصبح عادياً ومتماثلاً وتختفى كل التأثيرات التى سبق أن أحدثها التطعيم فى جيل الإكثار الخضرى التالى .

مصادر الاختلافات الوراثية

يمكن حصر المصادر الرئيسية للاختلافات الوراثية فيما يلى :

١- الطفرات Mutations :

تعد الطفرات المصدر الرئيسى للاختلافات المشاهدة فى الصفات ولا يمكن بدونها - مشاهدة أى نوع من الاختلافات بين الأفراد . وتزداد الاختلافات بين الأفراد مع ازدياد الطفرات بها . ونجد - أحياناً - أن طفرة واحدة فى أحد الجينات تعنى الفرق بين محصول وآخر ، مثلاً فى الحال فى الذرة الشامية التى تحتوى على الجين *Su* للإنوسوبرم النشوى والذرة السكرية التى تحتوى على الأليل *su* للإنوسوبرم السكرى . كما لا يختلف الكرب البرى عن كل من الكرب المزروع ، والقنبيط ، وكرب بروكسل ، وكرب أبو ركة ، والبروكولى ، سوى فى طفرة واحدة فى جين مسئول عن تحورات ضخمة ، أو طفرات فى عدد قليل من الجينات . ولولا تدخل الإنسان لانتخاب هذه الطفرات .. لما عاشت لأنها تمثل

تحورات نباتية كبيرة عن الحالة البرية الأصلية ، التي لاتزال موجودة فى المناطق الساحلية من أوروبا وشمال أفريقيا .. ويخصص للتربية بالطفرات فصل مستقل من هذا الكتاب .

٢- الانعزالات الوراثية Genetic Recombinaons :

بينما تحدث الطفرات بمعدلات منخفضة للغاية - فى جميع النباتات أياً كانت طريقة تكاثرها - فإن الانعزالات الوراثية لاتحدث إلا عندما يكون التكاثر جنسياً وتنشأ عنها تباينات عديدة بين الأفراد فيما تحويه من صفات . ولكن هذه الانعزالات لاتحدث إلا فى وجود الطفرات ؛ أى لاتحدث إلا فى وجود أكثر من أليل allele للجين الواحد (مثلاً يعد زوج الجينات D ، و d فى البسلة أليين لجين واحد حيث يتحكم الأليل السائد منها D فى صفة النبات الطويل ، بينما يتحكم الأليل المتنحى d فى صفة النبات القصير ، كما يعد العامل الوراثى W - الذى يتحكم فى لون الأزهار البنفسجى فى البسلة أيضاً - جيناً أليياً للعامل w ، الذى يتحكم فى لون الأزهار البيضاء ، ولكن العوامل الوراثية D ، W تعد جينات غير أليلية ؛ أى جينات مستقلة ، توجد على مواضع مختلفة من الكروموسومات) . وكلما ازدادت الاختلافات الوراثية بين الأفراد التى تتجهن مع بعضها ازدادت الانعزالات التى تظهر فى النسل . وقد شُرح موضوع الانعزالات الوراثية - بالتفصيل - فى جزء آخر من هذا الفصل ؛ لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لتربية النبات .

٣- التضاعف Ploidy :

يعد التضاعف الذاتى والهجينى .. أحد المصادر المهمة للاختلافات الوراثية ، وقد خصص للتربية بالتضاعف فصل مستقل من هذا الكتاب .

٤- الهجن النوعية Interspecific Hybrids :

تعد الهجن النوعية - كذلك - إحدى المصادر المهمة للاختلافات الوراثية ، وقد أُفرد لها فصل مستقل أيضاً . تفيد الهجن النوعية - غالباً - فى نقل صفات هامة (خاصة صفات المقاومة للآفات والتأقلم على الظروف البيئية القاسية) من نوع الآخر ، خاصة من الأنواع البرية إلى الأنواع المزروعة ، وقد يؤدى الهجين النوعى إلى إنتاج نوع نباتى مستقل ، يزرع كمحصول جديد ، مثل الشليك ، الذى نشأ كهجين نوعى بين النوع البرى *Fragaria virginiana* ، الذى ينمو على الساحل الشرقى من أمريكا الشمالية ، والنوع

البرى *F. chiloensis* ، الذى ينمو على ساحل المحيط الهادى . أجرى التهجين الأول بين النوعين الزراع الإنجليز ، منذ أكثر من ١٧٥ عاماً ، وأمكن من خلال مزيد من التهجينات فى النسل - مع انتحاب النباتات المرغوب فيها - الجمع بين صفة الإثمار والنوعية الجيدة التى توجد فى النوع *F. virginiana* ، وصفة الثمار الكبيرة الحجم التى توجد فى النوع *F. chiloensis* ؛ وبذا ظهرت الطرز الجديدة من الشليك المزروع *F. × ananassa* . ولاريب فى أنه حدث فى الماضى تهجينات نوعية عديدة ، أعقبتها تهجينات رجعية متتالية للهجين النوعى ، ونسله مع أحد أبويه أو كليهما - كل على انفراد - نتج عنها فى نهاية الأمر نقل بعض الصفات من أحد النوعين إلى النوع الآخر ، دون أن يؤثر ذلك فى الوضع التقسيمى للأنواع المهجنة . وتعرف هذه الحالات باسم introgression hybridization وقد يصعب معرفتها فى كثير من الأحيان ، التى لاينتقل فيها سوى عدد محدود من الجينات من نوع إلى آخر ، وأقصى ما يمكن التوصل إليه حينئذ هو التكهن بأن ذلك قد حدث فى الماضى .

وراثة الصفات البسيطة

إن الصفات البسيطة هى التى يتحكم فيها عامل وراثى واحد ، يكون ذا تأثير واضح ومحدد على الشكل المظهرى للفرد ، وهى الصفات التى تتعزل فى الجيل الثانى بنسبة ٣ سائد : ١ متنح (فى حالة السيادة التامة) ، وتتعزل فى التلقيح الاختبارى test cross (أى فى التلقيح بين الجيل الأول ، والأب المتنحى فى الصفة) ، بنسبة (١) سائد : (١) متنح . تكون الصفات البسيطة نوعية دائماً ، حتى لو أمكن قياسها كمياً ، وذلك لأنها تتميز - غالباً - بوجود حدود فاصلة فى الشكل المظهرى بين الأفراد المختلفة وراثياً عن بعضها ، فمثلاً قد يوجد تفاوت فى أطوال نباتات البسلة ؛ نتيجة لتأثرها بالظروف البيئية ، ولكن يمكن - دائماً - التمييز بين أطول النباتات القصيرة ، التى يكون تركيبها الوراثى dd ، وأقصر النباتات الطويلة التى يكون تركيبها الوراثى DD أو Dd . ويعطى كل جين من الجينات التى تتحكم فى الصفات البسيطة رمزاً خاصاً به .

قواعد إعطاء الرموز للجينات

نوجز - فيما يلى - أهم التوصيات الدولية الخاصة بقواعد إعطاء الرموز للجينات (عن Robinson وآخرين ١٩٧٦ ، Greenleaf ١٩٨٦) .

١- يجب أن يكون اسم الجين دالاً على الصفات المميزة للطفرة ، مع استخدام أقل عدد من الكلمات الإنجليزية أو اللاتينية في الاسم .

٢- يرمز للجين بحرف أو حروف رومانية مائلة italics ، بحيث يكون الحرف الأول في الرمز مطابقاً للحرف الأول في اسم الجين ، وقد يضاف حرف أو حرفان آخران للجينات المتشابهة في حرفها الأول لتمييز عن بعضها بعضاً .

٣- يكون الحرف الأول من الرمز كبيراً (capital letter) إذا كانت الطفرة سائدة ، وصغيراً (lowercase letter) إن كانت متنحية أما بقية الحروف في الرمز .. فتكون صغيرة في كلتا الحالتين . ويرمز للآليل الذي يتحكم في الصفة الطبيعية (البرية) بعلامة + ، أو يعطى الرمز العادي متبوعاً بعلامة + صغيرة في مستوى أعلى إلى اليمين (superscript) وعليه .. يكون الآليل الطبيعي للجين السائد A هو A^+ والجين المتنحي y هو y^+ .

٤- لا يعطى أى جين جديد رمزا خاصاً به إلا بعد أن يتأكد ذلك بانعزالات إحصائية للجين .

٥- إما أن تعطى الطفرات المختلفة وراثياً - والتي تكون متشابهة في تأثيرها المظهرى (mimics) - أسماء مختلفة ، ورموزاً مختلفة ، وإما أن تعطى رمزاً عاماً واحداً ويليهِ شرطة (وربما لاتوضع الشرطة) ثم تعطى رقماً عددياً أو حرفاً رومانياً على نفس المستوى (مثلاً 2 - pm) . ويعطى الرقم ١ للجين الأول في سلسلة من هذه الجينات ، ولكنه قد يذكر ، وربما لا يذكر ، فمثلاً يعطى الرمزان I ، و 2 - I للجين الذي يتحكم في المقاومة للسلسلة رقم (١) من الفطر المسبب لمرض الذبول الفيوزارى في الطماطم ، والجين الذي يتحكم في السلسلة رقم (٢) من نفس الفطر على التوالي . ويوصى دائماً بإجراء اختبار الأليلية Test of Allelism قبل إعطاء رمز لأى جين في سلسلة من الجينات من هذا القبيل ؛ وذلك لأن الجينات التي تؤثر في الصفة نفسها ، والمتحصل عليها من أنواع نباتية مختلفة لاتكون أليلية ، ويمكن في هذه الحالة - تمييزها برمز صغير في مستوى أعلى إلى اليمين (Superscript) يدل على اسم النوع .

٦- تعطى الأليلات المتعددة Multiple Alleles لنفس الجين رمزاً عاماً واحداً ، ويليهِ رقم عددي ، أو حرف روماني ، يكون في مستوى أعلى إلى اليمين (superscript) . ويجب دائماً إجراء اختبار الأليلية للتأكد من كون الجينات أليلية ، أم أنها جينات مختلفة .

٧- أما بالنسبة للآليلات التى توجد فى نفس الموقع الجينى ، التى يكون لها نفس التأثير المظهرى (أى التى لا يمكن تمييزها عن بعضها بعضاً) .. فإنها تعطى نفس الرمز وتميز - عند الرغبة فى ذلك - برقم عددى ، أو حرف مميز بين قوسين ، يكون فى مستوى أعلى إلى اليمين .

٨- إما أن تأخذ الجينات المحورة modifier genes رموزاً عادية ، أو أنها تعطى الوصف المناسب لما تحدثه من تأثير مثل : intensifier أو uppersor أو inhibitor ، ويلى ذلك .. شرطة ، ثم رمز الآليل الذى يتأثر بها .

٩- تكون أسبقية النشر هى الفيصلى فى الحالات التى أعطى فيها أكثر من رمز لنفس الجين ، أو رمزاً واحداً لأكثر من جين . وتوضع الرموز التى أعطيت خطأ بين قوسين فى قوائم الجينات .

اختبار الآليلية

ذكر اختبار الآليلية Allelism Test أثناء مناقشة قواعد إعطاء الرموز للجينات ، وهو اختبار يجرى لتحديد علاقة الجين بالجينات الأخرى التى تعطى تأثيراً مشابهاً ، فكثيراً ما يجد المربى نفسه أمام أكثر من مصدر لصفة من الصفات التى يرغب فى الاستفادة بها فى برنامج التربية ؛ فقد تتوفر - مثلاً - عدة مصادر للمقاومة لمرض ما ؛ حيث يتعين - حينئذ - معرفة إن كانت هذه المصادر تحتوى على نفس الجين الخاص بالمقاومة ، أم أنها تحتوى على آليلات مختلفة لنفس الجين ، أم على جينات مختلفة كلية . وترجع أهمية ذلك إلى أن المربى قد يرغب فى زيادة تركيز صفة المقاومة بإدخال أكثر من جين لها فى برنامج التربية ، وقد تتحكم الآليلات المختلفة لنفس الجين فى مستويات مختلفة من المقاومة ، كما قد يتحكم كل منها فى المقاومة لسلالات معينة من المسبب المرضى دون غيرها .

يجرى اختبار الآليلية بتلقيح كل مصدر للصفة مع صنف آخر ، لايحتوى على هذه الصفة ؛ حيث يمكن - بناء على الانغزال المشاهد فى الجيل الثانى لكل تلقيح - معرفة عدد الجينات المتحكم فى الصفة فى كل مصدر منها ، ويلى ذلك .. تلقيح المصادر المختلفة للصفة مع بعضها بكل الطرق الممكنة ، ودراسة الجيل الثانى لكل تلقيح ، فإن لم تحدث انعزالات .. دل ذلك على اشتراكها فى نفس الجين ، أو الجينات المتحكم فى الصفة ، أما إذا حدثت انعزالات فإن ذلك يكون دليلاً على أن الجينات المتحكم فى الصفة ليست

أليلية ؛ فيدل - مثلاً - حدوث انعزال بنسبة ١٥ : ١ على احتواء كل مصدر على جين مختلف للصفة ، ويدل انعزال بنسبة ٦٣ : ١ على احتواء كل مصدر على جينين للصفة ، واختلاف المصدرين فيما يوجد بهما من جينات ، وكمثال على اختبار الأليلية تُذكر دراسات Zink (١٩٧٣) الذى أجرى ستة تلقيحات بين خمسة أصناف من الخس ؛ لتحديد العلاقة بين جينات المقاومة للبياض الزغبي التى تتوفر فيها ، وحصل على النتائج المبينة فى جدول (٢ - ١) .

جدول (٢ - ١) : نتائج اختبار الأليلية لمصادر مختلفة للمقاومة للبياض الزغبي فى الخس .

الاحتفال (P)	مجموع مربع كاي (x ²)	الجيل الثانى		التلقيح
		قابل للإصابة	مقاوم	
٠.٩٥-٠.٧٠	(١:٢) ٠.٠١١١	١٤٦	٤٦	GL 118 x Meikoningen
٠.٩٥-٠.٧٠	(١:١٥) ٠.٠٠٤	٤٨٩	٣٣	GL118 x Ventura
٠.٧٠-٠.٥٠	(١:١٥) ٠.٢٣٧	١٢٥٢	٧٨	Calmar x Meikoningen
٠.٧٠-٠.٥٠	(١:١٥) ٠.٢٥١	٣٣٨	٢٥	GL118 x P. Blackpool
٠.٩٥-٠.٧٠	(١:٦٣) ٠.٠٢٩	١٤٢٨	٢٢	Calmar x P. Blackpool
٠.٩٥-٠.٧٠	(١:٦٣) ٠.٠٥٧	١٢٦٥	١٩	Calmar x Ventura

حدود تأثير العامل الوراثى على الشكل المظهرى

إن الجين لا يعمل فى فراغ ؛ فهو يؤثر ويتأثر بالجينات الأخرى الموجودة بالتركيب الوراثى للكائن الحى . ورغم أن الجين قد يكون له دور واحد فى التفاعلات الحيوية .. إلا أنه يكون له - غالباً - عدة تأثيرات نهائية على الشكل الظاهرى للكائن الحى ؛ وبذا فإن كل الجينات قد تكون ذات تأثير متعدد ، ويحاول مربو النبات الاستفادة من هذه الحقيقة فى تحديد القيمة الحقيقية للجين ؛ من خلال دراساتهم على السلالات ذات الأصول الوراثية المتشابهة Isogenic lines ، وهى السلالات التى تحتوى على أليلات مختلفة لجين واحد ، ولكنها تكون متماثلة - تماماً - فى جميع الجينات الأخرى ، وتنتج بإحدى

١- طريقة التهجين الرجعى Backcross Methad :

خُصِّصَ للتربية - بطريقة التهجين الرجعى - فصل مستقل من هذا الكتاب ، وهى تجرى بغرض نقل صفة أو صفات قليلة من سلالة برية أو صنف مزروع إلى صنف تجارى ناجح ، وتعتمد على انتخاب النباتات التى تحتوى على الصفة المراد نقلها بعد التهجين الأسمى ، وتهجينها رجعىاً للصنف التجارى وتكرار ذلك نحو ثمانى مرات ؛ حيث نحصل - فى نهاية الأمر - على سلالة جديدة مماثلة تماماً للصنف التجارى فى جميع العوامل الوراثية فيما عدا احتوائها على أليل مختلف للجين المطلوب معرفة تأثيره ، وتتميز هذه الطريقة بأنها تسمح بتقييم تأثير الجينات فى الأصناف التجارية الناجحة ، كما أن السلالة الجديدة المنتجة بالتهجين الرجعى .. قد يمكن استعمالها كصنف جديد إن كانت الصفة المنقولة إليها مرغوباً فيها ، ولكن يعاب عليها أنها لاتسمح بتقييم الجين إلا فى خلفية وراثية واحدة ، وهى الخلفية الخاصة بالصنف التجارى الذى استخدم كأب رجعى ، بينما قد يختلف تأثير الجين باختلاف الخلفية الوراثية للصنف الذى نقل إليه .

٢- طريقة التلقيح الذاتى مع انتخاب النباتات الخليطة فى الجين المراد دراسة تأثيره :

يسهل اتباع هذه الطريقة مع الجينات التى يكون فيها الفرد الخليط وسطاً فى صفاته بين الأبوين - أى فى حالات السيادة غير التامة incomplete dominance - وإن كانت ممكنة - بيد أنها تتطلب جهداً أكبر - مع الجينات ذات السيادة التامة ، وهى تعتمد على تمييز الأفراد الخليطة فى الجين المراد دراسة تأثيره ، إما مباشرة فى حالات السيادة غير التامة ، وإما بعد اختبار النسل فى حالات السيادة التامة ، وتلقيحها ذاتياً ، وتكرار ذلك لنحو ثمانية أجيال ، يبدأ ذلك فى الجيل الثانى للتلقيح بين صنفين يختلفان فى عدة صفات ، ويحتويان على أليلين مختلفين للجين المراد دراسة تأثيره ؛ حيث يتم انتخاب مجموعة من النباتات التى تمثل أكبر قدر من الاختلافات المشاهدة فى الصفات الحقلية أو البستانية الهامة ، مع ضرورة أن تكون جميعها خليطة فى الجين موضع الدراسة . ومع تلقيح هذه النباتات ذاتياً ، وتكرار ذلك فى نسل كل منها حتى الجيل السابع .. نحصل فى

الجيل الثامن على سلالتين أصيلتين من كل سلسلة من التلقيحات الذاتية ، وتكون سلالتا كل زوج منها متشابهتين تماما فى جميع العوامل الوراثية ، فيما عدا اختلافهما فى احتواء إحداهما على أحد الأليلات ، واحتواء الأخرى على الأليل الآخر للجين المراد تقسيمه ، ويمكن بهذه الطريقة دراسة تأثير الجين فى الشكل المظهرى فى خلفيات وراثية متنوعة ، ولكن يعاب عليها أنها لاتصلح فى المحاصيل الخلطية التلقيح التى تتدهور بالتربية الداخلية (أى بالتلقيح الذاتى الصناعى) حيث تفقد قوة نموها ، وبذا لايمكن دراسة التأثير الحقيقى للجين تحت الظروف الطبيعية ، كما أن التراكيب الوراثية الناتجة من برنامج التلقيح الذاتى تكون غالبا غير صالحة للاستعمال التجارى .

ونظراً لأن إنتاج السلالات ذات الأصول الوراثية المتشابهة تماماً يستغرق جهداً كثيراً وفترة زمنية طويلة .. لذا يكتفى الباحثون - عادة - بسلالات على درجة أقل من التشابه ، يطلق عليها اسم near - isogenic lines ويتطلب إنتاج هذه السلالات عدداً أقل من الهجن الرجعية - مقارنة بالسلالات ذات الأصول الوراثية المتشابهة تماماً - عند إنتاجها بالطريقة الأولى ، وعدداً أقل من أجيال التربية الداخلية عند إنتاجها بالطريقة الثانية . ويجب أن يؤخذ فى الحسبان - حينئذ - أن السلالات المنتجة ربما تختلف فى عدد قليل من الجينات التى لا يكون تأثيرها المظهرى واضحاً ، كذلك يصعب نقل جين واحد مرغوب فيه من نوع برى إلى نوع مزرع ، دون أن تنتقل معه الجينات القريبة منه على الكروموسوم ، التى ترتبط معه بشدة ، وتبقى معه مهما كان عدد التهجنات الرجعية إلى النوع المزرع .

ويصعب - فى بعض الأحيان - معرفة إن كان الجين متعدد التأثير ، أم أنه يرتبط بقوة بجينات أخرى . وبينما لا يكون لذلك أية أهمية - عملياً - مادام المربى يحصل على الصفات المرغوب فيها ، إلا أن الأمر يكون مختلفاً فى حالة ظهور صفات غير مرغوبة مع الصفة المرغوب فيها على النوام ؛ فينبغى فى هذه الحالة - الاستغناء عن الجين إن كان ذا تأثير متعدد ، أو محاولة كسر الارتباط غير المرغوب فيه إن وجد مثل هذه الارتباط (Allard ١٩٦٠) .

ولبيان أهمية السلالات ذات الأصول الوراثية المتشابهة فى تقدير القيمة الحقيقية للجين نستعرض دراسات Emery & Munger (١٩٧٠ أ ، ١٩٧٠ ب) على الطماطم ؛ فقد أنتج

الباحثان سلالات ذات أصول وراثية متشابهة من ثلاثة أصناف من الطماطم ، هي : فايربول Fireball ، وجاردنر Gardner ، وكورنل ٥٤ - ١٤٩ 149 - 54 Cornell تختلف فى العوامل الوراثية المتحكم فى صفات النمو المحدود ، والنمو غير المحدود ، والنمو المتقزم ، وعنق الثمرة الخالى من المفصل jointless ؛ ثم قارنا هذه السلالات على مسافات زراعة مختلفة ، وتدل نتائج دراساتهم على أن السلالات المحدودة النمو أنتجت محصولاً أعلى خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحصاد ، ولكن تساوى محصولها الكلى مع محصول السلالات غير المحدودة النمو ، وكان محصول كل منهما أعلى من محصول كل من السلالات المتقزمة والسلالات العديمة المفصل ، كما كان محصول السلالات عديمة المفصل أعلى من محصول السلالات المتقزمة فى الأسبوع الأخير من الحصاد . وقد استجابت السلالات المحدودة النمو لمسافات الزرعة الضيقة بإعطائها محصولاً أعلى من السلالات الأخرى ، خاصة فى الأسابيع الثلاثة الأولى من الحصاد . كما أنتجت السلالات غير المحدودة النمو والعديمة العقدة ثماراً أكبر ، ذات محتوى أعلى من المواد الصلبة الذائبة الكلية عما فى السلالات المحدودة النمو فى كل الأصناف ، وفى مسافات الزراعة المستعملة (وهى ١٥ × ١٨٠ سم ، و ٤٥ × ١٨٠ سم) ، ولكن اختلف مقدار الفرق فى حجم الثمار ، ومحتواها من المواد الصلبة الذائبة باختلاف الصنف . أما السلالات المتقزمة .. فقد أعطت ثماراً أصغر حجماً من السلالات غير المتقزمة إلا أن السلالتين تساوتا فى محتواهما من المواد الصلبة الذائبة . وتعنى هذه النتائج .. أن جميع الجينات التى درست كانت ذات تأثير متعدد .

الانحرافات الوراثية

إن الانحرافات الوراثية Genetic Recombinations هى المصدر الرئيسى للاختلافات الوراثية التى يستعملها المربي فى برامج التربية لأجل تحسين النباتات ، كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطريقة التلقيح السائدة فى المحصول ، ولذا .. فإن فهم الأساس الوراثى للعشائر النباتية وكيفية تداولها فى برامج التربية يتطلب إلماماً تاماً بكل ما يتعلق بالانحرافات الوراثية .

العوامل المؤثرة فى الانعزالات الوراثية

لا يحدث أى انعزال وراثى فى أفراد الجيل الأول F_1 generation مادامت الآباء المستخدمة فى التهجين أصيلة وراثياً فى الصفات التى يراد دراستها ، ويؤدى التلقيح الذاتى الطبيعى أو الصناعى إلى إنتاج نباتات الجيل الثانى ، وهى التى يبدأ فيها ظهور الانعزالات الوراثية . ويتأثر الانعزال فى هذا الجيل بالعوامل التالية :

١- عدد العوامل الوراثية التى يختلف فيها الأبوان :

يتوقف عدد التراكيب الوراثية المنعزلة فى الجيل الثانى على عدد العوامل الوراثية التى يختلف فيها الأبوان ، وهى نفسها عدد المواقع الجينية التى تكون خليطة فى الجيل الأول . ويبين جدول (٢-٣) عدد أنواع الجاميطات التى تنتجها نباتات الجيل الأول ، وعدد الأشكال المظهرية ، والتراكيب الوراثية ، ومجموع نسب التراكيب الوراثية المتوقعة فى الجيل الثانى فى حالتى : السيادة التامة والسيادة غير التامة ، بفرض اختلاف الأبوين فى عدد قدره (ن) من العوامل الوراثية . ويمكن استنباط هذه القوانين بسهولة ، بحساب أعداد ونسب التراكيب الوراثية والأشكال المظهرية عند اختلاف الآباء فى زوج أو زوجين أو ثلاثة أزواج من العوامل الوراثية . ويتضح من الجداول أن أعداد التراكيب الوراثية المنعزلة المتوقعة فى الجيل الثانى تزيد زيادة كبيرة ، بارتفاع عدد العوامل الوراثية التى يختلف فيها الأبوان (ن) فنجد أنها تكون ٣ فى حالة $n = ١$ ، و ٩ فى حالة $n = ٢$ ، و ٢٧ فى

جدول (٢-٣) : عدد أنواع الجاميطات التى تنتجها نباتات الجيل الأول ، وعدد الأشكال المظهرية ، والتراكيب الوراثية ، ومجموع نسب التراكيب الوراثية المتوقعة فى الجيل الثانى فى حالتى السيادة التامة والسيادة غير التامة ، بفرض اختلاف الأبوين فى عدد قدرة (ن) من العوامل الوراثية

فى حالة		
غياب السيادة والتفوق	السيادة التامة	البيان المطلوب
٢ ن	٢ ن	عدد أنواع الجاميطات التى تنتجها نباتات الجيل الأول
٣ ن	٢ ن	عدد الأشكال المظهرية المتوقعة فى الجيل الثانى
٢ ن	٢ ن	عدد التراكيب الوراثية الأصيلة المتوقعة فى الجيل الثانى
٣ ن	٣ ن	العدد الكلى للتراكيب الوراثية المتوقعة فى الجيل الثانى
٤ ن	٤ ن	مجموع نسب التراكيب الوراثية المتوقعة فى الجيل الثانى

حالة ن = ٣ ، و ٨١ في حالة ن = ٤ ، و ٥٩٠٤٩ في حالة ن = ١٠ ، و ١٠٤٦٠٣٥٣٢٠٣ في حالة ن = ٢١ .

ويمكن الحصول على نسبة أى تركيب وراثى بسهولة فى الجيل الثانى من المعادلة التالية :

$$\text{نسبة التركيب الوراثى المرغوب فيه} = \frac{س٢}{ن٤}$$

حيث تمثل "س" عدد العوامل الوراثية الخليطة فى التركيب الوراثى المرغوب فيه و "ن" عدد العوامل الوراثية التى يختلف فيها الأبوان .

أما نسبة الأفراد التى تكون ذات شكل مظهرى معين .. فإنها تساوى $\frac{ص٣}{ن٤}$ حيث تمثل "ص" عدد الصفات المظهرية السائدة فى الفرد المطلوب سواء أكان أصيلاً ، أم خليطاً فى تركيبه الوراثى عند كل من هذه الصفات ، و تمثل "ن" عدد العوامل الوراثية التى يختلف فيها الأبوان .

٢- عدد أليلات كل جين :

كان الافتراض - فى المناقشة السابقة - أن النبات ثنائى المجموعة الكروموسومية ، وبذا فإن الفرد الواحد لا يمكن أن يحتوى على أكثر من أليلين لكل جين ، ولو تعددت أليلات الجين . ولكن الأمر يختلف فى النباتات المتضاعفة ، حيث يمكن أن يزيد عدد الأليلات عند كل موقع جينى ، ويتوقف ذلك على درجة التضاعف ، وعدد الأليلات المتوفرة من كل جين ، ويتبع ذلك .. حدوث زيادة كبيرة فى عدد التراكيب الوراثية الممكنة فى الجيل الثانى ، ويأتى شرح ذلك فى الفصل الخاص بالتربية بالتضاعف .

٣- الارتباط بين الجينات :

يؤثر الارتباط بين الجينات - المحمولة على نفس الكروموسوم - على الانعزالات الوراثية التى تظهر فى الجيل الثانى ؛ حيث يؤدى إلى زيادة نسبة التراكيب الوراثية المماثلة للأبوين (التراكيب الأبوية) على حساب التراكيب الوراثية الجديدة (التراكيب العبورية) ويتوقف مقدار التأثير على درجة الارتباط بين الجينات ، وعلى كيفية حمل الجينات المرتبطة معاً على كروموسومات الجيل الأول ؛ أتوجد السائدة معاً على كروموسوم ، والمتنحية معاً على الكروموسوم الآخر (النظام الازنواجى AB/ab: coupling) أم تتوزع الأليلات السائدة والمتنحية على الكروموسومين

بالتبادل ؟ (النظام التنافرى (Ab/aB: repulsion) ، وهو ما يتوقف - بطبيعة الحال - على التركيب الوراثى للكباء . ويؤثر الارتباط فى قيمة العبور التى تكون دائما أقل من ٥٠ (وهى قيمة العبور فى حالة الانعزال الحر) وتحسب نسبة التراكيب الوراثية الأصلية السائدة AA BB أو المتنحية aa bb فى الجيل الثانى بالمعادلتين التاليتين :

نسبة التراكيب الوراثية الأصلية السائدة أو المتنحية فى حالة النظام الازدواجى

$$\frac{1}{4} (c - 1)^2 =$$

نسبة التراكيب الوراثية الأصلية السائدة أو المتنحية فى حالة النظام التنافرى

$$= \frac{1}{4} c^2$$

حيث تمثل "ع" قيمة العبور بين الجينين . ويتضح - لدى تطبيق المعادلة - أن نسبة التراكيب الوراثية الأصلية لاختلاف بين حالتى التماثل والتنافر ، عندما يكون الانعزال حراً (أى عندما تكون قيمة ع = ٥٠) ، بينما تزيد نسبة التراكيب الأصلية بزيادة قيمة العبور فى حالة النظام الازدواجى ، وتقل فى حالة النظام التنافرى كما فى جدول (٣-٣) . والعبرة من ذلك .. أن الارتباط بين جينين أو أكثر يمكن أن يكون مفيداً إذا وجدت الآليات المرغوب فيها للجينات المرتبطة فى النظام الازدواجى ، بينما يكون الارتباط معوقاً لعمل المربى إذا وجدت الآليات المرغوب فيها للجينات المرتبطة فى النظام التنافرى .

وعملياً .. يؤدى الارتباط إلى زيادة فرصة ظهور التراكيب الوراثية الأبوية فى الجيل الثانى ، بينما يقلل من فرصة ظهور انعزالات جديدة ، ويتوقف ذلك على شدة الارتباط التى تزيد بانخفاض قيمة (ع) . وقد يكون الارتباط مرغوباً فيه أو غير مرغوب فيه ؛ ففى النباتات غير المستأنسة ، والمحاصيل حديثة العهد بالزراعة .. يقلل الارتباط من احتمالات تحسين المحصول لأنه يقلل من فرصة ظهور تراكيب وراثية جديدة ، قد يستفاد بها فى تحسين المحصول . أما فى النباتات المزروعة - منذ أمد بعيد - فإن الارتباط يكون مرغوباً فيه ، لأنه يحافظ على ثبات التراكيب الوراثية المرغوب فيها .. ويكون الهدف النهائى لآى برنامج للتربية هو جمع الصفات المرغوب فيها معاً ، أى تشجيع الارتباطات بين الجينات المرغوب فيها ، وهو ما يتم بصورة تدريجية .

جدول (٢ - ٢) : نسبة التراكيب الوراثية الأصلية السائدة AA BB ، أو الأصلية المتنحية aa bb في حالتى النظام الازدواجى والتنافرى عند اختلاف قيمة العبور (ع) .

نسبة التراكيب الوراثية الأصلية السائدة ، أو الأصلية المتنحية في الجيل الثانى في حالة		
قيمة العبور (ع)	النظام الازدواجى (AB/ab)	النظام التنافرى (Ab/aB)
٠.٥٠	٦ر٢٥	٦ر٢٥
٠.٢٥	١٤ر٠٦	١٥ر٦
٠.١٠	٢٠ر٢٥	٢٠ر٢٥
٠.٠٢	٢٤ر٠١	٢٤ر٠١
٠.٠١	٢٤ر٥٠	٢٥ر٠٠٢٥
ع	$\frac{1}{4}(ع-1)^2$	$\frac{1}{4}ع^2$



طرق التعرف على النباتات المرغوب فيها فى الأجيال الانعزالية

يصعب - أحيانا - تمييز النباتات التى تحتوى على الصفات المرغوب فيها فى الأجيال الانعزالية ، حينما يكون تأثر الصفات بالعوامل البيئية كبيراً . ويجرى الانتخاب للصفات المرغوب فيها فى هذه الحالة ، بعد مقارنة النباتات مع بعضها ، ويستخدم لذلك أحد نظامين هما :

١- زراعة النباتات فى خطوط متوازية ، على مسافات متساوية من بعضها فى الخط الواحد grid design ؛ ثم تقسيم الحقل إلى شرائح طولية ، وانتخاب أفضل النباتات فى كل شريحة (شكل ٣ - ١ أ) .

٢- زراعة النباتات على مسافات موحدة من بعضها على أن تكون متبادلة الوضع فى الخطوط (زراعة رجل غراب) ، وهو ما يعرف بنظام خلايا نحل العسل honey comb design (شكل ٣ - ١ ب) لأن كل نبات تحدد قيمته بجعله فى مركز شكل مسدس الزوايا والأضلاع (مثل خلية نحل العسل) ، ثم مقارنته بكل نبات آخر داخل هذا

الشكل ، ولا ينتخب النبات إلا إذا كان فائقاً على النباتات الأخرى التي توجد معه داخل الشكل المسدس . ويمكن زيادة شدة الانتخاب بتوسيع مساحة شكل خلية النحل .



شكل (٣ - ١) : طرق مقارنة النباتات في الأجيال الانعزالية مع بعضها البعض لانتخاب المتميزة منها :

- (أ) طريقة الشرائح الطولية grid design .
 (ب) طريقة خلايا نحل العسل honeycomb design (عن Fehr ١٩٨٧) .

حساب الحد الأدنى لعدد النباتات التى تلزم زراعتها ؛ للحصول على التركيب الوراثى المرغوب فيه

يهتم المربي بزراعة عدد كاف من النباتات فى الأجيال الانعزالية ؛ لكى يضمن الحصول على نبات واحد - على الأقل - من التركيب الوراثى المرغوب فيه ، وتستخدم معادلة Mainlane (عن Watts ١٩٨٠) لحساب الحد الأدنى لعدد النباتات التى ينبغى زراعتها كما يلى :

$$N = \log_e F \left(P \frac{1}{2} \right)$$

حيث تمثل "N" عدد النباتات التى تلزم زراعتها ، و "P" مقلوب احتمال ظهور التركيب الوراثى المرغوب فيه فى الجيل الانعزالى ، و "F" احتمال المخاطرة بعدم العثور على التركيب الوراثى المطلوب (احتمال الفشل) .. علماً بأن لوغاريتم احتمالات الفشل للأساس (e) .. (أى قيمة $\log_e F$) تكون : ٢,٣ ، عندما يكون مستوى احتمال الفشل المسموح به ٠,١ ، و ٢,٩٩٦ عند مستوى احتمال فشل قدره ٠,٠٥ ، و ٤,٦ عند مستوى احتمال فشل ٠,٠١ ، و ٦,٩ ، عندما يكون مستوى احتمال الفشل ٠,٠٠١ .

أما عندما يحتاج المربي إلى عدد أكبر من النباتات من التركيب الوراثى المرغوب فيه .. فإنه يستخدم لذلك معادلات أخرى ؛ مثل معادلة J . R . Sedcole (عن Fehr ١٩٨٧) ، وهى كما يلى :

$$n = \frac{\frac{1}{[2 (r - 0.5) + z^2 (1 - q)] + z [z^2 (1 - q)^2 + 4 (1 - q) (r - 0.5)]^2}}{2q}$$

حيث تمثل "n" العدد الكلى للنباتات التى يتعين زراعتها ، و "r" العدد المطلوب من النباتات ذات التركيب الوراثى المرغوب فيه ، و "q" نسبة (معدل) ظهورها فى النسل ، و "P" احتمال الحصول على العدد المطلوب منها ، و z قيمة محسوبة تقابل الاحتمال P علماً بأن قيمة z تكون ١,٦٤٥ فى حالة P = ٠,٩٥ ، و ٢,٣٢٦ عند P = ٠,٩٩ .

وتجدر الإشارة إلى أن المعادلتين السابقتين يمكن استعمالهما - كذلك - فى كل الحالات المماثلة ؛ فهما تستخدمان - مثلاً - فى حساب الحد الأدنى لعدد النباتات التى

تلتزم زراعتها ؛ للعثور على نبات واحد ، أو عدد معين من النباتات المصابة بمرض ما إذا علمت نسبة إصابة البنور بذلك المرض . وقد استخدم Sedcole معادلة أخرى أكثر دقة وتعقيداً فى التوصل إلى الأرقام المبينة فى جدول (٣-٤) ، وهى أعداد النباتات التى يتعين زراعتها ؛ للعثور على عدد معين من تركيب وراثى مرغوب فيه ، عندما تكون احتمالات ظهورها حسب النسب المبينة فى الجدول (وهى أكثر النسب شيوعاً) ، ومع احتمال قدره ٠,٩٥ أو ٠,٩٩ . للحصول على العدد المطلوب من النباتات ذات التركيب الوراثى المرغوب فيه ، ويتبين من الجدول .. أن أعداد النباتات التى يتعين زراعتها تزيد زيادة كبيرة عند خفض احتمال المخاطرة ، بعدم ظهور التركيب الوراثى المرغوب فيه من ٥٪ إلى ١٪ ، وعند انخفاض النسبة المتوقعة لظهور التركيب الوراثى المرغوب فيه ، ومع زيادة العدد المطلوب من النباتات .

.. ويجب أن تؤخذ نسبة إنبات البنور فى الحسبان عند حساب عدد البنور التى يتعين زراعتها . ويحسب عدد البنور التى تلتزم زراعتها بقسمة العدد المحسوب من النباتات (بواسطة المعادلات) على نسبة إنبات البنور .

اختبار مربع كاي

يستخدم اختبار مربع كاي فى المجالات التالية :

١- لمطابقة النسب المشاهدة للانعزالات الوراثية مع النسب المتوقعة .
٢- لاختبار مدى استقلالية النتائج المشاهدة ؛ مثل اختبار ما إذا كانت نسب النباتات المصابة ، وغير المصابة بمرض ما تختلف - أو لا تختلف - جوهرياً فى مجموعة من الأصناف .

٣- لاختبار إن كانت مجموعة من العينات تنتمى إلى عشيرة واحدة ، أم لا .

استخدام اختبار مربع كاي فى مطابقة نسب الانعزالات الوراثية المشاهدة على النسب المتوقعة :

يستخدم اختبار مربع كاي (χ^2 ، أو χ^2 test) فى معرفة إن كانت النسب أو القيم المشاهدة للانعزالات الوراثية هى حقيقة مشابهة للنسب المنطوقية أو القيم المتوقعة ، ويحصل على مربع كاي عن طريق إيجاد الانحراف للقيم المشاهدة عن المتوقعة

جدول (٣-٤) : الحد الأدنى لعدد النباتات التي تلزم زراعتها في العشائر الانعزالية : حتى يمكن الحصول منها على عدد معين من نباتات ذات تركيب وراثي مرغوب فيه ، عند اختلاف النسبة المتوقعة لظهورها في العشيرة . واختلاف احتمالات النجاح الإحصائية ، المتوقعة لتحقيق ذلك .

عدد النباتات التي يجب زراعتها عندما يكون عدد النباتات المطلوبة من التركيب الوراثي المرغوب فيه (r)										
كما يلي :										
١٥	١٠	٨	٦	٥	٤	٣	٢	١	(p) _q	(l) _p
٤٠	٢٨	٢٣	١٨	١٦	١٣	١١	٨	٥	$\frac{1}{4}$	٠,٩٥
٦٢	٤٤	٣٧	٢٩	٢٥	٢١	١٧	١٣	٨	$\frac{1}{4}$	
٨٤	٦٠	٥٠	٤٠	٣٤	٢٩	٢٣	١٨	١١	$\frac{1}{4}$	
١٧٢	١٢٣	١٠٣	٨٢	٧١	٦٠	٤٩	٣٧	٢٣	$\frac{1}{8}$	
٣٤٧	٢٤٨	٢٠٨	١٦٦	١٤٤	١٢٢	٩٩	٧٥	٤٧	$\frac{1}{16}$	
٦٩٧	٥٠٠	٤١٨	٣٣٤	٢٩١	٢٤٦	٢٠٠	١٥٠	٩٥	$\frac{1}{32}$	
١٣٩٧	١٠٠٢	٨٣٩	٦٧١	٥٨٤	٤٩٤	٤٠١	٣٠٢	١٩١	$\frac{1}{64}$	
٤٥	٣٢	٢٧	٢٢	١٩	١٧	١٤	١١	٧	$\frac{1}{4}$	٠,٩٩
٧١	٥٢	٤٤	٣٥	٣١	٢٧	٢٢	١٧	١٢	$\frac{1}{4}$	
٩٦	٧٠	٦٠	٤٩	٤٣	٣٧	٣١	٢٤	١٧	$\frac{1}{4}$	
١٩٨	١٤٦	١٢٤	١٠١	٨٩	٧٧	٦٤	٥١	٣٥	$\frac{1}{8}$	
٤٠٢	٢٩٦	٢٥٢	٢٠٦	١٨٢	١٥٨	١٣٢	١٠٤	٧٢	$\frac{1}{16}$	
٨٠٩	٥٩٧	٥٠٨	٣١٦	٢٦٨	٢١٨	٢٦٦	٢١٠	١٤٦	$\frac{1}{32}$	
١٦٢٣	١١٩٨	١٠٢٠	٨٣٥	٧٣٩	٦٤٠	٥٣٥	٤٢٣	٢٩٣	$\frac{1}{64}$	

(i) p = احتمال الحصول على العدد المطلوب من النباتات ذات التركيب الوراثي المرغوب فيه .
q = نسبة ظهور النباتات ذات التركيب الوراثي المرغوب فيه في الجيل الانعزالي .

لكل حد من حدود النسبة ، ثم تربيع كل انحراف ، وقسمته على القيمة المتوقعة لحد ، ثم جمع هذه القيم مع بعضها ؛ فيكون حاصل الجمع هو مربع كاي .. أى إن :

$$\left[\frac{(\text{المشاهد} - \text{المتوقع})^2}{\text{المتوقع}} \right] \text{مجموع مربع كاي} = \text{مجموع}$$

ويحدد بعد ذلك احتمال حدوث مثل هذه القيمة من جدول توزيع مربع كاي (جدول ٣-٥) عند العدد المناسب لدرجات الحرية (وهو يساوى عدد فئات الأشكال المظهرية المنعزلة -١) فلو فرض - مثلاً - إن كانت قيمة مربع كاي لصفة بسيطة فى الجيل الثانى هى ٣٢٢.٠ فعلى أى شئ تدل هذه القيمة ؟ ، وكيف نحدد إن كانت النسبة المشاهدة هى حقيقة تمثل النسبة ٣ : ١ . يلاحظ من جدول توزيع مربع كاي أن قيمة ٣٢٢.٠ لدرجة حرية تساوى واحد ، تقع بين القيمتين ١٦٠.٠ لاحتمال ٠.٩٠ ، و ٤٥٥.٠ لاحتمال ٠.٥٠ ، أى إن قيمة مربع كاي المحسوبة تقع بين درجتى احتمال ٥٠٪ و ٩٠٪ . ويعنى ذلك أن إعادة هذه التجربة سينتج انحرافات ترجع إلى الصدفة تشابه - فى كبرها - الانحرافات المشاهدة - غالباً - أقل من مرة فى الخمسين ، ولكنها - غالباً - تكون أكبر من مرة فى التسعين ، وبذا .. يمكن اعتبار أن هذا الانحراف المشاهد يرجع إلى العينة أو إلى المصادفة ، وبمعنى آخر .. فإن هذا الانحراف غير معنوى . وعادة ما تفسر النتائج حسب موقع مجموع مربع كاي من الاحتمالات فى جدول توزيع مربع كاي على النحو التالى :

- ١- إذا كانت درجة الاحتمال ٠.٠٥ (أى ٥٪) أو أقل .. فإن ذلك يعنى أن النتائج المتحصل عليها غير مطابقة للنظرية الفرضية المقترحة ، وأن الانحرافات المشاهدة تعد انحرافات معنوية ، لا ترجع إلى المصادفة فقط ، كما تعد النظرية الفرضية غير مرضية .
- ٢- إذا كانت درجة الاحتمال أكبر من ٠.٠٥ ، حتى ٠.٩٠ ، فإن ذلك يعنى إن الانحرافات المشاهدة غير معنوية ، وأنها ترجع إلى المصادفة وحدها ؛ وبذا تكون النظرية الفرضية التى حسبت القيم المتوقعة على أساسها متفقة مع النتائج أو القيم المشاهدة .
- ٣- إذا كانت درجة الاحتمال أكبر من ٠.٩٠ ، حتى ٠.٩٥ ، فإن ذلك يعنى وجود تقارب

شديد غير طبيعي بين النتائج المشاهدة والنظرية الفرضية .

٤- أما إذا كانت درجة الاحتمال أكبر من ذلك .. فإن ذلك يثير الشك حول النتائج فى

احتمال وجود تحيز بوعى ، أو دون وعى لمطابقة النتائج المشاهدة مع النظرية الفرضية .

جدول (٣ - ٥) : جدول توزيع مربع كاي

درجات الحرية	الاحتمال							
	0.99	0.95	0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01
1	0.0002	0.004	0.46	1.64	2.71	3.84	5.41	6.64
2	0.020	0.103	1.39	3.22	4.60	5.99	7.82	9.21
3	0.115	0.35	2.37	4.64	6.25	7.82	9.84	11.34
4	0.30	0.71	3.36	5.99	7.78	9.49	11.67	13.28
5	0.55	1.14	4.35	7.29	9.24	11.07	13.39	15.09
6	0.87	1.64	5.35	8.56	10.64	12.59	15.03	16.81
7	1.24	2.17	6.35	9.80	12.02	14.07	16.62	18.48
8	1.65	2.73	7.34	11.03	13.36	15.51	18.17	20.09
9	2.09	3.32	8.34	12.24	14.68	16.92	19.68	21.67
10	2.56	3.94	9.34	13.44	15.99	18.31	21.16	23.21
11	3.05	4.58	10.34	14.63	17.28	19.68	22.62	24.72
12	3.57	5.23	11.34	15.81	18.55	21.03	24.05	26.22
13	4.11	5.89	12.34	16.98	19.81	22.36	25.47	27.69
14	4.66	6.57	13.34	18.15	21.06	23.68	26.87	29.14
15	5.23	7.26	14.34	19.31	22.31	25.00	28.26	30.58
16	5.81	7.96	15.34	20.46	23.54	26.30	29.63	32.00
17	6.41	8.67	16.34	21.62	24.77	27.59	31.00	33.41
18	7.02	9.39	17.34	22.76	25.99	28.87	32.35	34.80
19	7.63	10.12	18.34	23.90	27.20	30.14	33.69	36.19
20	8.26	10.85	19.34	25.04	28.41	31.41	35.02	37.57
21	8.90	11.59	20.34	26.17	29.62	32.67	36.34	38.93
22	9.54	12.34	21.34	27.30	30.81	33.92	37.66	40.29
23	10.20	13.09	22.34	28.43	32.01	35.17	38.97	41.64
24	10.86	13.85	23.34	29.55	33.20	36.42	40.27	42.98
25	11.52	14.61	24.34	30.68	34.38	37.65	41.57	44.31
26	12.20	15.38	25.34	31.80	35.56	38.88	42.86	45.64
27	12.88	16.15	26.34	32.91	36.74	40.11	44.14	46.96
28	13.56	16.93	27.34	34.03	37.92	41.34	45.42	48.28
29	14.26	17.71	28.34	35.14	39.09	42.56	46.69	49.59
30	14.95	18.49	29.34	36.25	40.26	43.77	47.96	50.89

ويعنى اتخاذ درجة الاحتمال ٠,٠٥ كأساس لقياس مطابقة النتائج المشاهدة مع النظرية الفرضية أن فرصة رفض نظرية صحيحة لاتزيد على ٥% ، بينما لاتزيد فرصة رفض نظرية صحيحة على ١٪ إذا اتخذت درجة احتمال ٠,٠١ كأساس .. فإنه توجد فى هذه الحالة فرصة أكبر لقبول نظرية غير صحيحة .

وتجب مراعاة الأمور التالية عند تطبيق اختبار مربع كاي .

١- لا يكون الاختبار حساساً للعينات الصغيرة ؛ فمثلاً .. يكون الانحراف عن النسبة ١:١ غير مقبول ، حسب اختبار مربع كاي ، إذا كانت النسبة المشاهدة ٢ : ٣ ، بينما يكون مقبولا إذا كانت النسبة المشاهدة ٢٠ : ٣٠ ، ويمكن القول .. إنه لايمكن تطبيق الاختبار - بدقة - على التوزيعات التى يقل فيها عدد الأفراد عن خمسة أفراد فى أى من الفئات .

٢- يزيد احتمال جوهرية النتائج كلما قرب الفرق المتوقع بين النسب ، فمثلاً .. يحتاج الاختبار إلى عينة أصغر حجماً ، عندما يكون الانعزال بنسبة ١ : ١ عما لو كان بنسبة ١ : ١٥ .

٣- لايمكن تطبيق اختبار مربع كاي - بدقة - على النسب المئوية ، أو النسب المأخوذة من تكرارات عديدة ، ولكن الاختبار يطبق على التكرارات العددية ذاتها ، فمثلاً .. إذا شُهد فى تجربة سبعة أفراد من طراز معين ، وواحد وعشرون فرداً من الطراز الآخر .. فإنه لا يكون من العدل إعادة حساب هذه القيم إلى نسب مئوية مثل ٢٥٪ للطراز الأول ، و٧٥٪ للطراز الثانى ، ثم بعد ذلك .. يطبق اختبار مربع كاي لهذه النسب المئوية التى تفترض أن المورد يتكون من مئة فرد ، بينما لا يوجد - حقيقة - فى هذه التجربة سوى ٢٨ فرداً ، وبالمثل .. فإن من الخطأ إعادة حساب القيمة المشاهدة ، تبعاً للنسبة ٣ : ١ مثلاً ، ثم اختبار هذه النسبة بمربع كاي بعد ذلك (طنطاوى وحامد ١٩٦٣ ، Whitehouse ١٩٧٣ ، Little & Hills ١٩٧٨) .

استخدام مربع كاي فى اختبار إن كانت مجموعة من العينات تنتمى إلى عشيرة واحدة أم لا :

يستخدم اختبار مربع كاي كذلك لدى مقارنة عشيرتين أو أكثر ، تقسم فيها الأفراد

إلى فئات نوعية ؛ فمثلا يجرى الاختبار عند مقارنة عشيرتين من محصول ما لمعرفة إن كانتا متشابهتين أم مختلفتين فى نسبة إصابتها بمرض ما . ويجرى الاختبار على اعتبار أن العشيرتين توجد بهما نفس درجة الإصابة بالمرض ؛ أى إنهما يجب أن يتشابهما فى نسبة النباتات المصابة بكل منهما ؛ فيحسب العدد المتوقع للنباتات المصابة فى كل من العشيرتين (أ ، ب) على أساس أنهما سيكونان بنفس النسبة التى توجد فى المجموع الكلى كما يلى :

$$\text{العدد المتوقع للنباتات المصابة من العشيرة أ} =$$

$$\frac{\text{العدد الكلى للنباتات المصابة فى العشيرتين} \times \text{العدد الكلى للنباتات المختبرة من العشيرة أ}}{\text{العدد الكلى للنباتات المختبرة من العشيرتين}}$$

$$\text{العدد الكلى للنباتات المختبرة من العشيرتين}$$

$$\text{العدد المتوقع للنباتات المصابة من العشيرة ب} =$$

$$\frac{\text{العدد الكلى للنباتات المصابة فى العشيرتين} \times \text{العدد الكلى للنباتات المختبرة من العشيرة ب}}{\text{العدد الكلى للنباتات المختبرة من العشيرتين}}$$

$$\text{العدد الكلى للنباتات المختبرة من العشيرتين}$$

وىلى ذلك .. حساب العدد المتوقع للنباتات غير المصابة من العشيرتين ؛ بحساب الفرق بين العدد الكلى المختبر ، والعدد المتوقع المصاب فى كل منهما ، ثم يحسب مربع كائى لأربع مجموعات من الأرقام المشاهدة والمتوقعة (تساوى دائما عدد العشائر المختبرة $\times$ عدد الفئات بكل عشيرة) ، وجمعها معاً .. نحصل على مجموع مربع كائى . ويحدد - بعد ذلك - احتمال حدوث هذه القيمة من جدول توزيع مربع كائى عند العدد المناسب من درجات الحرية . ويحسب عدد درجات الحرية المناسب من المعادلة التالية :

$$\text{عدد درجات الحرية} = (\text{عدد العشائر المختبرة} - 1) \times (\text{عدد الفئات بكل عشيرة} - 1)$$

$$\text{أى يكون عدد درجات الحرية فى هذا المثال : } (1 - 2) \times (1 - 2) = 1$$

ويعد احتمال ٠,٠٥ هو الحد الفاصل بين قيم مربع كائى الجوهرية (الأعلى من ٠,٠٥) وغير الجوهرية (٠,٠٥ أو أقل) وتدل القيم الجوهرية على أن العشيرتين مختلفتان وراثيا - عن بعضهما . أما القيم غير الجوهرية .. فتدل على أن العشيرتين

متشابهتان في درجة مقاومتها للمرض ، وأن فرقا بينهما - بالقدر المشاهد ، أو أكبر منه - لا يتوقع حدوثه بالمصادفة ، إلا في ٥٪ أو أقل من الحالات المشابهة (Briggs & Knowles ١٩٦٧) .

ولزيد من التفاصيل عن استعمالات اختبار مربع كاي .. يراجع أحد مراجع الإحصاء ؛ مثل LeClerc (١٩٦٢) ، و Snedecor & Cochran (١٩٦٧) ، و Little & Hills (١٩٧٨) ، و Gomez & Gomez (١٩٨٤) .

تأقلم العشائر النباتية على البيئة

يعنى تأقلم الصنف أو العشيرة قدرتها على النمو والإزهار والإثمار - بشكل جيد في ظروف بيئية معينة ، وهو ما يعنى قدرتها على إنتاج محصول جيد تحت هذه الظروف . ويرجع التأقلم إلى أحد أمرين ، هما كما يلي :

١- قدرة كل فرد - على حدة - في العشيرة على التأقلم مع الظروف البيئية السائدة وهو ما يعرف باسم التنظيم الفردي Individual Buffering وتوجد هذه الحالة في العشائر التي يتماثل جميع أفرادها في تركيبها الوراثي ؛ مثل السلالات النقية والهجن ، والسلالات الخضرية ، ويطلق على هذا النوع من التأقلم اسم Developmental Homeostasis .

٢- قدرة العشيرة - مجتمعة - على التأقلم مع الظروف البيئية السائدة ، وهو ما يعرف باسم تنظيم العشيرة Population Buffering وتوجد هذه الحالة في العشائر التي تتميز بوجود اختلافات بين أفرادها في التركيب الوراثي ، مثل الهجن الزوجية في الذرة ، والأصناف الناجحة من المحاصيل الخلطية التلقيح التي تكثر بالتلقيح الخلطي الطبيعي . وتتميز هذه العشائر بأن أفرادها تكون ذات تراكيب وراثية مختلفة ، يصلح كل منها لظروف معينة ، رغم أنها تعطى نفس الشكل المظهري للصفات الاقتصادية الهامة ، كما تتمكن التراكيب الوراثية المتباينة من استغلال مساحة الأرض ، دون أن تبقى فراغات بين النباتات ؛ مما يسمح بالاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية الحادثة ، ويطلق على هذا النوع من التأقلم اسم Genetic Homeostasis ، وتكون العشائر - في هذه الحالة - عرضة للانتخاب الطبيعي .

هذا .. ويوجد نوعان من التأقلم على البيئة ، هما :

١- تأقلم خاص Specific Adaptation :

يتميز الصنف - أو العشيرة - ذو التأقلم الخاص بتحملة لظروف بيئية خاصة ؛ مثل الملوحة العالية ، أو الحرارة المنخفضة أو المرتفعة .. إلخ . توجد هذه الأصناف - عادة - فى المناطق التى يكون الإنتاج فيها محدداً بمثل هذه الظروف البيئية الحادة .

٢- التأقلم العام General Adaptation :


يتميز الصنف - أو العشيرة - ذو التأقلم العام بتحملة لظروف بيئية متباينة ، وبقدرته على النمو ، وإنتاج محصول جيد فى مختلف الظروف ، ولكن لا يكون الصنف ذو التأقلم العام ناجحاً فى الحالات التى يوجد فيها انحراف حاد عن المتوسط العام فى أحد العوامل البيئية ؛ حيث يحسن فى هذه الحالة استخدام أصناف ذات تأقلم خاص . ومن أمثلة الأصناف ذات التأقلم العام .. أصناف القمح المكسيكية ، وأصناف الأرز التى أنتجت فى معهد بحوث الأرز الدولى فى الفلبين ، والتى نجحت زراعتها فى عديد من دول العالم .

عشائر النباتات الذاتية التلقيح

يؤدى التلقيح الذاتى المستمر - فى النباتات الذاتية التلقيح - إلى أن تصبح جميع النباتات أصيلة تماماً Homozygous 100% فى جميع عواملها الوراثية ، وتقل درجة الاصلالة الوراثية عن ١٠٠٪ إذا حدثت بالعشيرة نسبة من التلقيح الخلطى ، وكان التلقيح بين نباتات تختلف وراثياً عن بعضها ويتوقف مدى الانخفاض - فى الاصلالة الوراثية - عن ١٠٠٪ على نسبة التلقيح الخلطى التى تحدث فى الطبيعة . ويبين شكل (٢-٣) تأثير التلقيح الذاتى المستمر على نسبة النباتات الخليطة فى جين واحد . ويلاحظ من الشكل أن نسبة النباتات الخليطة تقل بمقدار النصف بعد كل جيل من أجيال التلقيح الذاتى . ويمكن حساب نسبة النباتات الخليطة فى الصفة بعد عدد قدره (ن) من أجيال التلقيح الذاتى من المعادلة التالية :

$$\text{نسبة النباتات الخليطة فى الصفة} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \times 100$$

جيل التلقيح الذاتي



شكل (٢ - ٣) : تأثير التلقيح الذاتي على النسبة المئوية للنباتات الخليطة ، يلاحظ أن نسبة النباتات الخليطة تقل بمقدار النصف مع كل جيل من أجيال التلقيح الذاتي (عن Brewbaker ١٩٦٤) .

أما بقية النباتات فتكون أصيله في الصفة ، ويحصل على نسبتها بطرح نسبة النباتات الخليطة من مئة . ويعنى ذلك أن نسبة النباتات الخليطة في أى عامل وراثى تصبح - على سبيل المثال - ١٥٦٢٥ ٪ بعد ٦ أجيال من التلقيح الذاتي ، و ٣٩٠ ٪ بعد ٨ أجيال ، و ٠٠٩٨ ٪ بعد ١٠ أجيال ، و ٠٠٠٠٠٣ ٪ بعد ١٥ جيلاً ... وهكذا . فلو ظهرت طفرة أدت إلى تغير التركيب الوراثى الأصل W^1W^1 إلى W^1W^2 كما فى شكل (٢-٣) .. فإن التلقيح الذاتى المستمر يؤدي إلى اختفاء النباتات الخليطة فى هذه الطفرة وانعزال مجموعتين من النباتات ، تحون إحدهما أصيلة فى الجين الأصل W^1W^1 والأخرى أصيلة فى الطفرة W^2W^2 وإذا حدث تلقيح خلطى طبيعى بين نباتين من هاتين المجموعتين .. فإن مصير النبات الخليط الناتج W^1W^2 يكون هو نفس مصير النبات الذى ظهرت فيه الطفرة الأصلية ؛ حيث يؤدي التلقيح الذاتى المستمر إلى نقص نسبة النباتات الخليطة فى النسل بمقدار النصف بعد كل جيل من أجيال التلقيح الذاتى كما سبق بيانه . ويعنى ذلك أن الأصالة الوراثية تكون هى السمة المميزة لعشائر النباتات الذاتية التلقيح .

السلالات النقية

تعرف السلالة النقية Pure Line بأنها : النسل الناتج من الإكثار الجيسى لأى نبات ذاتى التلقيح ، كما يعد النسل الناتج من الإكثار الجيسى لأفرادها من نفس السلالة النقية

مادام لا يحدث بها أى تغير وراثى بطريق الطفرات ، أو نتيجة التلقيح الخلطى مع نباتات من خارج السلالة ، ويتضح من التعريف السابق أنه يشترط - لإطلاق اسم سلالة نقية على نباتات محصول ما - أن يكون إكثاره جنسياً ، وتلقيحه ذاتياً . وأن تبدأ السلالة بنسل نبات واحد فقط ولكنها يمكن أن تتسع لتشمل أنسال هذه النباتات أيضاً .

كان يوهانسن Johanssen هو الذى توصل إلى ما عرف بنظرية السلالة النقية Pure line theory وذلك فى عام ١٩٠٣ بعد دراسات مستفيضة على الفاصوليا التى تعد من المحاصيل الذاتية التلقيح ، والتى يندر أن يحدث فيها تلقيح خلطى ، وقد لاحظ يوهانسن وجود اختلافات كبيرة فى وزن البنور الجافة فى الصنف الواحد ، وفى نسل النبات الواحد ، وبدأ دراسته بأن سجل وزن ٥٤٩٤ بذرة - كل على حدة - من صنف الفاصوليا Princess ، فوجد أن أوزانها قد توزعت توزيعاً طبيعياً ، وكان المتوسط العام لوزن البذرة الواحدة ٤٩٥ مجم . قام يوهانسن باختيار عدد من البنور ، تمثل المدى العام لوزن البذرة ، وزرعها فى الموسم التالى ، ثم اعتنى بتسعة عشر نباتاً منها حتى النضج ؛ حيث حصد بنور كل نبات على حدة ، ثم قدر متوسط وزن البذرة فى كل نسل منها ، فوجد أنها تراوحت من ٣٥٠ إلى ٦٤٠ مجم / بذرة . كما وجد أن متوسط وزن البذرة كان عالياً فى النباتات التى نتجت عن زراعة بنور كبيرة ، ومنخفضاً فى النباتات التى نتجت من زراعة بنور صغيرة ، وهو ما يدل على أن الانتخاب - فى تلك المرحلة - كان فعالاً . حافظ يوهانسن بعد ذلك على السلالات التسع عشرة ؛ بزراعتها لمدة ستة أجيال ، ووجد أن متوسط وزن البذرة ظل ثابتاً فى كل سلالة ، طوال فترة التجربة ؛ حيث تراوح من ٦٤٠ مجم / بذرة فى السلالة رقم (١) إلى ٣٥٠ مجم / بذرة فى السلالة رقم ١٩ .

وبالإضافة إلى ماتقدم .. قام يوهانسن بزراعة أكبر ، وأصغر البنور من كل من السلالات التسع عشرة ، ووجد أن متوسط وزن البذرة مساو دائماً - فى نسل النباتات التى نتجت من زراعة بنور كبيرة - لمتوسط الوزن فى نسل النباتات التى نتجت من زراعة بنور صغيرة وذلك فى كل من السلالات التسع عشرة (جدول ٣-٦) ولم تتغير تلك الحقيقة رغم استمراره فى انتخاب أكبر البنور وأصغرها لستة أجيال متتالية (جدول ٣-٧) ... إلا أنه كانت تظهر فى كل جيل اختلافات قليلة فى أوزان البنور ، داخل كل نسل .

جدول (٢-٦) : تباين السلالات النقية لصنف الفاصوليا Princess في متوسط وزن البذرة ، وتأثير الانتخاب داخل كل سلالة لجيل واحد على متوسط وزن البذرة (عن Merrell ١٩٧٥) .

وزن البذور المنتخبة كالمها						عدد البذور	متوسط وزن	
٧.	٦.	٥.	٤.	٣.	٢.	الممتلئة	البذرة	
متوسط وزن بذرة النسل (يذكر عند البذور الموزونة بين الأقواس)						للسلالة	(بالستيجرام)	السلالة
(٩١)٦٤,٩	(٥٤)٦٣,١					(١٤٥)	٦٤,٢	١
(٧٤)٥٥,٥	(١٢٠)٥٦,٥	(١٩٥)٥٤,٩	(٨٦)٥٧,٢			(٤٧٥)	٥٥,٨	٢
(٩٨)٥٤,٤	(٤٠)٥٦,٦	(١٤٤)٥٦,٤				(٢٨٢)	٥٥,٤	٣
(١١٢)٥٦,٦	(١٦٣)٥٣,٦	(٢٢)٥٤,٢				(٣٠٧)	٥٤,٨	٤
(١١٩)٥٠,٢		(٢٩)٤٩,٢	(١٠٧)٥٢,٨			(٢٥٥)	٥١,٢	٥
	(١٠)٤٢,٥		(١١١)٥٠,٨	(٢٠)٥٣,٥		(١٤١)	٥٠,٦	٦
	(٢٧)٤٨,٢		(٢٦٢)٤٩,٥		(١٦)٤٥,٩	(٣٠٥)	٤٩,٢	٧
		(٢٠)٤٧,٥	(١١٩)٤٩,١	(٢٠)٤٩,٠		(١٥٩)	٤٨,٩	٨
		(١٢٤)٤٧,٩		(١١٧)٤٨,٥		(٢٤١)	٤٨,٢	٩
		(٩٣)٤٦,٩	(٤١٢)٤٦,٧	(٢٨)٤٢,١		(٥٣٣)	٤٦,٥	١٠
		(٨٧)٤٦,٢	(٢١٧)٤٥,٤	(١١٤)٤٥,٢		(٤١٨)	٤٥,٥	١١
	(٢٧)٤٤,٠	(٤٢)٤٥,١			(١٤)٤٩,٦	(٨٢)	٤٥,٥	١٢
	(٩٥)٤٥,٨	(٢٠٥)٤٥,١	(٢١٩)٤٥,٠	(٩٣)٤٧,٥		(٧١٢)	٤٥,٤	١٣
	(٣٤)٤٢,٨		(٥١)٤٦,٩	(٢١)٤٥,٤		(١٠٦)	٤٥,٣	١٤
	(٣٩)٤٥,٠	(١٣١)٤٤,٦			(١٨)٤٦,٩	(١٨٨)	٤٥,٠	١٥
		(٣٦)٤١,٠	(٩٠)٤٤,١	(١٤٧)٤٥,٩		(٢٧٣)	٤٤,٦	١٦
			(٢١٧)٤٢,٤		(٧٨)٤٤,٠	(٢٩٥)	٤٢,٨	١٧
			(١٠٠)٤٠,٨	(٢٠٣)٤٠,٧	(٥٤)٤١,٠	(٣٥٧)	٤٠,٨	١٨
			(١٤٧)٣٤,٨	(٧٢)٣٥,٨		(٢١٩)	٣٥,١	١٩

جدول (٣-٧) : تأثير انتخاب البنور الخفيفة والثقيلة لسته أجيال فى السلالة رقم ١ من صنف الفاصوليا Princess .

سنة الحصاد	متوسط وزن بذور الأمهات المنتخبة		متوسط وزن بذور النسل		الفرق
	الوزن الخفيف	الوزن الثقيل	الوزن الخفيف	الوزن الثقيل	
١٩٠٢	٦٠	٧٠	٦٣,١٥	٦٤,٨٥	١,٧٠ +
١٩٠٣	٥٥	٨٠	٧٥,١٩	٧٠,٨٨	٤,٣١ -
١٩٠٤	٥٠	٨٧	٥٤,٥٩	٥٦,٦٨	٢,٠٩ +
١٩٠٥	٤٣	٧٣	٦٣,٥٥	٦٣,٦٤	٠,٠٩ +
١٩٠٦	٤٦	٨٤	٧٤,٣٨	٧٣,٠٠	١,٣٨ -
١٩٠٧	٥٦	٨١	٦٩,٠٧	٦٧,٦٦	١,٤١ -

وقد توصل يوهانس - من هذه الدراسة - إلى أن نسل أى نبات ذاتى التلقيح يكون عبارة عن سلالة نقية لايجدى فيها الانتخاب ؛ ورغم أنه قد يظهر بين نباتاتها بعض الاختلافات ، إلا أنها تكون بيئية ولا تورث . ويفسر ذلك - وراثياً - على أساس أن التلقيح الذاتى المستمر فى النباتات الذاتية التلقيح يجعل كل نبات فى العشيرة أصيلاً وراثياً . ونظراً لأن أية طفرة حدثت فى الماضى تكون قد انعزلت إلى فئتين من النباتات : أصيلة سائدة ، وأصيلة متنحية .. فإن نباتات العشائر الطبيعية قد تختلف عن بعضها وراثياً . ويؤدى التلقيح الذاتى لأى نبات منها إلى إنتاج سلالة نقية لا تظهر بها أية انعزالات وراثية ؛ لأنها تنتج من التلقيح الذاتى لنبات أصيل وراثياً ، وتتحدد الاختلافات بين هذه السلالات بمدى الاختلافات الوراثية بين النباتات التى انحدرت منها . وإذا ظهرت اختلافات بين نباتات كل سلالة .. فإن مردها يكون إلى البيئة ولا تورث . ويفسر ذلك الاختلافات التى حصل عليها يوهانس بين السلالات التسع عشرة ، ثم ثبات صفاتها بعد ذلك رغم استمرار انتخابه لأكبر البنور وأصغرها فى كل سلالة منها لسته أجيال .

يمكن - استناداً إلى ما تقدم - وصف السلالة النقية بأن جميع أفرادها تكون أصيلة وراثياً ، ومتماثلة تماماً مع بعضها فى تركيبها الوراثى ؛ أى إنها تكون 100% homozygous ، و 100% homogenous وغنى عن البيان .. أن أفرادها لا تكون أصيلة سائدة فقط أو أصيلة متنحية فقط فى جميع العوامل الوراثية ، بل إن العكس هو الصحيح ؛ حيث تكون بعض المواقع الجينية أصيلة سائدة ، وبعضها الآخر أصيلة متنحية .

الأنصاف البلدية (غير المحسنة)

تعد الأنصاف البلدية غير المحسنة land varieties عشائر طبيعية ، أدخلت فى الزراعة فى المناطق التى تنتشر فيها زراعة هذه الأنصاف ، وهى تتميز بتأقلمها على الظروف البيئية السائدة ، وتحملها للأفات المنتشرة فى هذه المناطق ؛ لذا .. فإنها تعد مصدراً جيداً لهذه الصفات على الرغم من أنها قليلة التجانس ، وأقل محصولاً وجودة من الأنصاف المحسنة .

تتميز عشائر الأنصاف البلدية من المحاصيل الذاتية التلقيح بأنها قليلة التجانس ؛ حيث تظهر اختلافات مظهرية واضحة بين أفرادها ويكون لها أساس وراثى ، كما أن كل فرد منها يكون أصيلاً وراثياً بدرجة عالية ، ولكن أصلاتها الوراثية تظل - غالباً - أقل من ١٠٠٪ ، ويفسر ذلك على أساس أن ظهور أية طفرة يتبعه انعزال فئتين أصيلتين من النباتات ، تحتوى إحداهما على الجين الطبيعى وتحتوى الأخرى على الطفرة . ومن الطبيعى أن الطفرات تحدث فى نباتات مختلفة ، ثم تتأصل فى نسلها فقط ، بينما تظل بقية النباتات فى العشيرة خالية منها . ورغم ضالة معدل ظهور الطفرات الطبيعية .. إلا أنها تظهر على مر السنين ، وفى عديد من المواقع الجينية وهو ما يؤدى إلى عدم تجانس أفراد العشيرة الواحدة فى تركيبها الوراثى . ويساعد حدوث نسبة بسيطة من التلقيح الخلطى إلى ظهور عديد من الانعزالات الوراثية ، التى تتأصل مرة أخرى مع معاودة التلقيح الذاتى ؛ فتبقى النباتات أصيلة ، ولكن تزيد بالعشيرة حالة عدم التجانس الوراثى ، ورغم أن التلقيح الذاتى يؤدى إلى الأصالة الوراثية التامة .. إلا أنها تظل أقل من ١٠٠٪ ؛ بسبب التلقيحات الخلطية القليلة التى قد تحدث - أحياناً - بين النباتات التى تختلف عن بعضها وراثياً .

الأصناف المحسنة الثابتة وراثياً

تعرف الأصناف المحسنة improved varieties غير الهجين من المحاصيل الذاتية التلقيح بأنها ثابتة وراثياً stable ، وذاتية الإكثار self-reproducing ، وصادقة التربية true-breeding ؛ وذلك لأن هذه الأصناف تكثر بواسطة نسلها الناتج من التلقيح الذاتي الطبيعي ، ولا تتغير صفاتها من جيل إلى آخر . ويتميز هذه الأصناف بأنها تكون على درجة عالية من التجانس الوراثي highly homogenous لأنها تكثر - منذ بداية إنتاجها - من نباتات متجانسة مظهرياً ووراثياً في جميع الصفات الاقتصادية المهمة ، كما تتم المحافظة عليها من أي خلط وراثي باستئصال النباتات المخالفة للصفة التي تظهر كطفرات - أولاً بأول - من حقول إنتاج البنور ، التي تعزل بدورها عن حقول الأصناف الأخرى بمسافة مناسبة ، تمنع حدوث أي خلط ميكانيكي أو وراثي . ويكون كل نبات في العشيرة أصيلاً وراثياً ، بدرجة تصل إلى ١٠٠٪ في جميع الصفات الاقتصادية المهمة ، ولكن تبقى دائماً حالات قليلة من الخلط الوراثي heterozygosity في بعض المواقع التي لا يكون لها تأثير مظهرى واضح . وبينما ترجع الأصالة إلى التلقيح الذاتي المستمر .. فإن الخلط الوراثي يحدث عقب التلقيحات الخلطية التي تحدث بنسبة منخفضة بين أفراد تكون حاملة لآليات مختلفة من هذه الجينات .

الأصناف الهجين

تستخدم الأصناف المحسنة الثابتة وراثياً ، أو السلالات النقية كنساء لإنتاج الأصناف الهجين من المحاصيل الذاتية التلقيح . ونظراً لأن أيأ من الآباء المستخدمة يكون أصيلاً وراثياً ، ولا ينتج سوى نوع واحد من الجاميطات .. لذا فإن اتحاد جاميطات الأبوين ينتج عنه تركيب وراثي واحد هو الصنف الهجين ؛ أي إن الصنف الهجين يكون متجانساً بنسبة ١٠٠٪ أو قريباً من ذلك . هذا وتختلف الآباء المستخدمة في إنتاج الصنف الهجين عن بعضها وراثياً - إلى حد كبير - (تزيد عادة قوة الهجين كلما بعدت القرابة بين الأبوين) وهو ما يعنى أن النباتات الهجين تكون على درجة عالية من الخلط الوراثي highly heterozygous .

عشائر النباتات الخلطية التلقيح

تتميز عشائر النباتات الخلطية التلقيح - التي تكثر بالتلقيح الخلطي الطبيعي بين

أفرادها - بأنها تكون غير متجانسة وراثياً heterogenous ، كما تكون أفرادها خليطة وراثياً heterozygous ، ولكن تتفاوت النوعيات المختلفة من عشائر هذه النباتات في درجتي عدم التجانس والخلط الوراثي ، وبعد التلقيح الخلطي - الذي تكثر به هذه العشائر في الطبيعة - المسنول الأول عن حالتي عدم التجانس والخلط الوراثي فيها لأنه يؤدي إلى تكوين وانعزال تراكيب وراثية جديدة بصفة دائمة ، بينما لا تتوفر الفرصة لحدوث تلقيح ذاتي ، يمكن أن يؤدي إلى تأصيل الصفات ... وتشترك جميع الجينات الموجودة في العشيرة الواحدة ، التي تدخل في شتى التراكيب الوراثية التي تمثل أفراد العشيرة فيما يسمى بمجمع الجينات gene pool الذي يعطى - في المتوسط - نفس التأثير في الشكل المظهرى من جيل إلى آخر مادام أنه لا يحدث تغيير في نسبة الآليات المختلفة لكل جين في العشيرة . ولكن يتحدد مصير الجين في العشائر الطبيعية بمدى تأثيره في الشكل المظهرى ؛ فإن كان تأثيره ضاراً .. فإن نسبته تقل تدريجياً ، والعكس صحيح . وإذا كان الجين ذو التأثير الضار مرتبطاً بجين آخر ذو تأثير مفيد .. فإن نسبة الجين الضار تبقى مرتفعة - إلى حد ما - بسبب الانتخاب الذي يحدث لصالح الجين المفيد المرتبط معه . ولكن يتوقف التوازن النهائى على مدى الضرر الذى يحدثه الجين الضار ، ومدى الفائدة التى تعود من الجين المفيد . وعندما تصل العشيرة إلى حالة التوازن .. فإن نسبة آليات الجينات المختلفة تظل ثابتة من جيل لآخر مادامت الظروف البيئية لم تتغير .

وبناء على ما تقدم بيانه .. فليس هدف مربي المحاصيل الخلطية التلقيح هو البحث عن نبات ، أو مجموعة نباتات ذات تركيب وراثي جيد ، بل هو البحث عن مجمع للجينات تعطى أفرادها - معاً - أشكالاً مظهرية مرغوباً فيها ومتقاربة (رغم أنها تكون خليطة وتختلف وراثياً عن بعضها) مع دوام نفس التأثير جيلاً بعد آخر . ويمكن القول .. إن مصير أى جين في مجمع الجينات يتوقف على مدى تأثيره في كل من الحالات التالية

١- الحالة الأصلية .

٢- الحالة الخلطة مع الآليات الأخرى للجين في نفس الموقع .

٣- حالات الانعزالات التى تؤثر فيها جينات أخرى غير آليية عليها (حالات التفوق

(epistasis) .

٤- حالات الارتباط الشديد مع الجينات الأخرى الضارة أو المفيدة .

يتضح من كل ما تقدم أن فهم الأساس الوراثى للنباتات الخلطية التلقيح .. يتطلب دراسة الجينات فى العشائر . ويعد قانون هاردى - فينبرج وسيلة لتحقيق هذا الهدف .

قانون هاردى - فينبرج

يستخدم قانون هاردى - فينبرج Hardy - Weinberg Law فى دراسة العشائر المنديلية Mendelian populations ، وهى العشائر التى تتكون من أفراد تتزاوج مع بعضها جنسياً . وقد بدأت دراسة العشائر من الوجهة الوراثية منذ عام ١٩٠٨ ، حينما قدم كل من هاردى فى إنجلترا ، و فينبرج فى المانيا (فى عام ١٩٠٩) قواعد جديدة لدراسة تكرار الجينات gene frequencies فى العشائر المنديلية . ويُقصد بالتكرار الجينى لجين ما فى العشيرة .. توضيح إن كان هذا الجين نادراً فى العشيرة أو غير نادر بالنسبة لآلياته الأخرى الموجودة فى نفس العشيرة . وقد أظهر هاردى و فينبرج أن العشائر المنديلية تحتوى على أى نسب لكل من الآليات السائدة والمتنحية لأى جين دونما أية علاقة بالنسب المنديلية المعروفة ، وأن التكرار النسبى لكل أليل يبقى ثابتاً من جيل إلى آخر ، بافتراض توفر الشروط التالية :

- ١- ألا يحدث انتخاب طبيعى ، أو انتخاب بواسطة الإنسان لصالح أى من التراكيب الوراثية فى العشيرة ، أو ضدها .
- ٢- أن يكون التزاوج بين أفراد العشيرة عشوائياً random mating ويقصد بذلك أن يكون لكل نبات نفس الفرصة لأن يُلَقَّح بحبوب لقاح من أى نبات آخر .
- ٣- أن تكون العشيرة كبيرة بالقدر الذى يسمح بحدوث كل التزاوجات الممكنة بين أفرادها .
- ٤- ألا تحدث هجرة migration إلى العشيرة من عشائر منديلية أخرى .
- ٥- أن يكون معدل حدوث الطفرات الشائعة واحداً فى كلا الاتجاهين ، أى بنفس المعدل من A إلى a مثلاً ، كما هو من a إلى A .
- ٦- أن تتساوى جميع أفراد العشيرة فى حيويتها وخصوبتها .

وينص قانون هاردى - فينبرج على أنه إذا كانت نسبة الأليلين A و a فى عشيرة منديلية هى p و q على التوالى (حيث $q+p=1$) .. فإن نسب التراكيب الوراثية المختلفة

تكون كما يلي :


$$p^2 = AA$$

$$2pq = Aa$$

$$q^2 = aa$$

$$1 = q^2 + 2pq + p^2 \text{ حيث}$$

وتصل أية عشيرة إلى حالة التوازن الوراثي بعد جيل واحد من التزاوج العشوائي ، وتظل على حالة التوازن هذه (من حيث نسب التراكيب الوراثية الأصلية السائدة ، والخلطة ، والأصيلة المتنحية لكل موقع جيني) ما دامت شروط القانون قد تحققت . ويبين شكل (٣-٢) نسب التراكيب الوراثية المختلفة الأصلية والخلطة ، التي تصل إليها حالة التوازن في العشيرة عند النسب المختلفة لآليلي الجين .



شكل (٣-٢) : نسب التراكيب الوراثية المختلفة الأصلية والخلطة التي تصل إليها حالة التوازن في العشيرة عند النسب المختلفة لآليلي الجين . يبين المحور الأفقي نسبة الآليل A2 ما نسبة الآليل A1 فتكون قيمتها 1 - A2 عند كل قيمة لنسبة الآليل A2 (Falconer ١٩٨١) .

ويمكن إثبات قانون هاردي - فينبرج على النحو التالي : إذا افترضنا وجود زوج من الأليلات A_1, A_2 في أحد المواقع الجينية ، ورمزنا لنسب الأليلات والتراكيب الوراثية الأصلية والمساندة كما يلي :

التراكيب الوراثية			الجينات	
$\frac{A_2A_2}{Q}$	$\frac{A_1A_2}{H}$	$\frac{A_1A_1}{P}$	$\frac{A_2}{q}$	$\frac{A_1}{p}$

فإن ذلك يعنى وجود ٩ تزاوجات عشوائية ممكنة بين التراكيب الوراثية المختلفة يمكن أن تأخذ الرموز التالية :

التراكيب الوراثية ونسبتها في الأب					التراكيب الوراثية ونسبتها في الأم
$\frac{A_2A_2}{Q}$	$\frac{A_1A_2}{H}$	$\frac{A_1A_1}{P}$			
PQ	PH	P^2	P	A_1A_1	
HQ	H^2	PH	H	A_1A_2	
Q^2	HQ	PQ	Q	A_2A_2	

ونظراً لأنه لا يهتم مصدر الجاميطات أهي من الأب أم من الأم ؛ لذا .. فإنه يمكن ضم أنواع ونسب الجاميطات معاً ، كما يظهر في العمود الأيمن من جدول (٣ - ٨) . يلاحظ في الجدول أن التزاوج $A_1A_1 \times A_1A_1$ يحدث بنسبة p^2 ، وينتج منه تركيب وراثي واحد هو A_1A_1 تكون نسبته p^2 أيضاً أما التراكيب $A_1A_2 \times A_1A_2$ الذي يحدث بنسبة H^2 فإنه ينتج التراكيب الوراثية الثلاثة A_1A_1 بنسبة $\frac{1}{4} H^2$ ، و A_1A_2 بنسبة $\frac{1}{2} H^2$ ، و A_2A_2 بنسبة $\frac{1}{4} H^2$. وبذا .. فإنه يمكن الحصول على التراكيب الوراثية التي تنتج من كل تزاوج ونسبتها . تظهر محصلة جميع التزاوجات أسفل الجدول ؛ حيث يتبين أن نسبة التراكيب الوراثية المتحصل عليها من جميع التزاوجات هي p^2 ، و $2pq$ ، و q^2 للتراكيب الوراثية A_1A_1 ، A_1A_2 ، و A_2A_2 على التوالي ، وهو ما يثبت وصول

العشيرة إلى حالة التوازن بعد جيل واحد من التلقيح العشوائي (Falconer ١٩٨٨) .

جدول (٢ - ٨) : نسب التراكيب الوراثية المتحصل عليها بعد جيل واحد من التزاوج العشوائي مشيرة ، يوجد فيها ثلاثة تراكيب وراثية هي A_1A_1 بنسبة P ، و A_1A_2 بنسبة H ، و A_2A_2 بنسبة Q .

التراكيب الوراثية التي تنتج من التزاوجات ونسبتها			التزاوج	
A_2A_2	A_1A_2	A_1A_1	نسبه	نوع التزاوج
—	—	P^2	P^2	$A_1A_1 \times A_1A_1$
—	PH	PH	$2PH$	$A_1A_1 \times A_1A_2$
—	$2PQ$	—	$2PQ$	$A_1A_1 \times A_2A_2$
$\frac{1}{4} H^2$	$\frac{1}{2} H^2$	$\frac{1}{4} H^2$	H^2	$A_1A_2 \times A_1A_2$
HQ	HQ	—	$2HQ$	$A_1A_2 \times A_2A_2$
Q^2	—	—	Q^2	$A_2A_2 \times A_2A_2$
$(Q + \frac{1}{2} H)^2$	$2(P + \frac{1}{2} H)(Q + \frac{1}{2} H)$	$(P + \frac{1}{2} H)^2$	المجموع	
q^2	$2pq$	p^2		

وكمثال على ما تقدم بيانه .. نفترض أن المربي كون عشيرة بزراعة ٢٠ نباتاً أصيلاً متيحياً (aa) مع ٤٠ نباتاً خليطاً (Aa) ، و ٤٠ نباتاً أصيلاً سائداً (AA) في إحدى الصفات والمطلوب هو معرفة هل هذه العشيرة في حالة توازن ؟ وإن لم تكن كذلك .. فمتى تصل إلى حالة التوازن ؟ وما حالة التوازن التي تصل إليها حينئذ ؟ وتتطلب الإجابة عن هذه الأسئلة أن نفترض حدوث تلقيح عشوائي بين هذه النباتات ، لنعرف ماسيكون عليه وضع العشيرة في الجيل التالي .

عندما تكون هذه العشيرة جاميطاتها المذكرة والمؤنثة .. فإنها تكون على النحو التالي :
تنتج الآباء حبوب لقاح تحمل الأليل (A) ، وتكون نسبتها $p = \frac{1}{2}$ ، (من التراكيب الوراثية

(AA) + ٠,٢ (من التراكيب الوراثية Aa) = ٠,٦ ، كما تنتج حبوب لقاح أخرى تحمل الأليل (a) تكون نسبتها q = ٠,٢ (من التراكيب الوراثية Aa) + ٠,٢ (من التراكيب الوراثية Aa) = ٠,٤ وتنتج الأمهات - فى نفس الوقت - بيضات تحمل الأليل (A) بنسبة p = ٠,٦ ، وبيضات تحمل الأليل (a) بنسبة q = ٠,٤ أيضاً . ويؤدى التزاوج الاعتباطى بينها إلى أن تصبح نسب التراكيب الوراثية المختلفة فى الجيل الثانى كما يلى :

الأمهات

<u>., ε = q = a</u>	<u>., γ = p = A</u>	<u>الـ</u>
., γε = pq = Aa	., γγ = p2 = AA	., γ = p = A
., γγ = q2 = aa	., γε = pq = Aa	., ε = q = a

أى إن $p^2 = AA = ٣٦$ ، ، و $2pq = Aa = ٤٨$ ، ، و $q^2 = aa = ١٦$. وتلك هي حالة التوازن التي تصبح عليها العشيرة ، وهي التي تصل إليها بعد جيل واحد من التلقيح الخلطي العشوائى ، تبعاً لقانون هاردي - وينبرج .

ولإثبات أن هذا الوضع الجديد هو - فعلا- حالة التوازن التي تظل عليها العشيرة ..
نفترض حدوث تلقيح خلطي مرة أخرى ؛ لنعرف ما سيكون عليه وضع العشيرة بعد جيل
آخر من التلقيح العشوائي . وتنتج هذه العشيرة حبوب لقاح ، تحمل الأليل (A) بنسبة q
 $= 0,36$ (من التراكيب الوراثية AA) + $0,24$ (من التراكيب الوراثية Aa) = $0,60$ ،
كما تنتج حبوب لقاح أخرى تحمل الأليل (a) تكون نسبتها $q = 0,16$ (من التراكيب
الوراثية aa) + $0,24$ (من التراكيب الوراثية Aa) = $0,40$ وتنتج الأمهات -فى الوقت
نفسه - بيضات تحمل الأليل (A) بنسبة $p = 0,6$ ، وبيضات تحمل الأليل (a) بنسبة q
 $= 0,4$. أيضاً . ويلاحظ أن نسب الجاميطات المتكونة هي نفس النسب التي كانت عليها
الجاميطات فى الجيل السابق ؛ لذا .. فإن التزاوج الاعتيادى بينها لا يغير من نسب
التراكيب الوراثية المختلفة فى العشيرة . أى إن العشيرة كانت قد وصلت بالفعل إلى حالة
التوازن الوراثى بعد جيل واحد من التلقيح الخلطي العشوائي ، وتظل على هذا الوضع
مادامت شروط تطبيق القانون قد تحققت .

ويطبق القانون - أيضاً - فى حالة وجود ثلاثة أليلات للجين فى العشيرة ، وينص القانون - فى هذه الحالة- على أنه إذا كانت نسبة الأليلات A_1 ، و A_2 ، و A_3 فى عشيرة مندلية هى p ، و q ، و r على التوالى (حيث $p + q + r = 1$) . فإن نسب التركيب الوراثية المختلفة تكون كما يلى :

$$p^2 = A_1A_1$$

$$q^2 = A_2A_2$$

$$r^2 = A_3A_3$$

$$2pq = A_1A_2$$

$$2pr = A_1A_3$$

$$2qr = A_2A_3$$

$$\text{حيث } 1 = 2qr + 2pr + 2pq + r^2 + q^2 + p^2$$

وتصل أية عشيرة إلى حالة التوازن الوراثى بعد جيل واحد من التزاوج العشوائى ، وتظل على حالة التوازن هذه مادامت شروط القانون قد تحققت .

وسواء وجدت ثلاثة أليلات أم أكثر من كل جين .. فإن اهتمام المربي يكون منصبا على أليل واحد منها وينظر إلى بقية الأليلات مجتمعة كأكليل ثانٍ . وبذا .. يستمر استعمال القانون بنفس طريقة استعماله عند وجود أليلين فقط للجين .

ويستخدم قانون هاردى - فينبرج فى تقدير مدى التقدم الذى يمكن إحرازه فى تنقية عشيرة ماخلطية التلقيح ، من صفة متنحية غير مرغوب فيها ، علما بأن الجينات التى تتحكم فى مثل هذه الصفات .. تظل دائماً مختفية فى الحالة الخليطة . ويؤدى التخلص من النباتات المتنحية الأصلية - التى تظهر بها الصفة قبل الإزهار- إلى إحراز تقدم كبير فى خفض نسبة الأكليل المتنحى غير المرغوب فيه (أى خفض q) فى الأجيال الأولى من الانتخاب ، عندما تكون قيمة q أصلاً كبيرة ، ثم يقل مدى التقدم الذى يمكن إحرازه فى كل جيل من الانتخاب ، كلما انخفضت قيمة q كما يتبين من جدول (٣-٨) . أما إذا أجرى الانتخاب (استبعاد النباتات غير المرغوب فيها) بعد الإزهار .. فإن الانخفاض فى

قيمة q يقل معدله بعد كل جيل من الانتخاب إلى نصف ماتكون عليه الحال عند إجراء الانتخاب قبل الإزهار ؛ لأن حبوب اللقاح التي تخصب بويضات النباتات المنتخبة تكون من كل من النباتات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها على حد سواء .

جدول (٩ ٣) : تأثير استبعاد جمع الأفراد الحاملة لصفة متنحية غير مرغوب فيها (q_2) على نسبة الأليل المتنحي (q) في عشيرة مندلية خلطية التلقيح (عن Burns ١٩٨٣) .

نسبة الأليل المتنحي (q)	عدد الأجيال الانتخابية ضد الصفة
٠,٥٠٠	جيل عشيرة الأساس
٠,٣٣٣	١
٠,٢٥٠	٢
٠,٢٠٠	٣
٠,١٦٧	٤
٠,١٤٣	٥
٠,١٢٥	٦
٠,١١١	٧
٠,١٠٠	٨
٠,٠٩١	٩
٠,٠٨٣	١٠
٠,٠١٩	١١
٠,٠١٠	١٢
٠,٠٠١	١٣

ونلاحظ على ماتقدم بيانه .. نفترض أن عشيرة في حالة توازن كانت فيها نسبة النباتات المتنحية الأصلية $aa = q^2 = ٠,٣٦$. ويعنى ذلك أن نسبة الأليل المتنحي $q = (a) = \sqrt{٠,٣٦} = ٠,٦$ ، وأن نسبة الأليل السائد $(A) = p = ١ - q = ٠,٤$ ؛ وبهذا .. تكون نسبة التركيب الوراثي السائد الأصيل $AA = p^2 = ٠,٤ \times ٠,٤ = ٠,١٦$ ، ونسبة التركيب الوراثي السائد الخليط $Aa = 2pq = ٠,٤ \times ٠,٦ \times ٢ = ٠,٤٨$. فإذا أمكن التخلص من جميع النباتات التي تحمل التركيب الوراثي المتنحي aa قبل الإزهار .. فإن النباتات المتبقية تكون أباء وأمهات للجيل التالي ، وتنتج جاميطاتها على

النحو التالي : تتكون حبوب لقاح تحمل الأليل السائد (A) تكون نسبتها $p = [0.16, 0]$ (من التراكيب الوراثية AA) + 0.24 (من التراكيب الوراثية Aa) $\div 0.64$ (مجموع نسب التراكيب الوراثية التي تشارك في إنتاج الجاميطات للجيل التالي) $= [0.625, 0]$ ، كما تتكون أيضاً حبوب لقاح تحمل الأليل المتنحي (a) تكون نسبتها $q = 0.24$ (من التراكيب الوراثية Aa) $\div 0.64$ (مجموع نسب التراكيب الوراثية التي تشارك في إنتاج الجاميطات للجيل التالي) $= 0.375$ وتتكون في الوقت نفسه بويضات بالطريقة نفسها ، تكون نسبتها $p = 0.625$ للبويضات الحاملة للأليل السائد (A) ، $q = 0.375$ للبويضات الحاملة للأليل المتنحي (a) . ويلاحظ أن مجموع $q + p = 0.625 + 0.375 = 1.0$ ، وهو ما يؤكد دقة الحسابات . يؤدي التزاوج الاعتباطي بين هذه الجاميطات ، إلى أن تصبح نسب التراكيب الوراثية المتكونة في الجيل التالي كما يلي :

الأمهات

$\therefore, rvo = q = a$ $\therefore, rre = pq = Aa$ $\therefore, vre = q^2 = aa$	$\therefore, rvo = p = A$ $\therefore, rvi = p^2 = AA$ $\therefore, rre = pq = Aa$	$\therefore, rvi = q = a$ $\therefore, rre = p = A$ $\therefore, rvo = q = a$

أى إن $p^2 = AA = ٠,٣٩١$ ، $2pq = Aa = ٠,٤٦٨$ ، $q^2 = aa = ٠,١٤١$ (يلاحظ أن مجموع التراكيب الوراثية = ١,٠ ، وهو ما يؤكد دقة الحسابات) . يتضح مما تقدم .. أن استبعاد جميع النباتات الحاملة للصفة المتنحية بحالة أصيلة -قبل الإزهار- أدى إلى تخفيض نسبة الأليل (a) فى العشيرة من ٠,٦ إلى ٠,٣٧٥ $[= ٠,١٤١ + ٠,٤٦٨ \div ٢]$ ، ونسبة النباتات المتنحية الأصلية من ٠,٣٦ إلى ٠,١٤١ بعد جيل واحد من الانتخاب .

أما إذا لم يمكن التخلص من النباتات التي تحمل التركيب الوراثي المتنحي aa إلا بعد الإزهار .. فإن ذلك يعنى أن هذه النباتات سوف تشارك بحبوب اللقاح فى مجمع الجينات ولكنها لا تشارك بالبويضات ؛ وبذا .. فإن نسب الجامطات الحاملة للكليلين (A) ، و (a)

سوف تختلف بين حبوب اللقاح والبيضات على النحو التالي :

تتكون حبوب لقاح تحمل الأليل (A) ، تكون نسبتها $p = 0.16$ (من التراكيب الوراثية AA) + 0.24 (من التراكيب الوراثية Aa) = 0.4 ، كما تتكون حبوب لقاح تحمل الأليل المتنحي (a) تكون نسبتها $q = 0.36$ (من التراكيب الوراثية aa) + 0.24 (من التراكيب الوراثية Aa) = 0.6 . يلاحظ أن مجموع $q+p = 0.4 + 0.6 = 1.0$.

تتكون - أيضاً - بيضات تحمل الأليل (A) ، تكون نسبتها $p = 0.16$ (من التراكيب الوراثية AA) + 0.24 (من التراكيب الوراثية Aa) ÷ 0.64 (مجموع نسب التراكيب الوراثية التي تشارك في إنتاج الجاميطات المؤنثة) = 0.625 ، كما تتكون - أيضاً - بيضات تحمل الأليل المتنحي (a) تكون نسبتها $q = 0.24$ (من التراكيب الوراثية Aa) ÷ 0.64 (مجموع نسب التراكيب الوراثية التي تشارك في إنتاج الجاميطات المؤنثة للجيل التالي) = 0.375 . يلاحظ أن مجموع $q+p = 0.625 + 0.375 = 1.0$ ، وهو ما يؤكد دقة الحسابات . يؤدي التزاوج الاعباطى بين الجاميطات المذكرة والمؤنثة المتكونة ، إلى أن تصبح نسب التراكيب الوراثية المتكونة فى الجيل التالى على النحو التالى :

الأمهات

<u>الأبــــــــاء</u>	<u>$p = A = 0.625$</u>	<u>$q = a = 0.375$</u>
$p = A = 0.4$	$p^2 = AA = 0.25$	$pq = Aa = 0.10$
$q = a = 0.6$	$pq = Aa = 0.375$	$q^2 = aa = 0.225$

أى إن $p^2 = AA = 0.25$ ، و $pq = Aa = 0.10$ ، و $q^2 = aa = 0.225$ (يلاحظ أن مجموع نسب التراكيب الوراثية = 1.0 ، وهو ما يؤكد دقة الحسابات) . يتبين مما تقدم .. أن استبعاد جميع النباتات الحاملة للصفة الأصلية بعد الإزهار أدى إلى خفض نسبة الأليل (a) فى العشيرة من 0.6 إلى 0.4875 [$0.225 + (0.24 \div 0.6)$] ، ونسبة النباتات المتنحية الأصلية من 0.36 إلى 0.225 بعد جيل واحد من الانتخاب .

ويتضح - لدى مقارنة الانتخاب قبل الإزهار بالانتخاب بعده - أن مقدار الانخفاض فى

نسبة الأليل غير المرغوب فيه كان : $0.6 - 0.375 = 0.225$ ، عندما أجرى الانتخاب قبل الإزهار ، بينما كان $0.6 - 0.4875 = 0.1125$ ، عندما أجرى الانتخاب بعد الإزهار . أى إن فاعلية الانتخاب قبل الإزهار كانت ضعف فاعلية الانتخاب بعد الإزهار .

الأصناف البلدية (غير المحسنة)

تتميز الأصناف البلدية غير المحسنة من المحاصيل الخلطية التلقيح بأنها تكون على درجة عالية من عدم التجانس الوراثى highly heterogenous ، الذى يكون مصاحباً بقدر كبير من عدم التجانس المورفولوجى ؛ لأن نباتات العشيرة تكون غالباً غير متجانسة فى كل من الصفات الاقتصادية الظاهرة وغير الظاهرة (وهى التى يلزمها التعرض لظروف بيئية معينة ؛ حتى يمكن تمييزها) على حد سواء . وبالإضافة إلى ذلك .. فإن كل نبات فى العشيرة يكون خليطاً بدرجة عالية highly heterozygous . ويكون مرد ذلك كله إلى التلقيح الخلطى ، مع حالة الإهمال التى تعامل بها الأصناف البلدية -عادة- حيث لاتجرى محاولات لتحسينها ، وجعلها أكثر تجانساً .

الأصناف المحسنة المفتوحة التلقيح

يطلق على الأصناف المحسنة التى تكثر بالتلقيح الخلطى الطبيعى العشوائى بين أفرادها اسم الأصناف المفتوحة التلقيح Open-pollinated Varieties . ونظراً لأن هذه الأصناف تعد محسنة ؛ لذا .. فإنها تكون -عادة- أصيلة فى الصفات الاقتصادية المهمة ، خاصة النوعية منها ؛ فإذا كان الصنف المفتوح التلقيح المحسن مقاوماً لمرض معين ، أو يتميز بلون أو شكل معين للثمار .. فإن جميع نباتات الصنف تكون أصيلة ومتجانسة فى هذه الصفات . كما يحاول المربي -أيضاً- تأصيل الصفات الكمية المهمة ، ولكن هذا الهدف ربما لايتحقق كاملاً ؛ وبذا .. يبقى جزء من الجينات التى تتحكم فى الصفات الكمية الاقتصادية ، والجينات الأخرى التى تتحكم فى الصفات غير المنظورة بحالة خليطة ، ويتحدد المظهر العام للعشيرة بحالة التوازن التى تصل إليها نسب أليلات كل جين ، تبعاً لقانون هاردي - فينبرج . ويساعد التلقيح الخلطى المستمر على بقاء النباتات heterozygous ، والعشيرة غير متجانسة heterogenous فى هذه الصفات . وتتوقف درجتا الخلط وعدم التجانس الوراثى على نسبة المواقع الجينية غير الأصلية ، وهى

التي تقل كلما أعطى المربي اهتماماً أكبر لتجانس الصفات فى العشيرة ، قبل نشر زراعتها كصنف جديد .

السلالات المرباة داخلياً

تستعمل السلالات المرباة داخلياً Inbred lines من المحاصيل الخلطية التلقيح كآباء فى الهجن التجارية ، وهى تنتج بالتلقيح الذاتى الصناعى المستمر لعدة أجيال ، وهو ما يعرف بالتربية الداخلية Inbreeding ، ويغضى هذا الموضوع بالتفصيل فى الفصل الخاص بالأصناف الهجين .

تتميز السلالات المرباة - داخلياً - بأنها تكون على درجة عالية من التجانس الوراثى highly homogenous ، وأن نباتاتها تكون على درجة عالية من الأصالة الوراثية highly homozygous ، ولكن بدرجة أقل مما فى السلالات النقية pure lines التى يكون تجانسها وأصالتها الوراثية تامين ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن التلقيح الذاتى الصناعى المتبع فى إنتاج السلالات المرباة داخلياً نادراً ما يدوم لأكثر من ستة أجيال ، ثم تكثر السلالات - بعد ذلك - بالتلقيح الخلطى بين نباتات كل سلالة sib pollination . ويسمح هذا العدد من أجيال التلقيح الذاتى بوجود نسبة بسيطة من الأفراد الخليطة فى كل موقع جينى لم يكن بحالة أصيلة منذ البداية ، كما يؤدى إكثار السلالة بالتلقيح الخلطى بين نباتاتها إلى حدوث بعض الانعزالات الوراثية ، وهو ما يجعلها أقل تجانساً من السلالات النقية .

ونظراً لأن بعض الأنواع النباتية تتدهور بشدة مع التربية الداخلية ؛ لذا .. فإن المربي يلجأ إلى إكثارها بالتلقيح الخلطى بين نباتات النسل الواحد بعد الجيل الثالث ، أو الرابع للتلقيح الذاتى ، ويقابل ذلك نقص فى كل من درجتى التجانس الوراثى والأصالة الوراثية

الأصناف الهجين

تتشابه هجن المحاصيل الخلطية التلقيح مع هجن المحاصيل الذاتية التلقيح فى كونها على درجة عالية من التجانس الوراثى highly homogenous ، وأن نباتاتها خليطة وراثياً بدرجة عالية highly heterozygous . ويقال فى تفسير ذلك ما سبق ذكره بالنسبة

لهجن المحاصيل الذاتية التلقيح ؛ لأن الآباء التى تستخدم فى إنتاج الهجن فى كليهما عبارة عن سلالات أصيلة لاتتعرض . ويشذ عن ذلك هجن بعض المحاصيل الخطية التلقيح ، التى تتدهور بشدة بالتربية الداخلية ، والتى لايمكن إكثار سلالاتها المرباة داخلياً بالتلقيح الذاتى بعد الجيل الثالث .

عشائر النباتات الخضرية التكاثر

يؤدى تراكم الطفرات المستمر فى النباتات الخضرية التكاثر إلى جعلها على درجة عالية من الخلط الوراثى highly heterozygous ، خاصة أنها تتكاثر -خضرياً- ولاتمر بالتلقيح الذاتى ؛ فإذا حدث طفرة ، وغيرت موقعاً جينياً مثلاً من AA إلى Aa .. فإنه يبقى على هذه الصورة مع استمرار الإكثار الخضرى . ويؤدى ظهور مزيد من الطفرات على مر السنين -فى نسل نفس النبات الذى ظهرت فيه الطفرة- إلى أن يصبح النبات خليطاً بدرجة كبيرة ، وهذا هو الطابع العام المميز لجميع عشائر النباتات الخضرية التكاثر ، ولكنها تختلف فيما بينها فى درجة التجانس الوراثى homogeneity بين أفرادها .

العشائر الطبيعية

تتميز العشائر الطبيعية من النباتات الخضرية التكاثر بأنها تكون على درجة عالية من عدم التجانس الوراثى highly heterogenous ، ويرجع ذلك إلى أن الطفرة التى تظهر فى نبات ما تظل محصورة فى نسل هذا النبات فقط . ونظراً لأن الطفرات تظهر عشوائياً فى أى نبات ؛ لذا .. نجد أن العشيرة الطبيعية تتباين كثيراً فى صفاتها الوراثية ، ويكون ذلك مصاحباً بتباين مماثل فى الشكل المظهرى لنباتاتها .. وتكون العشائر الطبيعية على درجة عالية من الخلط الوراثى ؛ مثل بقية عشائر النباتات الخضرية التكاثر .

الأصناف البلدية غير المحسنة

تتشابه الأصناف البلدية غير المتجانسة مع العشائر الطبيعية -وراثياً- إلى حد كبير ، إلا أنها تكون على درجة أعلى من التجانس الوراثى بين أفرادها ؛ بسبب اهتمام المزارعين بإكثار النباتات المتميزة فى صفاتها . ويرغم أن نباتات البستان الواحد قد تكون متجانسة

إلى حد ما .. إلا أن الصنف - عامة - يبقى غير متجانس إلى حد كبير ، ويمكن ملاحظة اختلافات كبيرة بين نباتات الصنف الواحد من مزرعة إلى أخرى .

الأنصاف المحسنة

تكون الأنصاف المحسنة على درجة عالية من الخلط الوراثي highly heterozygous ؛ كغيرها من عشائر النباتات الخضرية التكاثر ، إلا أنها تكون على درجة عالية جداً من التجانس الوراثي highly homogenous ؛ ذلك لأنها تنشأ بالإكثار الخضري لنبات واحد متميز ، ولا تحدث اختلافات وراثية بينها ، إلا إذا ظهرت طفرات فيها ، ولم ينتبه إليها ، وظلت تكثر مع الصنف الأصلي ؛ حيث تتميز -حينئذ- سلالات جديدة من كل صنف ، قد تكثر منفردة بدورها ، وتصبح أصنافاً جديدة .

السلالات الخضرية

إن السلالة الخضرية Clone هي النسل الناتج من الإكثار الخضري لنبات واحد ، ويمكن أن ينتمي النسل الناتج من الإكثار الخضري لنباتات السلالة الخضرية إلى نفس السلالة الخضرية أيضاً مادام أنه قد أمكن تتبع النسب ، مع التأكد من عدم ظهور طفرات بها .

وبينما تكون نباتات السلالة الخضرية على درجة عالية من الخلط الوراثي (مثل باقى عشائر النباتات الخضرية التكاثر) .. فإنها تكون متجانسة بنسبة ٨٠٠% 100% homogenous ؛ لأن مرد جميع أفرادها يكون إلى نبات واحد أكثر خضرياً . ويفسر ذلك عدم جدوى الانتخاب فى السلالة الخضرية .

الهجين

إن هجن النباتات الخضرية التكاثر ليست سوى أصناف محسنة ، نشأت بالإكثار الخضري لنبات هجين جيد الصفات ؛ وبذا .. فإنها تتشابه مع الأنصاف المحسنة فى كون نباتاتها على درجة عالية من الخلط الوراثي highly heterozygous ، بينما تكون أفراد العشيرة الواحدة على درجة عالية من التجانس highly homogenous .

الفصل الرابع

وراثة الصفات الكمية

سبق تعريف الصفات الكمية بأنها الصفات التى يوجد فيها استمرار فى الشكل المظهرى، والتى تتدرج من مستوى إلى آخر دون وجود فواصل محددة بين المستويات المختلفة ، كما فى صفات الطول ، والمحصول ، وقوة النمو ، وموعد النضج ... إلخ ، ونظراً لأن دراستها تستدعى القياس؛ لذا فإنها تسمى metrical traits أى الصفات المقيسة. وبرغم أن بعض الصفات الكمية يتحكم فى وراثتها جين واحد رئيسى major gene إلا أن غالبيتها يتحكم فيها عدد كبير من العوامل الوراثية multiple factors ، وبينما تدرس الفئة الأولى منها كصفات بسيطة ، يمكن - غالباً - تمييز مجاميع أفرادها وعدّها فى الأجيال الانعزالية .. فإن دراسة الفئة الثانية منها يدخل فى نطاق علم الوراثة الكمية Quantitative Genetics وهو موضوع هذا الفصل ، الذى يستمد أهميته من أن الصفات الكمية تشكل أهم الصفات الاقتصادية التى يهتم بها المربي ، فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى طرق خاصة فى دراستها ، وتداولها عند التربية .

خصائص الوراثة الكمية

يعد كل من نلسون ايلي Nilson - Ehle (١٩٠٨ - ١٩٠٩) فى السويد ، وإيست East (١٩٠٦ - ١٩٣٦) فى الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل العلماء الذين تناولوا الصفات الكمية بالدراسة، وهما اللذان أثبتا أن الصفات الكمية تسلك فى وراثتها سلوك الصفات الوصفية .

قام نلسون ايلي بإجراء تلقيح بين سلالتين نقيتين من القمح ، إحداهما حمراء الحبوب ، والأخرى بيضاء ؛ فكانت حبوب الجيل الأول وسطاً بين صفتي الأبوين ، أى كانت السيادة غير تامة ، وتدرجت حبوب الجيل الثانى من اللون الأحمر القاتم إلى اللون الأبيض وأمكن تمييزها إلى خمس فئات مظهرية كانت بنسبة ١ : ٤ : ٦ : ٤ : ١ .

فسر نلسون ايلي هذه النتائج على أساس أن صفة لون الحبوب يتحكم فيها زوجان من الجينات المتفارقة المتماثلة التأثير ؛ أى إن كلاً منها مماثل للآخر فى تأثيره فى إظهار صفة لون الحبوب الحمراء ، وأن تأثير هذه الجينات مُجمَع cumulative ؛ بمعنى أنه كلما زاد عدد الجينات السائدة كان اللون الأحمر أكثر تركيزاً .

أما إيست .. فقد درس وراثة طول الزهرة (طول التويج) فى الدخان ، وهى صفة قليلة التأثير بالعوامل البيئية ، وأجرى إيست تلقيحاً بين سلالتين نقيتين من الدخان البرى *Nicotiana longiflora* تختلفان اختلافاً واضحاً فى طول الزهرة ، وحصل على النتائج المبينة فى جدول (٤ - ١) ، ثم درس الاختلافات بين الآباء وأفراد الأجيال الأول والثانى والثالث ، وتوصل منها (وكذلك من دراسات أخرى أجراها على طول الكوز فى الذرة) إلى ما يلى :

١- تتشابه الاختلافات التى تظهر بين نباتات الجيل الأول - والناتجة من التلقيح بين أفراد نقية - مع الاختلافات التى تظهر بين نباتات الآباء ، وتكون جميعها اختلافات راجعة إلى الظروف البيئية فقط .

٢- تظهر اختلافات أكبر فى الجيل الثانى ؛ نتيجة لحدوث الانعزالات الوراثية ، ويمكن الحصول على التراكيب الوراثية للأبوين إذا زرع عدد كاف من النباتات فى هذا الجيل .

٣- تعطى النباتات المختلفة مظهرياً فى الجيل الثانى أنسلاً ذات متوسطات مختلفة فى الجيل الثالث .

وقد نجح إيست فى تطبيق قوانين مندل على الصفات الكمية التى درسها . ويمكن تلخيص أهم خصائص وراثة الصفات الكمية فى أنه يتحكم فيها عدة عوامل وراثية ، ذات تأثير كبير واضح ، يطلق عليها عادة اسم major genes ، وعوامل وراثية

جدول (٤-١) : التوزيع التكرارى لطول تبيغ الزهرة فى نباتات الإباء P_1 و P_2 ، والجيل الأول (F_1) ، والجيل الثانى (F_2) للتقاطع بين سلالتين نقيتين من *Nicotiana longiflora*

الجيل	سنة الزراعة	مركز مجموعات التوزيع التكرارى (سم)	العدد النسب الوسط الانحراف معامل الاختلاف	القياسى
P_1	١٩١١	٣٢ ٨٠ ١٣	٤٠.٥	١.٧٥
P_1	١٩١٢	١٦ ٢٨ ٤	٤٠.٦	٢.٠٠
P_1	١٩١٣	١ ٣٢ ٤	٣٩.٨	١.٠٩
F_1	١٩١١		٦٣.٥	٢.٩٢
P_2	١٩١١		٨٨	٢.٢٩
P_2	١٩١١		٤٧	٢.٣٣
P_2	١٩١١		٢٤	٢.٧٠
F_2	(١) ١٩١٢		٢١١	٥.٩١
F_2	(٢) ١٩١٢		٢٣٣	٦.٧٩

(١) حصل على نسل الجيل الثانى من نباتى جيل أول كانا ناميين فى سنة ١٩١٢

أخرى كثيرة ذات تأثير بسيط ، يطلق عليها اسم polygenes (وتسمى - أحيانا - الجينات الثانوية minor genes) . وتعد الجينات الثانوية أكثر تأثراً بالعوامل البيئية من الجينات الرئيسية ، ولكن لا يمكن قياس تأثير البيئة على كل عامل منها على حدة . وبينما يكون تأثير الجينات الرئيسية في الشكل المظهرى كبيراً .. فإن تأثير الجينات الثانوية لا يظهر إلا بعد تجمع عدد كبير منها في التركيب الوراثى ، وتعد هى الأساس في التطور وعملية الانتخاب الطبيعي .

تتميز الجينات الثانوية - أيضا - بأنها تنعزل بكثرة ، وتتوزع على أعداد كبيرة من التراكيب الوراثية (= ٣^٣ حيث ن هى عدد أزواج الجينات التى يختلف فيها الأبوان) ، وتتميز كذلك بأن الشكل المظهرى لا يتأثر كثيراً بإخلال جين محل آخر . لذا .. فإن تراكيب وراثية كثيرة يمكن أن تعطى نفس الشكل المظهرى ؛ كما تكون معظم العشائر الخلطية التلقيح خليطة إلى حد كبير فى هذه العوامل . وأخيرا .. فإن هذه الجينات الثانوية (أو الـ polygenes) .. قد تكون ذات تأثير متعدد على الشكل المظهرى ، وقد تكون محورة لفعل جينات أخرى modifiers ، أو مثبطة لها suppressors .

ومن أهم خصائص الوراثة الكمية - أيضا - ما يعرف بالانعزال الفائق الحدود transgressive segregation حيث يظهر فى الجيل الثانى لبعض التلقيحات أفراد تزيد عن الأب الأعلى ، أو تقل عن الأب الأقل فى الصفة المدروسة . ويحدث ذلك عندما يختلف الأبوان فى الجينات المسؤولة عن الصفة ، أو فى بعضها ، مما يؤدى إلى انعزال أفراد فى الجيل الثانى ، تحتوى على أليلات من تلك التى تزيد من الصفة ، تزيد عن تلك الموجودة فى الأب الأعلى أو تتركز فيها الأليلات التى تخفض من الصفة .

تحديد فئات ونسب الانعزالات الوراثية والمظهرية فى الجيل الثانى للصفات الكمية

يتبين من دراستنا لخصائص الوراثة الكمية أن عدة تراكيب وراثية يمكن أن تعطى نفس الشكل المظهرى؛ فعلى سبيل المثال .. لو أن صفة كمية يتحكم فيها ثلاثة أزواج من العوامل الوراثية هى : Aa ، و Bb ، و Cc ، وكانت الأليلات السائدة هى التى تزيد من الصفة .. فإن الشكل المظهرى - الذى يكون مرده إلى وجود خمسة أليلات سائدة - يمكن

أن يظهر فى أى من التراكيب الوراثية التالية :

AA BB CC ، أو AA Bb CC ، أو Aa BB CC

ونظراً لأن أياً من هذه التراكيب الوراثية يظهر فى الجيل الثانى بنسبة $\frac{3}{4}$ (حيث س ، ن هى عدد المواقع الجينية الخليطة فى كل من التركيب الوراثى المراد معرفة نسبته ، وفى الجيل الأول ، على التوالى) $= \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$ ؛ لذا .. فإن نسبة ظهور هذه التراكيب الوراثية مجتمعة $= \frac{2}{64} \times 3 = \frac{6}{64}$.

وتوجد طريقتان رئيسيتان لتحديد فئات ونسب الانعزالات الوراثية والمظهرية فى الجيل الثانى للصفات الكمية - التى يتساوى فيها تأثير الجينات المختلفة على الصفة - هما : باستخدام المعادلة ذات الحدين ، وباستخدام مثلث باسكال .

المعادلة ذات الحدين

يمكن معرفة نسب الانعزالات فى الجيل الثانى من مفكوك المعادلة ذات الحدين (س+ص)^ن ؛ حيث تمثل (س) الأليلات التى تؤثر على الصفة فى أحد الاتجاهات (كَأَن تزيد من الصفة مثلاً) ، وتمثل (ص) الأليلات التى تؤثر على الصفة فى الاتجاه الآخر (كأن تنقص من الصفة مثلاً) ، وتمثل (ن) عدد الأليلات الموجودة (تلك التى تزيد والتى تنقص من الصفة)؛ فمثلاً إذا تحكم فى الصفة خمسة أزواج من الجينات (أى عشرة أليلات) .. فإن المعادلة تصبح : (س + ص)^{١٠} ، ويكون مفكوكها كما يأتى :

$$\begin{aligned} & \text{س}^{١٠} + ١٠ \text{س}^٩ \text{ص} + ٤٥ \text{س}^٨ \text{ص}^٢ + ١٢٠ \text{س}^٧ \text{ص}^٣ + ٢١٠ \text{س}^٦ \text{ص}^٤ + ٢٥٢ \text{س}^٥ \text{ص}^٥ \\ & + ٢١٠ \text{س}^٤ \text{ص}^٦ + ١٢٠ \text{س}^٣ \text{ص}^٧ + ٤٥ \text{س}^٢ \text{ص}^٨ + ١٠ \text{س} \text{ص}^٩ + \text{ص}^{١٠} . \end{aligned}$$

وبذا تكون نسب الانعزالات هى : ١ : ١٠ : ٤٥ : ١٢٠ : ٢١٠ : ٢٥٢ : ٢١٠ : ١٢٠ : ٤٥ : ١٠ : ١ : ٢٠ : ٢١٠ : ٤٥ : ١٠ : ١ .

ويمكن الحصول على المعامل العددي لكل حد من مفكوك المعادلة ذات الحدين بالطريقة التالية :

١- يكون المعامل العددي لكل من الحدين : الأول والأخير دائماً عبارة عن الواحد الصحيح .

- ٢- يؤخذ أس (س) للحد الأول أى (ن) ، ويمثل هذا المعامل العددي للحد الثانى .
- ٣- يضرب المعامل العددي للحد الثانى فى أس (س) لهذا الحد ؛ أى (ن-١) ويقسم على ٢ ليعطى المعامل العددي للحد الثالث .
- ٤- يضرب المعامل العددي للحد الثالث فى أس (س) لهذا الحد ؛ أى (ن-٢) ، ويقسم على ٣ ليعطى المعامل العددي للحد الرابع ... وهكذا ، هذا .. ويعنى مفكوك هذه المعادلة أنه يوجد تركيب وراثى واحد ، يحتوى على الأليلات العشرة التى تزيد من الصفة ، وعشرة تراكيب وراثية ، يحتوى كل منها على تسعة أليلات من تلك التى تزيد من الصفة ، وأليل واحد من تلك التى تنقص من الصفة، وه ٤ تركيباً وراثياً، يحتوى كل منها على ثمانية أليلات ، من تلك التى تزيد من الصفة ، وأليلين من تلك التى تنقص من الصفة ... وهكذا . ويكون المجموع الكلى لنسب التراكيب الوراثية هو ١٠٢٤ ، وهو الذى يمكن الحصول عليه - أيضاً - من المعادلة ٤ ن حيث تمثل (ن) عدد أزواج العوامل الوراثية الخليطة فى الجيل الأول ؛ وبذا .. يكون مجموع النسب فى هذا المثال ٤ = ١٠٢٤ .

مثلث باسكال

يمكن الاستعانة بمثلث باسكال Pascal's Triangle المبين أدناه فى تحديد نسب الانعزالات فى الجيل الثانى ؛ حيث يكون كل معامل عددي عبارة عن مجموع العاملين العددين الموجودين أعلاه على اليمين واليسار كما يلى :

عدد الأليلات	المعاملات العددية للفئات المظهرية .
١	١ ١
٢	١ ٢ ١
٣	١ ٣ ٣ ١
٤	١ ٤ ٦ ٤ ١
٥	١ ٥ ١٠ ١٠ ٥ ١
٦	١ ٦ ١٥ ٢٠ ١٥ ٦ ١
٧	١ ٧ ٢١ ٣٥ ٣٥ ٢١ ٧ ١
٨	١ ٨ ٢٨ ٥٦ ٧٠ ٥٦ ٢٨ ٨ ١

ومن الطبيعي أنه لا يستعمل من المعاملات العددية بالمثلث ، إلا ما يقابل العدد الزوجى من الآليات ، وهو الذى يمثل عدد أزواج العوامل الوراثية التى تتحكم فى الصفة ؛ فلو أن الصفة يتحكم فيها - مثلاً - ٢ أزواج من العوامل الوراثية .. نبحت فى المثلث مقابل ٦ آليات ، لنجد أن نسب المعاملات العددية للفئات المظهرية هى ١ : ٦ : ١٥ : ٢٠ : ١٥ : ٦ : ١ .

توزيع الانعزالات المظهرية فى الجيل الثانى

تتأثر طريقة توزيع الانعزالات المظهرية للصفات الكمية - فى الجيل الثانى - بعوامل كثيرة ، نذكر منها مايلى :


- ١- عدد الجينات التى تتحكم فى الصفة .
- ٢- كون هذه الجينات ذات سيادة غير تامة ، أم سائدة .
- ٣- كون الجينات مرتبطة ، أم تتوزع توزيعاً حراً .
- ٤- كون الجينات متساوية فى تأثيرها فى الصفة ، أم غير متساوية .
- ٥- وجود علاقة تفوق بين الجينات المتحكم فى الصفة ، والجينات الأخرى فى النبات ، أو عدم وجودها .
- ٦- كون الجينات المتحكم فى الصفة تتأثر بجينات أخرى محورة ، أو لا تتأثر .
- ٧- مدى نفاذية الصفة penetrance ، ودرجة التعبير عنها expressivity فى التراكيب الوراثية المختلفة .
- ٨- مدى تأثر الصفة بالعوامل البيئية .

وأغلب الظن أن كثيراً من هذه العوامل تتداخل فى التأثير على الصفات الكمية ، بل إن السلوك الوراثى للجينات المتحكم فى الصفة الواحدة قد يختلف من جين إلى آخر ، وهو مايعد أقصى درجات التعقيد . وتعد أبسط الحالات .. تلك التى تكون فيها الجينات المتحكم فى الصفة غير مرتبطة ببعضها ، ومتساوية فى تأثيرها ، ولا تتفاعل مع الجينات الأخرى فى النبات أو تتأثر بها ، وذات نفاذية تامة ، وتعبر عن نفسها بوضوح وبدرجة واحدة ، ولا تتأثر بالعوامل البيئية . وإذا توافرت كل هذه الشروط - وهو أمر نادر الحدوث- فإن الانعزالات التى تحدث فى الجيل الثانى تكون مماثلة لتلك التى فى شكل (٤-١) الذى تظهر به التوزيعات فى حالتى غياب السيادة (التوزيعات التى على الجانب

الأيسر من الشكل) ، والسيادة التامة (التوزيعات التى على الجانب الأيمن من الشكل) ، وعندما تكون الصفة بسيطة - أى يتحكم فيها جين واحد - وعندما تكون الصفة كمية ويتحكم فيها ٢ ، أو ٤ ، أو ٦ ، أو ١٢ جيناً (التوزيعات من أعلى إلى أسفل فى الشكل) . ويتضح من هذه التوزيعات مايلى :

١- عندما تكون الصفة ذات سيادة غير تامة .. فإن التوزيعات تكون متساوقة ، أى متماثلة ومنتظمة حول الشكل المظهري ، الذى يأخذ القيمة الوسطية ، والذي يكون توزيعه أعلى التوزيعات ، ويكون كل شكل مظهري معبراً عن تركيب وراثي ، أو مجموعة من التراكيب الوراثية التى تتساوى فى عدد الآليات التى تؤثر فى الصفة . ويمكن الحصول على هذه التوزيعات من مفكوك المعادلة ذات الحدين ، أو باستخدام مثلث باسكال . وبينما يمكن تمييز فئات التوزيعات المختلفة فى الصفات البسيطة ، والصفات التى يتحكم فيها جينان أو ثلاثة جينات .. فإن فئات التوزيعات تقترب من بعضها مظهرياً - بشدة - كلما ازداد عدد الجينات المتحكم فى الصفة بحيث يصعب تمييزها عن بعضها ، كما تأخذ شكل منحني التوزيع الطبيعي . ويصاحب كل زيادة فى عدد الجينات المتحكم فى الصفة نقص كبير فى نسبة الأفراد المشابهة للأبوين ، الأمر الذى يستلزم زراعة عدد كبير من نباتات عشيرة الجيل الثانى للحصول على نبات واحد أصيل فى الصفة ومماثل لأحد الأبوين .

٢- عندما تكون الصفة سائدة سيادة تامة .. فإن التوزيعات تكون منحرفة أو مائلة skewed نحو الشكل المظهري للآليات السائدة . وبينما تزيد عدد فئات التوزيعات المظهرية مع زيادة عدد الجينات المتحكم فى الصفة .. فإن عدد الفئات يبقى أقل مما فى حالة غياب السيادة عند نفس العدد من الجينات . ويكون من السهل تمييز الفئات المظهرية عن بعضها فى الصفات التى يتحكم فيها من ١ - ٤ جينات ، إلا أن فئات التوزيعات تتقارب مع بعضها ، ويصبح من الصعب تمييزها بعد ذلك . وكلما ازداد عدد الجينات المتحكم فى الصفة .. بدا التوزيع أقرب إلى التوزيع الطبيعي ؛ أى كلما قل وضوح الجنوح ظاهرياً ؛ ذلك لأن نسب الفئات التى تتجمع فيها الآليات المتتخفة تنخفض بشدة ؛ بحيث لاتمثل شيئاً يذكر إلى جانب بقية العشيرة التى تبدو طبيعية إلى حد ما فى توزيعها برغم أنها تكون منحرفة - بشدة - نحو الصفة السائدة . ويلاحظ - أيضاً - أن الفئات المظهرية المنعزلة لاتمثل تراكيب وراثية متشابهة ؛ بسبب وجود السيادة .



شكل (٤-١) : التوزيعات المتوقعة في الجيل الثاني لصفة يتحكم فيها (من أعلي لأسفل في الشكل) ١، ٢، ٤، ٦، و ١٢ جيناً في حالتى السيادة التامة (العمود اليمين) ، وغياب السيادة (العمود الأيسر) علماً بأن درجة توريث الصفة ١٠٠٪ (عن Allard ١٩٦٤) .

ويبين جدول (٤-٢ ، نقلًا عن Simmonds ١٩٧٩) كيف أن زيادة عدد الجينات المتحكم في الصفة الكمية - عند غياب السيادة - يجعل توزيع فنات الأشكال المظهرية يقترب من التوزيع الطبيعي . أما شكل (٤-٢ ، نقلًا عن Falconer ١٩٨١) فإنه يبين كيف أن التوزيع في حالة السيادة التامة يبدو أقل جنوحاً كلما ازداد عدد الجينات المتحكم في الصفة . ويوضح الشكل التوزيع المتوقع من الانعزال الحر لأزواج الأليلات ، عندما يتحكم في الصفة ٦ جينات (شكل أ) ، أو ٢٤ جيناً (شكل ب) علماً بأن السيادة تامة لأحد الأليلات على الأليل الآخر في كل موقع جيني ، ونسبة جميع الأليلات ٥٠ ، ويؤدي كل موقع جيني متنح أصيل إلى خفض قيمة الصفة بمقدار وحدة كاملة في الشكل (أ) وربع وحدة في الشكل (ب) ، كما يظهر على المحور الأفقى الذى تتوزع عليه فنات التراكيب الوراثية ، التى تختلف فى عدد المواقع الجينية المتنحية الأصلية . أما المحور الرأسى .. فيمثل النسبة المئوية المتوقعة لكل فئة مظهرية ، وقد حسبت من مفكوك المعادلة ذات الحدين $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})^n$ حيث تمثل (ن) عدد المواقع الجينية .


تعد صفة وزن الثمرة فى الطماطم مثلاً جيداً للصفات الكمية التى يسود فيها أحد أليلي كل جين على الآخر ، ويبين شكل (٤ - ٣) توزيعاً حقيقياً لمتوسط وزن الثمرة بالجرام، حُصِّلَ عليه فى الجيل الثانى للتلقيح ، بين سلالة الطماطم رقم (٩٠٢) ذات الثمار الكبيرة نسبياً ، والسلالة البرية Red Current ذات الثمار الصغيرة جداً . ويظهر من الشكل سيادة صفة الثمار الصغيرة ، واقترب متوسط وزن الثمرة فى الجيلين الأول والثانى من المتوسط الهندسى المحسوب ، وابتعداهما كثيراً عن المتوسط الحسابى ، وهو ما يدل على أن الجينات ذات تأثير متجمع ، وأن تأثير إضافة أى جين هو زيادة وزن الثمرة بنسبة معينة ، وقد يمكن تفسير الجنوح المشاهد فى التوزيع - فى هذا المثال - على أساس سيادة الجينات التى تتحكم فى وزن الثمرة الصغيرة .

تقدير عدد الجينات المتحكم فى الصفات الكمية

تستخدم بعض المعادلات فى تقدير عدد الجينات التى تتحكم فى الصفات الكمية ، نذكر منها مايلى :


$$N = \frac{D^2}{8(VF_2 - VF_1)}$$

**



شكل (٤ - ٢) : التوزيع المتوقع لصفة سائدة يتحكم فيها ٦ جينات (علي اليسار) ، أو ٢٤ جيناً (علي اليمين) راجع المتن للتفاصيل (عن Falconer ١٩٨١) .

٢٠٠ -



شكل (٤ - ٣) : توزيع صفة وزن ثمرة الطماطم في الجيل الثاني للتقليح بين سلالة من الـ Red Current وسلالة الطماطم رقم ٩٠٢ . راجع المتن للتفاصيل (عن Briggs & knowles ١٩٦٧) .

حيث تمثل N الحد الأدنى لعدد الجينات المتحكم في الصفة وتمثل D الفرق بين متوسطى الأبوين، و VF_1 ، VF_2 تباينى الجيلين الأول والثانى على التوالى (Castle & Wright ١٩٢١). وتفترض هذه المعادلة مايلى :

- ١- عدم وجود أى ارتباط أو تفاعل بين الجينات المتحكم في الصفة .
- ٢- لكل الجينات درجة واحدة من الأهمية فى التأثير فى الصفة .
- ٣- لكل الجينات درجة سيادة واحدة .
- ٤- يكون أحد الأبوين - فقط - هو مصدر جمع الأليلات المؤثرة فى الصفة فى أحد الاتجاهات .

$$N = \frac{D^2}{8VA} \quad **$$

حيث يمثل VA التباين الإضافى الذى يحسب - بدوره- بالمعادلة التالية :

$$\frac{1}{2} VA = 2 VF_2 - (VB_1 + VB_2)$$

حيث يمثل VF_2 ، و VB_1 ، و VB_2 تباينات الجيل الثانى ، وعشائر التلقيحات الرجعية للأبوين الأول والثانى على التوالى (Mather & Jinks ١٩٧٨) .


التقدير الكمى لتأثير الجين على الفرد

تأثير الجينات فى العشائر

يعتبر متوسط العشيرة population mean من أهم القيم الإحصائية التى تستخدم فى الوصف الكمى للعشيرة ، وهو يمثل متوسط التراكيب الوراثية التى تتكون منها العشيرة ، ونوجز - فيما يلى - كيفية التوصل إلى المعادلة التى تستخدم فى حساب متوسط العشيرة (Falconer ١٩٨١) :

نفترض أن صفة ما يتحكم فيها جين واحد ، له أليلان ، هما A_1 ، و A_2 . ونفترض - أيضاً - أن القيمة الوراثية genotypic value للتركيب الوراثى الأصيل A_1A_1 هى $(+a)$ ، و للتركيب الوراثى الأصيل الآخر A_2A_2 هى $(-a)$ ، ولتركيب الوراثى الخليط

$A_1 A_2$ هي (d) ؛ فإذا كان الأليل A_1 هو الذى يزيد من الصفة وكانت النقطة (0) تمثل القيمة الوسيطة بين التركيبين الوراثيين الأصليين ، كما هو مبين فى الشكل التالى :



فإن قيمة التركيب الوراثي الخليط (أى d) تعتمد على درجة السيادة ؛ ففي غياب السيادة تماماً .. تكون (d) مساوية للصفر ، بينما تكون (d) موجبة إذا كان الأليل A_1 سائداً على A_2 وتكون سالبة إذا كان الأليل A_2 سائداً على A_1 .

وعندما تكون السيادة تامة تكون (d) مساوية لـ (+a) أو لـ (-a) ، بينما تكون قيمة d أكبر من (+a) ، أو أقل من (-a) فى حالة السيادة الفائقة over dominance .

ويعبر عن درجة السيادة بالقيمة : $\frac{d}{a}$.

هذا .. إلا أن القيمة الوراثية للتركيبات الوراثية الموجودة فى العشيرة لا تتأثر بالتركيب الوراثية فقط ، وإنما ينسبها إلى بعضها البعض أيضاً ، ويطلق على القيمة التى تنتج من ذلك اسم متوسط العشيرة ، وهى التى تحسب كالتالى :

التركيب الوراثي	النسبة	القيمة	النسبة × القيمة
$A_1 A_1$	p^2	+a	$p^2 a$
$A_1 A_2$	$2pq$	d	$2pqd$
$A_2 A_2$	q^2	-a	$-q^2 a$

المجموع : $M = a(p-q) + 2dpq$

علماً بأن p^2 ، و $2pq$ ، و q^2 هى نسب التركيبات الوراثية ، و M هو متوسط العشيرة .
وتتغير قيمة M فى الحالات المختلفة كما يلى :

١- فى حالة غياب السيادة تكون (d) مساوية للصفر ، وتصبح المعادلة كما يلى :

$$M = a(1-2q)$$

٢- فى حالة السيادة التامة تكون (d) مساوية لـ (a) ، وتصبح المعادلة كما يلى :

$$M = a (1-2q^2)$$

٣- فى حالة تاثر الصفة بعديد من العوامل الوراثية - كما هى الحال فى الصفات

الكمية - تصبح المعادلة كما يلى :

$$M = \sum a (p - q) + 2 \sum dpq$$

ولكى يتسنى فهم العوامل المؤثرة على متوسط العشيرة .. فإنه تلزم دراسة متوسط تأثير كل جين على حدة average effect of single genes ، وهو الذى يمثل بمتوسط انحراف قيمة الأفراد التى تحتوى على هذا الجين عن متوسط العشيرة . فلو أن هذا الجين يوجد منه أليلان هما A_1 ، و A_2 بنسبة p ، و q على التوالى .. فإنه يمكن تقدير متوسط تأثير الأليل A_1 (أو α_1) ، والأليل A_2 (أو α_2) كما يلى :

قيم ونسب التراكيب الوراثية المتكونة

الجاميطات	A_1A_1 a	A_1A_2 d	A_2A_2 -a	متوسط قيم التراكيب الوراثية المتكونة	متوسط العشيرة	متوسط تأثير الجين
A_1	p	q		pa + qd	- [a (p-q) + 2dpq]	q [a+d (p-q)]
A_2		p	q	-qa + pd	- [a (p-q) + 2dpq]	p [a+d (q-p)]

وبفرض أن الجاميطات التى تحمل الأليل A_1 تتحد عشوائياً مع الجاميطات الأخرى فى العشيرة .. فإن نسبة التراكيب الوراثية المنتجة تكون P من A_1A_1 ، و q من A_1A_2 ، وتكون القيمة الوراثية للتركيب A_1A_1 هى (+a) ، والتركيب A_1A_2 هى (d) ، ويكون المتوسط هو $pa+qd$ ، ويكون الفرق بين هذه القيمة ومتوسط العشيرة هو متوسط تأثير الأليل A_1 . وبحساب قيمة متوسط العشيرة من المعادلة الخاصة بها .. نجد أن :

$$\alpha_1 = pa + qd - [a (p-q) + 2 dpq]$$

$$= q [a + d (p-q)]$$

$$\alpha_2 = - p [a + d (p-q)]$$

ويكون متوسط تأثير الجين (أو α) كما يلى :

$$\alpha = a + d (p - q)$$

وتكون العلاقة بين α ، و α_1 ، و α_2 كما يلي :

$$\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$$

$$\alpha_1 = q \alpha$$

$$\alpha_2 = -p \alpha$$

وتحسب لكل تركيب وراثي ما تعرف بقيمة التربية breeding value كما يلي :

قيمة التربية	التركيب الوراثي
$2\alpha_1 = 2q \alpha$	A_1A_1
$\alpha_1 + \alpha_2 = (p-q) \alpha$	A_1A_2
$2\alpha_2 = -2p\alpha$	A_2A_2

وتحسب قيمة التربية في حالة وجود أكثر من أليلين على أساس أنها تمثل مجموع تأثير أى أليلين يوجدان في التركيب الوراثي للفرد ، وهي تمثل جزءاً من القيمة الوراثية للفرد ، وهو الذي يحدد متوسط قيمة النسل أو سلوكه ويعرف الفرق بين القيمة الوراثية ، وقيمة التربية بالانحراف الذي يرجع إلى السيادة dominance deviation : إذ إن :

$$G = A + D$$

حيث تمثل "G" القيمة الوراثية ، و "A" قيمة التربية ، و "D" الانحراف العائد إلى السيادة . وتحسب القيمة الوراثية لجميع الجينات معاً كما يلي :

$$G = A + D + I$$

حيث تمثل : (A) مجموع قيم التربية للجينات المختلفة ، و (D) مجموع الانحرافات العائدة إلى السيادة ، و (I) مجموع الانحرافات العائدة إلى التفاعل بين الجينات غير الأليلية epistatic deviation . ويقال عند غياب (D) ، و (I) أن الجينات ذات تأثير إضافي؛ إذ يعنى الفعل الإضافي للجين additive gene action إما غياب السيادة بالنسبة للآليات في الموقع الجيني الواحد (الجينات الأليلية) ، وإما غياب التفوق بالنسبة للجينات غير الأليلية .

ويمكن بيان العلاقة بين القيم التي سبقت دراستها كما يلي :

A_2A_2	A_1A_2	A_1A_1	التركيب الوراثي :
q^2	$2pq$	p^2	النسبة :
-a	d	a	القيمة الخاصة بالتركيب الوراثي :
الانحراف عن متوسط العشيرة			

- 2 p (a + q d)	a(q-p) + d(1-2pq)	2q (a - p d)	القيمة الوراثية :
- 2 p (α+pd)	(q-p) α+ 2pqd	2q (α- q d)	
-2 p α	(p-q) α	2 q α	قيمة التربية :
-2 p ² d	2pqd	- 2 q ² d	الانحراف العائد إلى السيادة :

هذا .. مع العلم بأن القيمة الوراثية قد عبر عنها بقيمة (a) ، أو بقيمة (α) ، وعبر عن الانحراف العائد إلى السيادة في صورة (d) ، علماً بأن (d) = صفراً في غياب السيادة ؛ حيث تتساوى القيمة الوراثية مع قيمة التربية .

درجة السيادة

تعتبر درجة السيادة degree of dominance (أو potence ratio) مقياساً لمتوسط سيادة كل الجينات المتحركة في الصفة في أحد الأباء على الجينات التي توجد في الأب الآخر ، وتحسب درجة السيادة بمقارنة المتوسطات المشاهدة لعشائر كل من الجيلين الأول ($\bar{F}_1$) ، والثاني ($\bar{F}_2$) ، والتلقيحات الراجعة إلى الأب الأول ($\bar{B}_1$) والثاني ($\bar{B}_2$) بالقيم المحسوبة التالية (عن Powers وآخرين ١٩٥٠) .

المتوسط المشاهد الذي تنسب إليه درجة السيادة القيمة المحسوبة التي يقارن بها المتوسط المشاهد

$$\bar{P}_1 + \bar{P}_2 / 2$$

$$\bar{P}_1 + 2\bar{F}_1 + \bar{P}_2 / 4$$

$$\bar{P}_1 + \bar{F}_1 / 2$$

$$\bar{P}_2 + \bar{F}_1 / 2$$

$$\bar{F}_1$$

$$\bar{F}_2$$

$$\bar{B}_1$$

$$\bar{B}_2$$

ويلى ذلك تقدير جوهريه الاختلافات بين المتوسطات الحسابية للعشائر (القيم المشاهده)
 بالقيم التى تقارن بها (القيم المحسوبة) ؛ باختبار "t" على النحو التالى :

$$t = \frac{\text{المتوسط المشاهد} - \text{المتوسط المحسوب}}{\text{الانحراف القياسى للمتوسط المشاهد}}$$

فإن لم يوجد فرق معنوى بين المتوسط المشاهد والمتوسط المحسوب .. كان ذلك دليلاً
 على غياب السيادة ، أما إذا وجد فرق معنوى بين المتوسطين .. فإن الحالة قد تكون واحدة
 من ثلاث كما يلى :

- ١- سيادة جزئية إذا كان المتوسط المشاهد للعشيرة بين متوسطها المحسوب ، والمتوسط
 المشاهد لأحد الآباء .
- ٢- سيادة تامة عندما لا يختلف المتوسط المشاهد للجيل الأول - جوهرياً - عن المتوسط
 المشاهد لأحد الآباء .
- ٣- سيادة فائقة Overdominance عندما يزيد المتوسط المشاهد للجيل الأول على الأب
 الأعلى فى الصفة أو يقل عن الأب الأقل .

ويعطى Mather (١٩٤٩) معادلة أخرى لحساب درجة السيادة كما يلى :

$$\text{درجة السيادة} = \frac{\text{المتوسط المشاهد للجيل الأول} - \text{المتوسط المحسوب للجيل الأول}}{\frac{1}{2}(\text{متوسط الأب ذى القيمة المرتفعة} - \text{متوسط الأب ذى القيمة المنخفضة})}$$

فإن زادت قيمة درجة السيادة على (+١) أو نقصت عن (-١) كان ذلك دليلاً على وجود
 سيادة فائقة . وإن كانت (+١) ، أو (-١) .. كان ذلك دليلاً على وجود سيادة تامة وإن كانت
 (صفر) .. كان ذلك دليلاً على غياب السيادة ، وإن تراوحت بين أكثر من (-١) وأقل من (+١)
 - فيما عدا قيمة الصفر - كان ذلك دليلاً على وجود سيادة جزئية .

تقدير درجة الجنوح skewness عن التوزيع الطبيعى

يعتبر الجنوح عن التوزيع الطبيعى فى عشائر الجيل الثانى دليلاً على الانحراف عن

التأثير الإضافي للجينات المتحكممة فى الصفات الكمية ، وتقدر درجة الجنوح على النحو التالى :

$$\text{درجة الجنوح} = \frac{2 \text{ (المتوسط المشاهد للجيل الثانى - القيمة الوسطى (median))}}{\text{الانحراف القياسى للجيل الثانى}}$$

يستعمل اختيار "t" لتحديد مدى جوهرية الجنوح المحسوبة ، مع حساب قيمة "t" على النحو التالى (عن Snedecor ١٩٥٦) :

$$t = \frac{\text{درجة الجنوح}}{\sqrt{\frac{6n(n-1)(n-2)(n+1)(n+2)}{(n-1)(n-2)(n+1)(n+2)}}}$$

حيث تمثل (n) عدد أفراد الجيل الثانى . وتدل قيمة الجنوح الموجبة على زيادة عدد الأفراد ذوى القيم الأقل من المتوسط ، بينما تدل القيمة السالبة على زيادة عدد الأفراد ذوى القيم الأعلى من المتوسط .

المتوسطات الهندسية

يظهر التأثير الهندسى geometric action للجينات فى بعض الصفات كصفة حجم الثمار مثلاً ؛ حيث تتفاعل الجينات مع بعضها بطريقة ليست اضافية additive ، وإنما تضاعفية multiplicative ، وهو ما يتمشى مع طبيعة الصفة ؛ حيث يكون الحجم حاصل ضرب أرقام ، وليس بحاصل جمع أبعاد ، ويقال إن الجينات ذات تأثير هندسى geometric gene action عندما تكون المتوسطات الهندسية المحسوبة يختلف العشائر الهندسية أقرب إلى القيم الملاحظة لهذه العشائر ، بينما يقال إن الجينات ذات تأثير حسابى arithmetic gene action عندما تكون متوسطاتها الحسابية أقرب إلى قيمتها الملاحظة . وتحسب المتوسطات الهندسية على النحو التالى (عن Powers & Lyon ١٩٤٨) .

$$\text{المتوسط الهندسى المتوقع للجيل الأول} = \sqrt{\text{المتوسط المشاهد للأب الأول} \times \text{المتوسط المشاهد للأب الثانى}}$$

المتوسط الهندسى المتوقع للجيل الثانى = العدد المقابل (antilogarithm) $\downarrow$:

لوغاريتم المتوسط المشاهد للأب الأول + ٢ لوغاريتم المتوسط المشاهد للجيل الأول + لوغاريتم المتوسط المشاهد للأب الثانى

٤

المتوسط الهندسى المتوقع للتلقيح الرجعى للأب الأول =

المتوسط المشاهد للجيل الأول $\times$ المتوسط المشاهد للأب الأول

المتوسط الهندسى المتوقع للتلقيح الرجعى للأب الثانى =

المتوسط المشاهد للجيل الأول $\times$ المتوسط المشاهد للأب الثانى

ويمكن تصور التأثيرين الإضافى والهندسى للجينات بمثال تزيد فيه قيمة الصفة بزيادة عدد الجينات التى تتحكم فيها على النحو التالى :

١- فى حالة التأثير الإضافى : قد تكون قيمة الصفة : ٣ ، ٦ ، ٩ ، و ١٢ ؛ حيث يزيد كل جين إضافى قيمة الصفة بمقدار ٣ وحدات ؛ أو ١ ، ١ ، ١ ، ٢ ، و ٣ ؛ حيث يزيد كل جين إضافى قيمة الصفة بمقدار ٠ ، ١ وحدة .

٢- فى حالة التأثير الهندسى : قد تكون قيمة الصفة ٣ ، ٩ ، و ٢٧ ، و ٨١ ؛ حيث يزيد كل جين إضافى قيمة الصفة بمقدار ثلاثة أضعاف القيمة السابقة ؛ أو ١ ، ١ ، ١ ، و ١ ، ٢١ ، و ٣٣١ ، و ٤٦٤١ ؛ حيث يزيد كل جين إضافى قيمة الصفة بمقدار ١ ، ١ ضعف القيمة السابقة ، أى يضيف حوالى ١٠٪ إلى القيمة السابقة .

ويلاحظ أن توزيع الأفراد فى الأجيال الانعزالية يكون دائماً مجنحاً skewed عندما تكون الجينات ذات فعل هندسى ، وللتأكد من صحة فرضية التأثير الهندسى للجينات .. يجب ألا تختلف القيم المشاهدة لعشائر الجيلين الأول والثانى ، وكذلك التلقيحات الرجعية - معنوياً - عن القيم المحسوبة على أساس التأثير الهندسى . ويؤدى تحويل القيم المشاهدة للأفراد فى حالة الصفات التى تؤثر عليها الجينات بطريقة هندسية إلى لوغاريتمات ، إلى أن يصبح توزيع الأفراد قريباً من التوزيع الطبيعى .

وبيضا لا يوجد أى ارتباط بين متوسطات أو تباينات الآباء والجيلين الأول والثاني وعشائر التلقيحات الرجعية فى حالة التأثير الإضافى للجينات .. نجد أن هذه القيم تكون مرتبطة ببعضها ، عندما تكون الجينات ذات تأثير هندسى ؛ ويصاحب زيادة المتوسطات زيادة التباينات فى حالة التأثير الهندسى ، بينما لا يشترط ذلك فى حالة التأثير الإضافى ؛ حيث قد تصاحب زيادة المتوسطات زيادة أو نقص فى التباينات (Brewbaker ١٩٦٤) .

مكونات التباين فى الصفات الكمية

يصعب فى الصفات الكمية تتبع كل جين على حدة فى الأجيال الإنعزالية ، كما يصعب تقسيم النباتات إلى أقسام محددة حسب النسب المندلية المعروفة كما فى الصفات البسيطة أو التى يتحكم فيها عدد قليل من الجينات. ويسعى المربى - بدلاً من ذلك - إلى تقدير التباين Variance - وهو قيمة إحصائية - للدلالة على مدى الاختلافات المشاهدة فى الصفة فى العشائر التى يقوم بدراستها .

يعرف التباين الكلى المشاهد باسم تباين الشكل المظهرى Phenotypic Variance ، ويرمز له بالرمز (V_{Ph}) ؛ ونظراً لأن الاختلافات التى تشاهد فى الشكل المظهرى ترجع إلى تأثير كل من التركيب الوراثى ، والعوامل البيئية على كل فرد من أفراد العشيرة ؛ لذا .. فإن :

$$V_{Ph} = V_G + V_E$$

حيث يمثل (V_G) التباين الذى يرجع إلى تأثير التركيب الوراثى أو التباين الوراثى Genotypic Variance ، بينما يمثل (V_E) التباين الذى يرجع إلى تأثير البيئة أو التباين البيئى Environmental Variance .

التباين البيئى

يقدر التباين البيئى لأية صفة ؛ بحساب مدى التباين فى هذه الصفة فى عشيرة يحمل جميع أفرادها نفس التركيب الوراثى؛ كأن تكون جميعها - مثلاً - سائدة أصيلة ، أو متنحية أصيلة ، أو خليطة فى الصفة . ويحسب التباين البيئى بالمعادلة التالية :

$$V_E = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n - 1}$$

حيث تمثل (X) القيمة المشاهدة للصفة لكل فرد من أفراد العشيرة بـ (n) عدد أفراد العشيرة ، بينما ترمز (Σ) لكلمة مجموع .

تجدر الإشارة إلى أن التباين البيئي لصفة ما لا يكون ثابتاً دائماً ، وإنما يتغير بتغير التركيب الوراثي لأفراد العشيرة في الصفة المدروسة ، وبتغيير الخلفية الوراثية لأفراد العشيرة ، فهو يكون أكبر - عادة - في السلالات الأصلية (مثل السلالات النقية ، أو السلالات المرباة تربية داخلية) عما في الأصناف العادية (الصادقة التربية ، أو المفتوحة التلقيح) ، ويقل في الأصناف الهجين عامة عما في الأصناف العادية . ورغم أن تقدير التباين البيئي يختلف بين العشائر غير المتجانسة .. إلا أنه يكون أقل فيها مما في العشائر الأكثر تجانساً ، باستثناء الأصناف الهجين . وبالإضافة إلى ما تقدم .. فإن التباين البيئي يختلف بين السلالات ذات الأصول الوراثية المتشابهة نظراً لاختلاف مدى تأثر التراكيب الوراثية السائدة الأصلية والمتنحية الأصلية بالصفة (أى يحدث تفاعل بين البيئة والتركيب الوراثي في التأثير على الصفة) . ولذا .. فإن أفضل تقدير للتباين البيئي يكون هو متوسط التباين البيئي للأبء والجيل الأول (وهى العشائر المتجانسة) كما يلي :

$$V_E = \frac{VP_1 + VP_2 + VF_1}{3}$$

حيث تمثل VP_1 ، و VP_2 ، و VF_1 تباينات أحد الآباء ، والاب الثاني ، والجيل الأول الهجين بينهما على التوالي .

ويفضل - أحياناً - حساب التباين البيئي بالمعادلة التالية :

$$V_E = \sqrt[3]{VP_1 \cdot VP_2 \cdot VF_1}$$

أى على أساس الجذر التكعيبي لحاصل ضرب تباين الأب الأول مع تباين الاب الثاني مع تباين الجيل الأول بينهما .

التباين الوراثى

أشرنا - سابقاً - إلى أن التباين الوراثى (V_G) يعكس القدر الذى يشارك به التركيب الوراثى فى التباين الكلى للصفة ، ويمكن تقسيم التباين الوراثى - بدوره - إلى مكونات أصغر ، يسهم كل منها بنصيب فى التباين الكلى للصفة وهى كما يلى :

١- تباين التأثير الإضافى للجين أو التباين الإضافى Additive Variance (V_A) وهو مقياس لقيمة التربية Breeding Value ، ويرجع إلى اختلاف التراكيب الوراثية الأصلية فى التأثير على الصفة ، وهو يعد أهم مكونات التباين الوراثى لأنه الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه عند الانتخاب .

٢- تباين تأثير السيادة أو تباين السيادة Dominance Variance (V_D أو V_D) وهو مقياس للانحراف الذى يعود إلى السيادة dominance deviation ؛ نتيجة للتفاعل بين الجينات الأليلية .


٣- تباين التفاعل Interaction Variance (V_I أو V_I) ، وهو مقياس للانحراف الذى يعود إلى التفاعل interaction deviation بين الجينات غير الأليلية ؛ أى إلى حالات التفوق epistasis .

وبذا .. فإنه يمكن إعادة صياغة معادلة التباين الكلى لتصبح كما يلى :

$$V_{Ph} = V_A + V_G + V_I + V_E$$

وبين شكل (٤ - ٤) معظم مكونات التباين التى سبقت الإشارة إليها . ويمكن الاستفادة من الشكل فى تفهم العلاقة فيما بينها ، خاصة فيما يتعلق بتباينات لم تسبق الإشارة إليها ، وهى تباين التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة Genotype - Environment Interaction Variance (V_{GE} أو V_{GE}) ، و الذى قسم - بدوره - إلى تباين التفاعل بين التأثير الإضافى والبيئة (V_{AE}) ، وتباين التفاعل بين تأثير السيادة والبيئة (V_{DE}) . ويمكن بإجراء التجارب المناسبة تقدير مكونات مختلفة لتباين مواقع إجراء الدراسة Sites ، ومواسم إجرائها seasons كجزء من التباين البيئى ، وكذلك تحديد تباين التفاعلات بين مكونات البيئة وبعضها (V_{EE}) ، وبين تأثير التفاعل والبيئة (V_{IE}) وتباينات التفاعلات بين مختلف مكونات التباين الوراثى ؛

مثل (V_{AA}) ، و (V_{AD}) ، و (V_{DD}) وهى التى تشكل فى مجموعها تباين التفاعل (V_I) وتمثل - على التوالى - تباين التفاعل بين قيمتين من قيم التربية ، وتباين التفاعل بين قيمة التربية لأحد المواقع الجينية مع الانحراف العائد إلى السيادة فى موقع جينى آخر ، وتباين التفاعل بين اثنين من الانحرافات العائدة إلى السيادة . وإذا كان التفاعل بين آليات أكثر من موقعين جينيين .. فإنه يكون شديد التعقيد .



شكل (٤ - ٤) : تخطيط للعلاقة بين الأنواع المختلفة من التباينات التى يتكون منها تباين الشكل المظهرى . راجع المتن للتفاصيل (عن Simmonds ١٩٧٩) .

ونظراً لأن حساب مختلف التفاعلات يكون أمراً معقداً ؛ لذا .. فإنها تهمل - عادة - حيث يحسب تباين التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئى ضمن التباين البيئى ، كما يقسم

التباين الوراثى إلى مكوناته الثلاثة الرئيسية (V_A) ، و (V_D) ، و (V_I) دونما تفصيل لتباين التفاعل ، أو قد يقسم إلى مكونين فقط ، هما (V_A) وبقية مكونات التباين الوراثى معاً ؛ ذلك لأن فاعلية عملية الانتخاب فى برامج التربية تتحدد - أساساً - بتباين التأثير الإضافى للجين .

طرق تقدير مكونات التباين فى الصفات الكمية

سبقت الإشارة إلى طريقة تقدير التباين البيئى عند مناقشة هذا الموضوع ، أما التباين الوراثى ومكوناته المختلفة ، وكذلك مختلف تباينات التفاعل .. فإنها تقدر بطرق شتى ، وتعتمد هذه الطرق على عدد من الافتراضات البيولوجية ، أكثرها شيوعاً مايلى (عن Sprague ١٩٦٦) :

- ١- أن تكون النباتات المقيمة عينة عشوائية ممثلة لكل التراكيب الوراثية الممكنة فى العشيرة التى أخذت منها .
- ٢- أن تكون النباتات ثنائية المجموعة الكروموسومية ، وتسلك مسلكاً طبيعياً أثناء الانقسام الاختزالى .
- ٣- ألا يوجد تأثير سيتوبلازمى على الصفة .
- ٤- ألا توجد آليات متعددة للجين .
- ٥- ألا يوجد ارتباط بين الجينات .
- ٦- أن تتساوى جميع التراكيب الوراثية فى قدرتها على التكاثر فلا يوجد انتخاب لصالح أى منها .
- ٧- ألا يوجد تفوق ؛ أى لا يوجد تفاعل بين الجينات غير الآليلية .

التقدير على أساس نسب الآليات وقيمتها الوراثية

تحسب مكونات التباين الوراثى لموقع جينى واحد بالمعادلات التالية (عن Falconer

: (١٩٨١)

$$\begin{aligned}
 V_A &= 2pq \alpha^2 \\
 &= 2pq [a + d (q - p)]^2 \\
 V_D &= (2pqd)^2 \\
 V_G &= V_A + V_D \\
 &= 2pq [a + d (q - p)]^2 + (2pqd)^2
 \end{aligned}$$

وتقدر قيمتا (V_A) ، و (V_D) للصفات الكمية التى يتحكم فيها أكثر من جين من مجموع قيم الـ (V_A) ، و الـ (V_G) لكل جين على التوالى ، ويهمل - عادة - تباين التفاعل بين هذه الجينات ؛ لأن حسابه معقد ، بينما يكون قليل الأهمية .

التقدير على أساس تحليل التباين لعدد من العائلات الوراثية

تعتمد هذه الطريقة - فى تقدير مكونات التباين - على تقييم عدد من العائلات الوراثية (بالنسبة للصفة المراد دراستها) فى عدة مناطق ، وعلى مدى عدة سنوات ، ويمكن أن تكون هذه العائلات من الجيل الثالث ، أو الرابع ، لتلقيح أو أكثر. ويكون متوسط المربعات المتوقع expected mean squares لمصادر التباين المختلفة كما يلى (عن Allard ١٩٦٤) .

متوسط المربعات المتوقع	درجات الحرية	مصدر التباين
$V_e + rV_{aly} + ryV_{al} + rlV_{ay} + rlyV_a$ (f-1)		العائلات
$V_e + rV_{aly} + rlV_{ay}$	(f-1) (y-1)	العائلات × السنوات
$V_e + rV_{aly} + ryV_{al}$	(f-1) (l-1)	العائلات × المواقع
$V_e + rV_{aly}$	(f-1) (y-1) (l-1)	العائلات × السنوات × المواقع
V_e	(r-1) (fly - 1)	الخطأ التجريبي

علما بأن f تمثل عدد العائلات ، و r : عدد المكررات ، و l : عدد المواقع ، و y : عدد سنوات التقييم، و V_e : تباين الخطأ التجريبي ، و V_a : التباين الناشئ عن الاختلافات بين العائلات ، و V_{al} التباين الناشئ عن التفاعل بين العائلات والمواقع ، ويعد مقياساً لما إذا كانت العائلات متجانسة فى سلوكها فى المواقع المختلفة ، أم غير متجانسة ، و V_{ay} التباين الناتج من التفاعل بين العائلات وسنوات الدراسة ، و V_{aly} التباين الناتج من التفاعل بين العائلات والمواقع والسنوات .

التقدير على أساس تباينات الآباء والجيلين الأول والثانى والتلقيحات الرجعية

يمكن تقدير مكونات التباين الوراثى بزرعة عشائر الآباء والجيلين الأول والثانى والتلقيحات الرجعية - معاً- فى وقت واحد ، وحساب القيمة المشاهدة للصفة موضع الدراسة فى كل فرد من كل عشيرة ، ثم حساب تباين الصفة فى كل عشيرة بالمعادلة العامة التى سبق شرحها لدى مناقشة التباين البيئى ، وهى

$$V = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n - 1}$$

وبذا .. يمكن الحصول على تباين الأبوين (V_{P1} و V_{P2}) ، وتباين الجيلين الأول الثانى (V_{F1} و V_{F2} على التوالى) ، وتباين التلقيحين الرجعيين للأبوين (V_{B1} و V_{B2} للأبوين الأول والثانى على التوالى) .

وتقدر- بعد ذلك- مكونات التباين الوراثى ؛ بالاستنباط من المعادلات التالية (عن Simmonds ١٩٧٩) :

$$V_{F2} = V_A + V_D + V_E$$

$$V_{B1} + V_{B2} = V_A + 2V_D + 2V_E$$

$$V_E = (V_{P1} + V_{P2} + V_{F1}) / 3$$

ويحسب التباين الإضافى بطرح حاصل ضرب المعادلتين الأولى والثانية من المعادلة الثانية ، ثم تحسب قيمة تباين السيادة بطرح التباين الإضافى من التباين الوراثى.

كما يمكن تقدير مكونات التباين الوراثى كما يلى (عن Benepal & Hall ١٩٦٧) :

$$V_A = 2(V_{F2} - \frac{1}{4} V_D - V_E)$$

$$V_D = 4(V_{B1} + V_{B2} - V_{F2} - V_E)$$

وتقدر مكونات التباين الوراثى كذلك بالمعادلات التالية (Warner ١٩٥٢) :

$$V_A = 2 V_{F2} - V_{B1} - V_{B2}$$

$$V_D = V_{F2} - V_E - V_A$$

ويذكر Gamble (١٩٦٢) طريقة مبسطة ؛ للاستدلال على أهمية فعل الإضافة ، والسيادة ، والتفاعل للجينات المتحكمات فى الصفات الكمية من ست قيم إحصائية ، يستعمل فى حسابها المتوسطات الحسابية لكل من الأبوين (الأول $\bar{P}_1$ ، والثانى $\bar{P}_2$) ، والجيلين (الاول $\bar{F}_1$ ، والثانى $\bar{F}_2$) ، والتلقيحين الرجعيين (إلى الأب الاول $\bar{B}_1$ ، وإلى الأب الثانى $\bar{B}_2$) . وفيما يلى القيم الست وطريقة حسابها :

$$m \text{ (المتوسط العام) } = \bar{F}_2$$

$$a \text{ (الفعل الإضافى للجينات) } = \bar{B}_1 - \bar{B}_2$$

$$d \text{ (فعل السيادة للجينات) } = \bar{F}_1 + 2\bar{B}_1 + 2\bar{B}_2 - \frac{1}{2}\bar{P}_1 - \frac{1}{2}\bar{P}_2 - 4\bar{F}_2$$

$$aa \text{ (تفاعل الفعل الإضافى × الإضافى) } = 2\bar{B}_1 + 2\bar{B}_2 - 4\bar{F}_2$$

$$ad \text{ (تفاعل الفعل الإضافى × السيادة) } = \frac{1}{2}\bar{P}_2 + \bar{B}_1 - \frac{1}{2}\bar{P}_1 - \bar{B}_2$$

$$dd \text{ (تفاعل السيادة × السيادة) } = \bar{P}_1 + \bar{P}_2 + 2\bar{F}_1 + 4\bar{F}_2 - 4\bar{B}_1 - 4\bar{B}_2$$

تعد القيم السابقة مجرد دليل على وجود الأنواع المختلفة من فعل الجينات وأهميتها ولكنها لا تفسر نسبة إلى التباينات الوراثية المختلفة ، التى تقدر بالطريقة التالية :

$$V_m = V_{\bar{F}_2}$$

$$V_A = V_{\bar{B}_1} + V_{\bar{B}_2}$$

$$V_D = V_{\bar{F}_1} + 16V_{\bar{F}_2} + \frac{1}{4}V_{\bar{P}_1} + \frac{1}{4}V_{\bar{P}_2} + 4V_{\bar{B}_1} + 4V_{\bar{B}_2}$$

$$V_{AA} = 4V_{\bar{B}_1} + 4V_{\bar{B}_2} + 16V_{\bar{F}_2}$$

$$V_{AD} = V_{\bar{B}_1} + \frac{1}{4}V_{\bar{P}_1} + V_{\bar{B}_2} + \frac{1}{4}V_{\bar{P}_2}$$

$$V_{DD} = V_{\bar{P}_1} + V_{\bar{P}_2} + V_{\bar{F}_1} + 16V_{\bar{F}_2} + 16V_{\bar{B}_1} + 16V_{\bar{B}_2}$$

هذا .. مع العلم بأنه لايلزم لحساب أى من القيم السابقة الذكر سوى المتوسطات الحسابية للعشائر الست من تجربة بمكررات بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة . يلى ذلك .. حساب الانحراف القياسى ، وقيمة "t" لكل تباين منها ، وهى التى يستدل منها على مدى جوهرية كل نوع من التباين . وتوجد معادلات لحساب التباينات السابقة عند

عدم توفر بيانات عن التلقيحات الرجعية مع توفر بيانات عن الجيل الثالث .

اختبار اسكيلنج Scalling Tests :

يجرى اختبار اسكيلنج ؛ للتأكد من أمرين هما :

١- غياب التفاعل بين الجينات غير الأليلية .

٢- غياب التفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية .

وترجع أهمية هذا الاختبار إلى أن معظم الطرق والمعادلات المستعملة في حساب تباين الإضافة وتباين السيادة تفترض عدم وجود أى تفاعل بين الجينات وبعضها .

وتتوفر تفاصيل اختبارات اسكيلنج في مراجع الوراثة الكمية والإحصائية ؛ مثل Singh & Chaudhary (١٩٧٩) ، ولايسعنا في هذا المقام إلا أن نقدم للقارئ فكرة عامة عن ماهية هذه الاختبارات .

توجد أربعة اختبارات اسكيلنج ، تأخذ الرموز A ، و B ، و C ، و D ، ويعتمد كل اختبار منها على توفر بيانات عن المتوسطات الحسابية لعشائر الأبوين ($\bar{P}_1$ و $\bar{P}_2$) ، والجيلين الأول ($\bar{F}_1$) ، والثاني ($\bar{F}_2$) ، والتلقيحين الرجعيين للأب الأول ($\bar{B}_1$) ، والثاني ($\bar{B}_2$) ، على أن يُحصل على المتوسطات من تجربة بمكررات بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة ، ويجرى اختبار اسكيلنج (D) عند توفر بيانات عن الجيل الثالث (F_3) مع غياب بيانات عن التلقيحات الرجعية .

يدل عدم اختلاف قيم اختبارات اسكيلنج (A) ، و (B) ، و (C) ، و (D) جوهرياً عن الصفر، أو عن حدود الانحراف القياسى لكل منها على عدم وجود أية تفاعلات ضمن مكونات تباين الشكل المظهرى ؛ وبذا .. يمكن تقدير قيم تباين الإضافة وتباين السيادة بالطريقة السهلة التى سبق بيانها ، التى تعتمد على قيم تباينات الآباء ، والجيلين الأول والثانى ، والتلقيحات الرجعية. أما إذا اختلفت قيم أى من اختبارات اسكيلنج جوهرياً عن الصفر .. فإن ذلك يكون دليلاً على وجود تفاعل بين جينات غير آليّة تتحدد نوعيتها حسب

إضافي × إضافي بصفة أساسية	D
سيادة × سيادة	C
إضافي × إضافي ، وسيادة × سيادة ، وإضافي × سيادة	A ، و B

ويلزم - في هذه الحالة - تقدير مكونات تباين الإضافة والسيادة والتفاعلات المختلفة من تباينات متوسطات عشائر الآباء ، والجيلين الأول والثاني ، والتلقيحات الرجعية بالطريقة التي سبق بيانها (Singh & Chaudhary ١٩٧٩) :

ويوجد اختبار اسكيلنج آخر ؛ للتعرف على مدى استقلالية التأثير البيئي عن التأثير الوراثي ؛ أي لاختبار غياب التفاعل بين البيئة والوراثة . ويجرى الاختبار بمقارنة تباينات العشائر غير الانعزالية VP_1 ، و VP_2 ، و VF_1 باستخدام اختبار (F) وتحسب قيمة (F) بقسمة التباين الأكبر على التباين الأصغر ، في كل مقارنة من المقارنات الثلاث الممكنة ، وهي : VP_1 مع VP_2 ، و VP_1 مع VF_1 ، و VP_2 مع VF_1 . تعرف جوهرية قيمة (F) المحسوبة لكل مقارنة من جدول (F) ، مع اعتبار درجات الحرية الأفقية للبسط ، والرأسية للمقام ، وتحسب درجات الحرية على اعتبار أنها = ن - ١ ؛ حيث تمثل (ن) عدد الأفراد التي استخدمت في حساب قيمة التباين ، وتدل جوهرية الاختبار على وجود تفاعل وراثي × بيئي (Sheppard ١٩٧٣) .

تصميم داياليل Diallel Design

يستعمل تصميم داياليل التزاوجي diallel mating design في تقدير مكونات التباين الوراثي . ويتم - أولاً - اختيار مجموعة من التراكيب الوراثية (تسمى الآباء) من عشيرة تكثر فيها الاختلافات الوراثية في الصفة المراد دراستها ، مع المحافظة على كل تركيب وراثي منها - بالإكثار بطريق التلقيح الذاتي - حتى يمكن تقييمها فيما بعد . يلي ذلك .. إجراء كل التزاوجات الممكنة بين التراكيب الوراثية (الآباء) المنتخبة ، وحصاد البنور التي تنتج من كل تلقيح منفصلة عن التلقيحات الأخرى . كما قد تجرى التلقيحات

العكسية reciprocal crosses - أيضا - حيث يستعمل كل تركيب وراثى - فى هذه الحالة - مرة كآب ، ومرة أخرى كأم فى كل التزاوجات الممكنة ، وتحصد البذور الناتجة من كل تلقيح منها منفصلة أيضاً . وبالإضافة إلى البذور الناتجة من كل التزاوجات والتزاوجات العكسية الممكنة .. فإن البذور الناتجة من التلقيح الذاتى لكل تركيب وراثى قد تستخدم فى الأخرى فى التصميم .

يتوقف عدد المداخل entries (العشائر الوراثية) التى يتم تقييمها فى تصميم داياليل على عدد التراكيب الوراثية (الآباء) المنتخبة من العشيرة الأصلية ، فإذا كان عددها (ن) .. يكون :

$$\text{عدد التزاوجات بينها بدون التزاوجات العكسية} = \frac{n(n-1)}{2}$$

عدد التزاوجات الممكنة بينها شاملة التزاوجات العكسية = $n(n-1)$

ويمكن أن يتضمن التقييم فى تصميم داياليل واحدة من الحالات الست التالية :

١- التزاوجات فقط .

٢- التزاوجات ، والأنسال الناتجة من التلقيح الذاتى للآباء المنتخبة .

٣- التزاوجات العكسية فقط .

٤- التزاوجات العكسية والأنسال الناتجة من التلقيح الذاتى للآباء المنتخبة .

٥- التزاوجات والتزاوجات العكسية (داياليل كامل complete diallel) .

٦- التزاوجات والتزاوجات العكسية والأنسال الناتجة من التلقيح الذاتى للآباء

المنتخبة .

ويعنى اعتماد التصميم على عدد قليل من الآباء توقع زيادة كبيرة فى الخطأ التجريبى sampling error فى القيم الإحصائية المحسوبة (قيم القدرة على التألف) ، بينما تؤدي كثرة عدد الآباء إلى صعوبة إجراء داياليل كامل ، أو نصف داياليل ، وقد حدا ذلك بعلماء الوراثة الإحصائية إلى إجراء تصميم يعتمد على تحليل نتائج مجموعة محدودة فقط من التزاوجات ، من بين كل التزاوجات الممكنة بين الآباء ، حينما يكون عددها كبيراً .

يعتمد تحليل الداياليل على توفر بيانات عن الصفة المراد قياسها ، تؤخذ من تجربة

بمكررات مصممة إحصائياً (يفضل عادة اتباع تصميم القطاعات العشوائية الكاملة . Randomized Complete Block Design) . وتدخل فى التصميم كل العشائر الوراثية التى يرغب فى استعمالها حسب نوع الداياليل، وهى: التزاوجات مع الآباء ، أو بدونها ؛ ومع التزاوجات العكسية ، أو بدونها . ويعتبر كل تزاوج أو أب معاملة فى التصميم ، تؤخذ منها قراءة واحدة لكل صفة مدروسة من كل مكررة .

إن العرض المفصل لخطوات تحليل تصميم الداياليل يخرج عن أهداف هذا الكتاب ، ويمكن الرجوع إليه فى أحد المصادر المتخصصة؛ مثل Griffing (١٩٥٦) ، و Hansen & Robinson (١٩٦٣) ، و Mather & Jinks (١٩٧٧) ، و Singh & Chaudhary (١٩٧٩) الذى يعد من أيسر المراجع فى هذا الموضوع لغير المتخصصين فى الوراثة الإحصائية ، ويفيد التصميم فى عمل تحليل كامل لمكونات التباين الوراثة لكل صفة مقيسة فضلاً عن الاستفادة منه فى تقدير المقدرة العامة على التآلف Specific general Combining ability (GCA) والمقدرة الخاصة على التآلف Combining ability (SCA) للآباء المستخدمة فى التصميم ، وهى القيم التى يكون لها أهمية بالغة عند استعمال الآباء فى إنتاج الأصناف الهجين أو الأصناف التركيبية (يراجع لذلك الفصل الخاص بالأصناف الهجين) . ونكتفى - فيما يلى - بعرض موجز لتحليل داياليل وكيفية استعماله فى تقدير مكونات التباين الوراثة (عن Fehr ١٩٨٧) .

يمكن تقدير مكونات التباين الوراثة بتحليل التباين ، من تصميم داياليل الذى يتضمن التلقيحات فقط (جدول ٤ - ٣) . ويمكن تقسيم الاختلافات بين التلقيحات فى الداياليل إلى اختلافات بين عائلات أنصاف الأقارب half-sib families (HS) واختلافات بين عائلات الأقارب التامة full - sib families (FS) ، علماً بأنه توجد عائلة أنصاف أقارب لكل أب فى الداياليل . ويقدر سلوك عائلته من أنصاف الأقارب من المتوسط المحسوب لجميع التلقيحات التى تشترك معاً فى أحد الآباء . وتعد الاختلافات بين عائلات أنصاف الأقارب تقديراً للمقدرة العامة على التآلف ، أما عائلات الأقارب التامة .. فهى التى تنتج من تزاوج أبوين لكل منها ؛ وبذا .. فإن عدد عائلات الأقارب التامة فى تصميم الداياليل يساوى عدد التزاوجات التى يجرى تقييمها . ويستعمل سلوك عائلات الأقارب التامة فى تقدير القدرة الخاصة على التآلف .

جدول (٤ - ٣) : تحليل التباين لتصميم داياليل يشتمل على $\frac{n(n-1)}{2}$ تلقيع بين عدد (ن) من الآباء ، وعدد (r) من المكررات .

التباين (I)	عدد درجات الحرية	مصدر التباين
	r - 1	المكررات
M ₂	[n (n - 1) / 2] - 1	التلقيحات
M ₂₁	n - 1	القدرة العامة على التآلف (GCA)
M ₂₂	n (n - 3) / 3	القدرة الخاصة على التآلف (SCA)
M ₁	(r - 1) {[n (n - 1) / 2] - 1}	الخطأ التجريبي
	m - 1	المجموع

(١) تشمل توقعات التباينات المختلفة على ما يلي :

$$M_2 = V_e + rV_c$$

$$M_{21} = V_e + r (\text{Cov FS} - 2 \text{Cov HS}) + r (n - 2) \text{Cov HS}$$

$$M_{22} = V_e + r (\text{Cov FS} - 2 \text{Cov HS})$$

$$M_1 = V_e$$

حيث يمثل (V_e) تباين الخطأ التجريبي ، و (V_c) تباين التلقيحات ، و (Cov FS) التباين المرافق لعائلات الأقارب التامة ، و (Cov HS) التباين المرافق لعائلات أنصاف الأقارب .

هذا .. وتعتمد مكونات التباين الوراثي الملازمة للتباين المرافق covariance لعائلات أنصاف الأقارب (Cov HS) ، وعائلات الأقارب التامة (Cov FS) على مدى التربية الداخلية (F) للتراكيب الوراثية المستعملة كآباء في الداياليل ؛ فعندما تكون الآباء عبارة عن نباتات من الجيل الثاني أو سلالات مستمدة منها (أى إن F= صفر) .. تصبح مكونات

التباين الوراثي كما يلي :

$$\text{Cov HS} = \frac{1}{4} V_A + \frac{1}{16} V_{AA}$$

$$\text{Cov FS} = \frac{1}{2} V_A + \frac{1}{4} V_A + \frac{1}{4} V_{AA}$$

ويضاف - أيضاً - إلى الجانب الأيمن للمعادلة الأولى الدرجات الأعلى من تباينات التفوق الإضافية ، بينما يضاف - كذلك - إلى الجانب الأيمن من المعادلة الثانية تباينات التفوق الأخرى الإضافية والسيادة ، وبفرض عدم وجود تفوق .. فإن التباين الإضافي (VA) يحصل عليه بضرب قيمة الـ Co HS ، في أربعة (المعادلة الأولى) . كما يمكن الحصول على تقدير لتباين السيادة (VD) كما يلي :

$$V_D = 4 (\text{Cov FS} - 2 \text{Cov HS})$$

$$= 4 [(\frac{1}{2} V_A + \frac{1}{4} V_D) - 2 (\frac{1}{4} V_A)]$$

وعندما تكون الآباء عبارة عن سلالات مرباة تربية داخلية ، ومختارة عشوائياً من العشيرة (أى F=1) .. فإن مكونات التباين الوراثي .. تصبح كما يلي :

$$\text{Cov HS} = \frac{1}{2} V_A + \frac{1}{4} V_{AA}$$

$$\text{Cov FS} = V_A + V_D + V_{AA}$$

ويشتمل الجانب الأيمن للمعادلة الأولى على الدرجات الأعلى من تباينات التفوق الإضافية ، بينما يشتمل الجانب الأيمن من المعادلة الثانية على تباينات التفوق الأخرى والسيادة . وبفرض عدم وجود تفوق .. فإن التباين الإضافي (VA) يُحصل عليه بضرب قيمة الـ Cov HS في ٢ . كما يمكن الحصول على تقدير لتباين السيادة (VD) كما يلي:

$$\text{Cov FS} - 2 \text{Cov HS} = (V_A + V_D) - 2 (\frac{1}{2} V_A) = V_D$$

تصميم رقم ١ Design I

يمكن تقدير مكونات التباين الوراثي - أيضاً - بواسطة ما يعرف بتصميم رقم (١) أو nested design . ويتضمن الجيرمبلازم الذي يستخدم لهذا التصميم تلقحيات بين نباتات تؤخذ اعتباراً من عشيرة تكثر فيها الاختلافات الوراثية ، مع تخصيص بعض هذه

النباتات كآباء (P_m) male parents ، و البعض الآخر كأمهات (P_f) female parents . يستخدم كل أب (ذكر) فى تلقيح عدد متساو من الأمهات (إناث) ، على أن يتم اختيار الآباء والأمهات بشكل اعتباطى ، وتستخدم مجموعات مختلفة من نباتات الأمهات مع كل نبات مستعمل كأب ، وبذا .. يكون عدد التلقيحات الفردية الممكنة مساوياً لعدد الآباء (P_m) مضروباً فى عدد الأمهات (P_f) التى يتم تزاوجها مع كل أب. فإذا تم تزاوج (١٠) سلالات آباء مع (٥٠) سلالة أمهات ، بمعدل خمس سلالات مختلفة لكل سلالة من سلالات الآباء .. يصبح عدد التلقيحات الفردية ١٠ × ٥ = ٥٠ تلقيحاً. ويستخدم - غالباً - تصميم القطاعات العشوائية الكاملة كتصميم إحصائى لدراسة الصفات .

ويتم تقسيم الاختلافات بين التلقيحات إلى اختلافات بين الآباء (الذكور) ، واختلافات بين الأمهات (الإناث) لكل ذكر ، وتكون مصادر الاختلافات ودرجات الحرية فى التحليل الإحصائى على النحو التالى :

التباين	درجات الحرية	مصادر الاختلافات
	r-1	المكررات
M ₃	m-1	الذكور
M ₂	m(f-1)	الإناث لكل ذكر
M ₁	(r-1) (mf-1)	الخطأ التجريبي
	rmf-1	الكلى

حيث تمثل (r) عدد المكررات، و (m) عدد نباتات أو سلالات الآباء (الذكور) ، و (f) عدد نباتات أو سلالات الأمهات (الإناث) المستخدمة مع كل ذكر ، هذا .. ويعد تباين الذكور ممثلاً للقدرة العامة على التألف بينما يعد تباين الإناث ممثلاً للقدرة الخاصة على التألف ، وتشتمل توقعات التباينات المختلفة على مايلى :

$$M_3 = V_e + r (\text{Cov FS} - \text{Cov HS}) + rf \text{Cov HS}$$

$$M_2 = V_e + r (\text{Cov FS} - \text{Cov HS})$$

$$M_3 = V_e$$

علماً بأن Cov FS هو التباين المرافق لعائلات الأقارب التامة ، Cov HS هو التباين لعائلات أنصاف الأقارب ، V_e هو تباين الخطأ التجريبي . وبذا يمكن حساب التباين الإضافي (VA) وتباين السيادة (VD) بنفس الطريقة التي سبق بيانها لدى مناقشة تصميم داياليل .

هذا .. ويمكن إجراء التصميم بالطريقة التي سبق بيانها مع زراعة عدد K من النباتات في كل قطعة تجريبية (Plot) وإجراء تحليل التباين على النحو التالي :

توقعات متوسط المربعات	درجات الحرية	مصادر الاختلافات
$V+kV_t+rkV_f/m+nrkV_m$	m-1	الذكور
$V+kV_t+rkV_f/m$	m(f-1)	الإناث لكل ذكر
		القطع التجريبية لكل ذكر
$V+kV_t$	mf(r-1)	ولكل أثنى
V	mfr(k-1)	الخطأ التجريبي
	mfrk-1	الكلى

علماً بأن :

V مجموع التباين الوراثي ، والتباين البيئي داخل القطع التجريبية .

V_t تباين تأثير القطع التجريبية .

V_f تباين تأثير الأمهات .

V_m تباين تأثير الآباء الذكور .

ويحسب التباين الإضافي (VA) وتباين السيادة (VD) كما يلي :

$$\frac{1}{4} V_A = V_m$$

$$\frac{1}{4} V_A + \frac{1}{4} V_D = V_f$$

تصميم رقم II Design

تقدر مكونات التباين الوراثي - كذلك - بواسطة ما يعرف بالتصميم رقم (٢) ، وهو

تصميم عاملى factorial design ، تمثل فيه بعض النباتات المنتخبة من عشيرة تكثر فيها الاختلافات الوراثية كآباء (ذكور) ، والبعض الآخر كأمهات (إناث) ويلقح كل أب مع كل أم ، ولكن لاتلقح الآباء مع بعضها كما لاتلقح الأمهات مع بعضها كذلك ؛ وبذا .. يكون عدد التلقيحات الفردية الممكنة مساوياً لعدد الآباء (P_m) ، مضروباً فى عدد الأمهات (P_f) ؛ فلو كان عدد الآباء ثمانية ، وكان عدد الأمهات ستاً ، يكون عدد التلقيحات الفردية الممكنة $8 \times 6 = 48$ تلقيحاً .

تقسم الاختلافات بين التلقيحات إلى اختلافات بين الآباء (الذكور) ، واختلافات بين الأمهات (الإناث) ، والتفاعل بين الذكور والإناث . ويمكن اعتبار التباين المرافق بين عائلات أنصاف الأقارب أنه $Cov HS_m$ عندما يكون الأب (الذكر) مشاركاً فى كل التلقيحات ، و $Cov HS_f$ حينما تكون الأم (الأنثى) مشاركة فى كل التلقيحات ، علماً بأنه تتساوى مكونات التباين الوراثى المزملة لكل منهما . وعندما تكون الآباء (الذكور والإناث) سلالات مربية تربية داخلية (أى حينما تكون قيمة F مساوية للصفر) .. تكون مكونات التباين الوراثى كما يلى .

$$Cov HS_m \text{ and } Cov HS_f = \frac{1}{4} V_A + \frac{1}{16} V_{AA}$$

ويضاف إلى الجانب الأيمن من المعادلة الدرجات الأعلى من تباينات التفوق الإضافية . أما حينما تكون الآباء (الذكور والإناث) عبارة عن سلالات مربية تربية داخلية (أى حينما تكون قيمة $F = 1$) .. تصبح مكونات التباين الوراثى كما يلى :

$$Cov HS_m \text{ and } Cov HS_f = \frac{1}{2} V_A + \frac{1}{4} V_{AA}$$

ويضاف إلى الجانب الأيمن من المعادلة الدرجات الأعلى من تباينات التفوق الإضافية . وتستخدم قيم التباينات المرافقة لعائلات أنصاف الأقارب لكل من الآباء (الذكور) والأمهات (الإناث) فى إيجاد تقديرات مستقلة للتباين الإضافى (V_A) . أما تقدير تباين السيادة (V_D) ؛ فيمكن الحصول عليه من العلاقة التالية :

$$Cov FS - (Cov HS_m + Cov HS_f) = V_D$$

علماً بأن

$$V_{mxf} = V_e + r (Cov FS - Cov HS_f - Cov HS_m)$$

حيث تمثل ($V_{m \times f}$) تباين التفاعل بين الذكور والإناث ، و (V_e) تباين الخطأ التجريبي، و r عدد المكررات المستعملة في التصميم الإحصائي . وتكون مصادر الاختلافات ودرجات الحرية في التحليل الإحصائي على النحو التالي :

التباين	درجات الحرية	مصادر الاختلافات
	$r-1$	المكررات (r)
M_4	$m-1$	الذكور (m)
M_3	$f-1$	الإناث (f)
M_2	$(m-1) (f-1)$	الذكور $\times$ الإناث
M_1	$(r-1) (mf-1)$	الخطأ التجريبي
	$rmf-1$	الكلية

علماً بأن توقعات التباينات المختلفة تتضمن ما يلي :

$$M_4 = V_e + r (Cov FS - Cov HS_f - Cov HS_m) + rf Cov HS_m$$

$$M_3 = V_e + r (Cov FS - Cov HS_f - Cov HS_m) + rm Cov HS_f$$

$$M_2 = V_e + r (Cov FS - Cov HS_f - Cov HS_m)$$

$$M_1 = V_e$$

حيث يمثل (V_e) تباين الخطأ التجريبي ، و ($Cov FS$) التباين المرافق لعائلات الأقارب التامة ، و ($Cov HS_f$) التباين المرافق لعائلات أنصاف الأقارب حينما تكون الأم (الأنثى) مشاركة في كل التلقيحات ، و ($Cov HS_m$) التباين المرافق لعائلات أنصاف الأقارب ، حينما يكون الأب (الذكر) مشاركاً في كل التلقيحات (عن Sprague ١٩٦٦، Fehr ١٩٨٧)

درجة التوريث

يرتبط مفهوم درجة التوريث Heritability - عادة - بالصفات الكمية ، إلا إنه لا يوجد ما يحول دون استعمالها مع الصفات البسيطة التي تتأثر كثيراً بالعوامل البيئية . ويعنى

بدرجة التوريث : مدى تطابق ظهور الصفة فى الأنسال ، مع ظهورها فى أبائها من النباتات المنتخبة ، أو هى القدرة على توريث صفة ما من نبات منتخبة إلى نسله . ويرمز لدرجة التوريث - عادة - بأحد الرمز h^2 ، أو H وسيكتفى بالرمز الأخير (H) - عادة - للدلالة على درجة التوريث فى هذا الكتاب ، وهى ليست مربعاً لقيمة ما ، بل هى نسبة ، وتعرف درجتان للتوريث ، هما درجة التوريث على النطاق العريض ، ودرجة التوريث على النطاق الضيق ، بالإضافة إلى ما يعرف بـ درجة التوريث المدركة أو الواقعة .

درجة التوريث على النطاق العريض أو المطلق

تحتسب درجة التوريث على النطاق العريض Broad Sense Heritability (تكتب اختصاراً BSH ، ويرمز لها كثيراً بالرمز H) بالمعادلة التالية (عن Burton ١٩٥١) :

$$BSH = \frac{V_G}{V_{Ph}}$$

حيث يمثل V_G ، و V_{Ph} التباين الوراثى والتباين الكلى (تباين الشكل المظهرى Phenotypic Variance) على التوالى ، ويحصل على هذه القيم من العلاقات التالية :

$$V_{Ph} = V_{F_2}$$

$$V_{F_2} = V_G + V_E$$

$$V_E = (V_{P_1} + V_{P_2} + V_{F_1}) / 3$$

ويتبين من ذلك أن درجة التوريث على النطاق العريض تمثل نسبة التباين الوراثى إلى التباين الكلى ، الذى يشمل التباين الوراثى والتباين البيئى ، وقد تحسب كنسبة مئوية للتباين الوراثى من التباين الكلى ، وقد يحسب التباين البيئى على أساس أنه الجذر التربيعى لحاصل ضرب تباينى الأبوين (Frey & Horner ١٩٥٧) :

$$V_E = \sqrt{V_{P_1} \times V_{P_2}}$$

وإذا توفرت بيانات عن الصفة فى الجيل الأول .. فإنه يفصل حساب التباين البيئى على


أساس أنه الجذر التكعيبي لحاصل ضرب تباين الجيل الأول فى تباين الأبوين كما يلى :

$$V_E = \sqrt[3]{V_{F1} \times V_{P1} \times V_{P2}}$$

يعاب على أى من الطرق السابقة فى حساب التباين البيئى أن الأبوين قد يكون تأثرهما بالعوامل البيئية أعلى بكثير من تأثر نباتات الجيل الثانى ، وهو ما يحدث حينما يكون الأبوان سلالات مرباة تربية داخلية من محاصيل تلقح - خلطياً - بدرجة عالية فى الطبيعة ؛ حيث تكون الآباء ضعيفة النمو ، بينما تظهر قوة الهجين فى نباتات الجيل الثانى ، لذا يفضل - فى حالات كهذه - اعتبار تباين الجيل الأول ممثلاً للتباين البيئى .

ويتبين من المعادلات المستعملة فى حساب درجة التوريث أن قيمة BSH تزداد كلما قل تأثر الصفة بالعوامل البيئية . ويوضح شكل (٤ - ٥) كيف يبدو ذلك عملياً فى توزيع صفة بسيطة (يتحكم فيها جين واحد) بين أفراد الجيل الثانى ، عند اختلاف درجة التوريث التى تقل - تدريجياً - من ١٠٠٪ إلى ٢٥٪ مع الاتجاه من أعلى لأسفل فى الشكل ، وبينما تمثل الرسوم البيانية - فى العمود الأيمن - التوزيع المتوقع للصفة فى حالات السيادة التامة .. فإن العمود الأيسر يمثل التوزيع المتوقع فى حالات غياب السيادة . ويفترض فى جميع الأشكال أن الأبوين يختلفان فى ١٢ وحدة من الوحدات التى تقاس بها الصفة .

يلاحظ من الشكل أن الأشكال المظهرية تكون ممثلة تماماً للتركيب الوراثية المنعزلة فى الجيل الثانى ، حينما لا تتأثر الصفة بالعوامل البيئية ؛ أى حينما تكون درجة التوريث ١٠٠٪ ، وهو ما يلاحظ - عادة - فى عديد من الصفات البسيطة ؛ كلون الأزهار مثلاً ، ومع نقص درجة التوريث إلى ٨٧,٥٪ يبدأ ظهور تداخل فى الشكل المظهرى بين فئات التركيب الوراثية الثلاثة فى حالة غياب السيادة ، وبين التركيب السائدة والمتنحية فى حالة السيادة التامة ؛ ويحدث ذلك نتيجة لتأثير البيئة على الشكل المظهرى للفرد ؛ حيث تزيد قيمة الصفة بدرجات متفاوتة فى بعض الأفراد ، وتقل بدرجات متفاوتة - كذلك - فى أفراد أخرى ، تحمل جميعها نفس التركيب الوراثى . ويزداد هذا التداخل مع زيادة تأثر الصفة بالعوامل البيئية - أى مع نقص درجة التوريث - إلى أن تختفى الحدود بين توزيع



شكل (٤ - ٥) : التوزيعات المتوقعة في الجيل الثاني لصفة بسيطة ، يتحكم فيها جين واحد تبلغ درجة توريثها (من أعلي لأسفل في الشكل) ١٠٠٪ ، ٨٧٫٥٪ ، ٧٥٪ ، ٥٠٪ ، ٢٥٪ في حالتى السيادة التامة (العمود الأيمن) ، وغياب السيادة (العمود الأيسر) راجع المتن للتفاصيل (عن Allard ١٩٦٤) .

فئات التراكيب الوراثية . وبينما يقترب توزيع الصفة - بين أفراد الجيل الثانى - من التوزيع الطبيعى عند غياب السيادة .. فإنه يكون مجنحاً Skewed نحو الصفة السائدة فى حالة السيادة . وتكون درجة التوريث مرتفعة - عادة - فى الصفات البسيطة والنوعية عامة ، بينما تكون منخفضة فى الصفات الكمية ، التى تشمل معظم الصفات الاقتصادية المهمة ؛ فنجد أن درجة توريث بعض الصفات فى نبات الذرة - على سبيل المثال - تقدر بنحو ٧٠٪ بالنسبة لصفة طول النبات ، و ٢٥٪ بالنسبة للمحصول ، و ١٧٪ بالنسبة لصفة طول الكوز . وترجع أهمية درجة التوريث إلى أن الانتخاب لصفة ما تقل فاعليته كلما انخفضت درجة التوريث ؛ لأن النباتات المنتخبة ربما لا تعكس حقيقة التراكيب الوراثية المرغوب فيها ؛ لذا .. فإن التعامل مع الصفات ذات درجات التوريث المنخفضة يتطلب أمرين هما :

١- انتخاب عدد كبير من النباتات التى تظهر بها الصفة ؛ لأن جزءاً كبيراً منها لا يكون ممثلاً للتركيب الوراثى المرغوب فيه .

٢- اختبار نسل النباتات المنتخبة قبل الاستمرار ، فى الاعتماد عليها فى برنامج التربية ، ويفضل أن يختبر النسل فى مكررات ، عندما تكون الصفة المعنية كمية ، وذات درجة توريث شديدة الانخفاض .

درجة التوريث على النطاق الضيق

إن أهم مكونات التباين الوراثى المؤثرة على فاعلية عملية الانتخاب هى التباين الإضافى ، فمع افتراض أن الصفة يتحكم فيها جين واحد ، ولاتتأثر بالعوامل البيئية (الرسوم العلوية من شكل ٤ - ٥) .. نجد أن أى نبات منتخب - عند غياب السيادة - يكون ممثلاً للتركيب الوراثى المرغوب ، بينما تكون النباتات المنتخبة الحاملة للصفة السائدة - فى حالة السيادة - من أحد تركيبين وراثيين هما : السائد الأصيل ، أو السائد الخليط . وتزداد الحالة تعقيداً كلما قلت درجة توريث الصفة - بطبيعة الحال - كما أن التفاعل بين الجينات غير الأليلية ، والتفاعلات بين التأثيرات المختلفة للجينات وبعضها البعض ، وبين تأثير الجينات وتأثير البيئة يقلل بدرجة أكبر من جدوى الانتخاب ؛ لأن النباتات المنتخبة لاتكون ممثلة للتراكيب الوراثية المرغوب فيها ، الأمر الذى لايتأتى إلا

حينما تكون الجينات التى تتحكم فى الصفة ذات تأثير إضافى ؛ ولذا .. فإن درجة التوريث الأهم للمربى هى تلك التى تأخذ فى الاعتبار نسبة التباين الإضافى (V_A) إلى التباين الكلى (V_{Ph}) ، أو هى النسبة المئوية للتباين الإضافى من التباين الكلى ، وتسمى درجة التوريث على النطاق الضيق *Narrow Sense Heritability* (تكتب اختصاراً NSH ، ويرمز لها - كثيراً - بالرمز h^2) ، وتكتب معادلتها العامة كما يلى :

$$NSH = \frac{V_A}{V_{Ph}}$$

يعد التباين الإضافى (V_A) أهم مكونات هذه المعادلة ، وتتبع عدة طرق لإيجاده ، أو لإيجاد درجة التوريث على النطاق الضيق مباشرة ، نتناولها - بالشرح - فى الجزء التالى .

طرق تقدير درجة التوريث على النطاق الضيق

يتأثر تقدير درجة توريث صفة ما بعدد من العوامل ؛ ولذا .. فإن القيم المتحصل عليها يجب أن تفسر فى نطاق الطريقة التى اتبعت للحصول عليها ؛ ذلك لأن قيم التباين الإضافى لصفة ما .. قد تختلف من صنف إلى آخر ، ومن عشيرة وراثية لأخرى ، كما أن درجة التوريث هى حاصل قسمة قيمتين ، يكون فيهما التباين البيئى (V_E) أحد المكونات الهامة للمقام ، وهو الذى يتأثر كثيراً بالتصميم التجريبي المتبع ، ويعدد المكررات المستعملة ، ومساحة الوحدات التجريبية ... إلخ . وفيما يلى .. شرح لبعض الطرق المتبعة فى تقدير التباين الإضافى ، أو فى تقدير درجة التوريث على النطاق الضيق مباشرة .

طريقة تحليل مكونات التباين :

١- تتبع أى من الطرق التى سبق بيانها عند مناقشة مكونات التباين الوراثى فى تقدير التباين الإضافى وهى طرق : تصميم داياليل ، والتصميم رقم (١) ، والتصميم رقم (٢) . ويستعمل تقدير التباين الإضافى بعد ذلك فى حساب درجة التوريث على النطاق الضيق باستعمال المعادلة العامة .

٢- طريقة ارتداد الأنسال على الآباء :

ينسب إلى Lush عام ١٩٤٠ (عن Fehr ١٩٨٧) طريقة ارتداد الأنسال على الآباء Parent-Offspring Regression لتقدير درجة التوريث على النطاق الضيق مباشرة ؛ حيث تمثل قيمة معامل الارتداد (b) درجة التوريث في المعادلة :

$$Y_i = a + b x_i + e_i$$

حيث تمثل (Y_i) متوسط قيمة الصفة في نسل الأب (i) الذى تبلغ قيمة الصفة فيه (X_i) و (a) المتوسط العام للصفة في جميع الآباء المستعملة ، و (e_i) الخطأ التجريبى المصاحب لتقدير X_i ؛ أما (b) فهى معامل الارتداد الخطى linear regression coefficient .

ويقصد بالآباء فى العشائر النباتية أى نبات أو سلالة عشوائية من العشيرة . ويقصد بالنسل النباتات التى تنمو من زراعة البذور التى تحصد من النباتات المنتخبة ، سواء نتجت هذه البذور بطريقة التلقيح الذاتى selfed progeny أم بطريق التلقيح الخلطى العشوائى half-sib progeny . كما يمكن استعمال ارتداد الأنسال على متوسط قيمة الأبوين الذى يمثل العلاقة بين متوسط الصفة فى الأبوين mid-parent point ، ونسلهما المشترك full-sib offspring . وتستعمل - عادة - نباتات الجيل الثانى - الذى نفترض أن تتوفر فيه جميع الاختلافات الوراثية - فى تقدير معامل الارتداد الخطى ؛ حيث تنتخب مجموعة كبيرة - نسبياً - من النباتات ، تكون ممثلة لكافة الأشكال المظهرية المشاهدة ، ثم تؤخذ أنسالها ، ويقدر متوسط الصفة فى كل نسل على حدة ، ولى ذلك .. حساب معامل الارتداد بالمعادلة السابقة ، وتتوقف قيمة درجة التوريث على النطاق الضيق على طريقة الحصول على النسل كما يلى :

أ - عندما تكون الأنسال ناتجة من التلقيح العشوائى بين النباتات المنتخبة وبقية النباتات فى الحقل :

تكون نصف الأليلات فى كل نسل فى هذه الحالة من النبات المنتخب (الأب) ، والنصف الآخر من بقية العشيرة ؛ ولذا .. فإن قيمة (b) المحسوبة تمثل نصف درجة

التوريث : أى إن درجة التوريث تكون فى هذه الحالة ضعف قيمة (b) . وتحسب قيمة (b) بالطريقة الإحصائية العادية ، التى يمكن الاطلاع على تفاصيلها فى أى من مراجع الإحصاء ؛ مثل Cochran & Cox (١٩٥٧) ، و Steel & Torrie (١٩٦٠) ، و Snedecor & Cochran (١٩٦٧) ، و Little & Hills (١٩٧٨) ، و Gomez & Gomez (١٩٨٤) .

ويتبين لدى التحليل الوراثى الإحصائى للطريقة التى يتم بها تقدير (b) فى هذه الحالة أنها تمثل كلا من التباين الإضافى وتباين التفاعل ، نسبة إلى التباين الكلى ، ولكنها لا تتضمن أى جزء من تباين السيادة ، لذا .. فإنه يمكن اعتبارها ممثلة لنصف قيمة درجة التوريث على النطاق العريض ، إلا إذا كان للتفاعل بين الجينات غير الأليلية أهمية كبيرة .

ب - عندما تكون الأنسال ناتجة من التلقيح الذاتى :


تكون جميع الأليلات فى كل نسل فى هذه الحالة من النبات المنتخب ، وتكون قيمة (b) ممثلة لدرجة التوريث مباشرة .

ج - الأنسال الناتجة من التلقيح بين أباء منتخبة :

تعرف الأنسال الناتجة فى هذه الحالة بأنها أنسال الأقارب full-sib progenies . ويلزم - فى هذه الحالة - تقدير الصفة فى كل أبوين يجرى تلقيحهما ، ثم تحسب القيمة الوسطية للصفة بينهما ، ومتوسط قيمة الصفة فى نسلهما ، ويكون ارتداد الأنسال محسوباً على القيمة الوسطية للأباء ، وتكون جميع الأليلات فى كل نسل من النبات المنتخب ، وتكون قيمة (b) المحسوبة ممثلة لدرجة التوريث مباشرة ، وهى تمثل التباين الإضافى وتباينات الطرز الإضافية لحالات التفوق (التفاعلات بين الجينات غير الأليلية) ؛ لذا .. يمكن اعتبار (b) ممثلة لدرجة التوريث على النطاق الضيق إذا كانت تفاعلات الإضافة غير مهمة .

يبين شكل (٤ - ٦) مثلاً نظرياً لثلاث حالات من ارتداد الأنسال على الآباء ، هى فى حالة $h=1$ (أى إن درجة التوريث ١٠٠٪) ، $h=0.6$ (أى إن درجة التوريث عالية) ،

وb= صفراً (أى إن درجة التوريث = صفراً) . يتبين من الشكل كيف تكون قيم الأنسال ممثلة تماماً لقيم الآباء ، حينما تكون قيمة (b) واحداً صحيحاً ، وكيف أنها تكون متناثرة بالقرب من خط الإرتداد حينما تكون قيمة (b) عالية (وهى القيم الممثلة فى الشكل بالنقط السوداء) ، وكيف أنها تتناثر دونما علاقة بقيم الآباء عندما تكون درجة التوريث مساوية للصفر (وهى القيم الممثلة فى الشكل بحروف x). أما شكلاً (٧ - ٤) ، و (٨ - ٤) .. فيبينان تقديرين مختلفين لدرجة توريث صفة واحدة ، هى المقاومة لعفن الجذور الجاف (الفيزارى) فى الفاصوليا ، ولكن من مصدرين مختلفين هما السلالة 2114-12 فى شكل (٧ - ٤) ، والسلالة N203 فى شكل (٨ - ٤) .




شكل (٦ - ٤) : مثال نظرى لثلاث حالات من ارتداد الأنسال على الآباء هى
١ = b ، و ٠.٦ = b ، و b = صفراً . راجع المتن للتفاصيل (عن Simmonds ١٩٧٩) .

ويعتمد تقدير درجة التوريث بطريقة ارتداد الأنسال على آباؤها على عدة فروض هي :

- (أ) أن تكون النباتات ثنائية المجموعة الصبغية .
- (ب) أن تكون العشيرة ناتجة من تلقح عشوائي .
- (ج) ألا يوجد ارتباط بين الجينات المتحركة في الصفة .
- (د) ألا تكون الآباء سلالات مربية تربية داخلية .
- (هـ) ألا يوجد ارتباط بينى بين سلوك الآباء والأنسال .

ويؤدى عدم توفر أى من هذه الفروض إلى أن يصبح تقدير التوريث متحيزاً ، ولايشكل ذلك مشكلة - عادة - حينما تُوزع الآباء والأنسال عشوائياً مستقلة عن بعضها فى تجربة



شكل (٤ - ٧) : ارتداد أنسال الجيل الثالث علي آباؤها من نباتات الجيل الثاني
 لصفة المقاومة لعفن الجذور الجاف (الفيوزاري) للتقليح Redkote x 2114-12 فى الفاصوليا
 (عن Hassan وآخرين ١٩٧١) .


بمكررات . كما يمكن أخذ معامل تصحيح في الاعتبار ، عندما تكون الآباء مرباة داخليا .

٢- طريقة التلقيحات الرجعية

تحسب درجة التوريث في طريقة التلقيحات الرجعية بالمعادلة التالية (Warner ١٩٥٢) :

$$NSH = \frac{2V_{F_2} - (V_{F_2B_1} + V_{F_2B_2})}{V_{F_2}}$$

حيث يمثل (V_{F_2}) تباين الجيل الثاني للتلقيح الفردي بين أبوين (P_1) ، و (P_2) ، بينما يمثل $V_{F_2B_1}$ ، و $V_{F_2B_2}$ تباين الجيل الثاني للتلقيحات الرجعية بين نباتات الجيل



شكل (٤ - ٨) : ارتداد أنسال الجيل الثالث علي آبائها من نباتات الجيل الثاني
لصفة المقاومة لعفن الجذور الجاف (الفيوزاري)
للتلقيح Redkote x N203 (عن Hassan وآخرين ١٩٧١) .

الأول للتلقيح الفردى السابق وكل من أبوى التلقيح (P1) ، و (P2) على التوالى . ويمثل البسط فى المعادلة السابقة التباين الإضافى فقط ؛ لذا .. فإن المعادلة تعد مقياساً لدرجة التوريث على النطاق الضيق .

درجة التوريث المدركة أو الواقعة

تستنبط درجة التوريث المدركة أو الواقعة Realized Heritability (تكتب اختصاراً RH) من النتائج التى يحققها الانتخاب فى جيل واحد ؛ وهى درجة توريث واقعية تأخذ فى الاعتبار ما أمكن تحقيقه بالفعل من تقدم أثناء الانتخاب ، وتحسب بإحدى المعادلتين التاليتين (Falconer ١٩٨٨) :

$$* \quad RH = \frac{\bar{X}_S F_3 - \bar{X}F_3}{\bar{X}_S F_2 - \bar{X}F_2}$$

أو

$$RH = \frac{\bar{X}_{high} F_3 - \bar{X}_{low} F_3}{\bar{X}_{high} F_2 - \bar{X}_{low} F_2}$$

يعتمد حساب درجة التوريث فى المعادلة الأولى على تقديرات متوسط الصفة فى عشيرة جيل ثان ($\bar{X}F_2$) لتلقيح فردى ، وفى مجموعة من النباتات المنتخبة منه ($\bar{X}_S \bar{F}_2$) . وفى الجيل الثالث عامة ($\bar{X}F_3$) وفى نسل النباتات المنتجة من الجيل الثانى ($\bar{X}_S \bar{F}_3$) . وقد تجرى الحسابات على أساس نباتات فردية، أو لوطات مكررة لمختلف العشائر الداخلة فى حساب درجة التوريث ، أو على أساس المتوسط العام لكل عشيرة .

أما فى المعادلة الثانية .. فإن حساب درجة التوريث يعتمد على تقديرات متوسط الصفة فى أعلى ($\bar{X}_{high} F_2$) ، وأقل ($\bar{X}_{low} F_2$) مجموعة من نباتات الجيل الثانى فى الصفة، ومتوسط الصفة فى كل من فئتي النباتات المنتخبة فى الجيل الثالث ($\bar{X}_{high} F_3$) للفتة العالية فى الصفة ، و ($\bar{X}_{low} F_3$) للفتة المنخفضة فى الصفة .

يعاب على درجة التوريث هذه أنها ربما لاتمثل درجة التوريث الحقيقية ، بسبب احتمالات وجود تأثير منتظم للبيئة فى التراكيب الوراثية فى العشيرة ، أو حدوث تدهور فى قوة النمو مع التربية الداخلية .

العوامل المؤثرة على دقة تقديرات درجة التوريث

تختلف درجة التوريث باختلاف الطريقة المتبعة فى تقديرها ، كما تتأثر دقة التقدير فى كل طريقة بثلاثة عوامل ، هى كما يلى (عن Fehr ١٩٨٧) :

- ١- الاحتياطات التى يتخذها المربى لتقليل الخطأ التجريبى experimental error إلى أدنى مستوى ممكن ، حيث تزيد دقة التقدير كلما انخفض الخطأ التجريبى .
- ٢- عدد المواقع locations ، والسنوات years التى يجرى فيها اختبار درجة التوريث ، عندما يكون الاختبار على أساس متوسط المداخل (العشائر الوراثية) entry-mean basis حيث يتأثر التقدير بعدد النباتات فى كل مكررة ، وعدد المكررات ، وعدد المواقع ، وعدد سنوات تقييم التركيب الوراثى ؛ فيؤدى الإخفاق فى تقدير تباينات : تفاعل التركيب الوراثى × الموقع (V_{gl}) ، والتركيب الوراثى × السنة (V_{gy}) ، والتراكيب الوراثى × الموقع × السنة (V_{gly}) إلى ظهور زيادة غير حقيقة فى تقدير درجة التوريث ، ولا يمكن فصل التباين الوراثى (V_G) عن تباينات التفاعل الثلاثة ، إلا إذا قُيِّمَت التراكيب الوراثية فى موقعين ، وعلى مدى سنتين كحد أدنى ؛ وبخلاف ذلك .. فإن البسط فى معادلة حساب درجة التوريث .. سوف يحتوى على ما يلى :

- (أ) V_G ، و V_{gl} فى حالة إجراء التقييم فى موقع واحد على مدى سنتين أو أكثر .
- (ب) V_G ، و V_{gy} فى حالة إجراء التقييم فى موقعين أو أكثر فى موسم زراعى واحد .
- (ج) V_G ، و V_{gl} ، و V_{gy} ، و V_{gly} فى حالة إجراء التقييم فى موقع واحد ، ولموسم زراعى واحد .


- ٣- عدم التوازن بين حالتى الارتباط التزاوجى (AB/ab) ، والتنافرى (Ab/aB) ، وهو ما يعرف باسم linkage disequilibrium ، الذى يحدث عندما لا تكون حالتا الارتباط بنفس النسبة فى العشيرة . وتؤدى الزيادة الكبيرة - فى حالة الارتباط التزاوجى - إلى ظهور زيادة غير حقيقية فى تقديرات تباينى الإضافة والسيادة ، بينما تؤدى الزيادة الكبيرة فى حالة الارتباط التنافرى إلى ظهور زيادة غير حقيقية فى تباين السيادة ، ونقص

غير حقيقى فى التباين الإضافى ، ويمكن تقليل حالة عدم التوازن تلك بالتزاوج العشوائى لأفراد العشيرة ، ويتوقف عدد الأجيال للوصول إلى التوازن على قوة الارتباط .

التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة

تشمل البيئة جميع العوامل الجوية والأرضية بالإضافة إلى العمليات الزراعية المتبعة ، وهى تؤثر - منفردة ، ومجموعة - فى أداء التراكيب الوراثية كما سبق أن أوضحنا ، ويحدث التفاعل بين التراكيب والبيئة حينما يختلف الأداء النسبى للتراكيب الوراثية المختلفة فى البيئات المختلفة . وبينما يمكن التنبؤ ببعض مكونات البيئة (مثل نوع التربة وموعد الزراعة ، وكثافة الزراعة) .. فإن بعض المكونات الأخرى لايمكن التنبؤ بها مثل موقع الزراعة وسنة الزراعة ، ويعطى كل منها تفاعلاً خاصاً به مع التركيب الوراثى ؛ مثل تفاعلات التركيب الوراثى $\times$ نوع التربة ، والتركيب الوراثى $\times$ موعد الزراعة ، والتركيب الوراثى $\times$ كثافة الزراعة ، والتركيب الوراثى $\times$ الموقع ، والتركيب الوراثى $\times$ السنة ، والتركيب الوراثى $\times$ الموقع $\times$ السنة .

ويبين شكل (٤ - ٩) ثلاثة طرز لكيفية تأثر أداء التراكيب الوراثية بالتغير فى العوامل البيئية . نجد فى الحالة الأولى (I) أن أداء (محصول) كلا الصنفين أعلى فى البيئة (ب) عما فى البيئة (أ) ، ولايوجد أى تفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة لأن الصنف الأعلى محصولاً (١) ظل متفوقاً على الصنف الآخر (٢) بمقدار ٢٠ وحدة فى كلتا البيئتين . أما الحالتان الأخريان .. فيظهر فيهما تفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة ؛ لاختلاف التأثير النسبى لمحصول الصنفين فى البيئتين ؛ فنجد فى الحالة (II) أن محصول كلا الصنفين أعلى فى البيئة (ب) مما فى البيئة (أ) ، ورغم أن الزيادة فى محصول الصنف (١) كان أكبر بكثير مما فى الصنف (٢) .. إلا أن الوضع النسبى للصنفين بقى كما هو ، ويتشابه الوضع فى الحالة (II) مع الحالتين الأخريين فى أن محصول الصنفين أعلى فى البيئة (ب) مما فى البيئة (أ) ، إلا أن الزيادة فى محصول الصنف (٢) كانت أعلى بكثير مما فى الصنف (١) ؛ مما أدى إلى اختلاف الوضع النسبى لأداء (محصول) الصنفين ، بحيث أصبح الصنف (٢) أعلى محصولاً من الصنف (١) فى البيئة (ب) ، بعد أن كان أقل منه محصولاً فى البيئة (أ) (Allard & Bradshaw ١٩٦٤ ، Fehr ١٩٨٧) .



شكل (٤ - ٩) : حالات التفاعل بين التركيب الوراثي والبيئة . راجع المتن للتفاصيل
(عن Fehr ١٩٨٧) .

وفيجد تفهم الأنواع المختلفة - من تفاعلات مكونات البيئة مع التركيب الوراثي - في إنتاج أصناف خاصة من المحاصيل الزراعية ، تصلح لبيئات معينة ، أو للزراعة في أراض معينة ، أو بكثافة معينة ، أو في مواسم معينة ... إلخ . كما يفيد المربي في إجراء الاختبارات على الأصناف الجديدة ؛ بحيث يمكن قصرها على مكونات البيئة التي تتفاعل مع التركيب الوراثي . هذا .. وكلما قلت التفاعلات بين التركيب الوراثي ومكونات البيئة كان ذلك دليلاً على أن التركيب الوراثي (الصنف الجديد) أكثر تأقلاً على الظروف البيئية، ويتوقع أن يبقى أداؤه (محصوله) ثابتاً باختلاف الظروف .

ويتطلب اختبار جوهرية الأنواع المختلفة من التفاعلات إجراء التجارب الحقلية بالتصميم المناسب في موقعين على الأقل ، على مدى سنتين على الأقل ، مع وجود

مكررتين على الأقل في كل تجربة . وكلما زاد عدد المكررات .. أمكن الحصول على تقدير أفضل للخطأ التجريبي ، بينما تؤدي زيادة مواقع الدراسة أو سنوات إجرائها إلى زيادة فرصة تمثيل مختلف العوامل البيئية . ويمكن الرجوع إلى أحد مراجع الإحصاء ؛ مثل Steel & Torrie (١٩٦٠) ، و Snedecor & Cochran (١٩٦٧) للاطلاع على تفاصيل طرق إجراء وتحليل هذه النوعية من الدراسات . هذا .. ويفصل Fehr (١٩٨٧) معنى النتائج التي يمكن الحصول عليها من هذه الدراسات ، وأهميتها العملية لكل من المربي ومنتجي المحصول .

مصادر إضافية

إن الوراثة الكمية ، أو الوراثة الإحصائية (أو الرياضية) ، أو البيولوجيا الإحصائية ووراثة العشائر لها بحر عميق ، لم نغادر على مدى هذا الفصل شطآنه ، وبينما قد يفى ما قدمناه باحتياجات غير المتخصص إلا أن المتخصص يلزمه التعمق في مصادر أخرى ؛ مثل Li (١٩٥٥) ، و Hansen & Robinson (١٩٦٣) ، و Mather & Jinks (١٩٧١) ، و Singh & Chaudhary (١٩٧٩) ، و Falconer (١٩٨١) ، و Wricke & Weber (١٩٨٦) ، كما توجد مصادر أقل تعمقاً ، مثل Sprague (١٩٦٦ ، ١٩٦٧) ، و Edwards (١٩٧٧) . ويلزم - في كل الحالات - أن يكون القارئ الباحث ملماً بما فيه الكفاية بالقواعد الأساسية للإحصاء ، وقد سبقت الإشارة إلى عديد من مصادرها في هذا الفصل . هذا .. ويتفق المؤلف مع كثيرين من مربي النبات ، في الاعتقاد بأن الوراثة الكمية أو الإحصاء البيولوجي قد قطع - نظرياً - شوطاً أبعد بكثير مما وصل إليه التطبيق العملي في مجال تربية النبات .

الفصل الخامس

جمع الجيرمبلازم تقييمه وإكثاره وحفظه

سبق أن عرفنا الجيرمبلازم germplasm فى الفصل الأول بأنه : أى مصدر لصفة معينة ، أو لمجموعة من الصفات الوراثية المحددة ، وقد يتسع استعمال المصطلح ليشمل عشرات الآلاف من السلالات والأصناف المعروفة من محصول معين . ويعدُّ حصر جيرمبلازم الأنواع النباتية من المناطق الجغرافية التى تكثر فيها الاختلافات الوراثية ، وتقييمه ، وإكثاره ، وثوثيقه ، وتوزيعه على المهتمين به ، وحفظه من أولى المهام التى يوليهها المربى عنايته ؛ لما لذلك من أهمية كبيرة فى توفير ذخيرة الاختلافات الوراثية التى نشأت على مر العصور ؛ للاستفادة بها فى برامج التربية ، والحفاظ عليها من الاندثار ؛ وتتطلب عملية جمع البيرمبلازم أن يكون المربى ملماً بتطور المحاصيل المزروعة والأنواع النباتية القريبة منها ، وبمناطق النشوء والارتقاء وتنوع الصفات ، وهى أمور تعد بمثابة المدخل الطبيعى لهذا الفصل .

تطور الأنواع النباتية و مناطق النشوء والارتقاء

لم يبدأ الإنسان فى ممارسة مهنة الزراعة إلا منذ نحو ١٠ آلاف سنة أو أقل من ذلك ، وهى فترة قصيرة للغاية فى حساب التطور ، وإنه ليفترض الآن أن الزراعة لم تبدأ مرة واحدة بل بدأت عدة مرات فى مواقع مختلفة ، وربما حدث ذلك فى وقت واحد ، وربما كانت بداية الزراعة فى أرض الرافدين (دجلة والفرات) ، كما يعتقد أن البدايات المبكرة

للزراعة كانت - أيضاً - فى كل من شمال الصين ، وأمريكا الوسطى ، وفى مناطق جبال الإنديز بأمريكا الجنوبية ، وهى المناطق التى شهدت بداية استقرار الإنسان وممارسته لمهنة الزراعة ، وعلى امتداد تاريخ الإنسان مع الزراعة ، لم يستعمل فى غذائه سوى نحو ٣٠٠٠ نوع من بين حوالى ٢٠٠٠٠٠ نوع معروف ، ولم يستأنس منها فى الزراعة سوى نحو ٢٠٠ نوع كمحاصيل زراعية ، ولم يعتمد - على نطاق واسع - فى غذائه سوى على ١٥ - ٢٠ نوعاً فقط .

الصفات المميزة للنباتات المزروعة

إن النباتات التى زرعها الإنسان منذ آلاف السنين (مثل ، القمح ، والذرة ، والبطاطس) تختلف كثيراً - مورفولوجياً وفسيولوجياً - عن الأنواع البرية التى يعتقد أنها قد نشأت منها . ويتبين - لدى مقارنة المحاصيل الزراعية التى توجد الآن بين أيدينا بالطرز البرية التى نشأت منها - وجود تغيرات معينة ، أحدثتها عملية الاستئناس عبر العصور ؛ بحيث أصبحت الأنواع المزروعة تشترك - معاً - فى صفات عامة مميزة ، نذكر منها مايلى (عن Hawkes ١٩٨٣) :

١- ضعف القدرة على منافسة الأنواع الأخرى :

تجدر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أن هذا الضعف فى القدرة على منافسة الأنواع الأخرى ليس مقصوراً على المحاصيل الزراعية فقط ، بل يشمل - كذلك - أسلافها التى نشأت منها ، بينما تتميز الأنواع البرية بالقدرة القوية على المنافسة - تحت الظروف الطبيعية - بحيث يمكنها الانتشار السريع ، وسيادة الأنواع الأخرى التى توجد معها فى نفس المنطقة ، بدرجة أكبر بكثير من الطرز الزراعية التى تطورت إليها ؛ لذا .. فإن محاصيلنا الزراعية قد فقدت كل - أو معظم - قدرتها على النمو والبقاء - تحت الظروف الطبيعية دون تدخل الإنسان . وتعد جميع الأنواع المزروعة وأسلافها غير القادرة على المنافسة فى الطبيعة بمثابة « حشائش » من الوجهة البيئية ؛ لأنها تنتشر سريعاً فى غياب المنافسة ، وتختفى بالسرعة نفسها إذا ما تعرضت لمنافسة من أحد الأنواع البرية المعمرة .

٢ - التعلق Gigantism :

حدث التعلق نتيجة استمرار انتخاب الإنسان للطرز الأكبر حجماً من البذور ،

والدرنات والجنور ، والأوراق ... إلخ .

٣- المدى الواسع من الاختلافات المورفولوجية :

بينما يندر وجود اختلافات مورفولوجية كبيرة بين سلالات الانواع البرية من النباتات .. فإننا نجد مدى واسعاً من الاختلافات المورفولوجية فى المحاصيل الزراعية ، خاصة فى صفات الأجزاء النباتية التى يزرع من أجلها المحصول ، كما فى درنات البطاطس ، وثمار الطماطم ، والقلقل ، والقرعيات .

٤- المدى الواسع للتأقلم الفسيولوجى :

أدى نقل الإنسان لنباتاته معه - فى أثناء ترحاله - إلى تأقلمها على الظروف الجديدة التى تعرضت لها ، وهو تأقلم وراثى ، حدث من خلال عملية الانتخاب الطبيعى ، على ما توفر من اختلافات وراثية ، حدثت بفعل الطفرات والانحرافات الوراثية .

٥- اندثار طرق الانتشار الطبيعية :

إندثرت الوسائل التى تنتشر بها البذور ، وتنتشر بها النباتات فى الطبيعة ، بفعل استمرار انتخاب الإنسان للطرز التى تناسبه وهى التى يمكنه الحصول عليها قبل أن تنتثر ، وتفقد منه .

٦- اندثار وسائل الحماية الطبيعية :

استمر الإنسان على مر العصور فى انتخاب الطرز التى تلبى احتياجاته ، وهو ما أدى إلى اختفاء بعض وسائل الحماية التى تميزت بها أسلافها من النباتات البرية ، تلك الحماية التى تمنع إتلاف أعضاء نباتية معينة بواسطة بعض المفترسات التى لاتسهم فى انتشار هذه الأعضاء ، ومن أمثلة ذلك ما يلى :

أ- تكون ثمار القرعيات المزروعة حلوة المذاق ، بينما تحتوى الطرز البرية منها على مركبات مرة ، تجعلها غير مستساغة الطعم بالنسبة للثدييات ، ولكنها تبدو مقبولة لدى الطيور التى تسهم فى انتشار بذورها .

ب- بينما انتخب الإنسان طرزاً حلوة المذاق من الأيام فإن الطرز البرية ذات الجذور

السطحية تكون مرة الطعم ، إلى درجة تمنع استهلاكها بواسطة الثدييات التي تحفر فى الأرض كالجرذان ، هذا وبينما تكون الطرز نوات الجنور المتعمقة حلوة الطعم لعدم جدوى الطعم المر بالنسبة لها ، فإن الإنسان انتخب منها طرزاً ذات جنور سطحية .
ج - اندثرت - تماما - الأشواك التى توجد فى ثمار الاصناف المزروعة من التفاح ، والكمثرى ، والبرقوق ، والموالح ، والبادنجان ، وهى التى تتوفر بكثرة كوسائل دفاعية فى الطرز البرية من هذه الأنواع .

٧- ضعف الخصوبة فى المحاصيل التى تكثر خضرياً :

تنتشر ظاهرة العقم فى المحاصيل التى تكثر خضرياً ، وربما يرجع ذلك إلى أن الإنسان دأب - عبر تاريخه مع الزراعة - على انتخاب الطفرات ذات الأعضاء النباتية الأكبر حجماً والأقوى نمواً ، والتى يوجه إليها الغذاء المجهز ، مما أدى إلى ضعف خصوبتها . كما تظهر بعدد من هذه المحاصيل درجات عالية من التضاعف ، وتوجد بها - أحياناً - كروموسومات زائدة أو ناقصة عن الهيئة الكروموسومية الكاملة ؛ كما فى اليام ، وقصب السكر ، مما يساعد على استمرار العقم ؛ وما كانت هذه الاختلافات الكروموسومية لتبقى لو أن هذه المحاصيل كانت تكثر جنسياً .

٨- تغير طبيعة النمو :

تختلف النباتات المزروعة عن اسلافها البرية فى طبيعة النمو ؛ حيث تتميز الأخيرة بالسيقان الطويلة ، والنمو غير المحدود ، وطبيعة النمو المعمرة ، بينما انتخب الإنسان ما يلائم احتياجاته ؛ فكانت النباتات التى اختارها قصيرة ومحدودة النمو ، وحولية .

٩- إنبات البنور السريع المتجانس :

بينما عملت الطبيعة على إكثار وانتشار الطرز التى يكون إنبات بنورها بطيئاً وغير متجانس - وهى التى لاتتعرض للاندثار إذا ما عصفت بها ظروف بيئية قاسية - فإن الإنسان انتخب ما لاعمه من طرز ذات إنبات سريع ومتجانس ؛ لكى تسهل زراعتها .

١٠- التغير من التلقيح الخلطى إلى التلقيح الذاتى :

يلاحظ أن الآباء البرية للمحاصيل الزراعية الذاتية التلقيح (كالقمح ، والطمطم) تكثر

بها ظاهرة التلقيح الخلطى، وقد كان التغير من التلقيح الخلطى إلى التلقيح الذاتى مصاحباً بالتجانس فى الطرز الذاتية التلقيح ، مكان الاختلافات فى الطرز الخلطية التلقيح .

موطن المحاصيل الزراعية ، ومناطق النشوء والارتقاء ، والاختلافات

اعتقد Decandolle أن بالإمكان التعرف على مكان بداية استئناس المحصول وزراعته من أماكن نموه برياً ، ولكن يصعب فى كثير من الأحيان معرفة ما إذا كانت النباتات النامية برياً هى برية حقيقىة ، أم أنها فلتات مما كان يزرع فى المنطقة ذاتها . ولا يمكن - أحياناً - تحديد موطن المحصول إطلاقاً ؛ كما فى الفول الذى لم يعرف له أية أسلاف برية ، كما لم يُقدِّم التعرف على مناطق النمو البرى للأسلاف فى بعض الحالات كما فى الطماطم ، فبينما يكثر نمو الأنواع البرية منها فى بيرو ، فإن الاعتقاد السائد عن موطنها أنه فى المكسيك .

وقد تبين - بالدراسة الحديثة لبعض الأنواع - أن ما كان يعتقد أنها الأسلاف البرية للمحصول لاتربطها به صلة قرابة ، ومن أمثلة ذلك .. البطاطس التى كان يعتقد أن أسلافها هى الطرز البرية التى تنمو فى شيلى ، وأرجواى ، والمكسيك ، ثم ظهر أنها أنواع أخرى تبعد - تقسيمياً - عن البطاطس المزروعة ، وتختلف عنها فى عدد الكروموسومات . وتوجد حالات انتشر فيها النوع - برياً - فى مناطق نقل إليها من موطنه الأصلى .

هذا .. وبينما يمكن الإعتماد على الأدلة المستمدة من الحفريات فى تحديد موطن المحصول .. فإن الأدلة التاريخية لا قيمة لها فى كثير من الأحيان لأن استئناس المحاصيل الزراعية الرئيسية حدث قبل التاريخ المكتوب بالآلاف السنوات .

إسهامات فافيلوف N. I. Vavilov فى تحديد مناطق نشوء النباتات :

عاش عالم النبات الروسى N. I. Vavilov فى الفترة من ١٨٨٧ إلى ١٩٤١ ، وقد بدأ دراسته ؛ بهدف تربية أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية تناسب الظروف البيئية

الشديدة التباين في الاتحاد السوفيتي ، وقد شعر فافيلوف بأن تحقيق هذا الهدف يستلزم استكشاف الاختلافات الوراثية بين النباتات المزروعة والطرز البرية القريبة منها في جميع أنحاء العالم ، وقد قام فافيلوف برحلاته خلال العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن ، وسجل خلالها ملاحظات مستفيضة عن الظروف البيئية ، والطبيعية الجغرافية السائدة والطرق الزراعية المستعملة في المناطق التي جمع منها العينات النباتية. وقد استشرق فافيلوف بذلك آفاقاً جديدة في مجال تربية النبات ، لم يكن أحد يفكر فيها من قبل ، ألا وهي الاستعانة بالجيرمبلازم ، الذي يمكن الحصول عليه من أى مكان في العالم في برامج التربية ، لنقل الصفات الهامة - التي يمكن أن توجد فيه - إلى الأصناف الجديدة المحسنة .

نقل فافيلوف ورفاقه - أثناء رحلاتهم - آلاف العينات النباتية الحية إلى معهدهم العلمى Institute of Plant Industry في ليننجراد ، وفي العديد من المحطات الفرعية للمعهد في شتى أنحاء الإتحاد السوفيتي ، ثم قاموا بإجراء دراسات مورفولوجية وسيتولوجية مستفيضة ، توصلوا من خلالها إلى أن الأنواع المزروعة قد تمزج خلال مراحل انتشارها من مواطنها الأصلية إلى طرز تختلف عن بعضها البعض مورفولوجياً وبيئياً .

وقد تبين لفافيلوف أنه توجد مناطق معينة من العالم ، تكثر فيها الاختلافات النباتية بشدة ، أطلق عليها اسم مراكز الاختلافات Centers of Diversity ، بينما توجد مناطق أخرى أقل من سابقتها في هذا الشأن . وقد اعتقد فافيلوف أن المناطق التي تكثر فيها الاختلافات الوراثية لحصول ما هي مواطنها الأصلية ، وأطلق عليها اسم مراكز النشوء . Centers of Origin وبناء على ما تقدم .. فقد قسم فافيلوف العالم إلى ثمانى مناطق ، (مراكز) للنشوء ، تضم ثلاث مناطق (مراكز) فرعية Subcenters ، اعتبرت جميعها مراكز نشوء Centers of Origin للمحاصيل التي ذكرت بها ، باستثناء ما ذكر منها كمراكز اختلافات ثانوية secondary centers of diversity بالنسبة لبعض المحاصيل ، والتي لم يعتبرها مراكز نشوء لها ، وهي كمايلي :

١- منطقة الصين :

يشمل هذا المركز المناطق الجبلية في غرب الصين ، والسهول المجاورة لها ، وتكثر فيه

الاختلافات الوراثية للشوفان وفول الصويا ، وفاصوليا أذوكى ، والبرقوق ، والخوخ ، والبرتقال ، واعتبرت هذه المنطقة بمثابة مركز ثانوى ، كذلك للفاصوليا العادية ، والمسترد الورقى ، والسّمسم .

٢- منطقة جنوب شرق آسيا :

يشمل هذا المركز كلاً من بورما ، وأسّام ، وتكثر فيه الاختلافات النباتية للأرز ، والدخن الأفريقى ، والحمص ، وفاصوليا موث ، وفاصوليا الأرز ، واللوبياء الهليونيه ، والبادنجان والقلقاس ، والخيار ، وشجرة القطن ، والملوخية ، والفلفل الأسود .

٢ ١- منطقة الهندو - ملايو :

وجدت فى هذه المنطقة اختلافات كثيرة لليام والموز وجوز الهند .

٣- منطقة وسط آسيا :

يضم هذا المركز مناطق شمال غرب الهند وأفغانستان ، وبعض الولايات السوفيتية المتاخمة (تديكستان وأزبكستان) ، وتكثر فيه الاختلافات النباتية للقمح ، والشليم ، والبسلة ، والعدس ، والحمص ، والسّمسم ، والكتان ، والقرطم ، والجزر ، والفجل والكمثرى ، والتفاح ، والجوز .

٤- منطقة الشرق الأدنى :

يشمل هذا المركز الجزء الاسيوى من تركيا ، والقوقاز ، وإيران ، والمناطق الجبلية من تركستان ، وتوجد به وفرة من الاختلافات الوراثية لأنواع القمح المحتوية على ٧ أزواج -أو ١٤ زوجاً - من الكروموسومات ، والشعير ، والشليم ، والشوفان الأحمر ، والعدس ، والبسلة ، والبرسيم الحجازى ، والسّمسم ، والكتان ، والقاوون ، واللوز ، والتين ، والرمان ، والعنب ، والمشمش ، والفسق ، كما اعتبرت هذه المنطقة مركزاً ثانوياً للحمص .

٥- منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط :

وجد فى هذا المركز اختلافات كثيرة للأقمح المحتوية على ١٤ زوجاً من الكروموسومات ، والشوفان ، والفول ، والكرنب ، والزيتون ، والخس .

٦- منطقة الحبشة :

وجد فى هذا المركز اختلافات كثيرة للأقماع بأنواعها المختلفة ، والشعير ، والحمص ،
والعدس ، والبسلة ، والكتان ، والسهمس ، والخروع ، والبن .

٧- منطقة جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى :

وجد بهذا المركز اختلافات كثيرة للذرة ، والفاصوليا العادية ، والفلفل ، والقطن ،
والعنب ، وأنواع القرع ، والقرع العسلى ، والجورد .

٨- منطقة أمريكا الجنوبية :

يضم هذا المركز بيرو ، وإكوادور ، وبوليفيا ، وتكثر فيه الاختلافات النباتية للبطاطا
والبطاطس ، وفاصوليا الليما ، والطماطم ، والقطن ، والباباظ ، والدخان .

٨ أ- منطقة شيلي :

توجد بهذا المركز اختلافات كثيرة من البطاطس .

٨ ب - منطقة البرازيل وباراجواى :

توجد بهذا المركز اختلافات كثيرة للكاسافا ، والفول السودانى ، والكاكاو ، وشجرة
المطاط ، والأناناس (Vavilov ١٩٥١ صفحات : ٢٠ - ٤٦) .

وعلى الرغم من التبسيط الزائد لمفهوم فافيلوف لمراكز المنشوء المبنى على كثرة
الاختلافات النباتية .. إلا أنه فتح الباب على مصراعية لدراسة الموضوع بعد ذلك ، كما
خدم علم تربية النبات خدمة جليلة بتوجيه الأنظار ، نحو مناطق العالم التى تكثر فيها
الاختلافات ، والتى جمعت منها بالفعل عشرات الآلاف من السلالات من شتى أنواع
النباتات الاقتصادية .

لقد توصل فافيلوف من دراساته إلى ما أسماه بقانون السلسلة المتناظرة Low of
Homologus Series ، الذى ينص على أنه يمكن العثور على اختلافات نباتية متشابهة
فى أنواع نباتية مختلفة فى منطقة جغرافية واحدة ، فإذا وجدت صفة معينة فى محصول

ما .. فمن المتوقع العثور على صفات مماثلة في الأنواع الأخرى القريبة منها ، والتي تنمو معها في المنطقة ذاتها ، وهو أمر يبدو منطقياً من الناحية البيولوجية - على الأقل - بالنسبة لمقاومة الآفات .

ولقد ثبتت صحة هذا القانون بعد ذلك ؛ فمثلاً .. وُجِدَ في المكسيك تشابه بين عدة أنواع من جنس البطاطس *Solanum* من حيث احتوائها على عدة طرز من المقاومة للنوة المتأخرة ، كما وجدت المقاومة لعدة سلالات من النيما تودا المتحوصلة في أنواع كثيرة من جنس البطاطس في جبال الأنديز الوسطى في بيرو ، وبوليفيا وشمال غرب الأرجنتين .

ولقد ميز فافيلوف بين المحاصيل الأولية Primary Crops ، والثانوية Secondary Crops ؛ على اعتبار أن المحاصيل الأولية هي المحاصيل المزروعة منذ القدم (مثل القمح ، والشعير ، والأرز ، وفول الصويا ، والكتان ، والقطن) ، وأن الثانوية تضم المحاصيل التي بدأت كحشائش مصاحبة للمحاصيل المزروعة ، ثم أصبحت من المحاصيل المزروعة في وقت لاحق ، بعد أن تأقلمت على نمو المحاصيل الأولية ، وحاكتها في عدد من الصفات الفسيولوجية ، والمورفولوجية من خلال عمليات الانتخاب غير الواعية التي قام بها الإنسان . ويمكن أن نذكر في هذا الشأن الأمثلة التالية :

- ١- نشأ الشليم كمحصول ثانوى - كان مصاحباً كحشيشة للقمح - كمحصول أولى في جنوب غرب آسيا .
- ٢- نشأ الشوفان كمحصول ثانوى - كان مصاحباً كحشيشة للشعير - كمحصول أولى في أوروبا ، وغرب آسيا .
- ٣- نشأ الفول والبسلة كمحصولين ثانويين - كانا مصاحبين كحشائش للحبوب الصغيرة - كمحاصيل أولية في جنوب غرب آسيا . ويرجع إلى فافيلوف الفضل في الربط بين المحاصيل المزروعة وأسلافها من الحشائش ؛ وذلك أهميته التطبيقية إلى جانب قيمته النظرية ؛ فهذه الحشائش تذخر بالطفرات الهامة وتلقح طبيعياً - أحياناً - مع المحاصيل التي نشأت منها ، كما يستخدمها مربو النبات كمصدر لعدد من الصفات الهامة في برامج التربية .

وقد حاول فافيلوف كذلك أن يميز بين مراكز الاختلافات الأولية Primary Centers

of Diversity والتي اعتبرها مراكز النشوء ، ومراكز الاختلافات الثانوية Secondary Centers of Diversity ، والتي لم يعتبرها مراكز للنشوء . وقد أخطأ فافيلوف - مع ذلك - فى الحكم على المراكز الأولية والثانوية لبعض المحاصيل ، كما لم يأخذ فى الحسبان أهمية المناطق التى تكثر فيها الاختلافات من الأنواع البرية القريبة من المحاصيل الزراعية ، التى يمكن اعتبارها بمثابة مناطق النشوء لهذه المحاصيل . وقد أصبح من المؤكد لدى الكثيرين من المهتمين بهذا الموضوع أن مناطق الاختلافات التى ذكرها فافيلوف ليست مناطق النشوء لجميع الأنواع التى ذكرت بها ، وإن كان كذلك بالنسبة للبعض منها فقط ، ولاشك فى أن اختلاف الظروف فى المناطق المختلفة كان له دور جوهري فى التأثير على مدى تباين الصفات فى المحصول ذاته ؛ فحتى لو تساوى معدل حدوث الطفرات فى هذه المناطق .. فإن تباين الظروف يحدد شدة الانتخاب الطبيعي الذى تؤدي حدة إلى نقص الاختلافات المشاهدة خلال فترة زمنية محدودة ، مقارنة بما يمكن أن يظهر من اختلافات خلال الفترة نفسها وفى منطقة أخرى تقل فيها حدة الانتخاب (عن Hawkes ١٩٨٣) .

محاولات الآخرين لتحديد مراكز النشوء :

اقترح شوكوفسكى Zhukovsky - وهو أحد الذين عملوا مع فافيلوف - سلسلة من ١٢ مركزاً كبيراً megacenters للنشوء شملت معظم أنحاء العالم ؛ حيث لم يترك سوى كندا ، والبرازيل ، وجنوب الأرجنتين ، وشمال سيبيريا ، والنرويج ، وإنجلترا ، كما اقترح شوكوفسكى - كذلك - مراكز صغيرة microcenters للأنواع البرية التى اعتبرها قريبة وراثياً من الأنواع المزروعة ، ويفيد التقسيم الذى اقترحه شوكوفسكى فى توضيح الفارق الكبير بين الانتشار المحدود للأنواع البرية ، والانتشار الواسع للأنواع المزروعة التى نقلها الإنسان معه من مكان إلى آخر ، ويميز شوكوفسكى بين المراكز الصغيرة الأولية primary gene microcenters وهى المناطق الصغيرة المحدودة التى نشأ فيها المحصول - والمراكز الثانوية الكبيرة secondary gene megacenters التى انتشرت فيها زراعة المحصول ، وهو يحاول بذلك تجنب منتقدي فافيلوف ، الذين اعتبروا أن مراكز النشوء التى ذكرها ليست مراكز على الإطلاق ، وإنما هى مناطق شاسعة انتشرت فيها زراعة محاصيل معينة .

كما استعمل هارلان Harlan مصطلح المراكز الصغيرة microcenters كذلك ، ولكن بمعنى مختلف عما استعمله شوكونفسكى ؛ حيث عنى به المناطق الصغيرة جداً ، الغنية بالاختلافات النباتية ضمن المناطق الكبيرة التى ذكرها فافيلوف . ويحدث التطور فى هذه المناطق الصغيرة بسرعة أكبر مما فى المناطق المجاورة .

ولقد فطن هوكس Hawkes إلى السبب الحقيقى وراء البلبلة التى أحدثتها التقسيمات السابقة لمناطق النشوء ألا وهو الخلط بين مراكز النشوء الحقيقية للمحصول ، والمناطق (أو المراكز) التى تطور فيها المحصول ، وكثرت فيها اختلافاته الوراثية غير تلك التى بدأت فيها زراعة المحصول ، واقترح لذلك نظاماً بدلاً قسم فيه العالم إلى أربعة مراكز نواة ، تضم عشر مناطق للاختلافات كما تحتوى - فيما بينها - على ثمانية مراكز ثانوية على النحو المبين أدناه .

تقسيم هوكس لمراكز النشوء :

قسم هوكس العالم إلى أربعة مراكز نواة Nuclear Centers (جدول ٥ - ١) ، وهى المناطق التى يعتقد أن الزراعة قد بدأت فيها ، تضم كل نواة منطقة أو عدة مناطق للاختلافات Regions of diversity . وقد استعمل هوكس مصطلح « منطقة » بدلاً من مصطلح "مركز" ؛ لأنه يعد أدق ؛ باعتبار المساحة الكبيرة للمنطقة الجغرافية الممتدة المعنية بالمصطلح . وقد انتشرت زراعة المحاصيل الزراعية فى هذه المناطق ، بعد أن امتدت إليها من مناطق نشوئها ، كما نشأت فيها - كذلك - محاصيل أخرى من أسلافها من «الحشائش» التى كانت مصاحبة للمحاصيل المزروعة ، سواء أكانت نشأتها بالانتخاب الواعى ، أم بالانتخاب غير الواعى . ولاتختلف هذه المناطق فى مجملها عن مراكز الاختلافات التى ذكرها فافيلوف . وبالإضافة إلى ذلك .. فقد ضمن هوكس كل منطقة للاختلافات مركزاً أو عدة مراكز ثانوية Minor Centers ، اعتبرها مراكز حديثة ؛ وتعتمد ألا يطلق عليها اسم microcenters حتى لاتختلط مع مفهوم هذا المصطلح فى تقسيمى شوكونفسكى وهارلان . وهى مناطق لم ينشأ فيها سوى محصول واحد أو محاصيل معودة . ومن المراكز الثانوية المذكورة فى جدول (٥ - ١) .. تعد اليابان موطناً للوبيا ، وغينيا الجديدة موطناً لقصب السكر ، وأوروبا موطناً للشليم ، والولايات المتحدة موطناً للطرطوفة .

جدول (٥-١) : تقسيم هوكس Hawkes لمراكز النواة nuclear centers (المناطق التي بدأت فيها الزراعة) ، ومناطق الاختلافات regions of diversity (المناطق التي امتدت إليها الزراعة وتكثر فيها الاختلافات) ، وما تضمه من مراكز ثانوية outlying minor centers (امتدت إليها الزراعة حديثاً ونشأت فيها محاصيل قليلة) .

مراكز النواة	مناطق الاختلافات	المراكز الثانوية
أولاً : شمال الصين	١- الصين ٢- الهند ٣- جنوب شرق آسيا	أ- اليابان ب- غينيا الجديدة ج- جزر سليمان - جزر فيجي - جزر جنوب المحيط الهادى
ثانياً : الشرق الأدنى	٤- وسط آسيا ٥- الشرق الأدنى ٦- حوض البحر الأبيض المتوسط ٧- الحبشة ٨- غرب أفريقيا	د- شمال غرب أوروبا
ثالثاً : جنوب المكسيك	٩- أمريكا الوسطى	هـ- الولايات المتحدة - كندا و- مناطق البحر الكاريبى
رابعاً : وسط إلى جنوب بيرو	١٠- شمال جبال الأنديز (من فنزويلا إلى بوليفيا)	ز- جنوب شيلي ح- البرازيل

موطن بعض النباتات الاقتصادية :

يلخص Merrell (١٩٧٥) مواطن النباتات الاقتصادية المهمة فى اثنتى عشرة منطقة كما يلى (يذكر المحصول الواحد أحيانا فى أكثر من منطقة ، ويعنى بذلك .. نشأة أنواع نباتية مختلفة من هذا المحصول فى مختلف المناطق) :

١- وسط آسيا :

نشأ فى وسط آسيا التفاح ، والجوز ، والقنب ، والدخن ، والدخن الإيطالى ،

والمسترد ، والكثيرى ، والروبارب .

٢- الصين :

نشأ فى الصين المشمش ، وفول الصويا ، والحنطة السوداء ، والعنّاب ،
والدخن اليابانى ، والتوت ، والشوفان naked oats ، والبرتقال ، والخبوخ ،
والبرسيمون persimmon ، والفجل ، والشاي ، واللفت .

٣- الهند وبورما :

نشأ فى منطقة الهند وبورما فاصوليا منج ، وبسلة تشك ، والقرفة ، واللوييا ،
والخيار ، والباذنجان ، والنيلة ، والجوت ، والمانجو ، والفلفل ، وبسلة بيجون ، والأرز ،
والقلقاس .

٤- جنوب شرق آسيا :

نشأ فى هذه المنطقة الخيزران ، والموز ، وشجرة الخبز ، والقرفة ، وجوز الهند ،
والقطن ، والزنجبيل ، والليمون البنزهير ، والليمون الاضاليا ، وجوزة الطيب ، ولسان
الحمل ، وقصب السكر ، واليوسفى ، واليام .

٥- جنوب غرب آسيا :

نشأ فى هذه المنطقة اللوز ، والشعير ، والجزر ، والكريز ، ونخيل البلح ، والتين ،
والكتان ، والعنب ، والعدس ، والعرقسوس ، والقاوين ، والخشخاش ، والبسلة ، والرمان ،
والبرقوق ، والسفرجل ، والسبانخ ، والقمح .

٦- الحبشة :

تعد الحبشة موطناً لكل من : الخروع ، والبن ، والقطن ، والكلوا ، والباياما .

٧- وسط أفريقيا :

نشأ فى منطقة وسط أفريقيا الدخن اللؤلؤى ، والسمسسم ، والذرة الرفيعة (السرغوم) ،
والبطيخ .

٨- أوروبا :

نشأ في أوروبا البلاكبرى ، والكشمش currant ، وعنب الثعلب goosberry ، وفجل الحسان ، والشوفان ، وبنجر السكر .

٩- حوض البحر الأبيض المتوسط :

نشأ في هذه المنطقة الخرشوف ، والهليون ، والفول ، والبروكولى ، وكرنب بروكسل ، والكرنب ، والقنبيط ، والكرفس ، والكستناء ، والهندباء ، والثوم ، وحشيشة الدينار (الجُنْجُل) ، وكرنب أبو ركة ، والخس ، والشوفان hulled oats ، والزيتون ، والبصل ، والبقدونس ، والسلق السويسرى .

١٠- أمريكا الوسطى :

نشأ في هذه المنطقة الأفوكا ، والفاصوليا العادية ، والفاصوليا المدادة ، والقطن ، والجورد ، والجريب فروت ، والذرة ، والفلفل ، والقرع العسلى ، وقنب السيزال ، والكوسة ، والبطاطا ، والفانيلىا .

١١- أمريكا الشمالية :

نشأ في هذه المنطقة البلوبرى ، والكرانبرى ، والطرطوفة ، والبيكان ، والراسبرى ، والشليك ، وعباد الشمس .

١٢- أمريكا الجنوبية :

نشأ في أمريكا الجنوبية فاصوليا جاك ، وفاصوليا الليما ، والبلاذر Cashew ، والكاسافا ، والكاكاو ، والقطن ، والجوافة ، والباباظ ، والفول السودانى ، والأناناس ، والبطاطس ، والكينين ، والمطاط ، والشليك ، والدخان ، والمطاطم .

مصادر إضافية :

لمزيد من التفاصيل عن نشأة الأنواع والتطور ، والتأقلم بوجه عام .. يمكن مراجعة بعض المصادر المتخصصة ؛ مثل : Darwin (١٨٧٢) ، و Shull (١٩٥١) ، و Wallace

Srb & (١٩٦٤) ، و Ehrlich وآخرين (١٩٧٤) ، و Dobzhansky وآخرين (١٩٧٧) . أما المصادر التالية .. فهي أكثر صلة بموضوع الدراسة ، ويجد فيها القارئ تفاصيل أخرى كثيرة عن موطن وتاريخ زراعة النباتات وتوزيعها في العالم ، وهي Vavilov (١٩٥١) ، و Wilsie (١٩٦٢) ، و Hutchinson (١٩٧٤) ، و Zeven & Zhukovsky (١٩٧٥) ، و Simmonds (١٩٧٦) ، و Hawkes (١٩٨٣) .

جمع الجيرمبلازم

حظى موضوع جمع الجيرمبلازم من المناطق التي تكثر فيها الاختلافات النباتية باهتمام كثيرين من المشتغلين بتربية النباتات ؛ لما له من أهمية كبيرة في التربية ؛ وذلك لأن المربي في بحث دائم عن صفات جديدة ، يمكن أن يستفيد منها في برامج التربية ، وغالباً ما يجد ضالته في ذخيرة الجيرمبلازم العالمى للمحصول ، الذي يعمل على تحسينه .

التعرية الوراثية

يعد مصطلح التعرية الوراثية Genetic Erosion من المصطلحات الحديثة - نسبياً - المستخدمة في علم تربية النبات ، ويعنى به اختفاء الاختلافات الوراثية ، التي كانت تنمو بصورة طبيعية ، وتوجد بكثرة في مراكز الاختلافات Centers of Diversity التي ذكرها فافيلوف وغيره . وقد بدأ القلق يساور مربى النبات حول اختفاء الاختلافات الوراثية في بداية الخمسينيات ، بعد أن اتضحت صورة التعرية الوراثية التي بدأت بصورة تدريجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وخاصة أن التعرية كانت شاملة لجميع مراكز الاختلافات التقليدية ، وإن كانت قد حدثت بصورة أسرع في بعضها عما في البعض الآخر ، ولقد بق الكثيرون من علماء تربية النبات (من أمثال Harlan ١٩٦٦) ناقوس ، الخطر ووجهوا أنظار العالم إلى خطورة هذا الأمر ، قبل أن تحدث التعرية الكاملة ، وكان من ثمرة جهودهم أن كثفت الجهود منذ الستينيات ، لإنقاذ ما تبقى من ذخيرة الاختلافات الوراثية فأرسلت عديد من الرحلات الاستكشافية ، التي جمعت عشرات الآلاف من السلالات النباتية .

ومن غرائب الصدف أن النجاح الكبير الذي حققته الأصناف المحسنة التي أنتجها مربو النبات كان له دور بارز في التعرية الوراثية ، فقد حلت هذه الأصناف تدريجياً محل الأصناف المحلية في المناطق التي كانت تذخر بالاختلافات الوراثية ، وهو أمر حدث نتيجة

تقبل المزارعين لها ؛ لما تميزت به من إنتاج عالٍ أو نوعية جيدة ، ومقاومة للأمراض ، وكان من نتيجة ذلك أن اندثرت الأصناف المحلية التي كانت شائعة في الزراعة ، واختفت معها ثروة طبيعية من الاختلافات الوراثية كانت قد تجمعت على مدى آلاف السنين ، وكان استمرار وجودها متوقفاً على الإنسان الذي كان يتولى زراعتها عاماً بعد آخر . وقد صاحب ذلك - أيضاً - اختفاء معادل للأصناف البرية القريبة ، وسلالات الحشائش من المحاصيل المزروعة ؛ لأن « الثورة الخضراء » التي رافقت إدخال الأصناف الجديدة المحسنة .. صاحبها - أيضاً - اهتمام أكبر بالزراعة ، وشهدت تقنيات حديثة ، قضت بدورها على ما تبقى من نباتات برية في المناطق الزراعية ، وكانت تعتمد في بقائها على البيئة الطبيعية . حدث ذلك - على سبيل المثال - بعد إدخال أصناف القمح الحديثة وانتشار زراعتها في تركيا ، والعراق ، وإيران ، وأفغانستان ، وباكستان ، والهند ، حيث لم يعد من السهل العثور على سلالات محلية ، أو برية من القمح ، في أي منها ، بعد أن كانت هذه الدول تزخر بها . كما حدث الشيء نفسه بعد إدخال الأصناف الحديثة من الأرز .

ولعل الولايات المتحدة ، وكندا ، وغرب ، أوروبا تعد من أبرز الأمثلة على التقدم الزراعي الذي صاحبه اختفاء شبه كامل للاختلافات النباتية الطبيعية واستبدالها بصنف واحد ، أو مجموعة محدودة من الأصناف ذات الخلفية الوراثية المتقاربة من كل محصول narrow genetic base . وعلى الرغم من أن ذلك يعد ضرورياً لمواجهة متطلبات التقنيات الحديثة في الزراعة .. إلا أنه يمكن أن يعرض المحاصيل المزروعة لأخطار جسيمة إذا ظهرت سلالات جديدة من الآفات الزراعية قادرة على إصابتها ، وهو ما حدث - بالفعل - في الولايات المتحدة في عام ١٩٧٠ ، حينما تعرض محصول الذرة لإصابة وبائية بالفطر *Helminthosporium maydis* المسبب لمرض لفحة الذرة الجنوبية ، وقد تبين من الدراسات التي أجريت حول هذا المرض أن السبب في انتشاره الوبائي كان استعمال مصدر واحد للعقم الذكري السيتوبلازمي في إنتاج معظم هجن الذرة في الولايات المتحدة ؛ حيث نقل هذا السيتوبلازم الحساس للفطر إلى جميع هجن الذرة ، التي أصبحت بدورها قابلة للإصابة بهذا الفطر .

وإلى جانب الدور غير المباشر للمربي .. فقد أسهمت محاولات التوسع الأفقي في

الزراعة بدور مهم ، فى التعرية الوراثية ، حيث قضت على البيئة الطبيعية التى كانت تنمو فيها الطرز البرية ، كما كان لتقليع أشجار الغابات دور سلبى بالغ الأهمية كذلك (Hawkes ١٩٨٣) .

وتعد البطاطس من أمثلة الأنواع المحصولية التى حدثت فيها تعرية وراثية كبيرة . ولقد نبه Ochoa (١٩٧٥) إلى أن الطرز البرية من الجنس *Solanum* تختفى بسرعة كبيرة من شيلي ، وبوليفيا ، وبيرو . ولزيد من التفاصيل .. يمكن الرجوع إلى مقالة Ochoa فى هذا الموضوع .

أوجه الاستفادة من الجيرمبلازم

· يستفاد من الجيرمبلازم الذى يتم جمعه بواحدة من ثلاث طرق : إما باستئناسه (أى إدخاله فى الزراعة كمحصول جديد) ، وإما باستعماله كصنف جديد من محصول مزروع ، وإما بالاستفادة منه كمصدر لصفات مهمة يحتاج إليها المربى ، وينقلها إلى الأصناف التجارية من خلال برامج التربية .

الاستئناس

يعرف الاستئناس Domestication فى مجال الزراعة بأنه إدخال محاصيل جديدة فى الزراعة لصالح البشرية ، بعد أن كان وجودها مقصوراً على الحالة البرية فى البيئة الطبيعية . ويلاحظ أن هذا التعريف للاستئناس يستبعد - تلقائياً - إدخال زراعة محصول ما من بلد إلى بلد آخر ؛ فذلك يدخل تحت مضمون إدخال النباتات Plant Introduction ولاشك فى أن بداية زراعة كل محصول كانت استئناساً له من قِبل الإنسان ، ومن أمثلة النباتات أو المجموعات النباتية التى استئنست حديثاً مايلى :

١- الكائنات الدقيقة التى استخدمت على نطاق واسع فى إنتاج مضادات الحيوية ، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك .. انتخاب الإنسان لسلاسل جديدة من فطر *Penicillium* ذات كفاءة عالية فى إنتاج المضاد الحيوى « البنسلين » .

٢- استئناس وزراعة نبات الجوايآل guayule (اسمه العلمى *Parthenium argentatum* ؛ بغرض إنتاج المطاط ؛ وهو نبات شجيرى صحراوى ، ينمو - برياً - فى

شمال وسط المكسيك ، وجنوب غرب الولايات المتحدة ، ورغم أن هذا النبات قد استعمل على نطاق ضيق فى إنتاج المطاط خلال الحرب العالمية الثانية .. إلا أن الاهتمام به - على نطاق واسع - لم يبدأ إلا فى السنوات الأخيرة ، خاصة أنه محصول صحراوى يتحمل الجفاف، ويمكن زراعته فى كثير من المناطق التى لا تتوافر فيها مياه الرى ، بالقدر الذى يلزم لزراعة المحاصيل العادية . وتتوفر البيانات عن هذا المحصول وزراعته فى مصادر خاصة : مثل Fangmeier وآخرين (١٩٨٤) ، و Estilai وآخرين (١٩٨٨) .

٣- استئناس أنواع نباتية أخرى كثيرة مقاومة للملوحة ، أو الجفاف ، أو مقاومة لهما معاً وزراعتها لأغراض مختلفة لصالح الإنسان وحيواناته الزراعية كمحاصيل زيتية ، أو محاصيل علف . وعلى سبيل المثال .. قام خبراء من جامعة أريزونا فى السنوات الأخيرة بتجربة زراعة أحد النباتات المحبة للملوحة halophytes ، والتى تسقى بماء البحر مباشرة فى مصر ، والإمارات العربية ، والمكسيك بغرض استعمالها علفاً للماشية واستخراج الزيت من بنورها . هذا .. ويمكن الرجوع إلى Somers (١٩٧٩) ، و Univ. of Arizona (١٩٨٠) ؛ لمزيد من التفاصيل عن الأنواع النباتية المقاومة للملوحة أو الجفاف ، التى تجرى محاولات استئناسها .

٤- استئناس شجيرات الهوهويا ، وهو نبات صحراوى يتحمل ظروف الجفاف الشديد، ويُستخرج من بنوره زيوت ، تجمع بين خصائص الدهن ، والشمع ، وتستعمل فى صناعة مواد التجميل ، كما تستخدم كزيوت لتشحيم الطائرات ، كبديل لزيت غنبر الحوت (مجلة الزراعة فى الشرق الأوسط - العدد الأول - المجلد الرابع) .

إدخال النباتات فى الزراعة كأصناف جديدة

يمكن أن تستعمل السلالات النباتية فى الزراعة مباشرة كصنف جديد من محصول مزروع ، إذا توفر لذلك شرطان ، هما :

- ١- أن يكون النبات المستورد من صنف تجارى .
- ٢- أن يفوق غيره من الأصناف الأخرى المنتشرة فى الزراعة عند مقارنته بها .

يعد هذا المفهوم لإدخال النباتات .. هو الأكثر واقعية فى الدول النامية التى تستورد مئات الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية - سنوياً - من الدول الأكثر تقدماً ، بغرض تقييمها وإدخالها فى الزراعة مباشرة ، إذا ثبت أنها تفوق الأصناف المحلية .

استعمال الجيرمبلازم كمصدر لصفات مهمة فى بواهج التربية

كانت مجموعات الجيرمبلازم العالمية للمحاصيل الزراعية - ولا تزال - هى المصدر الأول لعدد من الصفات الهامة التى نقلت إلى الأصناف التجارية المحسنة فى برامج التربية . ونعنى بذلك جيرمبلازم الأصناف المزروعة من المحصول ، وجيرمبلازم الطرز البرية (الحشائش المحصولية) منه ، وجيرمبلازم الأنواع البرية القريبة منه ، ونسوق - فيما يلى - بعض الأمثلة لفئة واحدة من النباتات ؛ هى محاصيل الخضر ، توضح إلى أى مدى استخدمت السلالات المدخلة (أو المستوردة) Plant Introductions فى تحسينها .

١- البصل :

أ- اكتشف Henry A . Jones العقم الذكوى فى أحد النباتات البرية من البصل سنة ١٩٢٥ ، والذي أصبح أهم نبات فى تاريخ تربية البصل . وتحتوى جميع هجن البصل المنتجة فى الولايات المتحدة على سيتوبلازم هذا النبات .

ب- وجدت المقاومة للتربس فى الصنف White Persian الإيرانى فى سنة ١٩٣٤ ، ولا يزال هذا الصنف مستعملا كمصدر للمقاومة للتربس فى برامج التربية .

ج- اكتشفت المقاومة لودة البصل onion maggot فى السلالة P. I. 344251 التى كانت قد جمعت من تركيا .

٢- القاون :

أ- اكتشفت المقاومة للبياض الدقيقى فى أصناف جمعت من الهند ، واستخدمت فى إنتاج أول صنف تجارى محسن مقاوم ، وهو PMR 50 سنة ١٩٣٢ ، الذى كان بداية لإنتاج سلسلة من الأصناف المقاومة للسلالة رقم (١) من الفطر المسبب للمرض والتى كان من أهمها الصنف PMR 45 .

ب - اكتشفت - كذلك - المقاومة للسلالة رقم (٢) من الفطر المسبب لمرض البياض الدقيقى فى سلالة هندية أخرى ، واستعملت فى إنتاج الصنفين المقاومين PMR5 ، و PMR6 سنة ١٩٤٢ ، وقد تلاهما ظهور أصناف أخرى مقاومة .

ج- وجدت المقاومة للبياض الزغبى فى السلالتين P. I. 124111 ، و P. I. 124112 .

من الهند ، ونقلت منهما إلى الصنف Gulfstream وغيره .

د- اكتشفت المقاومة لفيروس تبرقش البطيخ رقم (١) فى السلالة الهندية P.I.180280

هـ- اكتشفت المقاومة لفيرس تبرقش القاوون فى سلالة شرقية ، تستعمل فى التخليل .

و- اكتشفت المقاومة للمن ، فى السلالة الهندية P. I. 371795 .

٣- الخيار :

أ- اكتشفت المقاومة لفيرس تبرقش الخيار فى الصنف الصينى شاينيز لونج Chinese Long سنة ١٩٢٦ ، ثم فى الصنف طوكيو لونج جرين Tokyo Long Green الذى استعمله H . M . Munger كمصدر لمقاومة الفيرس فى أول صنفين تجاريين محسنين ، وهما تيببل جرين Tablegreen ، وماركت مور Marketmore ، وماتاهما من أصناف مقاومة .

ب- اكتشفت المقاومة للأنتراكنوز ، والبياض الدقيقى فى السلالة الهندية P. I. 197087 التى استخدمت فى التربية لإنتاج أصناف مقاومة فى كارولينا الجنوبية .

ج- اكتشف الخيار الأنثوى gynocious فى الصنف الكورى شوجوين Shogoin (P.I. 220860) ، الذى أكثر فى سنة ١٩٥٤ ، وأنتج منه أول سلالة خيار أنثوية محسنة وهى MSU 713-5 سنة ١٩٦٠ وهى التى استعملت - بدورها - فى إنتاج الهجين الأنثوى الأول سبارتان داون Spartan Dawn ، وسلالات أنثوية أخرى ، كانت الأساس لكل ما تلاها من أصناف خيار أنثوية .

د- وجدت المقاومة للبياض الدقيقى فى السلالة اليابانية P. I. 212233 .

هـ- وجدت المقاومة للذبول البكتيرى فى السلالتين P. I. 200815 ، و P. I. 200818 من بورما .

ز - وجدت صفة الثمار غير المرة فى السلالة الهولندية P.I.265887 .

ح - وجدت المقاومة للأنتراكنوز فى السلالة رقم P.I. 197087 من الهند .

ط - أما صفة الثمار البكرية . فهى توجد فى أصناف خيار البيوت المحمية الأوروبية ، وقد نقلت منها إلى الأصناف الأخرى .

٤- الكوسة :

أ- وجدت المقاومة لحشرة خنفساء الخيار فى سلالات من *Cucurbita pepo* ، و *C. moschata* ، و *C. maxima* .

ب- وجدت المقاومة لكل من البياض الزغبى والبياض الدقيقى فى سلالة *C. maxima* رقم P.I.135893 من الهند .

ج- وجدت المقاومة لفيرس تبرقش الخيار فى سلالة *C. pepo* رقم P.I.176959 من تركيا .

د- وجدت المقاومة لفيرس تبرقش الكوسة فى السلالة P.I. 172870 من تركيا .

هـ - البسلة :

أ- وجدت المقاومة لفيرس pea enation mosaic فى السلالة P.I.140295 من إيران .

ب- وجدت المقاومة لفيرس التبرقش المحمول بالبنور seed- borne mosaic virus فى إحدى السلالات المستوردة .

٦- الخس :

أ- اكتشفت المقاومة للبياض الزغبى فى إحدى سلالات النوع *Lactuca serriola* من روسيا . وهى التى جمعت فى سنة ١٩٣٢ ، واستعملت فى إنتاج ١٨ سلالة مقاومة من الخس ، وزعت على مربى المحصول فى عام ١٩٥٨ . كما وجدت المقاومة لنفس المرض فى سلالة الخس P. I. 167150 من تركيا فى سنة ١٩٤٩ ، وقد استعمل المصدران السابقان للمقاومة فى إنتاج الصنفين المقاومين فالمين Valmaine ، وفالريو Valrio وغيرهما .

ب - اكتشفت السلالة رقم (٢) من الفطر بعد ذلك ، ووجدت المقاومة لها فى السلالات : P. I. 27373 ، و P.I. 250425 ، و P.I. 274900 ، و P.I. 273606 ، و P.I. 274369 ، وهى التى استعملت فى إنتاج الصنف كالمار Calmar وماتلاه من أصناف مقاومة .

ج- وتلا ذلك اكتشاف السلالة رقم (٣) من الفطر ، ثم اكتشفت المقاومة لها فى الصنف الهولندى سوليتا Solita .

د- اكتشفت المقاومة لفيرس موزايك الخس فى السلالات P.I. 251245 ، و P.I. 251246 ، و P.I. 251247 التى استخدمت فى إنتاج أول الأصناف المقاومة من طراز الفانجارد Vanguard .

هـ- وجدت المقاومة لحشرة : Cabbage looper فى سلالة *L. saligna* رقم P.I. 261653 .

ز - وجدت المقاومة لمرض الجذر الفليني في عدة سلالات مستوردة .

ج - وجدت صفة الإزهار البطئ في السلالة P. I. 21118 .

٧- الفاصوليا :

أ- وجدت المقاومة لمرض اللبحة الهالية في بعض الأصناف الأمريكية المقاومة للسلالة

رقم ٢ من البكتيريا المسببة للمرض في السلالة P.I.150414 من السلفادور .

ب- وجدت المقاومة لعفن الجذر الفيوزاري في السلالة P.I.203958 التي استخدمت

في إنتاج أصناف الفاصوليا الجافة فيفا Viva ، وروزا Rosa .

ج- وجدت المقاومة لثلاث سلالات من بكتريا الذبول في السلالة P.I.165078 من

تركيا ، وهي التي استعملت في إنتاج الصنف المقاوم إمرسون Emerson .

د- وجدت المقاومة لأربع سلالات من الفطر المسبب للأنثراكنوز في إحدى السلالات من

فرنزويلا ، التي استعملت في إنتاج السلالة Cornell 49-242 ، وهي التي استعملت

- بنورها - في إنتاج أول الأصناف المقاومة شارليفوا Charlevoix .

هـ- وجدت المقاومة للبقعة البكتيرية العادية في السلالة P.I.207262 من كولومبيا .

و- وجدت المقاومة لفيروس التبرقش العادي ، والتبرقش الأصفر في السلالة

P.I.169754 من تركيا ، و P.I. 226856 من إسبانيا ، و P.I. 207203 من كولومبيا .

ز- وجدت المقاومة لخنفساء الفاصوليا المكسيكية في السلالة P.I. 181786 من

سوريا .

ح - وجدت المقاومة لنطاطات الأوراق في السلالة P.I. 173024 من تركيا ،

و P.I.151014 من شيلي .

ط- وجدت سلالات عالية إما في محتواها من البروتين ، وإما من الحامض الأميني

الضروري ميثونين في السلالات P.I. 180750 ، و P.I. 226920 ، و P.I. 169740 .

ي- وجدت القدرة على زيادة كفاءة استعمال عنصر البوتاسيوم عند مستويات

منخفضة من العنصر في السلالة P.I.180761 .

٨- البطاطس :

لقد ذكر أن من بين ١٢٠ صنفاً من البطاطس - أنتجت خلال الفترة من ١٩٣٠ إلى

١٩٧٠ - دخل إثنان أو أكثر من سلالات النباتات المدخلة Plant Introductions في

أنساب ١١٣ صنفا منها ، كما استعمل في كثير منها النوع *S. demissum* والأصناف الأوربية كمصدر مقاومة للندوة المتأخرة .

٩- البطاطا :

أ- استخدمت أكثر من ثلاثين سلالة مدخلة (P.I) من اليابان ، ويورتوريكو كمصادر لمقاومة العفن الاسود ، والذبول الفيوزارى ، وعفن التربة ، ونيماتودا تعقد الجذور ، وفيرس الفلين الداخلى .

ب- استخدمت السلالة P.I.153655 من جزيرة تنجان Tinjan Island كمصدر لمقاومة الذبول الفيوزارى فى كل من أصناف البطاطا المحسنة جم Gem ، و ردكلف Radcliffe ، وجوليان Julian .

١٠ السبانج :

عُثرت على المقاومة لكل من البياض الزغبي ، وفيرس تبرقش الخيار (١) فى السلالتين P.I. 140467 ، و P.I. 179590 .

١١- البطيخ :

نقل Orton صفة المقاومة للذبول الفيوزارى من البطيخ البرى الأفريقى Citron ، وأنتج أول الأصناف المقاومة للمرض وهو كونكرر Canqueror سنة ١٩١١ .

١٢- الكرنب :

- أ- أدخلت المقاومة للعفن الاسود من صنف يابانى .
- ب- أدخلت المقاومة للصدأ الأبيض ، وتعقد جذور الصليبيات ، وفيرس تبرقش اللفت ، والقدرة على تحمل الحرارة العالية من أنواع برية مختلفة .
- ج- اكتشفت المقاومة للبياض الزغبي فى السلالات P.I. 296131 ، و P.I. 205993 ، و P.I. 205994 من السويد ، و P.I. 189028 من البرتغال ، و P.I. 245015 من فرنسا .
- د- حصل على المقاومة لفيرس تبرقش القنبيط من السلالتين P.I. 225858 ، و P.I. 225860 من الدانمرك ، و P.I. 229747 من إيران .

أ- اكتشفت المقاومة للذبول الفيوزارى فى السلالة P.I. 79532 من *Lycopersicon pimpinellifolium* ، وكانت من بيرو ، واستعملت كمصدر للمقاومة فى إنتاج أكثر من ١٠٠ صنف مقاوم .

ب- أعقب ذلك اكتشاف المقاومة للسلالة رقم (٢) من الفطر المسبب للذبول الفيوزارى فى سلالة *L.esculentum* رقم P.I. 126915 .

ج- استخدمت بعض سلالات من *L. Pimpinellifolium* كمصدر لمقاومة عفن الرقبة ، وفطر استمفيليم *Stemphyllium* ، وفيرس ذبول الطماطم المبقع .

د- وجدت المقاومة لذبول فيرتسيليم فى السلالة P.I.303801 من أمريكا الجنوبية .

هـ- اكتشفت درجة عالية من المقاومة لفيرس تبرقش الطماطم فى سلالة *L.peruvianum* رقم P.I. 128650 .

و- وجدت صفة المحتوى المرتفع من حامض الأسكوربيك (فيتامين ج) فى السلالة P.I.126946 من *L. peruvianum* .

ز- وجدت صفة القدرة على الإنبات فى درجة الحرارة المنخفضة فى سلالتين من الاتحاد السوفيتى :

ح- وجدت المقاومة للنودة المتأخرة فى السلالة P.I. 204587 من تركيا .

ط- اكتشفت المقاومة لنيماتودا تعقد الجنور فى النوع *L.peruvianum* سلالة رقم P.I. 128657 ، واستعملت فى إنتاج عشرات الأصناف المقاومة (عن Peterson ١٩٧٥) . ولزید من التفاصيل عن مصادر المقاومة لنيماتودا تعقد الجنور من مختلف الأنواع البرية من الجنس *Lycopersicon* .. يراجع Ammati وآخرون (١٩٨٦) .

يتضح مما تقدم .. أن الجيرمبلازم كان مصدراً لعدد من الصفات الهامة ، التى استخدمها المربون فى برامج التربية ، خاصة صفات المقاومة للآفات . ويذكر Skrdla (١٩٧٥) أن من بين ٦٠٠ سلالة خيار اختبرت .. كانت ١٢٥ منها مقاومة لآفة (مرض أو حشرة) ، أو أكثر ، وأن أكثر من ٥٠٪ من السلالات المقاومة كانت متعددة المقاومة للآفات ، وظهر بإحداها (وهى P.I. 197087) مقاومة لثمانى آفات . كما ظهر عند اختبار ٣٧٠٠ سلالة طماطم وجود مقاومة لآفة أو أكثر فى ٢٥٠ سلالة منها ، وظهر فى عديد منها

مقاومة لنحو ٨-١٢ أفة ، وكان فى إحداها مقاومة لثلاث عشرة أفة . هذا .. ويعطى Knott & Dovrak (١٩٧٦) بياناً بمصادر المقاومة للأمراض فى جيرمبلازم الأنواع البرية عامة .

كانت تلك كلها مجرد أمثلة لحالات استعملت فيها السلالات المدخلة كمصدر لصفات مهمة ، عند إنتاج الأصناف المحسنة من بعض محاصيل الخضر . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يمكن الرجوع إلى Kruell & Borlaug (١٩٧٠) ، و Skardla (١٩٧٢) ، و Leon (١٩٧٤) ، و Peterson (١٩٧٥) ، و Alexander (١٩٧٥) ، و Bliss (١٩٨١) ، وكذلك Duke (١٩٨٢) بالنسبة لمصادر تحمل الظروف البيئية القاسية .


استكشاف الجيرمبلازم فى الداخل وفى الخارج

إن البحث عن الجيرمبلازم (أو استكشاف الجيرمبلازم) قد يكون داخلياً Domestic Plant Exploration أو خارجياً Foreign Plant Exploration ، والغرض فى كلتا الحالتين هو البحث عن مصادر الاختلافات الوراثية . ويكون للبحث الداخلى عن الجيرمبلازم أهمية فى استكشاف الطرز البلدية المتأقلمة جيداً على الظروف البيئية السائدة محلياً ، والتي تكون صفاتها مرغوبة من جمهور المستهلكين ؛ والأمثلة على ذلك كثيرة ، لعل أبرزها مئات الأصناف من نخيل البلح ، التى توجد فى منطقة الخليج العربى ، والتي نشأ أكثرها كانعزالات وراثية من حالات الإكثار الجينسى ، ثم أكثرت خضرياً بعد ذلك . كما كان هناك وعى دائم فى مصر بوجود انعزالات وراثية متفوقة من أشجار المشمش المكثرة - بذرياً - إلى أن تمكن القائمون على مشروع تطوير النظم الزراعية من إجراء الحصر اللازم ، والتعرف على عدد من الأشجار الممتازة الصفات فى أنحاء متفرقة من الدولة .

ولاشك فى أن كل دولة تزخر بالطرز المختلفة المحلية الشائعة بها من بعض المحاصيل الزراعية ، فالنوم البلدى المصرى -برغم صغر فصوصه- يعد أعلى محصولاً - فى مصر- من الأصناف المستوردة ذات الفصوص الكبيرة ، والتفاح المحلى العراقى يتميز بدرجة عالية - نسبياً - من الحموضة ، تجعله أكثر قبولاً لدى جمهور المستهلكين - فى العراق - عن الأصناف المستوردة ، وتعتبر الأصناف المحلية من السبانخ أبطأ - اتجاهاً نحو

الإزهار- من بعض الأصناف المستورده ... إلخ . وهكذا .. نجد فى أحيان كثيرة أن استكشاف الجيرمبلازم -داخلياً- يكون مجدياً فى تحسين الأصناف المحلية ، وفى العثور على مصادر لصفات التأقلم على الظروف البيئية ، وصفات النوعية التى يرغب فيها المستهلكون .

وبالرغم من أهمية الاستكشاف الداخلى للجيرمبلازم .. فإن ذكر موضوع البحث عن الجيرمبلازم وجمعه يعنى به - غالباً- تنظيم الرحلات الخارجية لاستكشاف الجيرمبلازم فى المناطق التى تكثر فيها الاختلافات الوراثية . ولعل أقدم رحلة نظمت فى التاريخ لجمع النباتات كانت تلك التى قام بها قدماء المصريين فى عهد الملكة حتشبسوت (من الأسرة الثانية عشرة) ، التى أرسلت سفنها إلى غرب أفريقيا ، لجمع نبات البخور incense من بلاد البونت (على سواحل الصومال) ، منذ نحو ٣٥٠٠ عام ، وقد وجدت النقوش الدالة على هذه الرحلة على جدران معبد الدير البحرى ؛ غرب الأقصر (شكل ٥-١) .



شكل (٥ - ١) : نقوش قدماء المصريين الخاصة برحلة جمع نبات البخور من بلاد البونت .

إن استكشاف الجيرمبلازم يتطلب أن يكون الباحث على دراية واسعة بعلم تقسيم النبات ، وبالاختلافات الوراثية المتوفرة من المحصول . ويفضل أن يقوم مربى النبات نفسه بعملية البحث عن الجيرمبلازم وجمعه ؛ لأنه أكثر من غيره تقديراً وتفهماً لأهمية هذا العمل .

المنظمات والمؤسسات المهتمة باستكشاف الجيرمبلازم وجمعه

سبق أن أوضحنا أن استكشاف الجيرمبلازم وجمعه لم يبدأ بصورة منظمة وعلى نطاق واسع إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، بعد أن بدأ العلماء فى إثارة موضوع تعرية الجيرمبلازم فى المحافل الدولية .

المنظمات الدولية المهتمة بالجيرمبلازم

بدأ اهتمام منظمة الأغذية والزراعة الدولية بالجيرمبلازم فى عام ١٩٤٧ ، حينما أوصت إحدى اللجان المتفرعة عن المنظمة (لجنة السلالات النباتية والحيوانية) بتوفير المعلومات عن السلالات النباتية ، وحرية تبادلها بين جميع أنحاء العالم . وعقد قسم إنتاج ووقاية النبات التابع للمنظمة أول اجتماع فنى له حول استكشاف النباتات وإدخالها فى عام ١٩٦١ ، وأوصى بإنشاء مراكز استكشاف Exploration Centers فى أجزاء مختلفة من العالم . كما عقدت المنظمة مؤتمراً فنياً حول استكشاف الثروة الوراثية النباتية واستعمالها، وحفظها عام ١٩٦٧ ، ونشرت وقائعه بعد ذلك (Frankel & Bennett ١٩٧٠) ، ثم عقد المؤتمر الثانى فى عام ١٩٧٣ (Frankel & Hawkes ١٩٧٥) والثالث فى عام ١٩٨١ .

وتعد الكتب التى نشرت فيها وقائع هذه المؤتمرات من أفضل ما صدر عن موضوع استكشاف الجيرمبلازم وجمعه وحفظه ، وقد كان لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية أنشطة أخرى مهمة فى هذا المجال ، منها : نشر الـ Plant Genetic Resources Newsletter ، وإنشاء وحدة البيئة المحصولية والثروة الوراثية FAO Unit of Crop Ecology and Genetic Resources ، وإنشاء هيئتين من الخبراء Expert Panels للثروة الوراثية النباتية ، كان لهما عدد من الأنشطة فى هذا المجال .

وقد تأسست المجموعة الاستشارية للبحث الزراعى الدولى The Cosnulative Group on International Agricultural Research (تكتب اختصاراً: CGIAR) سنة ١٩٧١ ؛ بإشراف مشترك من البنك الدولى ، ومؤسسة الأغذية والزراعة الدولية ، وبرنامج التنمية الإنمائى للأمم المتحدة (UNDP) ، وبتمويل من المؤسسات الخاصة مثل فورد ، وركفلر ، وكيلوج ، ومن الـ UNDP ، والبنك الدولى . وتهدف هذه المجموعة إلى زيادة الإنتاج الزراعى فى دول العالم الثالث ؛ من خلال أنشطة سبعة معاهد ، ومراكز بحثية للمحاصيل، واثنين آخرين للحيوانات الزراعية ، والمجلس الدولى للثروة الوراثية النباتية International Board for Plant Genetic Resources (يكتب اختصاراً IBPGR) .

وقد أنشئ المجلس الدولى للثروة الوراثية النباتية فى عام ١٩٧٣ ، وكان له أنشطة متعددة ؛ من أهمها إقامة اللجان الاستشارية المحصولية ، والتعاون مع المؤسسات الوطنية فى مختلف البلدان ، وتوفير الدعم للمهام الاستكشافية عن الجيرمبلازم فى أنحاء متفرقة من العالم ، ووضع الضوابط لعملية جمع ، وتوثيق ، وحفظ الجيرمبلازم فى جميع مراحلها ، وإقامة الندوات ، وتدريب العاملين فى هذا المجال .

أما مراكز شبكة معلومات المجموعة الاستشارية للبحث الزراعى الدولى (CGIAR) ، التى لها اهتمامات بجيرمبلازم المحاصيل الزراعية .. فهى كما يلى :

١- معهد بحوث الأرز الدولى International Rice Research Institute (يكتب اختصاراً : IRRI) ، ويوجد المعهد فى Los Banos بالفلبين ، ويهتم بتحسين محصول الأرز من كافة الوجوه . تتوفر لدى المعهد أعداد هائلة من سلالات الأرز الـ *indica* ، والـ *japonica* التى جمعها من جنوب آسيا ، وجنوب شرقها ، وشرقها . أما سلالات الأرز الغرب -أفريقية .. فإنها تحفظ فى المعهد الدولى للزراعة الاستوائية ، كما تخزن سلالات الأرز الـ *japonica* فى اليابان . ويحتفظ المركز بأكثر من ٢٤٠٠٠ سلالة من الأرز .

٢- المركز الدولى لتحسين الذرة والقمح The International Maize and Wheat Improvement Center (يكتب اختصاراً : CIMMYT) :

يوجد المركز فى El-Batan بالمكسيك ، ويهتم بجيرمبلازم ، وتحسين الذرة والقمح .

٣- المركز الدولي للزراعة الاستوائية The International Center For Tropical Agriculture (يكتب اختصاراً CIAT) :

يوجد المركز في Palmira بكولومبيا ، ويهتم بجيرمبلازم ، وتحسين كل من الكاسافا والفاصوليا ، والنباتات الرعوية من النجيليات والبقوليات . ويحتفظ المركز حالياً بأكثر من ٣٥٠٠ سلالة من الجنس *Phaseolus* (عن Hussain ١٩٨٦) .

٤- المعهد الدولي للزراعة الاستوائية The International Institute of Tropical Agriculture (يكتب اختصاراً IITA) :

يوجد المعهد في Ibadan بنيجيريا ، ويهتم بجيرمبلازم الأرز الأفريقي ، والمحاصيل الجذرية ، واللوبياء ، وبعض النباتات الأخرى الشائعة في المنطقة غير الذرة الرفيعة والدخن .

٥- مركز البطاطس الدولي The International Potato center (يكتب اختصاراً CIP) :

يوجد في Lima ببيرو ، ويهتم بجيرمبلازم البطاطس والأنواع البرية القريبة التي جمع منها أكثر من ٤٠٠٠ سلالة (عن Ochoa ١٩٧٥) .

٦- معهد بحوث المحاصيل الدولي للمناطق الاستوائية شبه الجافة The International Crop Institute for the Semi-Arid Tropics (يكتب اختصاراً ICRISAT) :

يوجد المعهد في Hyderabad في الهند ، ويهتم بجيرمبلازم المحاصيل المقاومة للجفاف خاصة : الذرة الرفيعة ، والدخن ، وبسلة تشك ، والفول السوداني ، وبسلة بيجون .

٧- المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة The International Center for Agricultural Research on Dry Areas (يكتب اختصاراً ICARDA) :

يوجد المركز في حلب بسوريا ، ويهتم بجيرمبلازم الشعير ، والعدس ، والفول ، والقمح durum ، وبسلة تشك .

٨- المركز الآسيوى لبحوث وتطوير الخضـر The Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC) : (يكتب اختصاراً : AVRDC) :

يوجد فى تايوان ، ورغم أنه يرتبط بشبكة معلومات الـ CGIAR إلا أنه لا يعد - رسمياً - جزءاً منها ، ويهتم بجيرمبلازم وتحسين الطماطم ، وفول الصويا ، والكرنب الصينى ، والبطاطا ، وفاصوليا المنج ، وعدة محاصيل خضر أخرى .

٩- رابطة تطوير الأرز الغرب أفريقية The West African Rice Development Association :

ترتبط الرابطة بشبكة معلومات الـ CGIAR إلا إنه ليس من مهامها حفظ الجيرمبلازم.

شبكات المعلومات الإقليمية

تولت المجموعة الاستشارية للبحث الزراعى الدولى IBPGR مسئولية إنشاء عدة شبكات للمعلومات تغطى كل منها عدة دول فى شبكة إقليمية Regional Networks كما يلى :

١- أوروبا :

بدأ العمل فى جمع الجيرمبلازم والاهتمام به منذ أيام فافيلوف فى معهد النباتات Institute of Plant Industry بـلينجراد ، ثم أنشئت شبكة معلومات لبنوك الجينات الأوروبية بفضل جهود الرابطة الأوروبية لبحوث تربية النبات The European Association for Research on Plant Breeding (اختصاراً : EUCARPIA) ضمت ما يلى :

١- بنك الجيرمبلازم The Insituto del Germplasma فى Bari بإيطاليا .

٢ - بنك للجينات Institut fur Pflanzenbau und Pflanzenzuchtung فى Braunschweig - Volkenrode بألمانيا .

٣- بنك الجينات الإسكندنافية The Nordic Gene Bank فى Lund بالسويد .

٤- بنك الجينات فى Kew بإنجلترا ، وبنك جينات الخضر بمحطة بحوث الخضر الوطنية National Vegatable Research Station فى Wellesbourne بإنجلترا أيضاً.

وقد أنشئت بنوك أخرى للجينات فى دول غرب أوروبا ، بكل من Braga فى البرتغال ، ومدريد بإسبانيا ، و Thessaloniki باليونان ، ونيقوسيا بقبرص ، و Wageningen بهولندا ، و Gembloux ببلجيكا ، و Montpellier بفرنسا . كما اتخذت خطوات لربط شبكات المعلومات التى توجد فى دول شرق أوروبا بتلك التى توجد فى دول غرب أوروبا . وتوجد بنوك الجينات فى أوروبا الشرقية فى كل من ليننجراد بروسيا ، و Gatersleben بألمانيا الشرقية (سابقاً) ، و Radzikow ببولندا ، وبراغ بتشيكوسلوفاكيا ، و Tapioszele بالمجر ، و Fundulea برومانيا ، و Plovidiv ببلغاريا .

٢- جنوب شرق آسيا .

٣- جنوب غرب آسيا .

٤- جنوب آسيا .

٥- حوض البحر الأبيض المتوسط .

وليزيد من المعلومات عن المؤسسات الدولية وشبكات المعلومات المهمة بالجيرمبلازم يراجع كل من : Zeven & Harten (١٩٧٩) ، و Hawkes (١٩٨٣) .

برامج وبنوك الجينات الوطنية

رغم أن بنوك الجينات الأوروبية ترتبط معاً بشبكة معلومات .. إلا أن جميعها بنوك وطنية . وتوجد برامج وبنوك جينات وطنية أخرى فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد السوفيتى ، وكندا ، وأستراليا ، واليابان ، والصين ، والبرازيل ، ودول أخرى . ويعتبر معهد فافيلوف N.I. Vavilov Institute هو المسئول عن تجميع الجيرمبلازم داخل الاتحاد السوفيتى وخارجه ، ويتبعه ٢٥ محطة بحوث ، تنتشر فى أنحاء متفرقة من الدولة . ويقوم المعهد بجمع مايقرب من ١٢٠٠٠ - ١٦٠٠٠ سلالة بذرية وخضرية سنوياً ، وهو يحتفظ بأكثر من ٢٠٠ ٠٠٠ سلالة من كافة المحاصيل ، ويرسل عينات منها لمن يطلبها بحرية تامة ، ويحتفظ بالسلالات البذرية فى أوعية غير منفذة للرطوبة ، على درجة حرارة تتراوح من صفر -٥°م ، كما يقوم المعهد بإكثار هذه السلالات وتقييمها . وليزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الأمر .. يراجع Brezhnev (١٩٧٥) .

ويعتبر جهاز الجيرمبلازم الوطنى الأمريكى من أكبر وأنجح أجهزة الجيرمبلازم فى العالم ؛ لذا .. سنتناوله بشئ من التفصيل .

جهاز جيرمبلازم النباتات الوطنى فى الولايات المتحدة (مثال)

يعتبر جهاز جيرمبلازم النباتات الوطنى The National Plant Germplasm System (يكتب اختصاراً : NPGS) فى الولايات المتحدة أحد المكونات الرئيسية لشبكة معلومات جيرمبلازم النباتات الدولية ، ويوجد تنسيق بينه وبين المجلس الدولى للثروة الوراثية النباتية IBPGR . يحتفظ الجهاز -حالياً- بأكثر من ٤٠٠ ٠٠٠ سلالة نباتية على شكل بنور أو نباتات خضرية ، تزيد بمعدل ٧٠٠٠ - ١٥٠٠٠ سلالة سنوياً ، كما تحتفظ بعض تعاونيات وراثة النباتات وتحسينها ، ومخزن البنور الوطنى National Seed Storage Laboratory (يكتب اختصاراً : NSSL) الأمريكى بأعداد إضافية من السلالات . تتكون البنية الأساسية لهذا الجهاز من أربعة مكونات رئيسية ، هى :

١- إدخال النباتات Plant Introduction :

يشرف على إدخال النباتات فى الولايات المتحدة مكتب إدخال النباتات The Plant Introduction Office الذى يعد جزءاً من معهد وراثة وجيرمبلازم النباتات Plant Genetics and Germplasm Institute (يكتب اختصاراً : PGGI) فى Beltsville بولاية ميرلاند ، وهو الذى يتبع وزارة الزراعة الأمريكية USDA . يسجل المكتب أية سلالة جديدة تدخل الولايات المتحدة تحت رقم خاص بها Plant Inventory (أو P . I .) .

وقد بدأ تطبيق نظام أرقام الـ P.I.s فى سنة ١٨٩٨ ، ولا يعطى أى رقم إلا مرة واحدة . هذا .. ولا يحتفظ المكتب بأية سلالات لديه وإنما يتولى توزيعها على المحطات والمراكز المختصة مباشرة. يتبع الـ PGGI - أيضاً - مختبران ، ومحطة إدخال للنباتات . ويتولى مختبر تقسيم النباتات The Plant Taxonomy Laboratory التعرف على النباتات التى تدخل جهاز الجيرمبلازم الوطنى ، ويعطيها الأسماء العلمية الصحيحة ، كما يشارك فى رحلات استكشاف النباتات . أما مختبر النباتات الاقتصادية The Economic Botany Laboratory .. فإنه يقوم بدراسة التوزيع الجغرافى والبينى للأنواع المحصولية .

وتقوم محطة إدخال النباتات The Plant Introduction Station فى Glenn Dale

بولاية ميرلاند بتوزيع أجزاء التكاثر الخضرية الخالية من الآفات ، التى تخضع للحجر الزراعى من كل من الفاكهة ، ونباتات الزينة الخشبية ، وبعض الخضروات . أما محطة فحص النباتات Plant Inspection Station فى واشنطن العاصمة .. فإنها تقوم بفحص الأجزاء النباتية ظاهرياً ؛ للتأكد من خلوها من الحشرات ومسببات الأمراض ؛ أما الأمراض التى تحمل -داخلياً- فى البنور .. فإنه لا يمكن التعرف عليها إلا بعد زراعة عينة منها ، ويجرى ذلك داخل بيوت محمية فى محطات إدخال النباتات الإقليمية .

تقوم محطة إدخال النباتات فى ميامى The Plant Introduction station at Miami بولاية فلوريدا - وهى جزء من محطة بحوث المحاصيل البستانية تحت الاستوائية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية - بمهمة تقييم ، وإدانة أصناف وسلالات بعض المحاصيل تحت الاستوائية ؛ مثل المانجو ، والأفوكادو ، والبن ، والكافور .

وتتولى أربع محطات إدخال نباتات إقليمية Regional Plant Introduction Stations (تكتب اختصاراً : RPIS) مهمة إدانة جيرمبلازم النباتات ، وتقييمه ، وهى كما يلى :

أ- محطة إدخال النباتات الإقليمية فى Geneva بنيويورك (Northeastern RPIS) ، ويدخل ضمن مسئولياتها محاصيل البصل ، والبسلة ، والبروكولى ، وعشب التيموثى timothy ، والطماطم التى نقلت إليها مؤخراً .

ب- محطة إدخال النباتات الإقليمية فى Experiment بولاية جورجيا (Southern RPIS) ، ويدخل ضمن مسئولياتها اللوبيا ، والدخن ، والفول السودانى ، والذرة الرفيعة ، والفلفل .

ج- محطة إدخال النباتات الإقليمية فى Ames بولاية أيوا (North Central RPIS) ، ويدخل ضمن مسئولياتها البرسيم الحجازى ، والذرة ، والبنجر ، والخيار ، والقاوون الذى نقل إليها مؤخراً .

د- محطة إدخال النباتات الإقليمية فى Pullman بولاية واشنطن (Western RPIS) ، ويدخل ضمن مسئولياتها الفاصوليا ، والكرنب ، والعكرش Fescue ، والقمح ، والعدس ، والخس ، والقرطم ، وبسلة تشك . وتوجد محطة إدخال أخرى غير إقليمية ، هى محطة إدخال البطاطس Interregional Potato Introduction Station فى Surgeon Bay

ولاية وسكتس ، وهى تركز على المحافظة على جيرمبلازم سلالات البطاطس ، وتحسينها ، لتلبية احتياجات مربى المحصول . وتحفظ هذه المحطة بأكثر من ٢٠٠٠ سلالة خضرية من الجنس *Solanum* ، تمثل ٩٢ من الأنواع التى تكون درنات ، وتحفظ البنور الحقيقية لنحو ٧٠٪ منها فى مخزن البنور الوطنى .

٢- مجموعات النباتات Plant Collections :

تشرف وزارة الزراعة الأمريكية على مخزن البنور الوطنى National Seed Storage Laboratory فى Fort Collins بولاية كلورادو ، الذى أنشئ فى سنة ١٩٥٨ ليتسع لنحو نصف مليون عينة بنور ؛ من السلالات النباتية التى تخزن فيه على درجة ٤ ، ٤م (٤٠) ، و ٢٢٪ رطوبة نسبية ، ويمكن خفض درجة الحرارة فى ثلاث غرف من غرف المخزن إلى -٢، ٢م (١٠) ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

ويقوم المخزن بحفظ القاعدة العريضة للمجموعات النباتية فى الولايات المتحدة ؛ مثل السلالات الرئيسية من الـ P.I.s ، والأصناف المنتجة حديثاً ، والأصناف التى لم تعد مستعملة فى الزراعة ، وسلالات الآباء لهجن النباتات الخلطية التلقيح ، وغيرها من السلالات المستعملة لأغراض الدراسات الوراثية ، أو كموائل مفرقة differential hosts لسلالات المسببات المرضية ، أو لأغراض حفظ حقوق المربى فى الأصناف والسلالات المسجلة . ويحتفظ المخزن - حالياً - بأكثر من ٢٠٤٠٠٠ سلالة نباتية من حوالى ٣٧٠ جنساً ، ونحو ١٩٦٠ نوعاً ؛ بغرض تخزينها فقط ؛ إذ ليس من مهامه توزيع السلالات على الراغبين فى الحصول عليها من مربى النبات ؛ لأن معظم السلالات التى توجد فيه توجد - أيضاً - فى أماكن أخرى ، وهى التى تقوم بمهمة التوزيع .

ونظراً لأن التخزين يكون تحت ظروف جيدة ، لذا .. فإن السلالات لاتعاد زراعتها لحفظ حيويتها إلا على فترات طويلة ، وهو ما يقلل كثيراً من احتمالات تغيرها وراثياً . وتختبر حيوية البنور على فترات منتظمة ، ويتم إعادة الزراعة - عند الضرورة - فى المناطق المناسبة لكل محصول بتعاقدات خاصة مع المخزن . ومن مهام المخزن - أيضاً - مدّ المحطات ، والمراكز المسئولة عن المجموعات الأخرى بعينات صغيرة من السلالات التى تفقد لديهم .

تقوم مستودعات السلالات الخضرية الوطنية National Clonal Repositories بمهمة إكثار وإدامة عدد من النباتات ، التي تتكاثر - خضرياً - من الفاكهة ، والنقل ، ونباتات أخرى خاصة ، كما يدخل -أيضاً- ضمن مهامها جمع جيرمبلازم هذه النباتات من جميع أنحاء العالم وتقييمه . ومن هذه المستودعات تلك التي توجد في المدن التالية :

أ- Corvallis بولاية أوريجون ، ويتولى مسئولية جيرمبلازم الكمثرى ، والبندق ، والثمار الصغيرة ، وحشيشة الدينار ، والنعناع .

ب- Davis بولاية كاليفورنيا ، ويتولى مسئولية جيرمبلازم العنب ، والفاكهة ذات النواة الحجرية ، والنقل .

ج- Miami بولاية فلوريدا ، ويتولى مسئولية جيرمبلازم بعض الفاكهة الاستوائية ، وشبه الاستوائية ، وقصب السكر .

د- Indio بولاية كاليفورنيا ، ويتولى مسئولية جيرمبلازم نخيل البلح .

هـ - Mayaguez في بورتوريكو (معهد مياجويز للزراعة الاستوائية Mayaguez Institute of Tropical Agriculture) ويتولى مسئولية الفاكهة الاستوائية والمحاصيل الصناعية .

توجد مجموعة الحبوب الصغيرة لوزارة الزراعة الأمريكية The USDA Small Grains Collection ضمن معهد وراثته وجيرمبلازم النباتات PGGI في Beltsville بولاية ميريلاند . وتضم المجموعة نحو ٩٠ ٠٠٠ سلالة من القمح ، والشعير ، والزمير ، والأرز ، والشيلم ، و *Aegilops* ، وتزيد مجموعة القمح وحدها على ٣٥ ٠٠٠ سلالة ، ومجموعة الشعير على ٣٥٠٠٠ سلالة .

أما المجموعات النباتية العملية Working Collections .. فهي مجموعات من جيرمبلازم محاصيل معينة ، والأنواع النباتية القريبة منها ، يُحْتَفَظُ بها لتلبية الاحتياجات اليومية لمربي النبات وغيرهم من علماء النبات الذين قد يرغبون في استعمالها للأغراض البحثية . ويعنى جهاز جيرمبلازم النبات الوطنى NPGS بأن تسجل هذه المجموعات ، ويحتفظ بعينات منها في مخزن البنور الوطنى . ويكون لكل مجموعة محصولية عالماً قيماً عليها curator ، يتولى مسئولية المحافظة على السلالات ، وإعادة زراعتها عند الضرورة ، وحمايتها ، وتوزيع عينات منها على الراغبين في استعمالها ، وتخزينها تحت ظروف جيدة

(درجة حرارة ٥٠ هـ م ، ورطوبة نسبية ٤٠٪) ، أو إيداعها أحد مستودعات جيرميلانم النباتات الخضرية التكاثر ، وتحديث قائمة سلالات المجموعة أولاً بأول .

وتوجد هذه المجموعات فى محطات الإدخال الإقليمية وغيرها من المحطات المهمة بالمجموعات النباتية . ويكون القيم مسئولاً عن إرسال فائض البنور المكثرة من كل سلالة إلى مخزن البنور الوطنى . وتحفظ هذه المحطات بأعداد كبيرة من سلالات الأنواع المحصولية منها - على سبيل المثال - مايربو على ٦٠٠٠ سلالة فاصوليا ، و ٤٨٠٠ سلالة طماطم ، و ١٨٠٠ سلالة فلفل ، و ١٧٠٠ سلالة قارون ، و ١٥٠٠ سلالة بسلة ، و ١٣٠٠ سلالة لوبيا (١٩٨٧ Fehr ، ١٩٧٥ Hyland) .

وتعتبر المجموعات النباتية التى بها جمعيات وتعاونيات المشتغلين بوراثة المحاصيل وتحسينها جزءاً هاماً من جهاز جيرميلانم النبات الوطنى NPGS ، ويستفيد منها المشتغلون بهذه المحاصيل فى جميع أنحاء العالم لأغراض التعليم ، والبحث فى مجالات التربية ، والوراثة ، والسيئولوجى ، والفسيلولوجى ، والوراثة الجزيئية . وقد سبق أن ذكرنا فى الفصل الأول أسماء معظم هذه التعاونيات ، ونذكر فيما يلى .. أعداد السلالات الوراثية genetic stocks ، التى تحتفظ بها بعضها :

المحصول	عدد السلالات المحتفظ بها	التعاونية الوراثية أو مكان وجود السلالات
الشعير	٢٠٠٠	قسم المحاصيل بجامعة ولاية كلورادو فى Fort Collins
القطن	٣٠٠	مختبر المحاصيل الحقلية بجامعة Texas A & M فى College Station .
الشفوفان	٢٠٠	مجموعة الحبوب الصغيرة فى Beltsville بولاية ميرلاند .
البسلة	٥٠٠٠	قسم علوم البنور والخضر بمحطة تجارب ولاية نيويورك الزراعية فى Geneva .
الذرة	٥١٠٠٠	قسم المحاصيل بجامعة إلينوي فى Urbana
الطماطم والأنواع البرية القريبة	١٧٠٠	قسم محاصيل الخضر بجامعة كاليفورنيا فى Davis
القمع	٦٠٠	جامعة ميسورى فى Columbia .

٣- نظام المعلومات Information System :

نظراً للكثرة الهائلة لأعداد السلالات المحتفظ بها ، والبيانات المسجلة عن كل منها ؛ لذا .. ظهرت الحاجة إلى تنمية نظام للمعلومات قائم على استعمال الحاسب الآلى ، وهو ما أدى إلى تكوين مشروع معلومات ثروة الجيرمبلازم Germplasm Resources In-formation Project ، الذى استكمل تكوين شبكة معلومات ثروة الجيرمبلازم Germ Plasm Resources Information Network

٤- المجموعات الاستشارية Advisory Groups :

يخدم عديد من المجالس واللجان كمجموعات استشارية لثروة الجيرمبلازم ، وهى كما يلى :

أ- مجلس الثروة الوراثية النباتية الوطنى The National Plant Genetic Resources Board وهو يهتم بالجيرمبلازم على مستوى الدولة .

ب- لجنة جيرمبلازم النباتات الوطنية The National Plant Germplasm Committee .

ج- اللجان الفنية الإقليمية Regional Technical Committees على مستوى محطات الإدخال الإقليمية .

د- لجان المحاصيل الاستشارية Crop Advisory Committees على مستوى المحاصيل .

هـ- المجلس الدولى للثروة الوراثية النباتية IBPGR الذى يتبع المجموعة الاستشارية للبحث الزراعى الدولى (CGIAR) الذى يربط بين جهاز جيرمبلازم النبات الوطنى NPGS ، وشبكة الجيرمبلازم العالمية (Skardla ، ١٩٧٥ ، Hyland ١٩٧٥ ، Fehr ١٩٨٧) .

خطوات عملية إدخال النباتات

نقدم - فيما يلى- أهم الخطوات التى تتبع عادة عند البحث عن الجيرمبلازم وجمعه .

١- الحصر :

يلزم - أولاً - عمل حصر بتوزيع الاختلافات ، والمناطق المهددة بالتعرية الوراثية ،

واحتياجات مربى النبات ، والأنواع النباتية القريبة من المحصول المزروع . ويتطلب الأمر دراسة القرابة النباتية بين المحصول ، والأنواع الأخرى القريبة ، التي قد تكون مصدراً لصفات مهمة ، والعلاقة التطورية بين بعضها البعض ، ويعنى ذلك أن يكون القائمون على عملية الحصر على دراية تامة بتقسيم النبات ، والصفات المحصولية المعروفة والمطلوبة . كما يجب أن يشمل الحصر طرز «الحشائش» المحصولية أيضاً ، التي كثيراً ما تستخدم كمصدر لصفات هامة ، خاصة المقاومة للآفات . ويعطى (1970) Leppik المراكز التي تتوفر فيها مصادر المقاومة لمختلف الأمراض النباتية . وإلى جانب الأنواع المزروعة والقريبة منها .. فإن جزءاً من الاهتمام يجب أن يوجه نحو الأنواع البرية التي لا يستعملها الإنسان في الوقت الحاضر . ورغم أن هذه الأنواع ربما لا تكون معرضة -حالياً- لخطر الاندثار .. إلا أن ذلك قد يحدث -مستقبلاً- في الوقت الذي قد تستعمل فيه بعض هذه الأنواع - مستقبلاً - كغذاء ، أو في الأغراض الصناعية .

٢- الاستكشاف والجمع :

تتم عمليتا الاستكشاف والجمع في وقت واحد -عادة- إلا إذا تأخر الجمع لحين نضج الثمار ؛ حيث يعهد بعملية الجمع -حينئذ- إلى أحد الفنيين المقيمين في المنطقة ويجب أن تكون المهمة الرئيسية للمستكشف هي تمثيل الاختلافات المشاهدة تمثيلاً صادقاً بأقل عدد من العينات ، مع أخذ كمية كافية من البذور أو الجزء النباتي المستخدم في التكاثر في كل عينة .

ويجب أن تشمل العينات جميع الطرز النباتية الموجودة في المنطقة ، وألاً يقتصر الاهتمام على النباتات ذات الصفات الجيدة الواضحة فقط . فكم من عينات لم يكن في مظهرها ما يدل على وجود أية قيمة لها حينما جمعت ، ثم اتضحت أهميتها فيما بعد ، ونذكر - مثلاً على ذلك - سلالة القمح رقم P.I. 178383 ، التي جمعت من تركيا في سنة ١٩٤٨ ، وكانت صفاتها تبدو رديئة ، فسيقانها طويلة ورفيعة وتميل إلى الرقاد بشدة ، وكانت قابلة للإصابة بصدأ الأوراق Leaf Rust ، ولا تتحمل برودة الشتاء ، ويصعب ارتباعها ، كما لم تكن صفات الخبز المصنع منها جيدة ؛ وكان من نتيجة ذلك أن أهملت هذه السلالة لمدة ١٥ عاماً ، إلى أن اكتشفت مقاومتها لأربع سلالات من الفطر المسبب للصدأ المخطط Stripe Rust ، الذي كان قد أصبح خطيراً في شمال غرب الولايات

المتحدة آنذاك ، ثم تبين أنها مقاومة كذلك لخمس وثلاثين سلالة من الفطر المسبب للتفحم العادى Common Bunt ، وعشر سلالات من الفطر المسبب لمرض التفحم والتقزم Stunt Bunt ، كما تبين أنها ذات قدرة عالية على تحمل الإصابة بمرضى التفحم flag smut ، والعفن snow mould . وكان من نتيجة ذلك أن استعملت هذه السلالة فى عدد كبير من برامج التربية (عن Harlan ١٩٧٥) .

ومن الأمور التى تجب مراعاتها ضرورة جلب بكتيريا العقد الجذرية الخاصة بالنباتات البقولية التى تستورد لأول مرة ؛ لأنه يوجد تخصص فسيولوجى بين الأنواع البقولية وأنواع بكتيريا الجنس *Rhizobium* التى تعيش معها تعاونياً . ويتم ذلك بفصل الجنور التى تكثر بها العقد الجذرية ، ثم تجفيفها بسرعة ، دون تعريضها للحرارة ، وحفظها فى حرارة منخفضة فى أوعية منفذة للرطوبة .

ويجب أن ترسل العينات التى يتم جمعها بالطائرة أولاً بأول ؛ حتى لا تتعرض للتلف بفعل العوامل الجوية ، أو بسبب الإصابة بالحشرات . وتعطى عناية خاصة للنباتات الخضرية التكاثر ؛ لأنها ربما لا تحتفظ بحيويتها لحين وصولها إلى محطة الإكثار ؛ فقد تجف ، أو تتعرض للإصابة بالعفن ، وقد ينتهى سكونها ، وتبدأ فى التزريع .

وقد تناول Sykes (١٩٧٥) موضوع جمع جيرمبلازم الفاكهة وحفظها من جميع الجوانب ، وتطرق إلى الاستشعار من بعد بطرق الرادار . والتصوير الجوى ؛ بغرض حصر توزيع الاختلافات ، ورصد التغيرات فى النموات الخضرية ، ومواعيد الإزهار ، ونضج الثمار ، وسقوط الأوراق ، كما ناقش المؤلف طرق الحفاظ على العقل ، ومنع جفافها لحين زراعتها ؛ بتعريضها للضباب الصناعى mist ، أو حفظها فى الثلاجات ... وغير ذلك من الطرق . وتعد مشكلة ضخامة المساحات - التى تلزم لزراعة النباتات التى يتم جمعها - من أكبر مشاكل الاحتفاظ بجيرمبلازم نباتات الفاكهة ، وهى المشكلة التى تناولها بالتحليل واقترح تطعيم نحو ٢٠٠ طعم من مختلف السلالات على كل أصل ؛ كحل لهذه المشكلة .

هذا .. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع كل من Bennett (١٩٧٠) بالنسبة لأسلوب تنظيم العمل وما يلزم من معدات ، و Leon (١٩٧٤) ، الذى تناول كيفية جمع جيرمبلازم عدد من النباتات الاستوائية و Harlan (١٩٧٥) الذى شرح - عن

خبرة - كيفية التجول ؛ للبحث عن الاختلافات الوراثية من النباتات التى تتكاثر جنسياً ، و Hawkes (١٩٧٥) ، الذى تناول الموضوع بالنسبة للنباتات الخضرية التكاثر ، و Zagaja (١٩٨٣) الذى تناول جمع جيرمبلازم نباتات الفاكهة .

٢- طرق أخذ العينات Sampling Techniques :

يحدد المختصون الهدف عند أخذ العينات فى أن يمثل كل تركيب وراثى -يزيد تكراره فى العشيرة الطبيعية على ٥٪ -مرة واحدة على الأقل فى العينة ؛ بنسبة تأكد إحصائية تبلغ ٩٥٪ ، ويوصون بأخذ عينة مجمعة ، تتكون من بنور ٥٠-١٠٠ نبات معاً من كل موقع (حقل) يتم استكشافه ، على أن يمثل كل نبات فى العينة المركبة بخمسين بذرة ، وأن تختار النباتات بطريقة عشوائية تماماً . ورغم أنه يمكن قبول عينات قليلة متحيزة biased قد يرى المستكشف أنها متميزة مورفولوجياً .. إلا أنه لايمكن قبول العينات التى تكون متحيزة تماماً ؛ لأنه لايمكن تقدير قيمة وأهمية الاختلافات الوراثية المشاهدة بمجرد النظر إليها .

أما بالنسبة للنباتات التى تتكاثر بالدرنات .. فإنه يفضل أخذ عينات عشوائية ممثلة لكل الاختلافات المشاهدة من أسواق القرى مباشرة ، على اعتبار أن المزارعين قد قاموا - بأنفسهم - بانتخاب أكثر الطرز تأقلاً على الظروف البيئية السائدة ، وأكثرها مقاومة للآفات الهامة . ويجب فى حالة جمع عينات النباتات الخضرية التكاثر من الحقل مباشرة عدم تركيز البحث فى منطقة واحدة ؛ حتى لاينتهى الأمر إلى جمع نباتات من سلالة خضرية واحدة .

ويمكن - إن أمكن - جمع بنور النباتات الخضرية التكاثر ، إلا أن ذلك لايتيسر فى كثير من الأحيان ؛ فهى - غالباً - ماتكون عقيمة ، أو عديمة التوافق ، وكثير منها لاينتج بنوراً بالمرّة .

٤- التوثيق الحقلى Field Documentation :

يجب تحضير نماذج ملائمة ، تملأ فى الموقع بالبيانات الخاصة بكل عينة يتم جمعها . ويراعى - فى هذه النماذج - ألا تكون مفصلة أكثر من اللازم ؛ حتى لايشيع الوقت فى

ملئها . ومن أهم البيانات التى يجب أن يتضمنها النموذج : اسم القائم بعملية الجمع ، ورقم العينة ، والاسم العلمى للنبات ، والاسم العادى للنبات ، واسم المقاطعة أو البلد ، وخطا الطول والعرض للموقع ، وتاريخ الجمع ، وارتفاع الموقع عن سطح البحر ، ورقم الصورة التى التقطت للنبات ، ونوع العينة النباتية (بنور أو أجزاء خضرية مختلفة) ، وحال النبات (برى - صنف مزروع - حشيشة محصولية ... إلخ) ، وتقدير عام لمعدل ظهور النبات فى الموقع ، والصفات العامة المميزة للمشاهدة ، والمميزات المحتملة للعينة .

هـ - الإدخال :

إن عملية إدخال النباتات تتطلب المرور بالحجر الزراعى : للتأكد من خلوها من الآفات الممنوع دخولها ، ويتطلب ذلك عمليات الفحص الظاهرى ، وزراعتها فى معزل : للتأكد من خلوها من الأمراض وزراعة الأجزاء الخضرية تحت ظروف خاصة من العزل ، مع فحصها فحصاً دقيقاً . وللتفاصيل الخاصة بإجراءات وعمليات الحجر الزراعى عند إدخال النباتات .. يراجع كل من : Khan (١٩٧٠) ، و Hewitt & Chiarappa (١٩٧٧) . كما يعطى Foster (١٩٨٨) شرحاً للنظم المتبعة فى استبعاد الآفات من العينات النباتية المتبادلة دولياً .

إكثار الجيرمبلازم وتقييمه

تقع مهمة إكثار الجيرمبلازم وحفظه على عاتق محطات الإدخال ، ومعاهد ومراكز البحوث النولية والإقليمية والوطنية ، وتعاونيات الوراثة والتربية ، ومستودعات النباتات الخضرية التكاثر المسنولة عن المجموعات المحصولية المختلفة : فتكون هى المسنولة -أولاً وأخيراً- عن بقاء السلالات -الموجودة لديها- نقية ، ومحتفظة بحيويتها . ويتحقق ذلك بتخزين بنور السلالات الجنسية التكاثر فى ظروف مثلى للتخزين : بحيث يمكن أن تحتفظ بحيويتها فترات طويلة ، تزيد على عشر سنوات عادة ، مع اختبار حيويتها على فترات ، بحيث تعاد زراعتها وإكثارها قبل أن تنخفض نسبة إنباتها بشكل حاد : حتى لا تفقد نهائياً . كما تعاد -أيضاً- زراعة وإكثار السلالات ، التى يقل رصيد المخزون منها عن حد معين : بسبب كثرة الطلب عليها من قبل المربين .

وبينما يسهل إكثار النباتات الذاتية التلقيح فإن النباتات الخلطية التلقيح تكون مشكلة كبيرة ، بسبب الأعداد الهائلة من السلالات التى يلزم إكثارها من جانب ، وبسبب انتشار

ظاهرة عدم التوافق الذاتى فى كثير من أنواعها ، أو التدهور فى نباتاتها مع التربية الداخلية من جانب آخر . ويتم التغلب على هذه المشاكل إما بإجراء التلقيح صناعياً بين نباتات السلالة الواحدة (كما فى القرعيات ، والذرة ، وأنواع الجنس *Lycopersicon* غير المتوافقة ذاتياً على سبيل المثال) ، وإما بوضع عدة نباتات تحت شبكة غير منفذة للحشرات ، وإدخال بعض الحشرات النظيفة من حبوب اللقاح للقيام بعملية التلقيح . وتتبع هذه الطريقة مع بعض المحاصيل الحشرية التلقيح (كالبصل ، والجزر ، والكرفس) .

أما المحاصيل الخضرية التكاثر .. فإنه يحافظ عليها - غالباً - على صورة خضرية فى مستودعات الجيرمبلازم ومراكز البحوث الخاصة بها . وتمثل الإصابات الفيروسية مشكلة كبيرة بالنسبة للنباتات النامية ، ويتم التخلص منها بإكثار النباتات عن طريق مزارع القمة الميرستيمية . وقد يمكن حفظ جيرمبلازم هذه النباتات بالتخزين بطرق خاصة تحت ظروف معينة - كما سيأتى شرحه فيما بعد - بدلاً من استمرار زراعتها .

وإلى جانب الإكثار والحفظ .. فإن المعاهد ، والمراكز ، والمحطات ، والمستودعات ، والتعاونيات التى سبق بيانها تقوم بدور رئيسى فى تقييم الجيرمبلازم - الذى فى حوزتها - للصفات المورفولوجية الظاهرة ، والصفات المحصولية أو البستانية المهمة ، أما صفات المقاومة للآفات والصفات الفسيولوجية غير الظاهرة التى يحتاج تقييمها إلى اختبارات خاصة .. فإن مهمة تقييمها تقع على عاتق مربى النبات ، أياً كان موقعهم ؛ لذا .. فإن المؤسسات التى تحتفظ بالجيرمبلازم غالباً ماترحب بإرسال عينات منها لكل من يرغب من العلماء والمختصين ؛ لتقييمها أو لإجراء الدراسات الوراثية ، أو السيتولوجية ، أو الفسيولوجية عليها .

وتجدر الإشارة إلى ضرورة الاستمرار فى حفظ جميع سلالات الجيرمبلازم ، حتى إن لم يجد مربو النبات فيها ضالتهم من الصفات التى يرغبون فى إدخالها ضمن برامج التربية ؛ ذلك لأن مالاقيمة له اليوم .. قد تكون له أهمية كبيرة فى المستقبل ، خاصة أن أهداف التربية تتغير على الدوام .

وليزيد من التفاصيل عن الأنشطة الدولية ، والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة فى مجال تقييم الجيرمبلازم .. يراجع Snee & Hendriksen (١٩٧٩) .

حفظ الجيرمبلازم فى البيئة الطبيعية

لا شك فى أن أفضل وسائل حفظ الجيرمبلازم تتم بتوفير المحميات المناسبة له فى البيئة الطبيعية *in situ* ؛ لحمايته من الانقراض ؛ حيث تتكاثر النباتات وتُلَقَّحُ خلطياً مع بعضها ، وتحدث فيها الطفرات بشكل طبيعى .. وبينما قد يمكن تطبيق هذه الطريقة بالنسبة للأنواع التى يخشى عليها من الانقراض - وهو أمر ممكن ومطلوب فى هذه الحالة - فإن تطبيقها غير ممكن ، وغير مطلوب بالنسبة للأنواع التى تنتشر زراعتها على نطاق واسع ؛ فهو أمر غير ممكن نظراً للتكاليف الباهظة التى يتطلبها حفظ الجيرمبلازم بهذه الطريقة . حيث تتطلب توفير مساحات كبيرة من المحميات الطبيعية فى المناطق الجغرافية التى تنتشر فيها الأنواع التى يراد حفظها ، كما لا يعد حفظ الأنواع الواسعة الانتشار بهذه الطريقة أمراً مرغوباً فيه لأنه لن يمكن الاحتفاظ إلا بعدد قليل من الاختلافات الوراثية ، التى تتوفر منها فى الطبيعة ، هذا فضلاً عن احتمال تعرضها للإصابة بالأوبئة . وتتم الطريقة الأخرى لحفظ الجيرمبلازم بالتخزين *ex situ* .

حفظ جيرمبلازم النباتات الجنسية التكاثر بالتخزين

تختلف الطرق المتبعة فى تخزين تقاوى المحاصيل الزراعية التى تستخدم فى الزراعة لسنة أو سنوات قليلة عن تلك التى تتبع فى حفظ الجيرمبلازم وتخزينه لسنوات عديدة ؛ سواء أكان الجيرمبلازم على صورة بنور ، أم أجزاء خضرية ، أم مزارع أنسجة ، أم أى جزء نباتى آخر . ومن أهم مزايا حفظ الجيرمبلازم لفترات طويلة ما يلى :

- ١- توفير نفقات إعادة زراعة السلالات على فترات متقاربة قبل أن تفقد حيويتها .
- ٢- تجنب احتمالات الخلط الميكانيكى لبنور السلالات عند إعادة إكثارها .
- ٣- تجنب - أو تقليل - احتمال حدوث أى تغير وراثى فى مجمع الجينات *gene pool* الأصلية للسلالة ، الأمر الذى قد يحدث عند إكثارها من وقت لآخر (عن Stanwood & Roos ١٩٧٩) .

تخزين البذور فى درجات الحرارة المنخفضة

يفضل تقسيم مجموعات الجيرمبلازم البذرية - حسب ظروف التخزين المناسبة - إلى فئتين .

١- المجموعات الأساسية Base Collections :

تخزن بنور المجموعات الأساسية لمدة طويلة ، تحت ظروف مثلى من الحرارة والرطوبة . لاستعمل هذه المجموعات فى التوزيع ، وتختبر حيويتها ، على فترات منتظمة ، ويجب أن يخزن من كل سلالة كمية من البنور ، تكفى الاحتياجات المتوقعة منها لاختبارات الإنبات خلال فترة التخزين ، ثم إعادة الزراعة حينما يحين وقت ذلك . وبرغم وجود عينات صغيرة منها لاختبارات الإنبات الدورية .. فإن الجزء الأكبر يبقى فى أوعية غير منفذة للرطوبة ، لا تفتح إلا عند إعادة الزراعة التى تكون عند انخفاض نسبة الإنبات إلى ٨٠ - ٨٥ ٪ من النسبة الأصلية ، ويوصى بتخزين هذه البنور فى درجة حرارة ١٨-°م ، أو أقل من ذلك فى أوعية غير منفذة للرطوبة ، مع خفض رطوبة البنور قبل التخزين إلى ٥ ± ١٪ على أساس الوزن الرطب ؛ وهو ما يعنى أن هذه الظروف لاتصلح لتخزين البنور التى تفقد حيويتها عند التجفيف . كما يجب توفر أجهزة توليد كهرباء إضافية ؛ لتعمل تلقائيا عند انقطاع التيار .

٢- المجموعات النشطة : Active Collections :

تخزن بنور المجموعات النشطة لفترات متوسطة المدى ، وهى التى تستعمل فى الإكثار ، والتوزيع ، والتقييم . ويعد الحد الأدنى المقبول - من الظروف التى تلزم لتخزين هذه المجموعات - درجة حرارة ٥م° ، مع خفض رطوبة البنور قبل التخزين إلى ٥ - ٧٪ ، وحفظها إما فى أوعية غير منفذة للرطوبة ، وإما فى أوعية منفذة للرطوبة . لكن مع مراعاة الا تزيد الرطوبة النسبية فى جو المخزن على ٢٠٪ وتحفظ بنور المجموعة النباتية - التى توجد فى مخزن البنور الوطنى فى الولايات المتحدة - على حرارة ٤,٤م° (٤٠°ف) ، مع رطوبة نسبية ٣٢٪ فى غير أوعية منفذة للرطوبة (عن Justice & Bass ١٩٧٩م) . كما تحفظ بنور بعض السلالات على درجة حرارة ١٢-١٠م° تحت الصفر ، فى أوعية منفذة للرطوبة . وتختبر حيوية السلالات المخزنة كل خمس سنوات ، حيث تكثر من جديد إذا وجد أن نسبة إنباتها قد انخفضت عن حد معين (Hartmann & Kester ١٩٨٣) . ولزيد من التفاصيل عن حفظ الجيرمبلازم بتخزين البنور فترات طويلة فى الحرارة المنخفضة .. يراجع Harrington (١٩٧٠) ، و Roberts (١٩٧٥) ، و Bass (١٩٨٠) .

حفظ البذور بالتجفيد

مازال حفظ البذور بالتجفيد freeze - drying فى مرحلة الدراسة والبحث . يراعى عند اتباع هذه الطريقة .. أن تجفف البذور - أولاً - بالطرق العادية إلى أن تنخفض نسبة رطوبتها إلى ١٠٪ ثم تجفف بالتجفيد (أى بالتبريد إلى درجة حرارة أقل من الصفر ، مع التجفيف تحت التفريغ فى أن واحد) إلى أن تنخفض رطوبتها إلى ٥٪ ثم تخزن - بعد ذلك - فى أوعية غير منفذة للرطوبة . تحتفظ البذور المجففة بهذه الطريقة بحيويتها لسنوات عديدة ، فى درجة حرارة الغرفة ، ولدد غير محدودة ، إذا خزنت فى حرارة التجمد (عن مجلة HortScience - العدد الثانى - المجلد ٢١ لعام ١٩٨٦) .

حفظ البذور وهى مشبعة بالماء

وجد أن بذور بعض النباتات يمكن أن تحتفظ بحيويتها - لفترات طويلة - وهى مشبعة بالماء imbibed ، مع حفظها فى ظروف لا تسمح باستمرار الإنبات . ويحاول الإنسان - بذلك - محاكاة الطبيعة حينما تتشبع البذور التى توجد تحت أشجار الغابات بالماء ؛ ولكنها لا تباشر الإنبات ، لوجودها تحت غطاء سميك من البقايا النباتية غير المتحللة والمتحللة جزئياً ، وكثافة الغطاء النباتى الذى يقلل كثيراً من وصول الضوء إليها . وربما تصلح هذه الطريقة لتخزين بذور الأنواع النباتية التى يتدهور إنباتها عند تجفيفها . ولزيد من التفاصيل عنها .. يراجع Villiers (١٩٧٥) .

حفظ البذور فى النيتروجين السائل

لايوجد أى ضرر يمكن أن يحدث للبذور عند تعرضها لدرجات الحرارة الشديدة الانخفاض حتى لو خزنت على درجة الحرارة المطلقة (وهى - ٢٧٣° م) مادام محتوى البذور الرطوبى منخفضاً ، أما البذور ذات المحتوى الرطوبى المرتفع فإنها تضار - بشدة - إذا تعرضت لدرجة التجمد ، ويتناسب مدى الضرر الحادث - طردياً - مع نسبة الرطوبة فى البذور ، ويظهر فى صورة تدهور شديد فى نسبة الإنبات ؛ وبذا .. فإن هذه الطريقة لاتصلح لتخزين البذور التى تفقد حيويتها عند التجفيف (recalcitrant seeds) ؛ كبذور الموالح ، والبن ، والكاكاو ، والمطاط ، ونخيل الزيت ، وجوز الهند .

ويوفر النيتروجين السائل درجة حرارة منخفضة ، مقدارها - ١٩٦° م ، وهى درجة

تتوقف عندها كل العمليات الحيوية التي تقود إلى تدهور حيوية البذور : فإذا تحملت بذور أى نوع نباتى التعرض لهذه الدرجة الحرارية - ولو لفترة قصيرة - ثم تحملت تدفنتها إلى درجة حرارة الغرفة بعد ذلك ، فإنها يمكن أن تُحفظ بحالة جيدة فى النيتروجين السائل لفترات غير محدودة .

ولتخزين البذور فى النيتروجين السائل .. تجب مراعاة ما يلى :

١- تجفف البذور - أولا - إلى درجة منخفضة من الرطوبة (حوالى ٥٪ على أساس الوزن الرطب) .

٢- توضع البذور فى أوعية ألومنيومية ، أو بلاستيكية ذات غطاء .

٣- تغمس الأوعية - بما فيها من بذور - فى النيتروجين السائل .

٤- وتنقل الأوعية - بما فيها من بذور - بعد انتهاء فترة التخزين ، من النيتروجين السائل إلى جو الغرفة مباشرة دون المرور بمراحل وسطية من درجات الحرارة (عن Sakai & Noshiro ١٩٧٥) .

وقد قام Stanwood & Roos (١٩٧٩) بتخزين بذور ١٤ نوعا من الخضر فى النيتروجين السائل لفترات : أسبوع ، وشهر ، وستة شهور - وهى فى أكياس ورقية - وتراوح نسبة الرطوبة فى البذور المخزنة من ٥ - ٩٪ . وقد تبين من النتائج التى حصل عليها (جدول ٥ - ٢) أن تخزين البذور فى النيتروجين السائل ، ثم إعادة إخراجها منه لم يكن له أى تأثير ضار على نسبة الإنبات ، كما لم تتأثر نسبة إنبات البذور بعد تخزينها لمدة ستة شهور . وقد قام الباحثان - كذلك - بدراسة تأثير حفظ بذور الفاصوليا والبسلة ، والخس فى النيتروجين السائل لمدة أسبوع على قوة الإنبات Vigor ، ولم يجدوا أى تأثير للمعاملة على وزن السويقة الجنينية العليا epicotyl ، أو وزن البادرة بعد ثمانية أيام من بدء اختبار الإنبات .

ولمزيد من التفاصيل عن مشاكل حفظ الجيرمبلازم فى النيتروجين السائل .. يراجع Sakai & Nashiro (١٩٧٥) .

جنول (٥-٢) : تأثير تخزين بذور بعض محاصيل الخضر في النتروجين السائل على نسبة الإنبات .

الإنبات (%) بعد الحفظ في النتروجين السائل لمدة			نسبة الإنبات الأولية (%)	نسبة رطوبة البذور (%)	المحصول
٦ شهور	شهر	أسبوع			
-	١٠٠	-	١٠٠	٧	الفاصوليا
-	٩١	٩٦	٩٦	٦,٣	البنجر
٩٢	٩٥	٩٤	٩٨	٦,٢	الكرنب
٩٢	٨٩	٨٩	٩٠	٥	القاوون
-	-	٨٢	٨٧	٦,١	الجزر
٩٢	٩٥	٩٤	٩٥	٥,١	الخيار
٩٢	٩٤	٩٥	٩٥	٦,٢	الباذنجان
-	٩٩	٩٩	٩٩	٨,٠	الخس
٩٨	٩٩	٩٩	٩٨	٦,٢	البصل
-	٩٦	-	٩١	٧,٢	البسلة
٩٣	٩٥	٩١	٩٣	٦,٢	الفلفل
٧٩	٧٧	٧٣	٨٢	٦,٧	الكوسة
٩٣	٩٢	٩٦	٩١	٥,٣	الطماطم
-	-	٩٥	٩٤	٩	البطيخ

حفظ جيرميلازم النباتات الخضرية التكاثري

تتبع عدة طرق في حفظ جيرميلازم النباتات التي تتكاثر خضرية ، منها مايلي :

١- الإكثار الخضرى :

يتطلب حفظ الجيرميلازم - بطريق الإكثار الخضرى - إعادة زراعة السلالات الخضرية سنوياً بالنسبة للمحاصيل الحولية مثل البطاطس ، وكل عدة سنوات بالنسبة للمحاصيل المعمرة . وفضلاً عن أن هذه الطريقة تعد مكلفة للغاية ، وتتطلب جهداً كبيراً ، ومساحات كبيرة لتنفيذها .. فإن الجيرميلازم يتعرض للإصابة بالأمراض الفيروسية التي تلزمه بعد ذلك ، مما يتطلب جهوداً كبيرة إضافية : للمحافظة عليه .

٢- تخزين الطعوم :

يمكن تخزين الطعوم scions التى تؤخذ من السلالات الخضرية فى درجة حرارة ، تتراوح من الصفر إلى ٥° م ، ولكن يعاب على هذه الطريقة أن فترة التخزين لا تتوم سوى بضعة شهور ، أو سنوات قليلة .

٣- تخزين بنور السلالات الخضرية :

برغم أن البنور الحقيقية (الجنسية) لاتعطى - عند زراعتها - نباتات مشابهة للسلالات الخضرية التى أخذت منها .. إلا إنها تحتوى على جميع الجينات ، التى يظهر تأثيرها فى السلالة الخضرية . وتتبع هذه الطريقة - حالياً - فى حفظ سلالات بعض المحاصيل الخضرية التكاثر : مثل البطاطس . ولقد وجد Barker & Johnston (١٩٨٠) أن بنور البطاطس الحقيقية يمكن تخزينها لمدة ١٠ سنوات تحت الظروف العادية ، دون أن يحدث لها أى نقص فى نسبة - أو قوة - الإنبات ، كما ظلت نسبة إنبات البنور عالية بعد ١٥-٢٠ سنة من التخزين ، إلا أنها كانت أبطأ فى الإنبات ، وأقل فى قوة نمو البادرات . وكما هى الحال بالنسبة لبنور النباتات التى تتكاثر جنسياً .. فإن بنور السلالات الخضرية يمكن أن تُخزن فى النيتروجين السائل (Crytopreservation) لآمد بعيد .

وتتميز طريقة حفظ جيرمبلازم النباتات الخضرية التكاثر بتخزين البنور بسهولة وقلة تكلفتها ، كما تفيد فى التخلص من العدد الأكبر من الفيروسات التى تصيبها : إذ لاتنتقل بطريق البنور سوى نسبة قليلة جداً من الفيروسات ؛ بالإضافة إلى سهولة نقل الجيرمبلازم بهذه الطريقة من دولة إلى أخرى (Foldo ١٩٨٧) .

٤- تخزين حبوب اللقاح :

يمكن تخزين حبوب لقاح السلالات الخضرية ؛ إما فى درجات الحرارة المنخفضة ، وإما فى النيتروجين السائل . ويعاب على الاعتماد على حبوب اللقاح - فى حفظ الجيرمبلازم - أنها لاتمثل سوى نصف الجينات التى يحملها الفرد ، فهى لابد أن تستخدم فى تلقيح نباتات أخرى من نفس النوع لدى إخراجها من المخازن ، نظراً لعدم توفر الطور الجاميطى المؤنث لنفس السلالة حينئذ .

٥- تخزين مزارع القمة الميرستيمية :

تتميز طريقة حفظ جيرمبلازم السلالات الخضرية - على صورة مزارع أنسجة - بإمكان تخزين أعداد ضخمة من السلالات فى حيز بسيط ، مقارنة بالزراعة الحقلية . فيمكن - على سبيل المثال - تخزين ٨٠٠ سلالة عنب ؛ بواقع ٦ مكررات لكل منها فى مساحة ٢م^٢ ، مقارنة بالحاجة إلى نحو هكتار من الأرض لزراعة نفس العدد من النباتات . ويعاب على هذه الطريقة أن إنتاج مزارع الأنسجة يتطلب وقتاً طويلاً ، كما أن زراعة النباتات بعد ذلك تتطلب وقتاً طويلاً أيضاً حتى تزهر وتثمر . ولاتخفى علينا الأخطار التى تواجه مجموعات الجيرمبلازم المخزنة من جراء الكوارث الطبيعية ، أو انقطاع التيار الكهربائى أو الإصابة ببعض آفات المزارع ، مثل العناكب mites (Brooks & Barton ١٩٨٣) .

وتعد مزارع القمة النامية الميرستيمية أفضل مزارع الأنسجة لحفظ جيرمبلازم السلالات الخضرية . وتكون النباتات المتحصل عليها - بهذه الطريقة - صغيرة جداً ، وأوراقها دقيقة ، وسيقانها رفيعة للغاية . وبرغم أن نموها يكون سريعاً فى البداية إلا أنه يصبح بطيئاً بمجرد استنفاد العناصر المغذية فى بيئة الآجار ، وتبقى النباتات حية على هذه الصورة - دون نمو يذكر - لعدة شهور . ويمكن استمرار حفظها فى أنابيب الاختبار على بيئة مغذية لمدد غير محدودة ، بتجديد المزارع كل ٦ أشهر إلى ١٢ شهراً ؛ ويجرى ذلك بقطع أجزاء صغيرة من المزارع ، تحتوى كل منها على عقدة من الساق ، والورقة التى توجد عندها ، ثم نقلها إلى مزارع جديدة .

تتبع طريقة مزارع القمة الميرستيمية على نطاق واسع لإكثار وحفظ سلالات العنب . تزرع القمة النامية لساق العنب فى أنابيب اختبار تتوافر بها بيئة مغذية ، تحتوى على تركيز مرتفع من أيون البوتاسيوم ، وتركيز منخفض (١ . ٠ جزءاً فى المليون) من منظم النمو إندول حامض الخليك IAA . تحفظ الأنابيب فى حرارة ٢٠°م ، وتعرض لإضاءة ضعيفة (٣٠٠ lux) لمدة ١٢ ساعة يومياً . تنمو الساق ، وتتكون الجنور فى خلال ٢٠ يوماً ، ويعقب ذلك نقل النباتات الصغيرة Plantlets إلى بيئة تحتوى على تركيز أقل من أيون البوتاسيوم (مثل محلول نوب Knop المغذى) ، وخالية من الأوكسين ، حيث يصل طولها إلى نحو ١٠ سم فى حوالى ١٠ شهور ، ويمكن إكثار هذه النباتات بعد ذلك بالعقل

الساقية ، حيث تؤخذ النباتات الصغيرة من أنبوبة الاختبار ، وتقطع إلى أجزاء صغيرة يحتوى كل منها على عقدة وورقة ، وتنقل هذه الأجزاء - بعد ذلك - إلى بيئة جديدة ، فى درجة حرارة ٢٠° م ؛ حيث تنتج كل منها نباتاً جديداً فى غضون ٥٠ يوماً ، ثم تنتقل - بعد ذلك - إلى حرارة ٩° م ؛ حيث يقل معدل نموها تدريجياً إلى أن يتوقف ، وبرغم توقف نمو النباتات إلا أنها تبقى حية . ولو أخذت منها عقل بعد فترات طويلة تصل إلى ٢٩٠ يوماً ، ووضعت فى بيئة جديدة فى حرارة ٢٠° م .. فإنها تبدأ فى النمو فى الحال ، وهوما يعنى إمكان حفظ النباتات بهذه الطريقة ، مع إعادة زراعتها فى بيئة جديدة سنوياً .

تتميز مزارع القمة الميرستيمية بإمكان استخدامها فى الإكثار الخضرى ، وإنتاج أعداد هائلة من النباتات فى فترة قصيرة ، فيمكن - فى حالة مزارع العنب - الحصول على ٥ أجزاء cuttings من النباتات الصغيرة شهرياً ، وهذا يعنى أنه يمكن إنتاج أكثر من ١٠ مليون نبات صغير من قمة ميرستيمية واحدة فى السنة (تسمى السلالات المنتجة بهذه الطريقة mericlones) . وفضلاً على أن مزارع القمة الميرستيمية تكون خالية من الإصابات الفيروسية .. فإن بقاءها فى بيئة معقمة يحميها من التعرض للإصابة بالفيروسات أو الآفات الأخرى . وتعد هذه المزارع مناسبة لحفظ جيرمبلازم النباتات التى لا تتحمل بنورها التجفيف ، وهى التى لا يمكن أن تخزن بنورها . كما تتوفر النباتات الصغيرة طوال العام ، ويمكن نقلها من دولة إلى أخرى دون مشاكل فى الحجر الزراعى .

هذا .. ويلاحظ أن معظم النباتات الصغيرة تعطى - عند زراعة ميرستيمها القمى فى بيئات مغذية - نموات تشبه الكالوس Callus-like outgrowth ، أو سيقاناً مشوهة ، وصفراء ، ولا يحدث التميز differentiation إلا عند توفر بعض المواد فى البيئة ، وأهمها حامض الجبريلليك بتركيز ١ ، ٠ جزءاً فى المليون وأيون البوتاسيوم بتركيز مرتفع يصل إلى ١٠ مللى مكافئ / لتر ؛ مقارنة بتركيز ٠ , ٨ مللى مكافئ / لتر فى بيئة White ، و ٢ , ١ مللى مكافئ / لتر فى بيئة Gautkeret ، وهى بيئات تستعمل فى مزارع الأنسجة الأخرى (Morel ١٩٧٥) .

وقد تمكن العلماء - بنجاح - من حفظ مزارع القمة الميرستيمية لبعض النباتات فى النيتروجين السائل على درجة - ١٩٦° م (Cryptopreservation) ؛ فمثلاً .. تمكن Reed & Lagerstedt (١٩٨٧) من حفظ القمم الميرستيمية لخمس سلالات من الـ *Rubus* ،

تنتمى لأربعة أنواع ؛ بتبريدها ببطء ؛ بمعدل ٨ و ٠°م كل دقيقة إلى أن وصلت حرارتها إلى - ٤٠°م ، ثم بردت بسرعة - بعد ذلك - حتى - ١٩٦°م في وجود مواد حامية cryptoprotectants . وقد أمكن - بعد ذلك تبريدها بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة ، واستعادت القمم الميرستيمية نموها في بيئة أجار بعد ذلك ، إما بشكل منتظم ، وإما في صورة كالوس ، وقد كانت أفضل المواد الحامية خليطاً من البولييثيلين جليكول ، والجلوكوز ، والد dimethylsulfoxide . ولزيد من التفاصيل عن تخزين جيرمبلازم السلالات الخضرية .. يراجع Henshaw وآخرون (١٩٨٠) بخصوص تخزين مزارع أنسجة البطاطس ، و Withers (١٩٨٠ ، ١٩٨٥) بالنسبة لحفظ مزارع الخلايا والأنسجة في النيتروجين السائل ، و Brooks & Barton (١٩٨٣) ، و Towill (١٩٨٨) .

التغيرات الوراثية المصاحبة لتخزين الجيرمبلازم

يصاحب تخزين الجيرمبلازم - عادة - نوعان من التغيرات الوراثية ، هما : التغيرات الوراثية التي تحدث بشكل تلقائي ؛ مثل الطفرات العارلية ، والتحورات الكروموسومية ، والتغيرات التي تحدث في الجينات gene pool ؛ نتيجة الانحراف الوراثي genetic drift وما قد ينتج عنه من تغيرات في نسب الجينات ، أو فقدان بعضها . هذا .. ويحدث استبعاد تلقائي لحالات التحورات الكروموسومية ؛ لفشل الانقسام الطبيعي في الخلايا التي تحدث فيها تلك التحورات ، وبذا .. فإن النباتات التي توجد فيها هذه التحورات لا تشترك في إنتاج البذور للجيل التالي ، أما الطفرات العارلية .. فإنها تعد مفيدة ، وتسهم في زيادة الاختلافات الوراثية في الجيرمبلازم . أما الانحرافات الوراثية ، واستعمال عينات صغيرة من البذور في إكثار السلالات .. فإنها تسهم بشكل خطير في تغيير نسب الجينات في العشيرة ، وهو أمر يجب تجنبه تماماً . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Roos (١٩٨٨) .

مصادر إضافية

سبقت الإشارة إلى عديد من المصادر التي تتناول شتى جوانب عملية استكشاف الجيرمبلازم وجمعه ، وتقييمه ، وتوثيقه ، وحفظه . وبالإضافة إلى ما تقدم .. فإن المراجع التالية تتناول الموضوع بشكل عام ، وتغطي كافة جوانبه ، ويفيد الرجوع إليها في معرفة

مزید من المعلومات ، وی : Frankel & Bennett (۱۹۷۰) ، و Creech & Reitz ،
(۱۹۷۱) ، و Frankel & Hawkes (۱۹۷۵) ، و Hawkes (۱۹۸۱ ، و ۱۹۸۳) ،
و Amer Soc. Hort . Sci. (۱۹۸۸) .

القسم الثاني

طرق التربية

الفصل السادس

التحسين الوراثى بالانتخاب

تعتبر عملية الانتخاب selection هى الركيزة الأساسية للتحسين فى أى برنامج للتربية ، وتعتمد جميع طرق التربية بالانتخاب المباشر على توفر الاختلافات الوراثية بين أفراد العشيرة النباتية بصورة طبيعية ؛ وكل ما يفعله المربي هو انتخاب التراكيب الوراثية المناسبة التى تتوفر فيها الصفات المرغوبة وإكثارها ؛ لتصبح صنفاً جديداً قائماً بذاته . أما طرق التربية التى تعتمد على التهجين مع الانتخاب .. فإن المربي يسعى بنفسه لتأمين الاختلافات التى تتكون كانعزالات وراثية عقب قيامه بالتهجين بين أفراد تختلف - وراثياً - عن بعضها البعض .

انتخاب الصفات البسيطة فى العشائر الذاتية التلقيح

تعتبر عملية انتخاب الصفات البسيطة فى عشائر النباتات الذاتية التلقيح سهلة وميسورة . فسواء أكانت الصفات المرغوبة سائدة ، أم متنحية .. فإنها توجد - دائماً - بحالة أصيلة فى عشائر النباتات الذاتية التلقيح ؛ ويكون من السهل تمييز الأفراد الحاملة للجينات التى تتحكم فى هذه الصفات ، خاصة عندما تكون درجات توريثها مرتفعة ، وهو ما تتميز به غالبية الصفات البسيطة .

ويؤدى انتخاب الأفراد الحاملة للصفات المرغوبة إلى تكوين عشائر جديدة محسنة . وتكون مهمة المربي - بعد ذلك - مقارنة العشائر الجديدة بالعشيرة الأصلية ، وبالأصناف

التجارية الشائعة في الزراعة ؛ للتأكد من تفوق إحداها أو بعضها قبل إطلاق زراعتها كصنف جديد .

تطبيق قانون هاردي - فينبرج على الانتخاب فى العشائر الخلطية التلقيح

يؤثر الانتخاب لصفة ما على توازن هاردي - فينبرج فى عشائر النباتات الخلطية التلقيح ، وذلك على النحو التالى :

١- حالة السيادة التامة مع الانتخاب ضد الأفراد المتنحية الأصلية :

سبقت مناقشة تأثير الانتخاب ضد صفة بسيطة متنحية فى نسب التراكيب الوراثية المختلفة فى عشائر النباتات الخلطية التلقيح (يراجع لذلك موضوع قانون هاردي - فينبرج فى الفصل الثالث) ، ونبين فيما يلى تأثير عملية الانتخاب على توازن هاردي - فينبرج .

إذا كانت النسب الأولية للأليلين A_1 ، و A_2 (وهما أليلان للجين A) فى العشيرة هى p ، و q على التوالى ، وكانت A_1 سائدة على A_2 ، وكان معامل الانتخاب coefficient of selection ضد الأفراد المتنحية الأصلية A_2A_2 هو s ، فإنه يمكن الحصول على مساهمة كل تركيب وراثى - بعد إجراء عملية الانتخاب- فى إنتاج الجاميطات اللازمة لتكوين الجيل التالى بضرب النسبة الأولية لكل تركيب وراثى فى قيمة التوافق fitness الخاصة به بعد الانتخاب ؛ كما يلى :

التركيب الوراثى

المجموع	A_2A_2	A_1A_2	A_1A_1	
1	q^2	$2pq$	p^2	النسبة الأولية
	$1-s$	1	1	قيمة التوافق fitness
$1 - sq^2$	$q^2 (1-s)$	$2pq$	p^2	المساهمة النسبية فى إنتاج الجاميطات

يلاحظ أن مجموع مساهمات التراكيب الوراثية فى إنتاج الجاميطات اللازمة لتكوين الجيل التالى لايساوى الواحد الصحيح ؛ بسبب حدوث فقدان قدره sq^2 ؛ نتيجة لإجراء عملية الانتخاب التى استبعدت فيها الأفراد المتنحية الأصلية ؛ وعليه .. فإنه يحصل على

نسبة الأليل A_2 في الجيل التالي (بعد إجراء عملية الانتخاب ضد الأفراد ذات التركيب الوراثي A_2A_2 بقسمة حاصل جمع مساهمة التركيب الوراثي A_2A_2 ونصف مساهمة التركيب الوراثي A_1A_2 على المجموع الجديد لمساهمات مختلف التراكيب الوراثية في إنتاج الجاميطات (وهو $1-sq^2$) كما يلي :

$$q_1 = \frac{q^2 (1-s) + pq}{1-sq^2}$$

وبحسب التغير في نسبة الأليل q (أو Δq) بعد جيل واحد من الانتخاب كما يلي:

$$\Delta q = q_1 - q$$

$$\begin{aligned} &= \frac{q^2 (1-s) + pq}{1-sq^2} - q \\ &= - \frac{sq^2 (1-q)}{1-sq^2} \end{aligned}$$

ويعنى ذلك أن تأثير الانتخاب على نسب الجينات لا يعتمد على شدة الانتخاب (s) فقط ، وإنما يعتمد -كذلك- على النسبة الأولية للجينات .

٢- حالة السيادة التامة مع الانتخاب ضد الأفراد السائدة :

يعنى إجراء الانتخاب ضد الأفراد السائدة أن قيمة التوافق تصبح $1-s$ لكل من التركيبين الوراثيين A_1A_1 ، و A_1A_2 ، وعندما يكون الانتخاب تاماً -أى عندما تكون قيمة (s) واحداً صحيحاً- فإن التغير في نسبة الأليل q (أو Δq) بعد جيل واحد من الانتخاب يصبح كما يلي :

$$\Delta q = 1 - q$$

أى إنه لو سمح للأفراد ذات التركيب الوراثي المتنحي الأصل فقط بالتكاثر .. فإن نسبة الأليل المتنحي تصبح واحداً صحيحاً بعد جيل واحد من الانتخاب .

٣- حالة السيادة غير التامة :

عندما يكون الفرد الخليط A_1A_2 وسطاً بين الأفراد الأصلية .. فإن قيمة التوافق تصبح $1 - \frac{1}{2}s$ للأفراد نوى التركيب الوراثي A_1A_2 ، و $1-s$ للأفراد التي يجرى الانتخاب ضدها ، بينما تبقى قيمة التوافق واحداً صحيحاً بالنسبة للأفراد التي تحمل التركيب الوراثي المرغوب .

٤- حالة الانتخاب لصالح الأفراد الخليطة :

تنتخب الأفراد الخليطة A_1A_2 في حالات السيادة الفائقة Overdominance . وبينما تكون قمية التوافق واحداً صحيحاً بالنسبة للأفراد الخليطة فإنها تصبح $(1-s_1)$ ، و $(1-s_2)$ للتركيبين الأصليين A_1A_1 ، و A_2A_2 .

وبين جدول (٦-١) التغير في نسبة الأليل q (أو Δq) بعد جيل واحد من الانتخاب في حالات السيادة المختلفة التي سبق بيانها (عن Falconer ١٩٨١) .

جدول (٦-١) : التغير في نسبة الأليل q (أو Δq) بعد جيل واحد من الانتخاب في حالات السيادة المختلفة .

حالة السيادة	الآليات أو التراكيب الوراثية المستبعدة	التراكيب الوراثية ونسبتها الأولية	التغير في نسبة الأليل A2 (أو Δq)
		A2A2 q ²	A1A2 2pq
		A1A1 p ²	
قيمة التوافق			
لا توجد سيادة	A2	1 - s	1 - $\frac{1}{2}$ s
السيادة تامة	A2A2	1 - s	1
السيادة تامة	A1	1	1 - s
يوجد تفوق	A2A2 و A1A1	1 - s ₂	1 - s ₁

(١) يمكن إعمال المقام إذا كانت قيمة (s) صغيرة ، ويعتبر البسط - حينئذ - مثلاً Δq .

تأثير النسب الأولية للآليات فى كفاءة عملية الانتخاب

يوضح شكل (٦-١) مدى التغير فى نسبة الآليل مع الانتخاب (Δq) ، عند اختلاف نسبته الأولية ، مع معامل انتخاب (s) قيمته ٠,٢ ، وهى القيمة الشائعة - غالباً - بالنسبة للصفات الكمية . يمثل المنحنيان العلويان العلاقة فى حالة غياب السيادة ، بينما يمثلها المنحنيان السفليان فى حالة السيادة التامة . وبينما تعنى علامة (+) أن الانتخاب لصالح الآليل ذى النسبة الأولية q .. فإن علامة (-) تعنى أن الانتخاب ضد هذا الآليل .


يتضح من الشكل ما يلى :

- ١- يكون الانتخاب أكثر فاعلية عندما تكون نسبة الآليات وسطية ، وتقل كفاءته تدريجياً - بزيادة قيمة q أو نقصها .
- ٢- يكون الانتخاب قليل الفاعلية ضد الآليات المتنحية ، عندما تكون نسبتها منخفضة فى العشيرة .


ويمكن التعبير عن التغير فى نسبة الآليات مع الانتخاب ؛ ببيان العلاقة بين نسبة الآليات وأجيال الانتخاب كما فى شكل (٦-٢) ، وهو الذى يمكن إعداده من شكل (٦-١) ، الذى بنى على أساس أن معامل الانتخاب s قيمته ٠,٢ . ويمثل الشكلان العلويان التغير فى نسبة الآليل (q) مع الانتخاب ، بينما يمثل الشكلان السفليان التغير فى نسبة التركيب الوراثى الأصيل (q^2) مع الانتخاب . وبينما تعنى العلامة (+) أن الانتخاب لصالح الآليل ذى النسبة الأولية (q) .. فإن علامة (-) تعنى أن الانتخاب ضد هذا الآليل ؛ لذا .. فإن قيمة q أو (q^2) تزداد فى الحالة الأولى وتقل فى الحالة الثانية .

يتضح من الشكل أن التغير فى نسبة الآليات ، أو فى نسبة التراكيب الوراثية .. يكون بطيئاً للغاية فى بداية عملية الانتخاب عندما تكون هذه النسب منخفضة جداً أو مرتفعة جداً ابتداءً ، ولكن معدل التغير يزداد فى الحالات الوسطية لهذه النسب ، ثم ينخفض مرة أخرى بالقرب من نهاية عملية الانتخاب .

وكما سبق بيانه فى جدول (٦-١) .. فإنه يمكن الاستغناء عن المقام فى معادلات حساب قيمة Δq حينما تكون قيمة s أو q صغيرة جداً نظراً لأنه يكون قريباً جداً من



شكل (٦ - ١) : العلاقة بين النسبة الأولية للأكيل (q) ، والتغير في نسبته (Δq) عند الانتخاب مع معامل انتخاب (s) تبلغ قيمة ٠,٢ . يراجع المتن للتفاصيل .



شكل (٦ - ٢) : التغير في نسبة الأليل (q) وفي نسبة التركيب الوراثي المتنحي الأصيل (q^2) مع الانتخاب مع معامل انتخاب (s) تبلغ قيمته ٠,٢. يراجع المتن للتفاصيل (عن Faconer ١٩٨١).

الواحد الصحيح ، وتحسب قيمة Δq حينئذ بالمعادلات التالية :

١- في حالة غياب السيادة تصبح المعادلة :

$$\Delta q = \pm \frac{1}{2} s q (1-q)$$

٢- في حالة السيادة التامة تصبح المعادلة :

$$\Delta q = \pm s q^2 (1-q)$$

عدد أجيال الانتخاب اللازمة لإحداث التغيير المطلوب

يُطرح هذا السؤال -غالباً- في برامج التربية : ما عدد الأجيال اللازمة من الانتخاب لإحداث التغيير المطلوب في نسبة الأليل غير المرغوب في العشيرة ؟ وتتوقف الإجابة على هذا السؤال على أربعة أمور ، هي :

١- حالة السيادة :

يتم اختيار المعادلة المناسبة لكل حالة من حالات السيادة - كما سبق بيانه - ففي حالة استبعاد النباتات المتنحية الأصلية .. تكون المعادلة المناسبة كما يلي :

$$q_1 = \frac{q^2 (1-s) + pq}{1 - sq^2}$$

وهي المعادلة التي تحدد نسبة الأليل المتنحي بعد جيل واحد من الانتخاب ضده .

٢- شدة الانتخاب :

يتوقف عدد الأجيال اللازمة لإحداث التغيير المطلوب على شدة الانتخاب ، وهي التي تتوقف على درجة توريث الصفة ؛ فلو فرض أن استبعدت جميع النباتات المتنحية الأصلية (أي كانت $s=1$) - كما هي الحال في حالات الانتخاب الطبيعي ضد الطفرات المتنحية المميتة ، وكما يحدث في برامج التربية عند الانتخاب ضد الصفات المتنحية غير المرغوبة - فإن المعادلة السابقة تصبح كما يلي :

$$q_1 = \frac{q}{1+q}$$

وباستعمال الرموز q_0 و q_1 و q_2 و q_t لنسبة الأليل المتنحي بعد صفر ، و ١ و ٢ ،
و t جيل من الانتخاب ضده .. فإنه يمكن التوصل إلى المعادلات التالية :

$$q_1 = \frac{q_0}{1+q_0}$$

$$q_2 = \frac{q_1}{1+q_1} = \frac{q_0}{1+2q_0}$$

$$q_t = \frac{q_0}{1+tq_0}$$

ويصبح - بالتالى - عدد الأجيال (t) اللازمة لتغيير نسبة الأليل من q_0 إلى q_t كما
يلى (عن Falconer ١٩٨١) :

$$t = \frac{q_0 - q_t}{q_0 q_t}$$

$$= \frac{1}{q_t} - \frac{1}{q_0}$$

٣- النسبة الأصلية للأليل (q_0) :

يكون التغير فى نسب الأليلات مع الانتخاب منخفضا للغاية ، عندما تكون نسبة الأليل
منخفضة أو مرتفعة أصلاً كما سبق أن أوضحنا ؛ ففى حالة استبعاد جميع النباتات
المتنحية الأصلية (كما فى المثال السابق) .. فإنه يلزم ١٢ جيلاً لزيادة نسبة الأليل السائد
من ٠,٩ إلى ٠,٩٥ ، بينما يلزم ٢٢ جيلاً أخرى لزيادة نسبته من ٠,٩٥ إلى ٠,٩٨ ، وإذا
فرض أن معامل الانتخاب s كان ٠,٢ وهو ما يحدث عندما تكون درجة التوريث
منخفضة .. فإنه يلزم فى هذه الحالة ٥٤ جيلاً لزيادة نسبة الأليل السائد من ٠,٩ إلى
٠,٩٥ ، و ١٥٥ جيلاً أخرى لزيادة نسبته من ٠,٩٥ إلى ٠,٩٨ ؛ هذا بفرض عدم ظهور
الأليل غير المرغوب كطفرة أثناء إجراء عملية الانتخاب .

٤- عدد الصفات التى ينتخب لها المربي :

يؤثر عدد الصفات التى ينتخب لها المربي على شدة الانتخاب الممكنة ؛ حيث تقل شدة

الانتخاب مع كل زيادة فى عدد الصفات . فلو أن المطلوب هو انتخاب أفضل ٥٪ من النباتات فى عشيرة مكونة من ١٠٠٠ نبات مثلاً .. لأمكن - فعلاً - إجراء الانتخاب على أفضل ٥٪ من النباتات فى هذه الصفة . ولكن شدة الانتخاب تخف حدتها مع زيادة عدد الصفات التى ينتخب لها المرء ؛ حيث يلزم - حينئذ - إجراء الانتخاب على أفضل ٢٢٪ ، و ٣٧٪ ، و ٥٥٪ ، و ٧٤٪ من النباتات عند الانتخاب لصفتين ، وثلاث ، وخمس ، وعشر صفات على التوالي ، بفرض تساوى شدة الانتخاب بالنسبة لجميع الصفات المنتخبة ؛ وذلك حسب المعادلة التالية :

$$\sqrt[n]{100 \times s} = \text{النسبة المئوية لأفضل النباتات التى يجب الإبقاء عليها}$$

حيث إن :

ن = عدد الصفات المنتخبة .

س = نسبة الأفراد التى يجب الإبقاء عليها للمحافظة على حجم العشيرة (٥٪ فى المثال السابق) (عن Allard ١٩٦٤) .

تأثير الطفرات على توازن هاردي - فينبرج

تؤثر الطفرات على التوازن الذى تصل إليه الأليلات فى العشيرة بعد تحسينها بالانتخاب، ولكن يتوقف مدى هذا التأثير على ما إذا كانت هذه الطفرات نادرة الحدوث ، أم أنه يتكرر حدوثها باستمرار ؛ فالطفرات النادرة الحدوث non - recurrent mutations لا يكون لها تأثير يذكر على نسبة الأليلات فى العشيرة ؛ لأن فرصتها فى البقاء تكون ضئيلة للغاية ، إلا إذا كانت قدرتها على البقاء أكبر من الصور الأخرى (الأليلات الأخرى) لنفس الجين ؛ فلو أن العشيرة كلها كانت ذات تركيب وراثى A_1A_1 ، وحدثت طفرة فى أحد الأفراد إلى A_2 .. فإن فرصة الفرد المظفر A_1A_2 فى التزاوج تكون ضئيلة جداً ؛ وإن لم يأخذ فرصته .. فإن الطفرة تنقرص ، وتعود العشيرة برمتها إلى التركيب الوراثى A_1A_1 كما كانت ؛ لذا .. فإن هذه الطفرات لاتحدث أى تغير فى نسب الأليلات فى العشيرة ، إلا إذا كان الانتخاب لصالحها .

ويختلف الأمر مع الطفرات التى يتكرر حدوثها recurrent mutations ؛ لأنها لاتفقد أبداً من العشيرة ؛ بسبب تكرر حدوثها بانتظام ؛ فإذا فرض وجود أليل A_1 ، وأنه يطفر

بانتظام إلى الأليل A_2 ؛ بمعدل قدره "u" في كل جيل ، وإذا كانت نسبة A_1 في جيل ما .. هي p_0 فإن نسبة الأليل A_2 في الجيل التالي تكون up_0 ، وتصبح نسبة الأليل A_1 كما يلي :

$$A_1 = p_0 - up_0$$

ويكون التغير في نسبة الجين قدره : $(- up_0)$.

أما إذا حدثت الطفرة في كلا الاتجاهين ، وبفرض وجود أليلين فقط للجين هما A_1 ، A_2 ، وأن نسبتيهما الأولية p_0 ، و q_0 على التوالي ، وأن A_1 يطفر إلى A_2 ؛ بمعدل قدره u في كل جيل ، بينما يطفر A_2 إلى A_1 بمعدل قدره v في كل جيل .. فإن نسبة الأليل A_2 تزيد في كل جيل بمقدار up_0 ؛ بسبب الطفرة في هذا الاتجاه ، وتقل بمقدار vq_0 بسبب الطفرة في الاتجاه الآخر ؛ وبذا .. يصبح التغير في نسبة الأليلات (Δq) بعد جيل واحد كما يلي :

$$\Delta q = up_0 - vq_0$$

يستمر هذا التغير في نسبة الأليلات إلى أن يصل الأليلان إلى حالة توازن بينهما ، وهي التي يتساوى عندها up مع vq ؛ ذلك لأن زيادة نسبة أحد الأليلين - تدريجياً - بسبب الطفرات .. تعني تبقى نسبة أقل من الأليل الآخر الذي تحدث فيه الطفرة في هذا الاتجاه ؛ في الوقت الذي تتوفر فيه نسبة أعلى من الأليل ، الذي تحدث فيه طفرة في الاتجاه المضاد . ونجد عند التوازن أن Δq تساوى صفراً .

هذا .. وتتراوح نسبة الطفرات في الطبيعة -بوجه عام- من 10^{-8} إلى 10^{-4} في الجيل الواحد . وتعد هذه النسبة ضئيلة جداً . ورغم أنها قد تؤثر في تطور الأنواع على المدى البعيد .. إلا أنها لا تؤثر في نسبة الأليلات بشكل ملحوظ يمكن قياسه .

وتدل الحالات المشاهدة على أن معدل حدوث الطفرات من الطرز البرية wild types إلى الطرز المطفرة mutant types يكون 10^{-8} أضعاف المعدل في الاتجاه العكسي ؛ وبذا .. فإن نسبة الأليلين عند وصولهما إلى حالة التوازن تكون 10^{-8} للطرز البرية ، و 10^{-4} للطرز المطفرة ؛ أي إن الطفرات تكون هي الأليلات الشائعة في العشائر الطبيعية . كما تجدر الإشارة إلى أن أي تغير في معدل حدوث الطفرات - مثل زيادة جرعة التعرض للإشعاعات - لا يؤثر في حالة التوازن مادام التغير واحداً في كلا اتجاهي الطفرات .

تأثير الهجرة إلى العشيرة فى توازن هاردي - فينبرج

تؤثر الهجرة migration إلى العشيرة على حالة التوازن الذى تصل إليه الآليات فى العشيرة بعد تحسينها ، ويتوقف مدى هذا التأثير على معدل الهجرة ، وعلى الفرق بين نسبة الأليل فى الأفراد المهاجرة والأفراد الأصلية .

فلو فرض أن كانت نسبة الأفراد المهاجرة إلى عشيرة كبيرة فى الحجم هى m ونسبة الأفراد الأصلية $(1-m)$ ، وأن نسبة أليل ما هى q_m بين الأفراد المهاجرة ، و q_0 بين الأفراد الأصلية ، فإن نسبة الأليل فى العشيرة المختلطة (q_1) تصبح كما يلى :

$$q_1 = mq_m + (1-m) q_0$$

$$= m (q_m - q_0) + q_0$$

ويصبح التغير فى نسبة الأليل (Δq) بعد جيل واحد من الهجرة كما يلى :

$$\Delta q = q_1 - q_0$$

$$= m (q_m - q_0)$$

الانتخاب فى الصفات الكمية

يتوقف مدى التقدم الذى يمكن إحرازه عند الانتخاب للصفات الكمية على العوامل التالية :

١- مدى توفر الاختلافات الوراثية .

٢- درجة توريث الصفة .

٣- شدة الانتخاب للصفة .

ويعبر عن التقدم الوراثى فى كل دورة من دورات الانتخاب (G_c) بالمعادلة التالية :

$$G_c = h^2 D$$

حيث تمثل :

h^2 : درجة التوريث على النطاق الضيق .

D : الفارق الانتخابى Selection Differential ، وهو الفرق بين متوسط الأفراد

المنتخبة من العشيرة والمتوسط العام للعشيرة فى الصفة المنتخبة .

ويحسب التقدم الوراثى السنوى (G_y) بقسمة التقدم الوراثى لكل دورة انتخاب على عدد السنوات التى تستغرقها كل دورة (y) كما يلى :

$$G_y = \frac{G_c}{y}$$

ويمكن التعبير عن الفارق الانتخابى (D) كما يلى :

$$D = k \sqrt{V_{Ph}}$$

حيث تمثل :

k : شدة الانتخاب Selection Intensity ، وهى الفارق الانتخابى معبراً عنه بوحدات قياسية .

V_{Ph} : تباين الشكل المظهرى .

ويمكن - بالتالى - إعادة صياغة معادلة التقدم الوراثى لكل دورة من دورات الانتخاب ، لتصبح كما يلى :

$$G_c = h^2 D = \frac{V_A}{V_{Ph}} k \sqrt{V_{Ph}} = \frac{k V_A}{\sqrt{V_{Ph}}}$$

حيث يمثل V_A التباين الإضافى .

ويشتمل تباين الشكل المظهرى V_{Ph} على الخطأ التجريبى (V_e) ، وتباين التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة (V_{ge}) ، وتباين التركيب الوراثى (V_g) .

ويمكن - بالتالى - تمثيل الجذر التربيعى لتباين الشكل المظهرى بالمعادلة التالية :

$$\sqrt{V_{Ph}} = \sqrt{\frac{V_e}{rt} + \frac{V_{ge}}{t} + V_g}$$

حيث تمثل r عدد المكررات ، و t عدداً للبيئات التى اختبرت فيها التراكيب الوراثية . ويعنى بالتراكيب الوراثية النباتات المفردة ، أو أنسالها . وتمثل البيئة بالمواقع والسنوات التى أجريت فيها الاختبارات .

ويمكن تقسيم الخطأ التجريبي إلى مكونين ، هما : التباين بين النباتات بكل وحدة تجريبية (V_w) ، والتباين من وحدة تجريبية لأخرى (V) كما يلي :

$$V_e = \frac{V_w}{n} V$$

حيث تمثل n عدد النباتات في كل وحدة تجريبية .

ويتضمن التباين بين النباتات - في كل وحدة تجريبية - الاختلافات التي تعود إلى تأثير البيئة ، وتلك التي ترجع إلى الاختلافات الوراثية بين النباتات . وتشتمل التأثيرات البيئية على الاختلافات في خصوبة التربة ، والرطوبة الأرضية ، وأى عامل آخر ، يمكن أن يسبب اختلافات مظهرية بين النباتات المتماثلة في تركيبها الوراثي . أما الاختلافات الوراثية بين الأفراد في الوحدة التجريبية الواحدة .. فترجع إلى الانعزالات الوراثية التي تظهر في نسل السلالة أو العائلة المختبرة . ويمكن - من ثم - تقسيم التباين بين النباتات داخل الوحدة التجريبية (V_w) إلى تباين بينى (V_u) ، وتباين وراثى (V_{wg}) كما يلي :

$$V_w = V_u + V_{wg}$$

وعليه .. فإنه يمكن إعادة صياغة معادلة التقدم الوراثى السنوى (G_y) لتصبح كما يلي :

$$\begin{aligned} G_y &= \frac{kV_A}{yV_{Ph}} \\ &= \frac{kV_A}{y \sqrt{(V_e / rt) + (V_{ge} / t) + V_g}} \\ &= \frac{kV_A}{y \sqrt{\{[(V_w / n) + V] / rt\} + (V_{ge} / t) + V_g}} \\ &= \frac{kV_A}{y \sqrt{\{([V_u + V_{wg}) / n] + V\} / rt) + (V_{ge} / t) + V_g}} \end{aligned}$$

أما التقدم الوراثى الذى يحدث فى كل دورة من دورات الانتخاب (G_c) .. فإنه يتوقف على طريقة التربية المتبعة ، والتى تتوقف فاعلية الانتخاب فى كل منها على مدى الاستفادة من التأثير الإضافى للجين . وبينما تناسب الطرق الآتى بيانها النباتات الخلطية التلقيح - وهى التى يحدث فيها التزاوج عشوائيا - فإنها يمكن أن تستعمل مع النباتات الذاتية التلقيح ، إذا ما أجرى لها تلقيح عشوائى صناعى فيما بينها . ويتأثر مقدار التباين الإضافى بمدى التحكم الواقع فى اختيار الآباء المستعملة فى إنتاج الأجيال التالية . وتعرف العلاقة بين النبات أو البذرة المستعملة فى التعرف على التراكيب الوراثية المتفوقة (وحدة الانتخاب) ، وبين النبات أو البذرة المستعملة لدراسة الانعزال (وحدة الانعزال) باسم تحكم الآباء Parent Control ، وهو الذى يرمز له بالرمز (C) ، ويعطى القيم التالية :

- ١- تأخذ c القيمة ٥٠ ، عندما تكون وحدة الانتخاب ماثلة لوحدة الانعزال ، وحينما لانتخب سوى الأمهات ؛ وهو ما يحدث -مثلاً- حينما تلقح نباتات الأمهات المنتخبة بنباتات آباء منتخبة وغير منتخبة -على حد سواء- مثلاً فى طريقة التربية بالانتخاب المتكرر للشكل المظهرى ، وطريقة الكوز للخط عندما يجرى الانتخاب بعد التلقيح .
- ٢- تأخذ c القيمة ١٠ ، حينما تكون وحدة الانتخاب ماثلة لوحدة الانعزال ، مع انتخاب كل من الأمهات والآباء ، مثلاً فى طريقة التربية بالانتخاب المتكرر للشكل المظهرى قبل التلقيح ، وطريقة تلقيح النباتات المنتخبة بصنف اختبارى (half-sib family) ، حينما تسعمل البذور المتبقية من التلقيحات (بعد تقييم التلقيحات) ، وطريقة الانتخاب فى نسل النباتات المنتخبة بعد تلقيحها مع بعضها البعض (full-sib family) ، وكذلك فى حالات التلقيح الذاتى للنباتات المنتخبة .
- ٣- تأخذ c القيمة ٢٠ ، حينما لا تكون وحدتا الانتخاب والانعزال متماثلتين ؛ كما هى الحال فى حالات : تلقيح النباتات المنتخبة بصنف اختبارى ، حينما تسعمل البذور الناتجة من التلقيح الذاتى أو السلالات الخضرية للنباتات المنتخبة ؛ من أجل الحصول على الانعزالات ؛ حيث تكون وحدة الانتخاب هى بذور أنصاف الأقارب half-sib ، بينما تكون وحدات الانعزال هى البذور الناتجة من التلقيح الذاتى أو السلالات الخضرية للتراكيب الوراثية المنتخبة .

وفيما يلي .. بيان بالمعادلات المستعملة في حساب التقدم المتوقع في كل دورة من دورات الانتخاب (G_c) ، عند اتباع كل من الطرق التى سبق بيانها :

الطريقة	التقدم المتوقع في كل دورة انتخاب (G_c)
الانتخاب المتكرر للشكل المظهرى بدون استعمال تحت وحدات تجريبية (subplots)	$\sqrt{\frac{kcV_A}{(V_u + V + V_{AE} + V_{DE} + V_A + V_D)}}$
الانتخاب المتكرر للشكل المظهرى مع استعمال تحت وحدات تجريبية	$\sqrt{\frac{kcV_A}{(V_u + V_{AE} + V_{DE} + V_A + V_D)}}$
طريقة الكوز للخط المحورة	$\sqrt{\frac{kc \frac{1}{4} V_A}{\frac{V_e}{rt} + \frac{1}{4} \frac{V_{AE}}{t} + \frac{1}{4} V_A}}$
أنصاف الأقارب (Half - Sib)	$\sqrt{\frac{kc \frac{1}{4} V_A}{\frac{V_e}{rt} + \frac{1}{4} \frac{V_{AE}}{t} + \frac{1}{4} V_A}}$
الأقارب التامة (Full - Sib)	$\sqrt{\frac{kc \frac{1}{2} V_A}{\frac{V_e}{rt} + \frac{(\frac{1}{2} V_{AE} + \frac{1}{4} V_{DE})}{t} + \frac{1}{2} V_A + \frac{1}{4} V_D}}$
التقنيات الذاتية	$\sqrt{\frac{kc V_A'}{\frac{V_e}{rt} + \frac{(V_{AE}' + \frac{1}{4} V_{DE})}{t} + V_A' + \frac{1}{4} V_D}}$

تستخدم المعادلات السابقة فى التنبؤ بالتقدم المتوقع فى كل دورة انتخاب لمقارنة مدى كفاءة مختلف طرق التربية ، قبل بدء برنامج الانتخاب ، وذلك حتى يمكن اختيار أكثرها كفاءة . ويعطى Fehr (١٩٨٧) مثلاً مفصلاً لحالة قارن فيها التقدم السنوى المتوقع للانتخاب عند اتباع أى من سبع طرق للتربية ، وعند اختلاف عدد العروات الممكنة من ١-٣ عروات سنوياً . وتقدر مختلف القيم فى المعادلات السابقة كما يلى :

١- تباين الشكل المظهرى والتباين الوراثى بمكوناته المختلفة :

يراجع لذلك الفصل الرابع .

٢- شدة الانتخاب :

تُعرّف شدة الانتخاب selection intensity بأنها النسبة المئوية لعدد السلالات المنتخبة إلى عدد السلالات المختبرة ، ويعبر عنها فى المعادلات بوحدات قياسية ، وهى التى يرمز لها بالرمز k . ويشرح Falconer (١٩٨١) كيفية حساب " k " : وهى تقل بزيادة نسبة التراكيب الوراثية المنتخبة إلى التراكيب المختبرة كما يلى :

k	النسبة المئوية للتراكيب الوراثية المنتخبة إلى المختبرة
٢,٦٤	١
٢,٤٢	٢
٢,٠٦	٥
١,٧٥	١٠
١,٥٥	١٥
١,٤٠	٢٠

٣- قيمة تحكم الآباء c (أو Parent Control) :

تتوقف هذه القيمة على العلاقة بين وحدة الانتخاب ووحدة الانعزال ، وتأخذ إحدى ثلاث قيم هى : ٠,٥ ، ١,٠ ، و ٢,٠ فى حالات طرق التربية المختلفة ، كما سبق بيانه .

يتوقف عدد سنوات كل دورة انتخاب على طريقة التربية المتبعة ، وعدد العروات التى يمكن زراعتها من المحصول فى كل عام . يكون الرقم صحيحاً إن لم يكن بالإمكان زراعة أكثر من عروة واحدة سنوياً ، بينما قد يحتوى الرقم على كسور فى غير ذلك من الحالات. هذا .. وتتطلب كل دورة انتخاب عروة زراعية واحدة فى طرق : الانتخاب المتكرر للشكل المظهرى عند اختيار أحد الأبوين أو كليهما قبل الإزهار ، وطريقة الكوز للخط عند انتخاب أحد الآباء فقط ؛ بينما تتطلب كل دورة انتخاب عروتين زراعتين فى طرق : الانتخاب المتكرر للشكل المظهرى عند تلقيح الآباء المنتخبة ذاتياً قبل تلقيحها معاً ، وطريقة الكوز للخط عند انتخاب كلا الأبوين ، وعند اتباع طريقة التلقيح بين النباتات المنتخبة (full - sib) ، وكذلك عند تلقيح النباتات المنتخبة بصنف اختبارى (half - sib families) ، حينما تستعمل البنور المتبقية من التلقيحات . ويزيد عدد العروات الزراعية اللازمة فى كل دورة انتخاب إلى ثلاث عروات ، حينما يجرى التلقيح بين أنسال النباتات المنتخبة الملقحة ذاتياً ، وإلى أربع عروات حينما يستمر التلقيح الذاتى لجيلين ، وإلى خمس عروات حينما يدوم التلقيح الذاتى لثلاثة أجيال قبل إجراء التلقيح بين السلالات المرباة بالتلقيح الذاتى .

وليزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Sprague (١٩٦٦) ، و Fehr (١٩٨٧) .

مشال على التقدم الوراثى بالانتخاب

يوضح شكل (٦-٢) مثلاً افتراضياً على التقدم الوراثى الذى قد يمكن إحرازه بعد دورة واحدة من دورات الانتخاب (عن Simmonds ١٩٧٩) . ويتبين من الشكل .. أن انتخاب الأفراد الموزعة فى الجزء المظلل من عشيرة الأساس (الرسم العلوى) يؤدى إلى إنتاج العشيرة المحسنة (الرسم السفلى) . هذا .. علماً بأن شدة الانتخاب (k) فى هذا المثال الافتراضى هى ١,٧٦ ، والنسبة المئوية للنباتات المنتخبة ١٠ ، ويتضح - لدى مقارنة القيم

الإحصائية فى عشيرة الأساس ؛ وفى نسل النباتات المنتخبة - ما يلى :

القيمة إحصائية	عشيرة الأساس	نسل النباتات المنتخبة
المتوسط العام للعشيرة	١٠,٠	١١,٧٦
تباين الشكل المظهرى (V_p)	٤,٠	١,٧٣
التباين الإضافى (V_A)	٢,٠	٣,٠
التباين البيئى (V_E)	٢,٠	٢,٠
درجة التوريث (h^2)	٠,٥	٠,٣٣

وقد تحقق فى هذا المثال تقدم قدره ١,٧٦ وحدة من الصفة المنتخبة بعد دورة واحدة من الانتخاب .


تحسين التقدم الوراثى السنوى فى برامج التربية بالانتخاب

يسعى المربي - دوماً - إلى تعزيز وزيادة التقدم الوراثى الذى يحرزه سنوياً فى برامج التربية بالانتخاب ؛ من خلال دراسته لكافة العوامل المؤثرة على القيم التى تدخل فى حساب التقدم الوراثى - والتى وردت فى المعادلات التى سبق بيانها- وهى كما يلى :

١- عدد سنوات كل دورة انتخاب :

يتوقف عدد سنوات كل دورة انتخاب على عدد العروات التى يمكن زراعتها كل عام ؛ حيث يمكن زراعة عروتين ، أو ثلاث عروات -أحياناً- من المحصول الواحد فى المناطق ذات المناخ المعتدل . أما فى المناطق الشديدة البرودة شتاءً ، أو الشديدة الحرارة صيفاً .. فيمكن زراعة عروات إضافية فى البيوت المحمية ، أو فى مناطق أخرى من العالم ، تسمح فيها الظروف البيئية باستمرار الزراعة .

ويستفاد من العروات الإضافية هذه فى إجراء التهجينات ، وفى التربية الداخلية ، وإكثار البنور ؛ كما قد يستفاد من بعضها فى التقييم والانتخاب ، ويتوقف ذلك على الإمكانيات المتاحة ، والمحصول المزروع ، والصفات التى يجرى الانتخاب لها ؛ فالزراعات



شكل (٦ - ٣) : مثال افتراضى لتحسين الوراثى الذي يحدث بعد دورة واحدة من الانتخاب. يراجع المتن للتفاصيل .

المحمية وحجرات النمو .. لا تناسب إلا المحاصيل التى لا تتطلب مساحات كبيرة لنموها ، وعمليات التربية التى لا تتطلب أعداداً كبيرة من النباتات لإنجازها . ويعد إجراء التهجينات أكثر عمليات التربية شيوعاً فى البيوت المحمية ، كما يجرى فيها - أحياناً - زراعة مزيد من الأجيال ؛ للوصول إلى الأصالة الوراثية ، ويكون ذلك - غالباً - بطريقة التحدر من البذرة المفردة Single - Seed Descent . كما يعد التقييم لمقاومة الآفات أكثر الاختبارات إجراء

فى البيوت المحمية وحجرات النمو ، وبالمقارنة .. فإن زراعة العروات الإضافية تحت ظروف الحقل - فى المناطق التى يسودها جو معتدل - تسمح بتقييم أعداد كبيرة من النباتات ، وإجراء معظم عمليات التربية التى تجرى فى العروة الرئيسية ، ولكن يعاب عليها صعوبة الإشراف الدائم على العمليات الزراعية التى تجرى بها ، والتكاليف والجهود الإضافية التى تبذل فى التنقل بين المحطتين ، والتأخير الذى قد يحدث فى انتقال البذور والأجزاء الخضرية المستعملة فى الزراعة فى حالة وجود قوانين حجر زراعى خاصة بالمحصول المراد زراعته . أما زراعة العروات الإضافية فى دول أخرى بنصف الكرة الأرضية المقابل .. فإنها تتطلب اتفاقيات دولية وترتيبات خاصة ، لسرعة انتقال الأجزاء النباتية المستعملة فى الزراعة . ولهذه الطريقة .. مزايا الطريقة السابقة وعيوبها .

٢- شدة الانتخاب (k) :

تفضل -دائماً- زيادة أعداد النباتات أو السلالات التى يجرى تقييمها ؛ لأن ذلك يكون مصاحباً بزيادة فى قيمة شدة الانتخاب بالوحدات القياسية (أو k) ؛ فبفرض أن المربى يقوم بانتخاب أفضل ٢٠ سلالة .. فإن ذلك يعنى أن شدة الانتخاب (كنسبة مئوية) تكون ٢٠٪ فى حالة اختبار ١٠٠ سلالة ، و ١٠٪ عند اختبار ٢٠٠ سلالة ، و ٥٪ لدى اختبار ٤٠٠ سلالة ، وتكون قيمة k المقابلة هى ١ ، ٤ ، و ١ ، ٧٥ ، و ٢ ، ٠٦ -للحالات الثلاث- على التوالى . وحتى لو حافظ المربى على نسبة مئوية ثابتة من السلالات المنتخبة .. فإن زيادة عدد السلالات المختبرة يعنى تقليل التربية الداخلية فى العشيرة ، وهو أمر مطلوب . وتعد ميكنة العمليات الزراعية واستخدام الحاسبات الآلية .. من أهم العوامل التى ساعدت مربى النباتات على زيادة أعداد السلالات التى تختبر فى برامج التربية سنوياً .

٣- تحكم الآباء (c) :

يمكن زيادة قيمة (c) من ٠ ، ٥ إلى ١ ، ٠ بانتخاب الصفة قبل تلقيح الأمهات بالآباء المنتخبة وغير المنتخبة . ويفضل انتخاب الأمهات والآباء قبل التلقيح ؛ حتى تكون الأليلات الموروثة للنسل من نباتات منتخبة . ويعنى انتخاب الأمهات أن نصف الأليلات - فقط - هى التى تكون من نباتات منتخبة أما النصف الآخر من الأليلات - وهو الذى يتحصل عليه من الآباء غير المنتخبة - فإنه لايسهم فى أى تقدم وراثى . كما يمكن زيادة تحكم الآباء من

١٠ ، ٢٠ : باستعمال البذور الناتجة من التلقيح الذاتى أو السلالات الخضرية ؛ لإجراء التلقيحات بين أنسال أنصاف الأقارب المتفوقة Superior half - sib progenies بدلاً من استعمال البذور المتبقية من أنصاف الأقارب (فى التلقيحات القمية) ؛ ذلك لأن الآليات الموجودة فى البذور الناتجة من التلقيح الذاتى تأتى من الأفراد المنتخبة فقط ، بينما تأتى نصف آليات بذور أنصاف الأقارب من النباتات المنتخبة ، ويأتى نصفها الآخر من العشيرة التى تضم أفراداً غير منتخبة .

٤- التباينات الوراثية (V_A ، و V_g) :

يتحدد مقدار التباين الوراثى الإضافى فى العشيرة بالعوامل التالية :

(١) الاختلافات الوراثية بين الآباء :

تتأثر الاختلافات الوراثية بعدد الآباء التى استعملت فى إنتاج العشيرة ، ومدى تقاربها أو تباعدها - وراثياً - عن بضعها البعض ؛ ففى النباتات الثنائية التضاعف .. يمكن أن تحتوى العشيرة الناتجة من تلقيح فردى single cross على أحد أليلين فقط فى كل موقع جينى ، ويزيد هذا الرقم إلى ثلاثة ، وأربعة فى العشائر الناتجة من التلقيحات الثلاثية three - way crosses ، والمزوجة (الرباعية) double crosses على التوالى ... وهكذا ؛ وهو ما يعنى توفر قدر أكبر من الاختلافات الوراثية . ولهذا الأمر أهمية خاصة فى برامج التربية التى يكون فيها عدة دورات من الانتخاب المتكرر ؛ نظراً لأن مدى التقدم الذى يمكن تحقيقه بالانتخاب يتوقف على عدد آليات كل جين فى عشيرة الأساس Base Population التى يبدأ فيها الانتخاب . وكلما زاد عدد الآباء المستعملة فى كل دورة انتخاب .. زادت الاختلافات الوراثية التى تتوفر للانتخاب .

وكلما كانت الآباء المستعملة فى إنتاج عشيرة الأساس متباعدة عن بعضها البعض وراثياً (أى مختلفة فى أنسابها) .. زادت فرصة مشاركتها بآليات مختلفة فى مختلف المواقع الجينية . كما يعتمد المربى إلى الحد من النقص فى الاختلافات الوراثية -الذى يحدث نتيجة للتربية الداخلية أثناء إجراء برنامج التربية- بانتخاب سلالات لدورات الانتخاب ، تنتمى (أو تنتسب) إلى تلقيحات أصلية مختلفة .

هذا .. ولا تعنى المناقشة السابقة أن يعتمد المربي إلى إدخال آباء غريبة exotic parents (وهي الأصناف أو السلالات التي لا تكون منتجة ، أو مزروعة في المنطقة التي تنتج لأجلها الأصناف الجديدة) لمجرد زيادة الاختلافات الوراثية في عشيرة الأساس ؛ لأن هذه الزيادة تكون مصاحبة بانخفاض عام في متوسط العشيرة . ولا ينصح بإدخال مثل هذه الآباء إلا في برامج الانتخاب المتكرر الطويلة المدى .

(ب) مدى التربية الداخلية في العشيرة قبل التقييم والانتخاب :

يزداد التباين الإضافي دائماً بزيادة التربية الداخلية في العشيرة ، ويزداد معها - أيضاً - التقدم الوراثي الممكن في كل دورة انتخاب ؛ إلا أنه يجب تقدير ذلك في ضوء الوقت الإضافي الذي يلزم للتربية الداخلية .

(ج) عدد الأجيال الانعزالية بين دورات التربية :

تزداد فرصة حدوث العبور بين الجينات المرتبطة -وتظهر انعزالات جديدة- بزيادة عدد أجيال التلقيح العشوائي في العشيرة ، وهو ما يسهم في زيادة الاختلافات الوراثية . ورغم أن زيادة عدد الأجيال في كل دورة انتخاب يمكن أن يؤثر سلبياً على التقدم الوراثي ، الذي يمكن تحقيقه سنوياً .. إلا أن ذلك التأثير لا يحدث في الحالات التي تكون فيها الأجيال الإضافية في غير المواسم التي يجري فيها الانتخاب .

هـ - الاختلافات داخل القطع التجريبية (Within Plot Variability) V_w و V_{wg} ،

و V_u .

تحدد الاختلافات داخل القطع التجريبية (V_w) بكل من البيئة (V_u) والانعزالات الوراثية (V_{wg}) ، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد النباتات التي يضمها القطاع (n) ، وهي النباتات التي يؤخذ متوسطها ليمثل متوسط القطعة التجريبية . وتكون n مساوية للواحد الصحيح عند انتخاب النباتات الفردية من العشيرة ؛ أما في حالات تقييم السلالات أو العائلات .. فإن قيمة n ترتبط بحجم القطعة التجريبية . ويمكن تقدير مدى تأثير زيادة عدد النباتات بكل قطعة تجريبية على V_w ؛ بافتراض قيمة ثابتة للاختلافات الكلية - ولتكن

٧٠٠ - مع تغيير أعداد النباتات المنتخبة n كما يلي :

$\sqrt{V_w/n}$	n
٢٦,٥	١
١٨,٧	٢
١٥,٣	٣
١٣,٢	٤
١١,٨	٥
٨,٤	١٠
٥,٩	٢٠
٤,٨	٣٠
٤,٢	٤٠
٣,٧	٥٠
٣,٤	٦٠
٢,٦	١٠٠

يلاحظ أن الفائدة - التي يتحصل عليها من جراء زيادة عدد النباتات بالقطعة التجريبية - تتناقص بزيادة n . فبينما يكون الفرق - في هذا المثال - ١٨,١ وحدة عند زيادة عدد النباتات من ١ إلى ١٠ . فإن الفرق يتضاءل إلى ٠,٨ وحدة عند زيادة عدد النباتات من ٦٠ إلى ١٠٠ بكل قطعة تجريبية . وعلى المرء أن يقدر - بنفسه - عدد النباتات الأمثل بكل وحدة تجريبية للصفات التي يرغب في تقييمها .

٦- الاختلافات بين القطع التجريبية Plot-to-Plot Variation (V) :

ترتبط الاختلافات بين القطع التجريبية بالاختلافات البيئية ، وهي التي يمكن تخفيضها ، إما بتقليل عدد الوحدات التجريبية في كل مكررة ، وإما بإنقاص مساحة كل وحدة تجريبية . ويؤدي ذلك إلى نقص المساحة المخصصة لكل مكررة ؛ ومن ثم .. إلى زيادة احتمالات تجانس التربة في المكررة الواحدة .

٧- الخطأ التجريبي (V_e) :

يؤدى أى انخفاض فى V_u ، أو V_{wg} ، أو V إلى انخفاض فى V_e . كما تتحدد أهمية V_e بكل من عدد المكررات (r) ، وعدد البيئات (t) التى تجرى فيها الاختبارات ؛ كما يتضح فى الموضوع التالى .

٨- التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة Genotype x Environment Interaction (V_{ge}) :

يمكن الحد من تأثير التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة ؛ بتقييم السلالات فى عدة بيئات (t) ، مع حفظ التوازن المناسب بين عدد المكررات (r) وعدد البيئات ، علماً بأن زيادة عدد البيئات يكون له تأثير أكبر على V_{ge} . ورغم أن التقدم الوراثى المتوقع بالانتخاب يكون أعلى مايمكن عند تقييم السلالات فى مكررة واحدة بعدة بيئات .. إلا أن ذلك لا يكون عملياً ، ولايجرى -عادة- بسبب زيادة التكاليف ؛ ويكتفى -عادة- بزراعة عدد من المكررات فى عدد محدود من البيئات (عن Fehr ١٩٨٧) .

٩- الانتخاب غير المباشر :

يكون الانتخاب أسرع ، ويتم التوصل إلى الصنف الجديد فى برامج التربية فى وقت أقل ، لو كان بالإمكان الاستدلال على الصفة الأولية primary character التى يراد انتخابها - مثل صفة المحصول - من صفات أخرى ثانوية secondary characters - مثل صفات حجم الورقة واتجاه نموها leaf orientation ، وارتفاع النبات ، والتفرغ ، أو تكوين الخلفات ، ومدى تعمق الجذور ، ومعدل البناء الضوئى ... إلخ . وتلخص أهمية العلاقة بين الصفة الثانوية والصفة الأولية بالمعادلة التالية :

$$\frac{CR_x}{R_x} = r_A \frac{i_y h_y}{i_x h_x}$$

حيث تمثل :

CR_x : التحسين المتحصل عليه فى الصفة الأولية بالانتخاب غير المباشر للصفة الثانوية .

R_x : التحسين المتحصل عليه بالانتخاب المباشر للصفة الأولية .

r_A : الارتباط الوراثى بين الصفة الأولية (x) والصفة الثانوية (y) .

i_y : شدة الانتخاب للصفة الثانوية .

i_x : شدة الانتخاب للصفة الأولية .

h_y : الجذر التربيعى لدرجة التوريث على النطاق الضيق الخاصة بالصفة الثانوية .

h_x : الجذر التربيعى لدرجة التوريث على النطاق الضيق الخاصة بالصفة الأولية

(عن Falconer ١٩٨٨) .

وتعرف شدة الانتخاب بأنها : النسبة بين عدد الأفراد أو السلالات المنتخبة إلى عدد الأفراد أو السلالات المختبرة . ولا يكون الانتخاب غير المباشر للصفات الثانوية مجدياً إلا إذا كان التعرف عليها أسهل ، ويتطلب جهداً ووقتاً أقل مما يلزم للتعرف على الصفات الأولية . كما تزيد فاعلية الانتخاب غير المباشر إذا كانت درجة التوريث على النطاق الضيق أعلى فى الصفة الثانوية مما فى الصفة الأولية . ويتأتى ذلك إذا كانت الصفة الثانوية ذات تباين إضافى كبير نسبياً ، أو كانت أقل تأثراً بالتغيرات البيئية ، أو أقل تفاعلاً مع البيئة . ونظراً لأن الجذر التربيعى لدرجتى توريث الصفتين الأولية والثانوية هو الذى يدخل فى المعادلة التى تبين العلاقة بينهما ؛ لذا .. فإن من الضرورى أن تكون درجة توريث الصفة الثانوية أعلى بكثير من درجة توريث الصفة الأولية ؛ حتى تظل النسبة بينهما كبيرة بعد استخراج الجذر التربيعى لكل منهما .

ولا توجد فائدة ترجى من الانتخاب غير المباشر إن لم يوجد ارتباط وراثى واضح بين الصفتين الأولية والثانوية . ويقدر هذا الارتباط بتقييم تراكيب وراثية مناسبة لذلك فى ظروف بيئية متباينة ؛ حيث يستدل من ارتباط الشكل الظاهرى phenotypic correlation بين الصفتين -مبدئياً- على العلاقة بين الصفتين . ويتطلب قياس الارتباط الوراثى genetic correlation بين الصفتين استعمال تراكيب وراثية عشوائية من عشائر منعزلة ، كما يستفاد - أحياناً - من السلالات ذات الأصول الوراثية المتشابهة فى هذا الشأن .

هذا .. ويقدر الارتباط الوراثي بالمعادلة التالية :

الارتباط الوراثي =

التباين الوراثي المرافق genetic co-variance للصفتين الأساسية والثانوية

التباين الوراثي للصفة الأساسية × التباين الوراثي للصفة الثانوية

أما ارتباط الشكل المظهري فيقدر بالمعادلة التالية :

ارتباط الشكل المظهري =

متوسط حاصل ضرب قيمة الصفتين الأساسية والثانوية في الأفراد المختبرة

متوسط مربع قيمة الصفة الأساسية × متوسط مربع قيمة الصفة الثانوية في نفس الأفراد

(عن Kwon & Torrie ١٩٦٤) .

الفصل السابع

طرق التربية بالانتخاب المباشر

نتناول فى هذا الفصل طرق التربية التى تعتمد على الانتخاب المباشر فى الاختلافات الوراثية المتوفرة ، دون أن يقوم المربي بإجراء أية تلقيحات ، وهى التى تعد من أبسط طرق التربية . وتجدر الإشارة إلى أن الانتخاب لا يؤدي إلى إحداث تغيرات وراثية ، ولكنه يجرى فى وجودها . كما أن الانتخاب لا يكون مجدياً إلا إذا كانت الاختلافات المتوفرة وراثية .

انتخاب السلالة النقية

سبق أن عرفنا السلالة النقية Pure Line - فى الفصل الثالث- بأنها : نسل نبات واحد ذاتى التلقيح ، وبيننا أن أفرادها تكون أصيلة وراثياً homozygous ، بنسبة ١٠٠٪ ، وأنها تكون متجانسة homogenous وراثياً تماماً . يتبين من تعريف السلالة النقية أنها لا تتوفر إلا فى النباتات الذاتية التلقيح ؛ لذا .. فإن التربية بطريقة انتخاب السلالة النقية Pure Line Selection لا تتبع إلا مع هذه الفئة من النباتات . وتكون بداية برنامج التربية - عادة - فى عشيرة تكثر فيها الاختلافات الوراثية كالأصناف البلدية أو الأصناف القديمة غير المعتنى بها ، والتى تكون قد تراكت فيها الاختلافات الوراثية ؛ نتيجة للتلقيح الاعتيادى مع أصناف أخرى ، أو نتيجة لحدوث الطفرات بها . وتتلخص خطوات التربية فيما يلى :

١- يُنْتخَبُ عدد كبير من النباتات من عشيرة الأساس . وتعد هذه الخطوة غاية فى

الأهمية ، لأن النباتات المنتخبة تمثل الحد الأقصى للاختلافات الوراثية التي يمكن الحصول عليها ؛ ذلك لأن كلاً منها يعطى نسلاً عبارة عن سلالة نقية ، تتماثل جميع أفرادها وراثياً- مع بعضها البعض ، ومع النبات الذي نشأت منه ؛ وعليه .. فإن كانت النباتات المنتخبة عديمة الجدوى .. فإن الانتخاب فيها لن يقود إلى أى تقدم .

٢- يزرع نسل كل نبات منتخب على حدة فى الموسم التالى ؛ لملاحظته ، والتخلص من أية سلالة نقية تظهر فيها عيوب واضحة . وتستمر هذه الخطوة -عادة- لعدة مواسم زراعية ؛ بغرض التخلص من أكبر عدد من السلالات قبل البدء فى المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج التربية ، والتي تكون على نطاق واسع . ويمكن -عن طريق العدوى الصناعية بالحشرات ومسببات الأمراض الهامة- التخلص من عدد آخر من السلالات .

وتجدر الإشارة إلى أن التلقيح الذاتى الطبيعى - فى هذه الفئة من النباتات - يُسهّل كثيراً من مهمة المربي الذى يكتفى بتعليم السلالات المرغوبة ، ثم حصاد بنورها دونما حاجة لتكيسها أو عزلها ؛ نظراً لعدم حدوث خلط وراثى بين السلالات بعضها ببعض . كما أن استمرار التلقيح الذاتى يعمل على استمرار احتفاظ كل سلالة بصفاتهما ؛ مما يجعل من الممكن خلط بنور كل سلالة -معاً- منذ البداية .

٣- تجرى الخطوة الأخيرة بعد أن يعجز المربي عن التخلص من أية سلالات أخرى بمجرد الملاحظة ؛ حيث يقوم -حينئذ- بمقارنة السلالات المتبقية بالأصناف التجارية الشائعة فى الزراعة فى تجارب موسعة ، يقدر فيها المحصول والصفات الاقتصادية الهامة . ويتم - فى النهاية - انتخاب سلالة واحدة ، تكون هى أساس الصنف الجديد .

وتجدر الإشارة إلى أن الأصناف الجديدة التى تنتج بهذه الطريقة تنشأ من تراكيب وراثية ، توجد منذ البداية فى العشيرة الأصلية ، وأن كل ما يتم خلال سنوات التربية هو التعرف على هذه التراكيب ، وإثبات أنها أفضل من التراكيب الوراثية الأخرى ، ومن الأصناف التجارية المستعملة فى الزراعة .

ولهذه الطريقة أهمية كبيرة فى تحسين الأصناف البلدية ، وقد اتبعت فى تحسين جميع المحاصيل الاقتصادية الهامة الذاتية التلقيح ؛ كالقمح ، والأرز ، والفاصوليا ، والبسلة ؛ فأمكن فى البسلة -على سبيل المثال- انتخاب نباتات مقاومة للسلالة رقم ٦ من الفطر

Fusarium oxysporum f.sp. *pisi* المسبب لمرض الذبول الفيوزارى . وقد وجدت النباتات المقاومة بنسبة تقل عن ٠,٢ ٪ . كما وجدت اختلافات وراثية بين النباتات -فى عدد من الأصناف التجارية- فى صفات : موعد الإزهار ، وعدد العقد حتى الزهرة الأولى ، وطول النبات . وقد تمكن Haglund & Anderson (١٩٨٧) من انتخاب سلالات نقية من الصنفين إيرلى فروستى Early Frosty ، ودارك سكن برفكشن Dark Skin Perfection ، اختلفت - جوهرياً - عنهما فى صفات : عدد الأيام حتى الإزهار ، وعدد السلاميات حتى أول زهرة ، والمحصول ، كما وجد لدى مقارنة سلالة منتخبة من كل صنف مع الصنف الاصلى الذى انتخبت منه - لمدة خمس سنوات- أن محصولهما كان أعلى من محصول الصنفين الأصليين بمتوسط قدره ٤٤ ٪ لإحدهما ، و ٥٦ ٪ للآخرى . هذا .. بينما لم تختلف السلالات المنتخبة عن الصنف الاصلى الذى نشأت منه فى الصفات المورفولوجية العامة المميزة للصنف ، وهو ما يدل على أنها لم تكن راجعة إلى خلط ميكانيكى لبذور الصنف مع صنف آخر .

الانتخاب الإجمالى فى النباتات الذاتية التلقيح

تشابه طريقة الانتخاب الإجمالى Mass Selection فى النباتات الذاتية التلقيح مع طريقة انتخاب السلالة النقية فى المرحلتين الأولى والثانية من برنامج التربية : حيث يتم انتخاب عدد كبير من نباتات عشيرة ، تكثر فيها الاختلافات الوراثية ، ثم زراعة نسل كل نبات على حدة لعدة مواسم زراعية ؛ لاستبعاد السلالات التى تكون صفاتها غير مرغوبة - كما سبق بيانه فى طريقة انتخاب السلالة النقية - وبقى ذلك .. خلط بذور السلالات النقية ذات الصفات المرغوبة معاً ، ومقارنتها بالأصناف التجارية الشائعة فى الزراعة فى تجارب موسعة ، تستمر لثلاثة مواسم زراعية ؛ يقدر فيها المحصول والصفات الاقتصادية الهامة . ويتم فى النهاية .. اعتماد مخلوط السلالات كصنف جديد ، إذا ثبت أنه يفوق الأصناف التجارية المعروفة .

يتضح مما تقدم أن طريقة الانتخاب الإجمالى لا تختلف - فى جوهرها - عن طريقة انتخاب السلالة النقية ، سوى فى كون الصنف الجديد يتألف فى هذه الطريقة من مجموعة من السلالات النقية الممتازة ، بينما يتكون من سلالة نقية واحدة فى طريقة انتخاب السلالة النقية . وتعد هذه الطريقة - كسابقتها - ذات أهمية كبيرة فى تحسين الأصناف البلدية ،

كما تفيد -أيضاً- فى تحسين الأصناف الجديدة المستوردة إذا كانت بها عيوب ظاهرة .

ويجرى الانتخاب الإجمالى فى النباتات الذاتية التلقيح -عادة- بطريقة أخرى ، تتشابه مع تلك المتبعة مع النباتات الخلطية التلقيح ، وذلك بانتخاب عدد كبير من النباتات التى تظهر بها الصفات المرغوبة . وحصادها ، ثم خلط بذورها -معاً- وزراعتها فى دورة أخرى من الانتخاب . وتكرر هذه العملية إلى أن يتوقف التحسين مع الانتخاب ، ثم تقارن العشيرة المنتخبة مع الأصناف التجارية الشائعة فى الزراعة . وتعتبر هذه الطريقة مناسبة لإجراء تحسين وراثى سريع فى صفات معينة ؛ مثل : ارتفاع النبات ، وموعد النضج ، وحجم البذور ، ومقاومة الآفات ، والقدرة على تحمل الظروف البيئية القاسية ؛ حيث يكفى استئصال النباتات التى لاتحمل الصفات المرغوبة ، وحصاد البذور من النباتات المتبقية فى الحقل . ويمكن اتباع طرق خاصة تزيد من كفاءة عملية الانتخاب لمثل هذه الصفات ؛ مثل: العدوى الصناعية بمسببات الأمراض ، والزراعة فى الأراضى الملحية أو الجيرية ... إلخ ، وتقليم النباتات على الارتفاع المرغوب ، ثم حصاد العشيرة سننيمترات القمية فقط (كما فى الشوفان) ، واستعمال الغرابيل فى انتخاب البذور الكبيرة الحجم (كما فى الفاصوليا ، وفول الصويا) .

ويعاب على الانتخاب الإجمالى فى النباتات الذاتية التلقيح أن فرصة تكوين تراكيب وراثية جديدة تكون معدومة تقريباً ، إذا كان التلقيح الذاتى تاماً ؛ لذا .. فإن التحسين الوراثى يبقى دائماً فى حدود ما هو موجود أصلاً فى العشيرة .

الانتخاب الإجمالى فى النباتات الخلطية التلقيح

اتبعت طريقة الانتخاب الإجمالى فى تحسين كثير من المحاصيل الخلطية التلقيح ، خلال النصف الأول من هذا القرن ، ومازالت مستعملة فى بعض المحاصيل . ورغم اختلاف تفاصيل هذه الطريقة فى النباتات الخلطية التلقيح عما سبق بيانه بالنسبة للنباتات الذاتية التلقيح .. إلا أن مضمونها واحد فى كل منهما ؛ إذ يكون الهدف هو تحديد التراكيب الوراثية المرغوبة ، وخلطها -معاً- لتكون أساساً للصنف الجديد .

يبدأ برنامج التربية بانتخاب عدد كبير من النباتات التى تبدو صفاتها جيدة ، من عشيرة تكثر فيها الاختلافات الوراثية ، ويكون الانتخاب على أساس الشكل الظاهرى .

يتبع ذلك .. خلط البذور الناتجة من النباتات المنتخبة - معاً - ثم زراعتها فى الموسم التالى ؛ لإجراء بورة أخرى من الانتخاب ، وهكذا ... تستمر دورات الانتخاب ؛ إلى أن يتحقق التحسين المطلوب ، أو إلى أن يصبح الانتخاب غير مُجْدٍ . ويستغرق إنتاج الصنف الجديد بهذه الطريقة نحو ثمانى سنوات .

وتكون هذه الطريقة أكثر فاعلية ، ويكون الانتخاب أكثر جدوى لو أمكن الانتخاب للصفات المرغوبة قبل الإزهار ؛ حيث يمكن -حينئذ- إزالة النباتات غير المرغوبة من العشيرة ، وترك النباتات المرغوبة فقط ؛ ليحدث التلقيح فيما بينها . أما إن لم يمكن الانتخاب للصفات المرغوبة إلا بعد حدوث التلقيح -كما فى جميع الصفات التى تعتمد على الثمار العاقدة ، التى منها صفة المحصول فى النباتات الثمرية - فإن النباتات التى تُنتخب تكون قد لُقِّحت بنباتات أخرى ، قد تكون ذات صفات مرغوبة ، أو غير مرغوبة ؛ أى إن نصف الجينات التى توجد فى النباتات المنتخبة تكون قد حصلت عليها من آباء غير معلومة ، وهو ما يؤدى إلى بطء التحسن الوراثى . هذا .. ويمكن بالنسبة للنباتات ذات الحولين -كبنجر السكر- والمعمرة إجراء التقييم والانتخاب فى موسم نمو ، وإنتاج البذور فى الموسم التالى .

وكما سبق بيانه (تحت موضوع توازن هاردي - فينبرج فى الفصلين : الرابع ، والسادس) .. فإنه يمكن التخلص من الأليلات السائدة غير المرغوبة كلية فى جيل واحد من الانتخاب ، بينما تبقى الأليلات المتنحية غير المرغوبة مستترة فى الحالة الخليطة . ويكون التقدم الحادث بالانتخاب أعلى بكثير عندما تكون نسبة الأليل المتنحى غير المرغوب مرتفعة فى عشيرة الأساس عما لو كانت نسبته منخفضة .

المزايا

١- تفيد طريقة الانتخاب الإجمالى فى النباتات الخلطية التلقيح فى إنتاج أصناف جديدة من السلالات البرية ، وفى تحسين الأصناف البلدية ، ومخاليط الأصناف ، والأصناف المستوردة التى توجد بها عيوب ظاهرة ، وفى المحافظة على نقاوة الأصناف التى لا تلقى عناية خاصة عند إنتاج بذورها .

٢- تعد أسهل طرق التربية وأسرعها ؛ لأنها لا تحتاج إلى تلقيحات مُحكَّم فيها لإنتاج

الصفة ، ولعدم الحاجة إلى إجراء اختبارات خاصة للصفة المنتج .
٣- تعد الطريقة الوحيدة الممكنة لتحسين الأصناف البلدية والسلالات البرية من المحاصيل الخلطية التلقيح .
٤- أعطت هذه الطريقة نتائج جيدة بالنسبة للصفات ذات درجات التوريث المرتفعة ، والصفات التي يمكن التعرف عليها بسهولة ؛ فهي قد اتبعت بنجاح في إنتاج أصناف جديدة من الذرة ، تختلف في لون الحبوب ، وحجم الكوز ، وموقعه على الساق ، وموعد النضج ، ونسبة الزيت والبروتين في الحبوب .

العيوب

تعتبر طريقة الانتخاب الإجمالي بطيئة ، عندما يرغب في تحسين المحصول ، والصفات الكمية في النباتات الخلطية التلقيح ، ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية :
١- عدم القدرة على تمييز التراكيب الوراثية الجيدة على أساس الشكل المظهري فقط ؛ نظراً لتأثر الصفات الكمية بشدة بالعوامل البيئية .
٢- حصول النباتات المنتخبة على حبوب لقاح من نباتات غير منتخبة ؛ بسبب التلقيح الخلطي المفتوح .
٣- يؤدي الانتخاب الشديد إلى صغر حجم العشيرة ؛ مما يحدث نوعاً من التربية الداخلية ، ويتسبب - بالتالي - في ضعف قوة نمو النباتات .
٤- تبقى - دائماً - نسبة من الجينات المنتخبة غير المرغوبة في العشيرة مستترة في التراكيب الوراثية الخليطة .

العوامل المؤثرة على درجة الاستجابة للانتخاب

تتأثر درجة الاستجابة للانتخاب بالعوامل التالية :

١- مدى توفر الاختلافات الوراثية في العشيرة الأصلية :

يكون أثر الانتخاب واضحاً في السلالات البرية ، والأصناف البلدية التي تكثر فيها الاختلافات الوراثية ، ولكن يقل التحسن الوراثي بعد بضع دورات انتخابية ؛ نتيجة لثبات الصفات . ويعمل الانتخاب في هذه الحالة على الاختلافات الوراثية الصرة

Free Variability ، التى تتوفر فى العشيرة .

٢- مدى توفر الاختلافات الوراثية الكامنة :

يعنى بالاختلافات الكامنة Potential Variability تلك التى يمكن أن تظهر فى أى وقت ، بعد حدوث عبور فى مناطق معينة من الكروموسومات ، يؤدى إلى ظهور انعزالات وراثية جديدة هى التراكيب العنبرية ، ولذلك أهمية كبيرة فى تحسين الصفات الكمية ، التى يتحكم فى وراثتها عدد كبير من العوامل الوراثية ؛ حيث يحدث -عادة- تقدم سريع فى الانتخاب بعد كل حالة عبور .

٣- درجة توريث الصفات :

تزداد سرعة الاستجابة للانتخاب بزيادة درجة توريث الصفات المنتخبة .

٤- درجة التربية الداخلية :

يؤدى الانتخاب الشديد للصفات إلى اختيار عدد قليل من النباتات التى تتوفر فيها الصفات المرغوبة لتكوين الجيل التالى ، وهو ما يؤدى إلى حدوث نوع من التربية الداخلية ، التى يكون لها أثر سيئ على قوة النمو . وكذلك يحدث الانتخاب الشديد تغييراً فى الهيكل الوراثى للعشيرة genetic drift ، يكون مصاحباً بتغير فى نسب الآليات المختلفة بها ؛ مما يؤثر على صفاتها العامة المميزة ؛ ويكون لذلك كله انعكاساته السلبية على درجة الاستجابة للانتخاب .

بعض التعديلات المدخلة على طريقة الانتخاب الإجمالى

تجرى بعض التعديلات على طريقة الانتخاب الإجمالى ؛ بغرض زيادة كفاءتها فى تحسين النباتات الخلطية التلقيح ، ومن هذه التعديلات ما يلى :

١- اختبار النسل :

يُجرى اختبار النسل Progeny Testing بتقييم ١٠-١٥ نباتاً من نسل كل نبات منتخب . ويفيد اختبار النسل فى التأكد من أن النباتات المتميزة المنتخبة تورث صفاتها المرغوبة للنسل . ولهذا الاختبار أهمية خاصة بالنسبة للصفات الكمية والصفات ذات

درجات التوريث المنخفضة ، كما يفيد في التأكد من جودة نسل النباتات التي انتخبت بعد الإزهار ، ولقحت بنباتات غير منتخبة . ويفضل -دائماً- إجراء اختبار النسل في مكررات . وتنتج الأنسال لاختبارها بإحدى الطرق التالية :

(أ) بحصاد بذور النباتات المنتخبة التي تركت للتلقيح الخلطي المفتوح .

(ب) بحصاد بذور النباتات المنتخبة بعد تلقيحها ذاتياً .

(ج) بحصاد بذور التلقيح القمي top cross بين كل من النباتات المنتخبة - التي تستعمل كأب - وصنف تجارى ناجح يستعمل كأم ، ويعرف باسم الصنف الاختبارى Tester Variety . كما يلحق -أيضاً- كل نبات منتخبة ذاتياً ، وتحصد هذه البذور كذلك . وبناء على نتيجة تقييم التلقيح القمي .. يتم تحديد النباتات ذات الصفات المرغوبة ، وهي التي تخطط بذورها الناتجة من التلقيح الذاتي معاً ؛ لبدء دورة جديدة من الانتخاب .

٢- خلط السلالات المرباة داخلياً :

تربى بعض السلالات بالتلقيح الذاتي لعدة أجيال ، ثم تخطط بذور السلالات المنتخبة معاً ؛ لتكون أساساً للصنف الجديد ، وتعرف هذه الطريقة باسم line breeding ، وهي تفيد في التخلص من بعض الأليلات المتنحية غير المرغوبة ، ولكنها نادراً ماتتبع في تحسين النباتات الخلطية التلقيح لما يصاحبها من نقص في قوة النمو ؛ بسبب التربية الداخلية ، الأمر الذي يجعل من الصعب تقييم السلالات التي يُراد إدخالها في الصنف الجديد . هذا .. فضلاً عن أن هذه الطريقة تشجع على ظهور سلالات ، تزداد فيها نسبة التلقيح الذاتي ، بينما يكون من المرغوب زيادة نسبة التلقيح الخلطي بين السلالات التي تشكل الصنف الجديد ، للحصول على أكبر قدر من قوة الهجين . ويفضل - عند اتباع هذه الطريقة - أن يكون عدد السلالات التي تدخل في تكوين الصنف الجديد كبيراً ؛ حتى لا تكون قريبة من بعضها البعض ، ولزيادة فرصة ظهور قوة الهجين في الصنف الجديد .

٣- الانتخاب الإجمالي المبني على تمثيل كافة الظروف البيئية :

يعرف الانتخاب الإجمالي المبني على تمثيل كافة الظروف البيئية في الحقل باسم Stratified Mass Selection ، ويجرى بتقسيم الحقل الذي تجرى فيه عملية الانتخاب إلى عدة أقسام متساوية ، ثم ينتخب من كل منها عدد متساو من النباتات ، وهي التي

تحصد بذورها وتخلط معاً ؛ لبدء دورة جديدة من الانتخاب . وتفيد هذه الطريقة فى تقليل تأثير البيئة إلى أدنى مستوى ممكن ؛ نظراً لأنها تضمن تمثيل كل الظروف البيئية فى منطقة الدراسة .

٤- طريقة الكوز للخط ear-to-row method :

تعرف طريقة تقييم نسل النباتات المنتخبة التى تُركت للتلقيح الخلطى الطبيعى (الطريقة ١ أ) عند تطبيقها على الذرة باسم طريقة الكوز للخط . وقد أدخلت هذه الطريقة بواسطة G.G. Hopkins فى عام ١٨٩٧ ، وفيها تحصد الكيزان الممتازة من النباتات التى تعرضت للتلقيح الخلطى العشوائى ، ويزرع فى العام التالى جزء من بذور كل كوز فى خط مستقل ، بينما يحتفظ ببقية البذور . وبعد أن ينتهى التقييم .. تخلط البذور المتبقية من الكيزان التى ظهر تفوقها معاً ؛ لبدء دورة جديدة من الانتخاب فى الموسم التالى . وبذا .. فإن كل دورة انتخاب تستمر لمدة موسمين زراعيين .


وقد أفادت هذه الطريقة فى تحسين محصول الذرة فى محتواه من الدهون والبروتين فى سنوات قليلة ، واستمر التحسين مع استمرار الانتخاب . ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال بالنسبة للمحصول ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها لاتقيد فى تقييم التركيب الوراثى للنباتات المنتخبة بصورة جيدة (حيث لأيقم كل نسل سوى فى خط واحد فى منطقة واحدة) ، فضلاً على أن النباتات المنتخبة (التي تقيم أنسائها) .. تتلقى دائماً حبوب لقاح من نباتات غير منتخبة .

تحسين نسبتي الدهون والبروتين فى الذرة بطريقة الانتخاب الإجمالى


يعد برنامج تحسين نسبة الدهون والبروتين فى حبوب الذرة - بالانتخاب الإجمالى- من الدراسات الكلاسيكية فى تربية النبات . وقد بدأ الانتخاب فى الصنف المفتوح التلقيح برزهوايت Burr's White فى جامعة إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية فى عام ١٨٩٦ ، واستمر إلى الوقت الحاضر باستثناء الفترة من ١٩٤٢ إلى ١٩٤٤ . وكان الهدف هو إنتاج أربع سلالات من الذرة مرتفعة -أو منخفضة- فى نسبة كل من الدهون والبروتين فى الحبوب ، واتبعت طريقة الكوز للخط خلال الأجيال الثمانية والعشرين الأولى منها . أما

بعد ذلك .. فكان يؤخذ ٦٠ كوزاً من كل من السلالات الأربع للتقييم ، ثم تخطط معاً حيوب أكثر ١٢ كوزاً من كل سلالة إظهاراً للصفة المنتخبة .

وقد أعطى الانتخاب لنسبة البروتين المرتفعة تحسناً مستمراً ؛ حيث ارتفعت النسبة من ١٠,٩٪ في عشيرة الأساس إلى ١٣,٧٪ ، و ١٦,١٪ ، و ١٩,٣٪ ، و ٢٦,٦٪ في الأجيال : الخامس ، والعشرين ، والخمسين ، والسبعين على التوالي . وبالمقارنة .. فقد استمرت الاستجابة كذلك للانتخاب لنسبة البروتين المنخفضة ؛ حيث انخفضت النسبة إلى ٩,٦٪ ، و ٧,٣٪ ، و ٤,٩٪ ، و ٤,٤٪ في نفس الأجيال السابقة الذكر على التوالي . كذلك ارتفعت نسبة الدهون بانتظام من ٤,٧٪ إلى أن وصلت إلى أكثر من ١٥٪ ، بينما توقفت الاستجابة للانتخاب المستوى المنخفض من الدهون عند حوالي ٨٪ بعد ثلاثين عاماً من الانتخاب (شكلا ٧-١ ، ٧-٢) . وفضلاً على ذلك .. فإن الانتخاب في الاتجاه العكسي -لصفة نسبة البروتين أو الدهون بعد ٥٠ جيلاً من الانتخاب في اتجاه ما- أحدث تغييراً كبيراً وسريعاً في الصفة . حدث ذلك في السلالات الأربع (العالية والمنخفضة من حيث نسبة البروتين أو الدهون) ؛ مما يدل على أن العشيرة الأصلية كانت تحتوى على اختلافات وراثية أكثر مما كان متوقعا (Welsh ١٩٨١) .



شكل (٧ - ١) : تأثير خمسين جيلاً من الانتخاب على نسبة الدهون في حيوب الذرة . يمثل الخط المتصل النتائج الحقيقية ، بينما يمثل الخط المتقطع القيم المتوقعة علي أساس معادلات الارتباط المبينة (عن Allard ١٩٦٠) .



شكل (٧ - ٢) : تأثير خمسين جيلاً من الانتخاب على نسبة البروتين في حبوب الذرة . يمثل الخط المتصل النتائج الحقيقية ، بينما يمثل الخط المتقطع القيم المتوقعة علي أساس معادلات الارتباط المبينة .

ولسوء الحظ .. فإن سلالة الذرة المرتفعة في نسبة البروتين كان غناها بالبروتين مرده إلى ارتفاع محتواها من البرولامينات (أو الزيين zein) ، وهي بروتينات فقيرة بالحامضين الأمينيين الضروريين ليسين lysine ، وتربتوفان tryptophan ؛ لذا.. فإن هذه السلالة لم تستعمل في أى برنامج للتربية ؛ لتحسين نسبة البروتين في الذرة . وقد كان محصول هذه السلالة منخفضاً ؛ حيث لم يزد على نحو ثلاث متوسط محصول الذرة بولاية إلينوى . ويبدو أن ذلك كان مرده إلى وجود علاقة سالبة بين المحصول ونسبة البروتين (عن Alexander ١٩٧٥) .

طرز الاستجابة للانتخاب

يذكر Allard (١٩٦٤) خمسة طرز للاستجابة للانتخاب في طريقة الانتخاب الإجمالي في النباتات الخلطية التلقيح ، يمكن إيجازها فيما يلي :

الطراز الأول .. يحدث فيه تقدم سريع مع الانتخاب ، يليه ببطء واضح . يحدث ذلك في حالات الانتخاب لصفات خاصة ؛ مثل طول النبات ، واللون ، والمقاومة لبعض الأمراض ،

وهى صفات يتحكم فيها جينات رئيسية major ، ذات تأثير كبير على الصفة ، وأخرى ثانوية minor ذات تأثير ضعيف . ويرجع التقدم السريع - فى البداية - إلى انتخاب الجينات الرئيسية ، بينما يحدث التقدم البطئ الذى يعقب ذلك نتيجة لانتخاب الجينات الثانوية .

الطراز الثانى .. تحدث فيه استجابة بطيئة ومستمرة للانتخاب ؛ ويحدث ذلك فى حالات الانتخاب للصفات التى يتحكم فيها عدد كبير من الجينات التى تتركز ببطء - وبصفة تدريجية - مع استمرار الانتخاب ، ومن أمثلتها .. صفات المحتوى المرتفع أو المنخفض من البروتين ، والمستوى المرتفع من الدهون فى الذرة .

الطراز الثالث .. تحدث فيه استجابة بطيئة ومستمرة لفترة ، ثم تتوقف -بعدها- الاستجابة للانتخاب كلية . حدث ذلك فى حالة الانتخاب لصفة المحتوى المنخفض من الدهون فى الذرة ؛ حيث استمر الانخفاض البطئ فى نسبة الدهون لنحو ٣٠ جيلاً ، ثم توقف بعد ذلك . ورغم أن هذه الصفة يتحكم فيها أليلات أخرى من نفس الجينات التى تتحكم فى صفة المحتوى المرتفع من الدهون .. إلا أن الانخفاض فى نسبة الدهون كان مصاحباً بنقص مستمر فى حجم جنين الحبة ، واستمر الانخفاض فى نسبة الدهون إلى أن أصبح الجنين صغيراً للغاية ؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور عقبة فسيولوجية أمام الانتخاب رغم استمرار توفر الاختلافات الوراثية لتلك الصفة .

الطراز الرابع .. لا تحدث فيه أية استجابة للانتخاب . يحدث ذلك عند محاولة تحسين الصفات ذات درجات التوريث المنخفضة ؛ مثل صفة المحصول بطريقة الكوز للخط ؛ لأن مثل هذه الصفات تتطلب إجراء اختبار النسل الناتج من التلقيح الذاتى ، بينما يستحيل ذلك بطريقة الكوز للخط .

الطراز الخامس .. تحدث فيه استجابة سريعة ، ثم تتوقف الاستجابة ، ثم تتكرر مرحلتا الاستجابة السريعة والتوقف مرة أخرى . يحدث ذلك فى الحالات التى توجد فيها اختلافات كامنة ، لا تظهر إلا بعد حدوث عبور مناسب ، يؤدى إلى ظهور تراكيب وراثية جديدة ، تفيد فى عملية الانتخاب .

الفصل الثامن

الظواهر المستعملة فى إنتاج الهجن : العقم الذكرى وعدم التوافق

يستفيد المربي من عدد من الظواهر النباتية الطبيعية فى تسهيل إنتاج الهجن ، وإجراء التلقيحات . ومن هذه الظواهر انفصال الجنس ، والعقم الذكرى ، وعدم التوافق . وقد سبق تناول ظاهرة انفصال الجنس بالتفصيل فى الفصل الثانى ، وتناول الظاهرتين الآخرين فى هذا الفصل قبل الدخول فى تفاصيل طرق إنتاج الأصناف الهجين فى الفصل العاشر .

العقم الذكرى

تنتشر ظاهرة العقم الذكرى Male Sterility انتشاراً واسعاً فى المملكة النباتية ، لدرجة أنها وجدت فى أى محصول بحث فيه عنها . كما تتكرر الظاهرة بأكثر من جين فى المحصول الواحد ؛ فيعرف - مثلاً - ٢٤ زوجاً من الجينات غير الآلية ، تتحكم فى طفرات مختلفة من العقم الذكرى فى الشعير ، ونحو ٢٤ زوجاً فى الذرة ، ونحو ٥٠ زوجاً فى الطماطم ، و ٩ أزواج فى البسلة (Myers & Gritton ١٩٨٨) .

مظاهر العقم الذكرى

تؤدى حالة العقم الذكرى إلى عدم قدرة النبات على أن يكون ملقحاً لأزهاره أو لأزهار

أية نباتات أخرى . ويأخذ العقم الذكري أحد ثلاثة مظاهر ، هي :

١- عقم حبة اللقاح Pollen Sterility :

تخلو المتوك في هذه الحالة من حبوب اللقاح ، أو تنتج بها حبوب لقاح ضامرة ، لاتصلح للتلقيح .

٢- عقم الأسدية Staminal Sterility :

تتحور أسدية الطلع في هذه الحالة إلى تراكيب أخرى ، أو قد تختفى كلية ؛ ففي الجزر - مثلاً - توجد سلالات عقيمة الذكر ، تتحور فيها الأسدية إلى تراكيب بتلية مختلفة الأشكال ، ويطلق على الظاهرة في هذه الحالة اسم (Eisa & Wallace) Petaloidy (١٩٦٩) .

٣- عدم تفتح المتوك Positional sterility :

تفشل المتوك في هذه الحالة في التفتح ، رغم أنها تكون ممتلئة بحبوب لقاح خصبة ، قادرة على إحداث الإخصاب لو أنها استعملت في التلقيح يدوياً .

ويُعنى بالعقم الذكري -عادة- عقم حبة اللقاح ؛ لأنه أكثر مظاهر العقم شيوعاً . وأياً كان مظهر العقم .. فإنه قد يتحكم فيه عوامل وراثية في النواة ، أو في السيتوبلازم ، أو في كليهما .

العقم الذكري الوراثي

ينتشر العقم الذكري الوراثي genetic male sterility في جميع النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية ، سواء أكانت برية أم مزروعة . ويتحكم في هذا النوع من العقم - عادة - عامل وراثي واحد مُتَنَحٍ ، إلا أنه قد يتفاعل -أحياناً- عاملان وراثيان ، أو أكثر ؛ لإعطاء صفة العقم ، ويرمز إلى عامل العقم الذكري بالرمز ms (وهما الحرفان الأولان لكلمتي male sterility) ، ويكون التركيب الوراثي ms ms عقيماً ، بينما يكون التركيبان الآخران (Ms Ms ، و Ms ms) ذوي خصوبة .

يمكن نقل صفة العقم الذكري الوراثي بسهولة إلى أي صنف ، أو سلالة ، يراد

استعمالها كأم في الهجن ؛ وذلك باتباع طريقة التهجين الرجعى (يراجع الفصل الثانى عشر للتفاصيل الخاصة بهذه الطريقة) . وتستعمل السلالة التى يراد نقل صفة العقم الذكرى إليها كأم ؛ لتلقيح السلالة الحاملة لصفة العقم الذكرى ، ثم يُلقح الجيل الأول - ذاتياً - لعزل النباتات الأصلية فى صفة العقم ، وهذه تُلقح -بدورها رجعىاً- مرة أخرى بالصنف المراد نقل صفة العقم الذكرى إليه . وباستمرار التلقيحات الرجعية المتبوعة بالتلقيح الذاتى .. نحصل بعد ٦-٨ تلقيحات رجعية على سلالة جديدة ، تتشابه مع السلالة الأصلية فى جميع الصفات ، فيما عدا احتوائها على صفة العقم الذكرى .

وتتم المحافظة على السلالات العقيمة الذكر باتباع إحدى الطرق التالية :

١- بالتلقيح الذاتى اليدوى للحالات التى تنتج فيها الأزهار حبوب لقاح خصبة ، ولكن متوكة تكون غير قادرة على التفتح . وتتطلب هذه الطريقة جهداً خاصاً من المربي ؛ لإدامة السلالات العقيمة الذكر .

٢- بالاستفادة من ظاهرة الخصوبة الجزئية ، التى تظهر على النباتات العقيمة الذكر تحت ظروف معينة بإكثارها فى هذه الظروف ، بينما يمكن استعمالها فى إنتاج الهجن فى الظروف التى يكون فيها العقم تاماً . ومن أمثلة ذلك .. حالة عقم ذكرى ظهرت فى القطن ، كانت فيها النباتات المتنحية الأصلية خصبة جزئياً ، تحت ظروف البيوت المحمية (الصوبات) بينما كانت عقيمة تماماً تحت ظروف الحقل ، وظهرت حالة عقم أخرى فى الجزر ، كانت فيها النباتات خصبة - جزئياً - فى ولاية وسكتس ، بينما كانت عقيمة تماماً فى ولاية كاليفورنيا (Duvick ١٩٦٦) .

٣- بتلقيح السلالة العقيمة الذكر الأصلية (ms ms) بسلالة أخرى ذات أصول وراثية مماثلة isogenic line ، تكون خصبة الذكر وخليطة (Ms ms) ، ويؤدى التلقيح بينهما إلى إنتاج نسل يتوفر فيه التركيبان الوراثيان ms ms ، و Ms ms لنفس السلالة ، بنسبة ١:١ ، ويمكن بتلقيحهما - معاً - الاستمرار فى المحافظة على السلالة العقيمة الذكر، كلما تطلب الأمر إكثارها .

هذا .. ويؤدى استعمال السلالات العقيمة الذكر وراثياً -كأم فى التهجينات- إلى إنتاج هجن تكون خليطة (Ms ms) وخصبة . وتقل الاستفادة من هذه الظاهرة فى إنتاج الهجن التجارية من المحاصيل الذاتية التلقيح ؛ نظراً للحاجة إلى وسيلة صناعية لنقل حبوب اللقاح

من السلالة المستعملة كآب إلى السلالة العقيمة الذكر المستعملة كأم ، ولكنها - أى الظاهرة - تفيد - على الأقل - فى تجنب الحاجة إلى إجراء عملية خصى أزهار سلالات الأمهات . كما اقترح استعمال العقم الذكري ؛ كوسيلة لتسهيل عملية الانتخاب المتكرر فى هذه الفئة من النباتات .

العقم الذكري السيتوبلازمى

يحدث العقم الذكري السيتوبلازمى Cytoplasmic Male Sterility عندما يوجد فى السيتوبلازم عامل خاص بالعقم ، يرمز له بالرمز S (من العقم Sterility) ؛ بينما يوجد العامل F (من الخصوبة Fertility) فى سيتوبلازم النباتات غير العقيمة .

ويمكن نقل صفة العقم الذكري السيتوبلازمى - بسهولة - إلى أى صنف أو سلالة يراد استعمالها كأم فى الهجن ؛ وذلك باتباع طريقة التهجين الرجعى . وتستعمل السلالة التى يراد نقل صفة العقم الذكري إليها كآب لتلقيح السلالة الحاملة لصفة العقم الذكري السيتوبلازمى . وتكون نباتات الجيل الأول الناتجة عقيمة الذكر ، لأن السيتوبلازم ينتقل إليها من الأم العقيمة الذكر ، المحتوية على عامل العقم الذكري . وتلقح نباتات الجيل الأول - رجعىاً - بالسلالة المراد نقل صفة العقم الذكري إليها ؛ وباستمرار هذه العملية .. نحصل (بعد ٦-٨ تلقيحات رجعية) على سلالة جديدة ، تتشابه مع السلالة الأصلية فى جميع الصفات فيما عدا احتوائها على صفة العقم الذكري .

وتتم المحافظة على السلالات الحاملة لعامل العقم الذكري السيتوبلازمى بسهولة وإكثارها ؛ وذلك بتلقيحها بسلالة أخرى من نفس الصنف isogenic line تكون خصبة الذكر . وتكون النباتات الناتجة من هذا التلقيح عقيمة الذكر ؛ لأنها تتلقى السيتوبلازم من الأم العقيمة ، كما تكون مماثلة للسلالة التى يراد إكثارها ؛ إذ لا يحدث بها أى تغير فى التركيب الوراثى لتشابه أبوى التلقيح وراثياً . وتستمر المحافظة على السلالة بتكرار نفس التلقيح .

ويؤدى استعمال السلالات العقيمة سيتوبلازمياً كأم فى التهجينات إلى إنتاج هجن تكون عقيمة الذكر ؛ لذا .. فإن استعمال هذا النوع من العقم الذكري لا يصلح للمحاصيل التى تؤكل ثمارها أو بنورها (لأن نباتات الجيل الأول الهجين تكون عقيمة ، ولا تنتج

قيمة q يقل معدله بعد كل جيل من الانتخاب إلى نصف ماتكون عليه الحال عند إجراء الانتخاب قبل الإزهار : لأن حبوب اللقاح التي تخصب بويضات النباتات المنتخبة تكون من كل من النباتات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها على حد سواء .

جدول (٣-٩) : تأثير استبعاد جمع الأفراد الحاملة لصفة متنحية غير مرغوب فيها (q^2) على نسبة الأليل المتنحي (q) في عشيرة مندلية خلطية التلقيح (عن Burns ١٩٨٣).

نسبة الأليل المتنحي (q)	عدد الأجيال الانتخابية ضد الصفة
٠,٥٠٠	صفر جيل عشيرة الأساس
٠,٣٣٣	١
٠,٢٥٠	٢
٠,٢٠٠	٣
٠,١٦٧	٤
٠,١٤٣	٥
٠,١٢٥	٦
٠,١١١	٧
٠,١٠٠	٨
٠,٠٩١	٩
٠,٠٨٣	١٠
٠,٠١٩	١١
٠,٠١٠	١٢
٠,٠٠١	١٣

وكمثال على ماتقدم بيانه .. نفترض أن عشيرة في حالة توازن كانت فيها نسبة النباتات المتنحية الأصلية $aa = q^2 = ٠,٣٦$. ويعنى ذلك أن نسبة الأليل المتنحي $q = (a) = \sqrt{٠,٣٦} = ٠,٦$ ، وأن نسبة الأليل السائد $(A) = p = ١ - q = ١ - ٠,٦ = ٠,٤$. وبهذا .. تكون نسبة التركيب الوراثى السائد الأصل $AA = p^2 = ٠,٤ \times ٠,٤ = ٠,١٦$ ، ونسبة التركيب الوراثى السائد الخليط $Aa = 2pq = ٠,٤ \times ٠,٦ \times ٢ = ٠,٤٨$. فإذا أمكن التخلص من جميع النباتات التي تحمل التركيب الوراثى المتنحي aa قبل الإزهار .. فإن النباتات المتبقية تكون أباء وأمهات للجيل التالى ، وتنتج جاميطاتها على

النحو التالي : تتكون حبوب لقاح تحمل الأليل السائد (A) تكون نسبتها $p = 0.64$ (من التراكيب الوراثية AA) + 0.24 (من التراكيب الوراثية Aa) $\div 0.64$ (مجموع نسب التراكيب الوراثية التي تشارك في إنتاج الجاميطات للجيل التالي) $= 0.625$ ، كما تتكون أيضاً حبوب لقاح تحمل الأليل المتنحي (a) تكون نسبتها $q = 0.24$ (من التراكيب الوراثية Aa) $\div 0.64$ (مجموع نسب التراكيب الوراثية التي تشارك في إنتاج الجاميطات للجيل التالي) $= 0.275$ وتتكون في الوقت نفسه بويضات بالطريقة نفسها ، تكون نسبتها $p = 0.625$ للبويضات الحاملة للأليل السائد (A) ، $q = 0.275$ للبويضات الحاملة للأليل المتنحي (a) . ويلاحظ أن مجموع $q+p = 0.625 + 0.275 = 1.0$ ، وهو ما يؤكد دقة الحسابات . يؤدي التزاوج الاعتباري بين هذه الجاميطات ، إلى أن تصبح نسب التراكيب الوراثية المتكونة في الجيل التالي كما يلي :

الأمهات

الأبــــــــــــــــاء	$p = A = 0.625$	$q = a = 0.275$
$p = A = 0.625$	$AA = p^2 = 0.391$	$Aa = pq = 0.224$
$q = a = 0.275$	$Aa = pq = 0.224$	$aa = q^2 = 0.141$

أي إن $AA = p^2 = 0.391$ ، و $Aa = 2pq = 0.468$ ، و $aa = q^2 = 0.141$ (يلاحظ أن مجموع التراكيب الوراثية $= 1.0$ ، وهو ما يؤكد دقة الحسابات) . يتضح مما تقدم .. أن استبعاد جميع النباتات الحاملة للصفة المتنحية بحالة أصيلة - قبل الإزهار - أدى إلى تخفيض نسبة الأليل (a) في العشيرة من 0.6 إلى 0.275 $[= 0.141 + 0.468 \div 2]$ ، ونسبة النباتات المتنحية الأصيلة من 0.36 إلى 0.141 بعد جيل واحد من الانتخاب .

أما إذا لم يمكن التخلص من النباتات التي تحمل التركيب الوراثي المتنحي aa إلا بعد الإزهار .. فإن ذلك يعني أن هذه النباتات سوف تشارك بحبوب اللقاح في مجمع الجينات ولكنها لا تشارك بالبويضات ؛ وبذا .. فإن نسب الجاميطات الحاملة للأليلين (A) ، و (a) (a)

سوف تختلف بين حبوب اللقاح والبيضات على النحو التالي :

تتكون حبوب لقاح تحمل الأليل (A) ، تكون نسبتها $p = 0.16$ (من التراكيب الوراثية AA + (Aa) 0.24 (من التراكيب الوراثية Aa) $= 0.4$ ، كما تتكون حبوب لقاح تحمل الأليل المتنحي (a) تكون نسبتها $q = 0.36$ (من التراكيب الوراثية aa) $+ 0.24$ (من التراكيب الوراثية Aa) $= 0.6$. يلاحظ أن مجموع $q+p = 0.6 + 0.4 = 1.0$.

تتكون - أيضاً - بيضات تحمل الأليل (A) ، تكون نسبتها $p = 0.16$ (من التراكيب الوراثية AA + (Aa) 0.24 (من التراكيب الوراثية Aa) $\div 0.64$ (مجموع نسب التراكيب الوراثية التي تشارك في إنتاج الجاميطات المؤنثة) $= 0.625$ ، كما تتكون - أيضاً - بيضات تحمل الأليل المتنحي (a) تكون نسبتها $q = 0.24$ (من التراكيب الوراثية Aa) $\div 0.64$ (مجموع نسب التراكيب الوراثية التي تشارك في إنتاج الجاميطات المؤنثة للجيل التالي) $= 0.375$. يلاحظ أن مجموع $q+p = 0.375 + 0.625 = 1.0$ ، وهو ما يؤكد دقة الحسابات . يؤدي التزاوج الاعتباري بين الجاميطات المذكورة والمؤنثة المتكونة ، إلى أن تصبح نسب التراكيب الوراثية المتكونة في الجيل التالي على النحو التالي :

الأمهات

<u>الأبواء</u>	<u>$p = A = 0.625$</u>	<u>$q = a = 0.375$</u>
$p = A = 0.4$	$p^2 = AA = 0.25$	$pq = Aa = 0.15$
$q = a = 0.6$	$pq = Aa = 0.375$	$q^2 = aa = 0.225$

أي إن $p^2 = AA = 0.25$ ، و $2pq = Aa = 0.525$ ، و $q^2 = aa = 0.225$ (يلاحظ أن مجموع نسب التراكيب الوراثية $= 1.0$ ، وهو ما يؤكد دقة الحسابات) . يتبين مما تقدم .. أن استبعاد جميع النباتات الحاملة للصفة الأصلية بعد الإزهار أدى إلى خفض نسبة الأليل (a) في العشيرة من 0.6 إلى 0.4875 ، $[0.225 + (0.525 \div 2)]$ ، ونسبة النباتات المتنحية الأصلية من 0.36 إلى 0.225 بعد جيل واحد من الانتخاب .

ويتضح - لدى مقارنة الانتخاب قبل الإزهار بالانتخاب بعده - أن مقدار الانخفاض في

نسبة الأليل غير المرغوب فيه كان : $0,6 - 0,375 = 0,225$ ، عندما أجرى الانتخاب قبل الإزهار ، بينما كان $0,6 - 0,4875 = 0,1125$ ، عندما أجرى الانتخاب بعد الإزهار .
 أى إن فاعلية الانتخاب قبل الإزهار كانت ضعف فاعلية الانتخاب بعد الإزهار .

الأصناف البلدية (غير المحسنة)

تتميز الأصناف البلدية غير المحسنة من المحاصيل الخلطية التلقيح بأنها تكون على درجة عالية من عدم التجانس الوراثى highly heterogenous ، الذى يكون مصاحباً بقدر كبير من عدم التجانس المورفولوجى ؛ لأن نباتات العشيرة تكون غالباً غير متجانسة فى كل من الصفات الاقتصادية الظاهرة وغير الظاهرة (وهى التى يلزمها التعرض لظروف بيئية معينة ؛ حتى يمكن تمييزها) على حد سواء . وبالإضافة إلى ذلك .. فإن كل نبات فى العشيرة يكون خليطاً بدرجة عالية highly heterozygous . ويكون مرد ذلك كله إلى التلقيح الخلطى ، مع حالة الإهمال التى تعامل بها الأصناف البلدية -عادة- حيث لاتجرى محاولات لتحسينها ، وجعلها أكثر تجانساً .

الأصناف المحسنة المفتوحة التلقيح

يطلق على الأصناف المحسنة التى تكثر بالتلقيح الخلطى الطبيعى العشوائى بين أفرادها اسم الأصناف المفتوحة التلقيح Open-pollinated Varieties . ونظراً لأن هذه الأصناف تعد محسنة ؛ لذا .. فإنها تكون -عادة- أصيلة فى الصفات الاقتصادية المهمة ، خاصة النوعية منها ؛ فإذا كان الصنف المفتوح التلقيح المحسن مقاوماً لمرض معين ، أو يتميز بلون أو شكل معين للثمار .. فإن جميع نباتات الصنف تكون أصيلة ومتجانسة فى هذه الصفات . كما يحاول المربي -أيضاً- تأصيل الصفات الكمية المهمة ، ولكن هذا الهدف ربما لايتحقق كاملاً ؛ وبذا .. يبقى جزء من الجينات التى تتحكم فى الصفات الكمية الاقتصادية ، والجينات الأخرى التى تتحكم فى الصفات غير المنظورة بحالة خليطة ، ويتحدد المظهر العام للعشيرة بحالة التوازن التى تصل إليها نسب أليلات كل جين ، تبعاً لقانون هاردي - فينبرج . ويساعد التلقيح الخلطى المستمر على بقاء النباتات heterozygous ، والعشيرة غير متجانسة heterogenous فى هذه الصفات . وتتوقف درجتا الخلط وعدم التجانس الوراثى على نسبة المواقع الجينية غير الأصلية ، وهى

التي تقل كلما أعطى المربي اهتماماً أكبر لتجانس الصفات فى العشيرة ، قبل نشر زراعتها كصنف جديد .

السلالات المرباة داخلياً

تستعمل السلالات المرباة داخلياً Inbred lines من المحاصيل الخلطية التلقيح كآباء فى الهجن التجارية ، وهى تنتج بالتلقيح الذاتى الصناعى المستمر لعدة أجيال ، وهو ما يعرف بالتربية الداخلية Inbreeding ، ويغطى هذا الموضوع بالتفصيل فى الفصل الخاص بالأصناف الهجين .

تتميز السلالات المرباة - داخلياً - بأنها تكون على درجة عالية من التجانس الوراثى highly homogenous ، وأن نباتاتها تكون على درجة عالية من الأصالة الوراثية highly homozygous ، ولكن بدرجة أقل مما فى السلالات النقية pure lines التى يكون تجانسها وأصالتها الوراثية تامين ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن التلقيح الذاتى الصناعى المتبع فى إنتاج السلالات المرباة داخلياً نادراً ما يدوم لأكثر من ستة أجيال ، ثم تكثر السلالات - بعد ذلك - بالتلقيح الخلطى بين نباتات كل سلالة sib pollination . ويسمح هذا العدد من أجيال التلقيح الذاتى بوجود نسبة بسيطة من الأفراد الخليطة فى كل موقع جينى لم يكن بحالة أصيلة منذ البداية ، كما يؤدى إكثار السلالة بالتلقيح الخلطى بين نباتاتها إلى حدوث بعض الانعزالات الوراثية ، وهو ما يجعلها أقل تجانساً من السلالات النقية .

ونظراً لأن بعض الأنواع النباتية تتدهور بشدة مع التربية الداخلية ؛ لذا .. فإن المربي يلجأ إلى إكثارها بالتلقيح الخلطى بين نباتات النسل الواحد بعد الجيل الثالث ، أو الرابع للتلقيح الذاتى ، ويقابل ذلك نقص فى كل من درجتى التجانس الوراثى والأصالة الوراثية

الأصناف الهجين

تتشابه هجن المحاصيل الخلطية التلقيح مع هجن المحاصيل الذاتية التلقيح فى كونها على درجة عالية من التجانس الوراثى highly homogenous ، وأن نباتاتها خليطة وراثياً بدرجة عالية highly heterozygous . ويقال فى تفسير ذلك ماسبق ذكره بالنسبة

لهجن المحاصيل الذاتية التلقيح ؛ لأن الآباء التى تستخدم فى إنتاج الهجن فى كليهما عبارة عن سلالات أصيلة لاتتعزل . ويشذ عن ذلك هجن بعض المحاصيل الخطلية التلقيح ، التى تتدهور بشدة بالتربية الداخلية ، والتى لايمكن إكثار سلالاتها المرباة داخلياً بالتلقيح الذاتى بعد الجيل الثالث .

عشائر النباتات الخضرية التكاثر

يؤدى تراكم الطفرات المستمر فى النباتات الخضرية التكاثر إلى جعلها على درجة عالية من الخلط الوراثى highly heterozygous ، خاصة أنها تتكاثر -خضرياً- ولاتمر بالتلقيح الذاتى ؛ فإذا حدثت طفرة ، وغيرت موقعاً جينياً مثلاً من AA إلى Aa .. فإنه يبقى على هذه الصورة مع استمرار الإكثار الخضرى . ويؤدى ظهور مزيد من الطفرات على مر السنين -فى نسل نفس النبات الذى ظهرت فيه الطفرة- إلى أن يصبح النبات خليطاً بدرجة كبيرة ، وهذا هو الطابع العام المميز لجميع عشائر النباتات الخضرية التكاثر ، ولكنها تختلف فيما بينها فى درجة التجانس الوراثى homogeneity بين أفرادها .

العشائر الطبيعية

تتميز العشائر الطبيعية من النباتات الخضرية التكاثر بأنها تكون على درجة عالية من عدم التجانس الوراثى highly heterogenous ، ويرجع ذلك إلى أن الطفرة التى تظهر فى نبات ماتظل محصورة فى نسل هذا النبات فقط . ونظراً لأن الطفرات تظهر عشوائياً فى أى نبات ؛ لذا .. نجد أن العشيرة الطبيعية تتباين كثيراً فى صفاتها الوراثية ، ويكون ذلك مصاحباً بتباين مماثل فى الشكل المظهرى لنباتاتها .. وتكون العشائر الطبيعية على درجة عالية من الخلط الوراثى ؛ مثل بقية عشائر النباتات الخضرية التكاثر .

الأصناف البلدية غير المحسنة

تشابه الأصناف البلدية غير المتجانسة مع العشائر الطبيعية -وراثياً- إلى حد كبير ، إلا أنها تكون على درجة أعلى من التجانس الوراثى بين أفرادها ؛ بسبب اهتمام المزارعين بإكثار النباتات المتميزة فى صفاتها . وبرغم أن نباتات البستان الواحد قد تكون متجانسة

إلى حد ما .. إلا أن الصنف - عامة - يبقى غير متجانس إلى حد كبير ، ويمكن ملاحظة اختلافات كبيرة بين نباتات الصنف الواحد من مزرعة إلى أخرى .

الأصناف المحسنة

تكون الأصناف المحسنة على درجة عالية من الخلط الوراثي highly heterozygous ؛ كغيرها من عشائر النباتات الخضرية التكاثر ، إلا أنها تكون على درجة عالية جداً من التجانس الوراثي highly homogenous ؛ ذلك لأنها تنشأ بالإكثار الخضري لنبات واحد متميز ، ولا تحدث اختلافات وراثية بينها ، إلا إذا ظهرت طفرات فيها ، ولم ينتبه إليها ، وظلت تكثر مع الصنف الأصلي ؛ حيث تتميز -حينئذ- سلالات جديدة من كل صنف ، قد تكثر منفردة بدورها ، وتصبح أصنافاً جديدة .

السلالات الخضرية

إن السلالة الخضرية Clone هي النسل الناتج من الإكثار الخضري لنبات واحد ، ويمكن أن ينتمي النسل الناتج من الإكثار الخضري لنباتات السلالة الخضرية إلى نفس السلالة الخضرية أيضاً مادام أنه قد أمكن تتبع النسب ، مع التأكد من عدم ظهور طفرات بها .

وبينما تكون نباتات السلالة الخضرية على درجة عالية من الخلط الوراثي (مثل باقى عشائر النباتات الخضرية التكاثر) .. فإنها تكون متجانسة بنسبة 100% ٪١٠٠ homogenous ؛ لأن مرد جميع أفرادها يكون إلى نبات واحد أكثر خضرياً . ويفسر ذلك عدم جدوى الانتخاب فى السلالة الخضرية .

الهجن

إن هجن النباتات الخضرية التكاثر ليست سوى أصناف محسنة ، نشأت بالإكثار الخضري لنبات هجين جيد الصفات ؛ وبذا .. فإنها تتشابه مع الأصناف المحسنة فى كون نباتاتها على درجة عالية من الخلط الوراثي highly heterozygous ، بينما تكون أفراد العشيرة الواحدة على درجة عالية من التجانس highly homogenous .

الفصل الرابع

وراثة الصفات الكمية

سبق تعريف الصفات الكمية بأنها الصفات التى يوجد فيها استمرار فى الشكل المظهرى، والتى تتدرج من مستوى إلى آخر دون وجود فواصل محددة بين المستويات المختلفة ، كما فى صفات الطول ، والمحصول ، وقوة النمو ، وموعد النضج ... إلخ ، ونظراً لأن دراستها تستدعى القياس؛ لذا فإنها تسمى metrical traits أى الصفات المقیسة. وبرغم أن بعض الصفات الكمية يتحكم فى وراثتها جين واحد رئيسى major gene إلا أن غالبيتها يتحكم فيها عدد كبير من العوامل الوراثية multiple factors . وبينما تدرس الفئة الأولى منها كصفات بسيطة ، يمكن - غالباً - تمييز مجاميع أفرادها وعدّها فى الأجيال الانعزالية .. فإن دراسة الفئة الثانية منها يدخل فى نطاق علم الوراثة الكمية Quantitative Genetics وهو موضوع هذا الفصل ، الذى يستمد أهميته من أن الصفات الكمية تشكل أهم الصفات الاقتصادية التى يهتم بها المربى ، فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى طرق خاصة فى دراستها ، وتداولها عند التربية .

خصائص الوراثة الكمية

يعد كل من نلسون إيلى Nilson - Ehle (١٩٠٨ - ١٩٠٩) فى السويد ، وإيست East (١٩٠٦ - ١٩٣٦) فى الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل العلماء الذين تناولوا الصفات الكمية بالدراسة، وهما اللذان أثبتا أن الصفات الكمية تسلك فى وراثتها سلوك الصفات الوصفية .

قام نلسون ايلي بإجراء تلقيح بين سلالتين نقيتين من القمح ، إحداهما حمراء الحبوب ، والأخرى بيضاء ؛ فكانت حبوب الجيل الأول وسطاً بين صفتي الأبوين ، أى كانت السيادة غير تامة ، وتدرجت حبوب الجيل الثانى من اللون الأحمر القاتم إلى اللون الأبيض وأمكن تمييزها إلى خمس فئات مظهرية كانت بنسبة ١ : ٤ : ٦ : ٤ : ١ .

فسر نلسون ايلي هذه النتائج على أساس أن صفة لون الحبوب يتحكم فيها زوجان من الجينات المتفارقة المتماثلة التأثير ؛ أى إن كلاً منها مماثل للآخر فى تأثيره فى إظهار صفة لون الحبوب الحمراء ، وأن تأثير هذه الجينات مُجمَع cumulative ؛ بمعنى أنه كلما زاد عدد الجينات السائدة كان اللون الأحمر أكثر تركيزاً .

أما إيست .. فقد درس وراثة طول الزهرة (طول التويج) فى الدخان ، وهى صفة قليلة التأثير بالعوامل البيئية ، وأجرى إيست تلقيحاً بين سلالتين نقيتين من الدخان البرى *Nicotiana longiflora* تختلفان اختلافاً واضحاً فى طول الزهرة ، وحصل على النتائج المبينة فى جدول (٤ - ١) ، ثم درس الاختلافات بين الآباء وأفراد الأجيال الأول والثانى والثالث ، وتوصل منها (وكذلك من دراسات أخرى أجراها على طول الكوز فى الذرة) إلى ما يلى :

١- تتشابه الاختلافات التى تظهر بين نباتات الجيل الأول - والناجمة من التلقيح بين أفراد نقية - مع الاختلافات التى تظهر بين نباتات الآباء ، وتكون جميعها اختلافات راجعة إلى الظروف البيئية فقط .

٢- تظهر اختلافات أكبر فى الجيل الثانى ؛ نتيجة لحدوث الانعزالات الوراثية ، ويمكن الحصول على التراكيب الوراثية للأبوين إذا زرع عدد كاف من النباتات فى هذا الجيل .

٣- تعطى النباتات المختلفة مظهرياً فى الجيل الثانى أنسلاً ذات متوسطات مختلفة فى الجيل الثالث .

وقد نجح إيست فى تطبيق قوانين مندل على الصفات الكمية التى درسها . ويمكن تلخيص أهم خصائص وراثة الصفات الكمية فى أنه يتحكم فيها عدة عوامل وراثية ، ذات تأثير كبير واضح ، يطلق عليها عادة اسم major genes ، وعوامل وراثية

جدول (٤-١) : التوزيع التكرارى لطول توتيج الزمردية فى نباتات الآباء (P₁ و P₂) ، والجيل الاول (F₁) ، والجيل الثانى (F₂) الناتج بين سلالتين نقيتين من *Nicotiana longiflora*.

الجيل	سنة الزراعة	مركز مجسمات التوزيع التكرارى (سم)	العدد المتوسط الانحراف معادل	الانحراف القياسي
P ₁	١٩١١	٣٢ ٨. ١٣	١٢٥	١.٧٥
P ₁	١٩١٢	١٦ ٢٨ ٤	٤٩	٢.٠٠
P ₁	١٩١٣	١ ٣٢ ٤	٢٧	١.٠٩
F ₁	١٩١١		١٣٧	٢.٩٢
P ₂	١٩١١		٨٨	٢.٢٩
P ₂	١٩١١		٤٧	٢.٢٣
P ₂	١٩١١		٢٤	٢.٧٠
F ₂	(١)١٩١٢		٢١١	٥.٩١
F ₂	(٢)١٩١٢		٢٣٣	٦.٧٩

(١) حصل على نسل الجيل الثانى من نباتى جيل أول كانا ثاميين فى سنة ١٩١٢

أخرى كثيرة ذات تأثير بسيط ، يطلق عليها اسم polygenes (وتسمى - أحيانا - الجينات الثانوية minor genes) . وتعد الجينات الثانوية أكثر تأثراً بالعوامل البيئية من الجينات الرئيسية ، ولكن لا يمكن قياس تأثير البيئة على كل عامل منها على حدة. وبينما يكون تأثير الجينات الرئيسية فى الشكل المظهرى كبيراً .. فإن تأثير الجينات الثانوية لا يظهر إلا بعد تجمع عدد كبير منها فى التركيب الوراثى ، وتعد هى الأساس فى التطور وعملية الانتخاب الطبيعى .

تتميز الجينات الثانوية - أيضا - بأنها تنعزل بكثرة ، وتتوزع على أعداد كبيرة من التراكيب الوراثية (= ٣^٣ حيث ن هى عدد أزواج الجينات التى يختلف فيها الألبان) ، وتتميز كذلك بأن الشكل المظهرى لا يتأثر كثيراً بإحلال جين محل آخر. لذا .. فإن تراكيب وراثية كثيرة يمكن أن تعطى نفس الشكل المظهرى ؛ كما تكون معظم العشائر الخلطية التلقيح خليطة إلى حد كبير فى هذه العوامل . وأخيرا .. فإن هذه الجينات الثانوية (أو الـ polygenes) .. قد تكون ذات تأثير متعدد على الشكل المظهرى ، وقد تكون محورة لفعل جينات أخرى modifiers ، أو مثبطة لها suppressors .

ومن أهم خصائص الوراثة الكمية - أيضا - ما يعرف بالانعزال الفائق الحدود transgressive segregation حيث يظهر فى الجيل الثانى لبعض التلقيحات أفراد تزيد عن الأب الأعلى ، أو تقل عن الأب الأقل فى الصفة المدروسة . ويحدث ذلك عندما يختلف الألبان فى الجينات المسؤولة عن الصفة ، أو فى بعضها ، مما يؤدى إلى انعزال أفراد فى الجيل الثانى ، تحتوى على أليلات من تلك التى تزيد من الصفة ، تزيد عن تلك الموجودة فى الأب الأعلى أو تتركز فيها الأليلات التى تخفض من الصفة .

تحديد فئات ونسب الانعزالات الوراثية والمظهرية فى الجيل الثانى للصفات الكمية

يتبين من دراستنا لخصائص الوراثة الكمية أن عدة تراكيب وراثية يمكن أن تعطى نفس الشكل المظهرى؛ فعلى سبيل المثال .. لو أن صفة كمية يتحكم فيها ثلاثة أزواج من العوامل الوراثية هى : Aa ، و Bb ، و Cc ، وكانت الأليلات السائدة هى التى تزيد من الصفة .. فإن الشكل المظهرى - الذى يكون مرده إلى وجود خمسة أليلات سائدة - يمكن

ومن الطبيعي أنه لا يستعمل من المعاملات العددية بالمثلث ، إلا ما يقابل العدد الزوجى من الأليلات ، وهو الذى يمثل عدد أزواج العوامل الوراثية التى تتحكم فى الصفة ؛ فلو أن الصفة يتحكم فيها - مثلاً - ٣ أزواج من العوامل الوراثية .. نبحث فى المثلث مقابل ٦ أليلات ، لنجد أن نسب المعاملات العددية للفئات المظهرية هى ١ : ١٥ : ٢٠ : ١٥ : ٦ : ١ .

توزيع الانعزالات المظهرية فى الجيل الثانى

تتأثر طريقة توزيع الانعزالات المظهرية للصفات الكمية - فى الجيل الثانى - بعوامل كثيرة ، نذكر منها مايلى :


- ١- عدد الجينات التى تتحكم فى الصفة .
- ٢- كون هذه الجينات ذات سيادة غير تامة ، أم سائدة .
- ٣- كون الجينات مرتبطة ، أم تتوزع توزيعاً حراً .
- ٤- كون الجينات متساوية فى تأثيرها فى الصفة ، أم غير متساوية .
- ٥- وجود علاقة تفوق بين الجينات المتحكم فى الصفة ، والجينات الأخرى فى النبات ، أو عدم وجودها .
- ٦- كون الجينات المتحكم فى الصفة تتأثر بجينات أخرى محورة ، أو لا تتأثر .
- ٧- مدى نفاذية الصفة penetrance ، ودرجة التعبير عنها expressivity فى التراكيب الوراثية المختلفة .
- ٨- مدى تأثر الصفة بالعوامل البيئية .

وأغلب الظن أن كثيراً من هذه العوامل تتداخل فى التأثير على الصفات الكمية ، بل إن السلوك الوراثى للجينات المتحكم فى الصفة الواحدة قد يختلف من جين إلى آخر ، وهو مايعد أقصى درجات التعقيد . وتعد أبسط الحالات .. تلك التى تكون فيها الجينات المتحكم فى الصفة غير مرتبطة ببعضها ، ومتساوية فى تأثيرها ، ولا تتفاعل مع الجينات الأخرى فى النبات أو تتأثر بها ، وذات نفاذية تامة ، وتعبر عن نفسها بوضوح وبدرجة واحدة ، ولا تتأثر بالعوامل البيئية . وإذا توافرت كل هذه الشروط - وهو أمر نادر الحدوث- فإن الانعزالات التى تحدث فى الجيل الثانى تكون مماثلة لتلك التى فى شكل (٤-١) الذى تظهر به التوزيعات فى حالتى غياب السيادة (التوزيعات التى على الجانب

الأيسر من الشكل) ، والسيادة التامة (التوزيعات التى على الجانب الأيمن من الشكل) ، وعندما تكون الصفة بسيطة - أى يتحكم فيها جين واحد - وعندما تكون الصفة كمية ويتحكم فيها ٢ ، أو ٤ ، أو ٦ ، أو ١٢ جيناً (التوزيعات من أعلى إلى أسفل فى الشكل) . ويتضح من هذه التوزيعات مايلى :

١- عندما تكون الصفة ذات سيادة غير تامة .. فإن التوزيعات تكون متساوقة ، أى متماثلة ومنتظمة حول الشكل المظهرى ، الذى يأخذ القيمة الوسطية ، والذى يكون توزيعه أعلى التوزيعات ، ويكون كل شكل مظهرى معبراً عن تركيب وراثى ، أو مجموعة من التراكيب الوراثية التى تتساوى فى عدد الأليلات التى تؤثر فى الصفة . ويمكن الحصول على هذه التوزيعات من مفكوك المعادلة ذات الحدين ، أو باستخدام مثلث باسكال . وبينما يمكن تمييز فئات التوزيعات المختلفة فى الصفات البسيطة ، والصفات التى يتحكم فيها جينان أو ثلاثة جينات .. فإن فئات التوزيعات تقترب من بعضها مظهرياً - بشدة - كلما ازداد عدد الجينات المتحكم فى الصفة بحيث يصعب تمييزها عن بعضها ، كما تأخذ شكل منحنى التوزيع الطبيعى . ويصاحب كل زيادة فى عدد الجينات المتحكم فى الصفة نقص كبير فى نسبة الأفراد المشابهة للأبوين ، الأمر الذى يستلزم زراعة عدد كبير من نباتات عشيرة الجيل الثانى للحصول على نبات واحد أصيل فى الصفة ومماثل لأحد الأبوين .

٢- عندما تكون الصفة سائدة سيادة تامة .. فإن التوزيعات تكون منحرفة أو مائلة skewed نحو الشكل المظهرى للأليلات السائدة . وبينما تزيد عدد فئات التوزيعات المظهرية مع زيادة عدد الجينات المتحكم فى الصفة.. فإن عدد الفئات يبقى أقل مما فى حالة غياب السيادة عند نفس العدد من الجينات . ويكون من السهل تمييز الفئات المظهرية عن بعضها فى الصفات التى يتحكم فيها من ١ - ٤ جينات ، إلا أن فئات التوزيعات تتقارب مع بعضها ، ويصبح من الصعب تمييزها بعد ذلك . وكلما ازداد عدد الجينات المتحكم فى الصفة .. بدا التوزيع أقرب إلى التوزيع الطبيعى؛ أى كلما قل وضوح الجنوح ظاهرياً ؛ ذلك لأن نسب الفئات التى تتجمع فيها الأليلات المتتخية تنخفض بشدة ؛ بحيث لاتمثل شيئاً يذكر إلى جانب بقية العشيرة التى تبدو طبيعية إلى حد ما فى توزيعها برغم أنها تكون منحرفة - بشدة - نحو الصفة السائدة . ويلاحظ - أيضاً - أن الفئات المظهرية المنعزلة لاتمثل تراكيب وراثية متشابهة ؛ بسبب وجود السيادة .



شكل (٤-١) : التوزيعات المتوقعة في الجيل الثاني لصفة يتحكم فيها (من أعلي لأسفل في الشكل) ١، ٢، ٤، ٦، و ١٢ جيناً في حالتى السيادة التامة (العمود الأيمن) ، وغياب السيادة (العمود الأيسر) علماً بأن درجة توريث الصفة ١٠٠٪ (عن Allard ١٩٦٤).

ويبين جدول (٤-٢ ، نقلًا عن Simmonds ١٩٧٩) كيف أن زيادة عدد الجينات المتحكم في الصفة الكمية - عند غياب السيادة - يجعل توزيع فئات الأشكال المظهرية يقترب من التوزيع الطبيعي . أما شكل (٤-٢ ، نقلًا عن Falconer ١٩٨١) فإنه يبين كيف أن التوزيع في حالة السيادة التامة يبدو أقل جنوحاً كلما ازداد عدد الجينات المتحكم في الصفة . ويوضح الشكل التوزيع المتوقع من الانعزال الحر لأزواج الأليلات ، عندما يتحكم في الصفة ٦ جينات (شكل أ) ، أو ٢٤ جيناً (شكل ب) علماً بأن السيادة تامة لأحد الأليلات على الأليل الآخر في كل موقع جيني ، ونسبة جميع الأليلات هو . ، ويؤدي كل موقع جيني متتحكم أصيل إلى خفض قيمة الصفة بمقدار وحدة كاملة في الشكل (أ) وربع وحدة في الشكل (ب) ، كما يظهر على المحور الأفقي الذي تتوزع عليه فئات التراكيب الوراثية ، التي تختلف في عدد المواقع الجينية المتنحية الأصلية . أما المحور الرأسي .. فيمثل النسبة المئوية المتوقعة لكل فئة مظهرية ، وقد حسبت من مفكوك المعادلة ذات الحدين $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})^n$ حيث تمثل (ن) عدد المواقع الجينية .

تعد صفة وزن الثمرة في الطماطم مثلاً جيداً للصفات الكمية التي يسود فيها أحد أليلي كل جين على الآخر ، ويبين شكل (٤ - ٣) توزيعاً حقيقياً لمتوسط وزن الثمرة بالجرام، حُصِّلَ عليه في الجيل الثاني للتلقيح ، بين سلالة الطماطم رقم (٩٠٢) ذات الثمار الكبيرة نسبياً ، والسلالة البرية Red Current ذات الثمار الصغيرة جداً . ويظهر من الشكل سيادة صفة الثمار الصغيرة ، واقترب متوسط وزن الثمرة في الجيلين الأول والثاني من المتوسط الهندسي المحسوب ، وابتعداها كثيراً عن المتوسط الحسابي ، وهو ما يدل على أن الجينات ذات تأثير متجمع ، وأن تأثير إضافة أى جين هو زيادة وزن الثمرة بنسبة معينة ، وقد يمكن تفسير الجنوح المشاهد في التوزيع - في هذا المثال - على أساس سيادة الجينات التي تتحكم في وزن الثمرة الصغيرة .

تقدير عدد الجينات المتحكم في الصفات الكمية


تستخدم بعض المعادلات في تقدير عدد الجينات التي تتحكم في الصفات الكمية ، نذكر منها مايلي :

$$N = \frac{D^2}{8(VF_2 - VF_1)}$$

**


اسفل الجول مقارنة بين التوزيع الطبيعي ، وتوزيع صلة يتحكم فيها ستة جينات .

المعامل	عدد العوامل	الوراثية (ن)	المساحة المنخفضة	النوع	التكرار	لحظ الفئات	المظهرية	المساحة المتوسطة	النوع	التكرار	لحظ الفئات	المظهرية	المساحة العالية
1	2	1		2									1
2	4	1		6									1
3	8	1	6	20									1
4	16	1	8	70									1
5	32	1	10	252									1
6	64	1	12	792									1
7	128	1	14	2184									1
8	256	1	16	5712									1
9	512	1	18	14536									1
10	1024	1	20	35168									1
11	2048	1	22	87392									1
12	4096	1	24	215040									1
13	8192	1	26	530624									1
14	16384	1	28	1327104									1
15	32768	1	30	3307200									1
16	65536	1	32	8192000									1
17	131072	1	34	20121600									1
18	262144	1	36	50304000									1
19	524288	1	38	125769600									1
20	1048576	1	40	314457600									1
21	2097152	1	42	783168000									1
22	4194304	1	44	1967936000									1
23	8388608	1	46	4943232000									1
24	16777216	1	48	12383744000									1
25	33554432	1	50	30959360000									1
26	67108864	1	52	77398400000									1
27	134217728	1	54	193496320000									1
28	268435456	1	56	488790400000									1
29	536870912	1	58	1221926400000									1
30	1073741824	1	60	3144576000000									1
31	2147483648	1	62	7831680000000									1
32	4294967296	1	64	19679360000000									1
33	8589934592	1	66	49432320000000									1
34	17179869184	1	68	123837440000000									1
35	34359738368	1	70	309593600000000									1
36	68719476736	1	72	773984000000000									1
37	137438953472	1	74	1934963200000000									1
38	274877906944	1	76	4887904000000000									1
39	549755813888	1	78	12219264000000000									1
40	1099511627776	1	80	31445760000000000									1
41	2199023255552	1	82	78316800000000000									1
42	4398046511104	1	84	196793600000000000									1
43	8796093022208	1	86	494323200000000000									1
44	17592186044416	1	88	1238374400000000000									1
45	35184372088832	1	90	3095936000000000000									1
46	70368744177664	1	92	7739840000000000000									1
47	140737488355328	1	94	19349632000000000000									1
48	281474976710656	1	96	48879040000000000000									1
49	562949953421312	1	98	122192640000000000000									1
50	1125899906842624	1	100	314457600000000000000									1
51	2251799813685248	1	102	783168000000000000000									1
52	4503599627370496	1	104	1967936000000000000000									1
53	9007199254740992	1	106	4943232000000000000000									1
54	18014398509481984	1	108	12383744000000000000000									1
55	36028797018963968	1	110	30959360000000000000000									1
56	72057594037927936	1	112	77398400000000000000000									1
57	144115188075855872	1	114	193496320000000000000000									1
58	288230376151711744	1	116	488790400000000000000000									1
59	576460752303423488	1	118	1221926400000000000000000									1
60	1152921504606846976	1	120	3144576000000000000000000									1
61	2305843009213693952	1	122	7831680000000000000000000									1
62	4611686018427387904	1	124	19679360000000000000000000									1
63	9223372036854775808	1	126	49432320000000000000000000									1
64	18446744073709551616	1	128	123837440000000000000000000									1
65	36893488147419103232	1	130	309593600000000000000000000									1
66	73786976294838206464	1	132	773984000000000000000000000									1
67	147573952589676412928	1	134	1934963200000000000000000000									1
68	295147905179352825856	1	136	4887904000000000000000000000									1
69	590295810358705651712	1	138	12219264000000000000000000000									1
70	1180591620717411303424	1	140	31445760000000000000000000000									1
71	2361183241434822606848	1	142	78316800000000000000000000000									1
72	4722366482869645213696	1	144	196793600000000000000000000000									1
73	9444732965739290427392	1	146	494323200000000000000000000000									1
74	18889465931478580854784	1	148	1238374400000000000000000000000									1
75	37778931862957161709568	1	150	3095936000000000000000000000000									1
76	75557863725914323419136	1	152	7739840000000000000000000000000									1
77	151115727451828646838272	1	154	19349632000000000000000000000000									1
78	302231454903657293676544	1	156	48879040000000000000000000000000									1
79	604462909807314587353088	1	158	122192640000000000000000000000000									1
80	1208925819614629174706176	1	160	314457600000000000000000000000000									1
81	2417851639229258349412352	1	162	783168000000000000000000000000000									1
82	4835703278458516698824704	1	164	1967936000000000000000000000000000									1
83	9671406556917033397649408	1	166	4943232000000000000000000000000000									1
84	19342813113834066795298816	1	168	12383744000000000000000000000000000									1
85	38685626227668133590597632	1	170	30959360000000000000000000000000000									1
86	77371252455336267181195264	1	172	77398400000000000000000000000000000									1
87	154742504910672534362390528	1	174	193496320000000000000000000000000000									1
88	309485009821345068724781056	1	176	488790400000000000000000000000000000									1
89	618970019642690137449562112	1	178	1221926400000000000000000000000000000									1
90	1237940039285380274899124224	1	180	3144576000000000000000000000000000000									1
91	2475880078570760549798248448	1	182	7831680000000000000000000000000000000									1
92	4951760157141521099596496896	1	184	19679360000000000000000000000000000000									1
93	9903520314283042199192993792	1	186	49432320000000000000000000000000000000									1
94	19807040628566084398385987584	1	188	123837440000000000000000000000000000000									1
95	39614081257132168796771975168	1	190	309593600000000000000000000000000000000									1
96	79228162514264337593543950336	1	192	773984000000000000000000000000000000000									1
97	158456325028528675187087900672	1	194	1934963200000000000000000000000000000000									1
98	316912650057057350374175801344	1	196	4887904000000000000000000000000000000000									1
99	633825300114114700748351602688	1	198	12219264000000000000000000000000000000000									1
100	1267650600228229401496703205376	1	200	31445760000000000000000000000000000000000									1
101	2535301200456458802993406410752	1	202	78316800000000000000000000000000000000000									1
102	5070602400912917605986812821504	1	204	196793600000000000000000000000000000000000									1
103	10141204801825835211973625643008	1	206	494323200000000000000000000000000000000000									1
104	20282409603651670423947251286016	1	208	1238374400000000000000000000000000000000000									1
105	40564819207303340847894502572032	1	210	3095936000000000000000000000000000000000000									1
106	81129638414606681695789005144064	1	212	7739840000000000000000000000000000000000000									1
107	162259276829213363391578010288128	1	214	19349632000000000000000000000000000000000000									1
108	324518553658426726783156020576256	1	216	48879040000000000000000000000000000000000000									1
109	649037107316853453566312041152512	1	218	122192640000000000000000000000000000000000000									



شكل (٤ - ٢) : التوزيع المتوقع لصفة سائدة يتحكم فيها ٦ جينات (علي اليسار) ، أو ٢٤ جيناً (على اليمين) راجع المتن للتفاصيل (عن Falconer ١٩٨١) .

٢٠٠ -



شكل (٤ - ٣) : توزيع صفة وزن ثمرة الطماطم في الجيل الثاني للتقليع بين سلالة من الـ Red Currant وسلالة الطماطم رقم ٩٠٢ . راجع المتن للتفاصيل (عن Briggs & knowles ١٩٦٧) .

حيث تمثل N الحد الأدنى لعدد الجينات المتحكممة في الصفة وتمثل D الفرق بين متوسطى الأبوين، و VF_1 ، VF_2 تباينى الجيلين الأول والثانى على التوالى (Castle & Wright ١٩٢١). وتفترض هذه المعادلة مايلى :

- ١- عدم وجود أى ارتباط أو تفاعل بين الجينات المتحكممة فى الصفة .
- ٢- لكل الجينات درجة واحدة من الأهمية فى التأثير فى الصفة .
- ٣- لكل الجينات درجة سيادة واحدة .
- ٤- يكون أحد الأبوين - فقط - هو مصدر جمع الأليلات المؤثرة فى الصفة فى أحد الاتجاهات .

$$N = \frac{D^2}{8VA} \quad **$$

حيث يمثل VA التباين الإضافى الذى يحسب - بدوره- بالمعادلة التالية :

$$\frac{1}{2} VA = 2 VF_2 - (VB_1 + VB_2)$$

حيث يمثل VF_2 ، و VB_1 ، و VB_2 تباينات الجيل الثانى ، وعشائر التلقيحات الرجعية للأبوين الأول والثانى على التوالى (Mather & Jinks ١٩٧٨) .


التقدير الكمى لتأثير الجين على الفرد

تأثير الجينات فى العشائر

يعتبر متوسط العشيرة population mean من أهم القيم الإحصائية التى تستخدم فى الوصف الكمى للعشيرة ، وهو يمثل متوسط التراكيب الوراثية التى تتكون منها العشيرة ، ونوجز - فيما يلى - كيفية التوصل إلى المعادلة التى تستخدم فى حساب متوسط العشيرة (Falconer ١٩٨١) :

نفترض أن صفة ما يتحكم فيها جين واحد ، له أليلان ، هما A_1 ، و A_2 . ونفترض - أيضاً - أن القيمة الوراثية genotypic value للتركيب الوراثى الأصيل A_1A_1 هى $(+a)$ ، وللتركيب الوراثى الأصيل الآخر A_2A_2 هى $(-a)$ ، وللتركيب الوراثى الخليط

$A_1 A_2$ هي (d) ؛ فإذا كان الأليل A_1 هو الذى يزيد من الصفة وكانت النقطة (0) تمثل القيمة الوسيطة بين التركيبين الوراثيين الأصليين ، كما هو مبين فى الشكل التالى :



فإن قيمة التركيب الوراثي الخليط (أى d) تعتمد على درجة السيادة ؛ ففي غياب السيادة تماماً .. تكون (d) مساوية للصفر ، بينما تكون (d) موجبة إذا كان الأليل A_1 سائداً على A_2 وتكون سالبة إذا كان الأليل A_2 سائداً على A_1 .

وعندما تكون السيادة تامة تكون (d) مساوية لـ (+a) أو لـ (-a) ، بينما تكون قيمة d أكبر من (+a) ، أو أقل من (-a) فى حالة السيادة الفائقة over dominance .

ويعبر عن درجة السيادة بالقيمة : $\frac{d}{a}$.

هذا .. إلا أن القيمة الوراثية للتركيب الوراثية الموجودة فى العشيرة لا تتأثر بالتركيب الوراثية فقط ، وإنما بنسبها إلى بعضها البعض أيضاً ، ويطلق على القيمة التى تنتج من ذلك اسم متوسط العشيرة ، وهى التى تحسب كالاتى :

التركيب الوراثي	النسبة	القيمة	النسبة × القيمة
$A_1 A_1$	p^2	+a	$p^2 a$
$A_1 A_2$	$2pq$	d	$2pqd$
$A_2 A_2$	q^2	-a	$-q^2 a$

المجموع : $M = a(p-q) + 2dpq$

علماً بأن p^2 ، و $2pq$ ، و q^2 هى نسب التركيب الوراثية ، و M هو متوسط العشيرة .
وتتغير قيمة M فى الحالات المختلفة كما يلى :

١- فى حالة غياب السيادة تكون (d) مساوية للصفر ، وتصبح المعادلة كما يلى :

$$M = a(1-2q)$$

٢- فى حالة السيادة التامة تكون (d) مساوية لـ (a) ، وتصبح المعادلة كما يلى :

$$M = a (1-2q^2)$$

٣- فى حالة تأثر الصفة بعدد من العوامل الوراثية - كما هى الحال فى الصفات الكمية - تصبح المعادلة كما يلى :

$$M = \sum a (p - q) + 2 \sum dpq$$

ولكى يتسنى فهم العوامل المؤثرة على متوسط العشيرة .. فإنه تلزم دراسة متوسط تأثير كل جين على حدة average effect of single genes ، وهو الذى يمثل بمتوسط انحراف قيمة الأفراد التى تحتوى على هذا الجين عن متوسط العشيرة . فلو أن هذا الجين يوجد منه أليلان هما A_1 ، و A_2 بنسبة p ، و q على التوالى .. فإنه يمكن تقدير متوسط تأثير الأليل A_1 (أو α_1) ، والأليل A_2 (أو α_2) كما يلى :

قيم ونسب التراكيب الوراثية المتكونة

الجاميطات	A_1A_1 a	A_1A_2 d	A_2A_2 -a	متوسط قيم التراكيب الوراثية المتكونة	متوسط العشيرة	متوسط تأثير الجين
A_1	p	q		pa + qd	- [a (p-q) + 2dpq]	q [a+d (p-q)]
A_2		p	q	-qa + pd	- [a (p-q) + 2dpq]	- p [a+d (q-p)]

وبفرض أن الجاميطات التى تحمل الأليل A_1 تتحد عشوائياً مع الجاميطات الأخرى فى العشيرة .. فإن نسبة التراكيب الوراثية المنتجة تكون P من A_1A_1 ، و q من A_1A_2 ، وتكون القيمة الوراثية للتركيب A_1A_1 هى (+a) ، وللتركيب A_1A_2 هى (d) ، ويكون المتوسط هو $pa+qd$ ، ويكون الفرق بين هذه القيمة ومتوسط العشيرة هو متوسط تأثير الأليل A_1 . وبحساب قيمة متوسط العشيرة من المعادلة الخاصة بها .. نجد أن :

$$\alpha_1 = pa + qd - [a (p-q) + 2 dpq]$$

$$= q [a + d (p-q)]$$

$$\alpha_2 = - p [a + d (p-q)]$$

ويكون متوسط تأثير الجين (أو α) كما يلى :

$$\alpha = a + d (p - q)$$

وتكون العلاقة بين α ، و α_1 ، و α_2 كما يلي :

$$\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$$

$$\alpha_1 = q \alpha$$

$$\alpha_2 = -p \alpha$$

وتحسب لكل تركيب وراثي ما تعرف بقيمة التربية breeding value كما يلي :

قيمة التربية	التركيب الوراثي
$2\alpha_1 = 2q \alpha$	A_1A_1
$\alpha_1 + \alpha_2 = (p-q) \alpha$	A_1A_2
$2\alpha_2 = -2p\alpha$	A_2A_2

وتحسب قيمة التربية في حالة وجود أكثر من أليلين على أساس أنها تمثل مجموع تأثير أي أليلين يوجدان في التركيب الوراثي للفرد ، وهي تمثل جزءاً من القيمة الوراثية للفرد ، وهو الذي يحدد متوسط قيمة النسل أو سلوكه ويعرف الفرق بين القيمة الوراثية ، وقيمة التربية بالانحراف الذي يرجع إلى السيادة dominance deviation : إذ إن :

$$G = A + D$$

حيث تمثل "G" القيمة الوراثية ، و "A" قيمة التربية ، و "D" الانحراف العائد إلى السيادة . وتحسب القيمة الوراثية لجميع الجينات معاً كما يلي :

$$G = A + D + I$$

حيث تمثل : (A) مجموع قيم التربية للجينات المختلفة ، و (D) مجموع الانحرافات العائدة إلى السيادة ، و (I) مجموع الانحرافات العائدة إلى التفاعل بين الجينات غير الأليلية epistatic deviation . ويقال عند غياب (D) ، و (I) أن الجينات ذات تأثير إضافي؛ إذ يعنى الفعل الإضافي للجين additive gene action إما غياب السيادة بالنسبة للأليلات في الموقع الجيني الواحد (الجينات الأليلية) ، وإما غياب التفوق بالنسبة للجينات غير الأليلية .

ويمكن بيان العلاقة بين القيم التي سبقت دراستها كما يلي :

A_2A_2	A_1A_2	A_1A_1	التركيب الوراثي :
q^2	$2pq$	p^2	النسبة :
-a	d	a	القيمة الخاصة بالتركيب الوراثي :

الانحراف عن متوسط العشيرة

- 2 p (a + q d)	a(q-p) + d(1-2pq)	2q (a - p d)	القيمة الوراثية :
- 2 p (α+pd)	(q-p) α + 2pqd	2q (α- q d)	
-2 p α	(p-q) α	2 q α	قيمة التربية :
-2 p ² d	2pqd	- 2 q ² d	الانحراف العائد إلى السيادة :

هذا .. مع العلم بأن القيمة الوراثية قد عبر عنها بقيمة (a) ، أو بقيمة (α) ، وعبر عن الانحراف العائد إلى السيادة في صورة (d) ، علماً بأن (d) = صفراً في غياب السيادة ؛ حيث تتساوى القيمة الوراثية مع قيمة التربية .

درجة السيادة

تعتبر درجة السيادة degree of dominance (أو potence ratio) مقياساً لمتوسط سيادة كل الجينات المتحركة في الصفة في أحد الأباء على الجينات التي توجد في الأب الآخر ، وتحسب درجة السيادة بمقارنة المتوسطات المشاهدة لعشائر كل من الجيلين الأول ($\bar{F}_1$) ، والثاني ($\bar{F}_2$) ، والتلقيحات الراجعة إلى الأب الأول ($\bar{B}_1$) والثاني ($\bar{B}_2$) بالقيم المحسوبة التالية (عن Powers وآخرين ١٩٥٠) .

المتوسط المشاهد الذي تتسبب إليه درجة السيادة القيمة المحسوبة التي يقارن بها المتوسط المشاهد

$\bar{P}_1 + \bar{P}_2 / 2$	$\bar{F}_1$
$\bar{P}_1 + 2\bar{F}_1 + \bar{P}_2 / 4$	$\bar{F}_2$
$\bar{P}_1 + \bar{F}_1 / 2$	$\bar{B}_1$
$\bar{P}_2 + \bar{F}_1 / 2$	$\bar{B}_2$

ويلى ذلك تقدير جوهري الاختلافات بين المتوسطات الحسابية للعشائر (القيم المشاهدة)
بالقيم التى تقارن بها (القيم المحسوبة) ؛ باختبار "t" على النحو التالى :

$$t = \frac{\text{المتوسط المشاهد} - \text{المتوسط المحسوب}}{\text{الانحراف القياسى للمتوسط المشاهد}}$$

فإن لم يوجد فرق معنى بين المتوسط المشاهد والمتوسط المحسوب .. كان ذلك دليلاً
على غياب السيادة ، أما إذا وجد فرق معنى بين المتوسطين .. فإن الحالة قد تكون واحدة
من ثلاث كما يلى :

١- سيادة جزئية إذا كان المتوسط المشاهد للعشيرة بين متوسطها المحسوب ، والمتوسط
المشاهد لأحد الآباء .

٢- سيادة تامة عندما لا يختلف المتوسط المشاهد للجيل الأول - جوهرياً - عن المتوسط
المشاهد لأحد الآباء .

٣- سيادة فائقة Overdominance عندما يزيد المتوسط المشاهد للجيل الأول على الأب
الأعلى فى الصفة أو يقل عن الأب الأقل .

ويعطى Mather (١٩٤٩) معادلة أخرى لحساب درجة السيادة كما يلى :

$$\text{درجة السيادة} = \frac{\text{المتوسط المشاهد للجيل الأول} - \text{المتوسط المحسوب للجيل الأول}}{\frac{1}{4}(\text{متوسط الأب ذى القيمة المرتفعة} - \text{متوسط الأب ذى القيمة المنخفضة})}$$

فإن زادت قيمة درجة السيادة على (١+) أو نقصت عن (١-) كان ذلك دليلاً على وجود
سيادة فائقة . وإن كانت (١+) ، أو (١-) .. كان ذلك دليلاً على وجود سيادة تامة وإن كانت
(صفر) .. كان ذلك دليلاً على غياب السيادة ، وإن تراوحت بين أكثر من (١-) وأقل من (١+) -
فيما عدا قيمة الصفر - كان ذلك دليلاً على وجود سيادة جزئية .

تقدير درجة الجنوح skewness عن التوزيع الطبيعى

يعتبر الجنوح عن التوزيع الطبيعى فى عشائر الجيل الثانى دليلاً على الانحراف عن

التأثير الإضافي للجينات المتحكم في الصفات الكمية ، وتقدر درجة الجنوح على النحو التالي :

$$\text{درجة الجنوح} = \frac{3 (\text{المتوسط المشاهد للجيل الثاني} - \text{القيمة الوسطى (median)})}{\text{الانحراف القياسي للجيل الثاني}}$$

يستعمل اختيار "t" لتحديد مدى جوهرية الجنوح المحسوبة ، مع حساب قيمة "t" على النحو التالي (عن Snedecor ١٩٥٦) :

$$t = \frac{\text{درجة الجنوح}}{\sqrt{\frac{6n(n-1)(n-2)(n+1)(n+2)}{(n-1)(n-2)(n+1)(n+2)}}}$$

حيث تمثل (n) عدد أفراد الجيل الثاني . وتدل قيمة الجنوح الموجبة على زيادة عدد الأفراد ذوى القيم الأقل من المتوسط ، بينما تدل القيمة السالبة على زيادة عدد الأفراد ذوى القيم الأعلى من المتوسط .

المتوسطات الهندسية

يظهر التأثير الهندسي geometric action للجينات في بعض الصفات كصفة حجم الثمار مثلاً ؛ حيث تتفاعل الجينات مع بعضها بطريقة ليست إضافية additive ، وإنما تضاعفية multiplicative ، وهو ما يتمشى مع طبيعة الصفة ؛ حيث يكون الحجم حاصل ضرب أرقام ، وليس بحاصل جمع أبعاد ، ويقال إن الجينات ذات تأثير هندسي geometric gene action عندما تكون المتوسطات الهندسية المحسوبة بمختلف العشائر الهندسية أقرب إلى القيم الملاحظة لهذه العشائر ، بينما يقال إن الجينات ذات تأثير حسابي arithmetic gene action عندما تكون متوسطاتها الحسابية أقرب إلى قيمتها الملاحظة . وتحسب المتوسطات الهندسية على النحو التالي (عن Powers & Lyon ١٩٤١) .

$$\text{المتوسط الهندسي المتوقع للجيل الأول} = \sqrt{\text{المتوسط المشاهد للأب الأول} \times \text{المتوسط المشاهد للأب الثاني}}$$

المتوسط الهندسي المتوقع للجيل الثاني = العدد المقابل (antilogarithm) ↓ :

لوغاريتم المتوسط المشاهد للأب الأول + ٢ لوغاريتم المتوسط المشاهد للجيل الأول + لوغاريتم المتوسط المشاهد للأب الثاني

3

٢٠٠٠ المتوسط الهندسي المتوقع للتفقيح الرجعى للأب الأول =

المتوسط المشاهد للجيل الأول $\times$ المتوسط المشاهد للأب الأول

المتوسط الهندسي المتوقع للتلقيح الرجعي للأب الثاني =

المتوسط المشاهد للجيل الأول $\times$ المتوسط المشاهد للأب الثاني

ويمكن تصور التأثيرين الإضافي والهندسي للجينات بمثال تزيد فيه قيمة الصفة بزيادة عدد الجينات التي تتحكم فيها على النحو التالي :

١- في حالة التأثير الإضافي : قد تكون قيمة الصفة : ٣، ٦، ٩، و ١٢ ؛ حيث يزيد كل جين إضافي قيمة الصفة بمقدار ٣ وحدات ؛ أو ١، ١، ١، ٢، و ٣ ؛ حيث يزيد كل جين إضافي قيمة الصفة بمقدار ٠، ١ وحدة .

٢- فى حالة التأثير الهندسى : قد تكون قيمة الصفة ٣، و ٩، و ٢٧، و ٨١؛ حيث يزيد كل جين إضافى قيمة الصفة بمقدار ثلاثة أضعاف القيمة السابقة ؛ أو ١، و ١، و ١، و ٢١، و ١، و ٣٣١، و ١، و ٤٦٤١؛ حيث يزيد كل جين إضافى قيمة الصفة بمقدار ١، و ١ ضعف القيمة السابقة ، أى يضيف حوالى ١٠٪ إلى القيمة السابقة .

ويلاحظ أن توزيع الأفراد في الأجيال الانعزالية يكون دائماً مجنحاً skewed عندما تكون الجينات ذات فعل هندسي ، وللتأكد من صحة فرضية التأثير الهندسي للجينات .. يجب ألا تختلف القيم المشاهدة لعشائر الجيلين الأول والثاني ، وكذلك التلقيحات الرجعية - معنوياً - عن القيم المحسوبة على أساس التأثير الهندسي . ويؤدي تحويل القيم المشاهدة للأفراد في حالة الصفات التي تؤثر عليها الجينات بطريقة هندسية إلى لوغاريتمات ، إلى أن يصبح توزيع الأفراد قريباً من التوزيع الطبيعي .

وبينما لا يوجد أى ارتباط بين متوسطات أو تباينات الآباء والجيلين الأول والثاني وعشائر التلقيحات الرجعية فى حالة التأثير الإضافى للجينات .. نجد أن هذه القيم تكون مرتبطة ببعضها ، عندما تكون الجينات ذات تأثير هندسى ؛ ويصاحب زيادة المتوسطات زيادة التباينات فى حالة التأثير الهندسى ، بينما لا يشترط ذلك فى حالة التأثير الإضافى ؛ حيث قد تصاحب زيادة المتوسطات زيادة أو نقص فى التباينات (Brewbaker ١٩٦٤) .

مكونات التباين فى الصفات الكمية

يصعب فى الصفات الكمية تتبع كل جين على حدة فى الأجيال الانعزالية ، كما يصعب تقسيم النباتات إلى أقسام محددة حسب النسب المندلية المعروفة كما فى الصفات البسيطة أو التى يتحكم فيها عدد قليل من الجينات. ويسعى المربي - بدلاً من ذلك - إلى تقدير التباين Variance - وهو قيمة إحصائية - للدلالة على مدى الاختلافات المشاهدة فى الصفة فى العشائر التى يقوم بدراستها .

يعرف التباين الكلى المشاهد باسم تباين الشكل المظهرى Phenotypic Variance ، ويرمز له بالرمز (V_{Ph}) ؛ ونظراً لأن الاختلافات التى تشاهد فى الشكل المظهرى ترجع إلى تأثير كل من التركيب الوراثى ، والعوامل البيئية على كل فرد من أفراد العشيرة ؛ لذا .. فإن :

$$V_{Ph} = V_G + V_E$$

حيث يمثل (V_G) التباين الذى يرجع إلى تأثير التركيب الوراثى أو التباين الوراثى Genotypic Variance ، بينما يمثل (V_E) التباين الذى يرجع إلى تأثير البيئة أو التباين البيئى Environmental Variance .

التباين البيئى

يقدر التباين البيئى لأية صفة ؛ بحساب مدى التباين فى هذه الصفة فى عشيرة يحمل جميع أفرادها نفس التركيب الوراثى؛ كأن تكون جميعها - مثلاً - سائدة أصلية ، أو متنحية أصلية ، أو خليطة فى الصفة ويحسب التباين البيئى بالمعادلة التالية :

$$V_E = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n - 1}$$

حيث تمثل (X) القيمة المشاهدة للصفة لكل فرد من أفراد العشيرة و (n) عدد أفراد العشيرة ، بينما ترمز (Σ) لكلمة مجموع .

تجدر الإشارة إلى أن التباين البيئي لصفة ما لا يكون ثابتاً دائماً ، وإنما يتغير بتغير التركيب الوراثي لأفراد العشيرة في الصفة المدروسة ، وبتغيير الخلفية الوراثية لأفراد العشيرة ، فهو يكون أكبر - عادة - في السلالات الأصلية (مثل السلالات النقية ، أو السلالات المرباة تربية داخلية) عما في الأصناف العادية (الصادقة التربية ، أو المفتوحة التلقيح) ، ويقل في الأصناف الهجين عامة عما في الأصناف العادية . ورغم أن تقدير التباين البيئي يختلف بين العشائر غير المتجانسة .. إلا أنه يكون أقل فيها مما في العشائر الأكثر تجانسا ، باستثناء الأصناف الهجين . وبالإضافة إلى ما تقدم .. فإن التباين البيئي يختلف بين السلالات ذات الأصول الوراثية المتشابهة نظراً لاختلاف مدى تأثر التراكيب الوراثية السائدة الأصلية والمتنحية الأصلية بالصفة (أي يحدث تفاعل بين البيئة والتركيب الوراثي في التأثير على الصفة) . ولذا .. فإن أفضل تقدير للتباين البيئي يكون هو متوسط التباين البيئي للأبء والجيل الأول (وهى العشائر المتجانسة) كما يلي :

$$V_E = \frac{VP_1 + VP_2 + VF_1}{3}$$

حيث تمثل VP_1 ، و VP_2 ، و VF_1 تباينات أحد الأبء ، والأب الثانى ، والجيل الأول الهجين بينهما على التوالي .

وبفضل - أحيانا - حساب التباين البيئي بالمعادلة التالية :

$$V_E = \sqrt[3]{VP_1 \cdot VP_2 \cdot VF_1}$$

أى على أساس الجذر التكعيبي لحاصل ضرب تباين الأب الأول مع تباين الأب الثانى مع تباين الجيل الأول بينهما .

التباين الوراثى

أشرنا - سابقاً - إلى أن التباين الوراثى (V_G) يعكس القدر الذى يشارك به التركيب الوراثى فى التباين الكلى للصفة ، ويمكن تقسيم التباين الوراثى - بدوره - إلى مكونات أصغر ، يسهم كل منها بنصيب فى التباين الكلى للصفة وهى كما يلى :

١- تباين التأثير الإضافى للجين أو التباين الإضافى Additive Variance (V_A) وهو مقياس لقيمة التربية Breeding Value ، ويرجع إلى اختلاف التراكيب الوراثية الأصلية فى التأثير على الصفة ، وهو يعد أهم مكونات التباين الوراثى لأنه الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه عند الانتخاب .

٢- تباين تأثير السيادة أو تباين السيادة Dominance Variance (V_D أو V_D) وهو مقياس للانحراف الذى يعود إلى السيادة dominance deviation ؛ نتيجة للتفاعل بين الجينات الأليلية .


٣- تباين التفاعل Interaction Variance (V_I أو V_I) ، وهو مقياس للانحراف الذى يعود إلى التفاعل interaction deviation بين الجينات غير الأليلية ؛ أى إلى حالات التفوق epistasis .

وبذا .. فإنه يمكن إعادة صياغة معادلة التباين الكلى لتصبح كما يلى :

$$V_{Ph} = V_A + V_G + V_I + V_E$$


وبين شكل (٤ - ٤) معظم مكونات التباين التى سبقت الإشارة إليها . ويمكن الاستفادة من الشكل فى تفهم العلاقة فيما بينها ، خاصة فيما يتعلق بتباينات لم تسبق الإشارة إليها ، وهى تباين التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئة Genotype - Environment Interaction Variance (V_{GE} أو V_{GE}) ، و الذى قسم - بدوره - إلى تباين التفاعل بين التأثير الإضافى والبيئة (V_{AE}) ، وتباين التفاعل بين تأثير السيادة والبيئة (V_{DE}) . ويمكن بإجراء التجارب المناسبة تقدير مكونات مختلفة لتباين مواقع إجراء الدراسة Sites ، ومواسم إجرائها seasons كجزء من التباين البيئى ، وكذلك تحديد تباين التفاعلات بين مكونات البيئة وبعضها (V_{EE}) ، وبين تأثير التفاعل والبيئة (V_{IE}) وتباينات التفاعلات بين مختلف مكونات التباين الوراثى ؛

مثل (V_{AA}) و (V_{AD}) و (V_{DD}) وهى التى تشكل فى مجموعها تباين التفاعل (V_I) وتمثل - على التوالى - تباين التفاعل بين قيمتين من قيم التربية ، وتباين التفاعل بين قيمة التربية لأحد المواقع الجينية مع الانحراف العائد إلى السيادة فى موقع جينى آخر ، وتباين التفاعل بين اثنين من الانحرافات العائدة إلى السيادة . وإذا كان التفاعل بين أليلات أكثر من موقعين جينيين .. فإنه يكون شديد التعقيد .



شكل (٤ - ٤) : تخطيط للعلاقة بين الأنواع المختلفة من التباينات التى يتكون منها تباين الشكل المظهرى . راجع المتن للتفاصيل (عن Simmonds ١٩٧٩) .

ونظراً لأن حساب مختلف التفاعلات يكون أمراً معقداً ؛ لذا .. فإنها تهمل - عادة - حيث يحسب تباين التفاعل بين التركيب الوراثى والبيئى ضمن التباين البيئى ، كما يقسم



شكل (٩ - ٢) : التغير في نسبتي الأصالة (التماثل) الوراثية ، و الخلط (عدم التماثل) الوراثي مع التلقيح الذاتي (عن Chaudhari ١٩٧١) .

خصوصيتها ، وعدم حدوث انتخاب لصالح تراكيب وراثية معينة على حساب غيرها ، وعدم حدوث طفرات فى صالح أحد الأليلين بنسبة عالية مؤثرة .

تأثير عدد أزواج العوامل الوراثية المنعزلة على سرعة الوصول إلى الأصلية الوراثية

لحساب نسبة الأفراد الأصلية فى عواملها الوراثية بعد عدد معين من أجيال التلقيح الذاتى فى حالات الانعزال فى أكثر من زوج من الجينات .. فإنه يمكن التوصل إلى المعادلة الخاصة بذلك من جدول (٩ - ١) . يبين الجدول نسبة الأفراد الأصلية - وراثياً - بعد التلقيح الذاتى لعدد (م) من الأجيال ، وفى حالات الانعزال فى (ن) من أزواج العوامل الوراثية . والمعادلة المستنبطة من الجدول هى :

$$\text{نسبة الأفراد الأصلية وراثياً} = \left(\frac{1 - \frac{1}{2^n}}{2^n} \right) \times 100$$

وتجدر ملاحظة أن (م) تمثل أيضاً رقم الجيل الانعزالى ؛ حيث إن $F_1 = S_0$ ، و $F_2 = S_1$ (الجيل الانعزالى الأول) ، و $F_3 = S_2$ (الجيل الانعزالى الثانى) ... وهكذا ؛ كما أن (ن) تمثل عدد أزواج العوامل الوراثية الخليطة فى الجيل S_0 ، أو هى عدد العوامل الوراثية التى يختلف فيها أبوا الجيل الأول F_1 .

هذا .. ويعاب على هذه المعادلة أنها لاتصلح للتطبيق إلا على أزواج الجينات المستقلة فى توزيعها ؛ إذ إن نسبة الأفراد الأصلية تتغير عند وجود ارتباط بين الجينات المنعزلة .

ويتضح من جدول (٩ - ١) -لدى تطبيق المعادلة المستنبطة منه- أنه كلما زاد عدد العوامل الوراثية المنعزلة (ن) تأخر الوصول إلى حالة الأصالة الوراثية . ويبين شكل (٩-٣) سرعة الوصول إلى الأصالة الوراثية عند وجود ١ ، ٥ ، ١٠ ، ٢٠ ، و ٤٠ ، و ١٠٠ زوج من العوامل الوراثية المنعزلة .

ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر عن نسب التراكيب الوراثية المتوقعة ، التى تختلف فى عدد المواقع الجينية الأصلية أو الخليطة بها ، بعد أى عدد من أجيال التلقيح الذاتى (م) ، وعند اختلاف عدد العوامل الوراثية المنعزلة (ن) من مفكوك المعادلة ذات الحدين :

جدول (٩-١) : تأثير التطبيق الذاتي لعدد (م) من الأجيال على النسبة المئوية للأفراد الأصيلة وراثيًا عند وجود عدد (ن) من العوامل الوراثية المتنوعة .

نسبة الأفراد الأصيلة عند انبزال (ن) من العوامل الوراثية				
(ن)	٤	٣	٢	١
أجيال التطبيق الذاتي (s)				
$F_2 = S_1$	$100 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4$	١٢,٥	٢٥	٥٠
$F_3 = S_2$	$100 \times \left(\frac{1}{4}\right)^4$	٣١,٦٤	٤٢,١٩	٦٢,٥
$F_4 = S_3$	$100 \times \left(\frac{1}{8}\right)^4$	٥٨,٦٢	٦٦,٩٩	٧٦,٥٦
$F_5 = S_4$	$100 \times \left(\frac{1}{16}\right)^4$	٧٧,٢٥	٤٢,٤٠	٨٧,٨٩
(م)	$100 \times \left(\frac{1-f_r}{f_r}\right)^4$	$100 \times \left(\frac{1-f_r}{f_r}\right)^3$	$100 \times \left(\frac{1-f_r}{f_r}\right)^2$	$100 \times \left(\frac{1-f_r}{f_r}\right)^1$

٣ (١) $^2(31) = 93$ فرداً خليطاً في زوجين من الجينات ، وأصيل في الثالث .
 ٣ (١) $^2(31) = 2883$ فرداً خليطاً في زوج واحد من الجينات ، وأصيل في الزوجين الآخرين
 (٣١) $^3 = 29691$ فرداً أصيلاً في الأزواج الثلاثة من الجينات .

هذا .. ولاتتفق النسب المحسوبة بالمعادلة مع النسب المشاهدة ، إلا إذا تساوت التراكيب الوراثية في القفرة على التكاث ، وهو الأمر الذي لا يحدث - عادة - نظراً لأن التراكيب الوراثية الخليطة تكون أقوى نمواً ؛ مما يؤدي إلى إبطاء الوصول إلى التجانس الوراثي .

يتبين مما سبق .. أن التدهور الملاحظ في صفات النسل الناتج من التلقيح الذاتي لأفراد خليطة في تركيبها الوراثي هو نتيجة لحدوث الانعزال الجيني ، وتكوين سلالات نقية ؛ ذلك لأن الأفراد الخليطة توجد بها جينات ضارة أو معيبة متنحية ، تكون مستترة ؛ كونها متنحية ؛ وبذلك .. لا يظهر أثرها المباشر في الفرد الخليط ، لوجود الأليل السائد . لكن هذه الجينات تنعزل بحالة أصيلة عند إجراء التلقيح الذاتي ؛ فيظهر - من ثم - أثرها الضار . ومتى انعزلت هذه الجينات ، وثبتت بحالة أصيلة في السلالات المتكونة .. فإن التدهور المصاحب للتربية الداخلية يتوقف ، كما تثبت صفات السلالات المتكونة وهو الأمر الذي يحدث بعد ٧ - ٨ أجيال من التلقيح الذاتي .

١- تأثير الارتباط في سرعة الوصول إلى الأصالة الوراثية .

يؤثر الارتباط بين العوامل الوراثية المنعزلة على سرعة الوصول إلى حالة الأصالة الوراثية من وجهتين كما يلي :

١- يقلل الارتباط من عدد العوامل الوراثية المنعزلة (ن) في المعادلتين السابقتين ؛ نظراً لأن الجينات المرتبطة بشدة تنعزل ، كما لو كانت جيناً واحداً ، وعليه .. فإن الارتباط يسرع من الوصول إلى حالة الأصالة الوراثية .

٢- يزيد الارتباط من نسب التراكيب الوراثية المحتوية على الجينات المرتبطة على حساب نسب التراكيب الأخرى ، وعموماً .. فإن الارتباط يحافظ على التراكيب الوراثية للأبوين ، ويقلل من فرصة تكوين انعزالات وراثية جديدة ، وهو بهذا الشكل يجعل مهمة المربي صعبة ، ولكنه يساعد المربي أيضاً من حيث كون الارتباط يحافظ على التراكيب


الوراثية المرغوب فيها فى السلالات التى ينتخبها المربي .

تأثير درجة التربية الداخلية على سرعة الوصول إلى الأصالة الوراثية

سبق أن أوضحنا أن التلقيح الذاتى هو أشد درجات التربية الداخلية ، وأنه توجد درجات أقل من ذلك ؛ مثل التزاوج بين نبات وآخر من نسل واحد ، أو بين نباتين من سلالتين تشتركان فى أحد الآباء ، أو فى أحد الأجداد ... إلخ . ويستعمل فى وصف هذه التزاوجات المسميات المستعملة فى تربية الحيوان ، مثل التزاوج بين الإخوة الأشقاء والإخوة غير الأشقاء ، وأبناء العم من الدرجة الأولى ، وأبناء أبناء العم من الدرجة الثالثة ... إلخ . ويبين شكل (٩ - ٤) تأثير الدرجات المختلفة من التربية الداخلية على سرعة الوصول إلى الأصالة الوراثية ؛ فنجد - مثلاً - أن كل ثلاثة أجيال من التلقيح الذاتى تعادل ١٠ أجيال من تلقيح الإخوة الأشقاء (التلقيح بين نبات وآخر من نسل واحد) . ولكن جميع الطرق تؤدى - فى نهاية الأمر - إلى الأصالة الوراثية ؛ بنسبة ١٠٠٪ ، أما شكل (٩ - ٥) .. فإنه يبين كيفية إجراء بعض طرق التربية الداخلية فى النباتات ، مع استعمال الذرة (وهو نبات وحيد الجنس ، وحيد المسكن) كمثال . والطرق المبينة فى الشكل هى : التلقيح الذاتى ، وتلقيح متبادل بين نباتين من نسل واحد full-sib mating ، وتلقيح جميع النباتات بحبوب لقاح مخلوطة معاً ومجموعة من نفس النباتات half-sib mating ، وتلقيح جميع النباتات بحبوب لقاح من أب رجعى backcrossing .

قوة الهجين

تحدث قوة الهجين Hybrid Vigor (Heterosis) عند تلقيح نباتات من نوع واحد ، تختلف عن بعضها وراثياً ، ويكون ارتباطها الوراثى (من حيث صلة النسب بينها) قليلاً أو معدوماً . وبرغم أن الزيادة فى قوة النمو تعد من أبرز مظاهر قوة الهجين .. إلا أن مصطلح قوة الهجين أوسع من هذا ؛ حيث يتضمن -أيضاً- أية زيادة فى المحصول ، وفى صفات الجودة الاقتصادية ، ومقاومة الآفات ، والتأقلم على الظروف البيئية السائدة ... إلخ . ولا يشترط لظهور قوة الهجين أن تكون آباء السلالات المستعملة فى إنتاج الهجين



شكل (٩ - ٤) : تأثير الدرجات المختلفة من التربية الداخلية في سرعة الوصول إلى الأصالة الوراثية .


ضعيفة النمو ، أو تعاني التدهور المصاحب للتربية الداخلية ؛ فهي - أى قوة الهجين - تظهر في معظم أنواع النباتات ، بما في ذلك النباتات الذاتية التلقيح ، والنباتات الخلطية التلقيح التي لاتنضار بالتربية الداخلية . وقد وجدت قوة الهجين في جميع النباتات التي درست فيها هذه الظاهرة .

وقد قُدمَت نظريتان أساسيتان لتفسير قوة الهجين ، هما نظرية السيادة الفائقة ، ونظرية السيادة .


نظرية السيادة الفائقة

تقدم كل من Shull ، و East - على انفراد في عام ١٩٠٨ - بنظرية السيادة الفائقة Over Dominance Hypothesis ؛ لتفسير ظاهرة قوة الهجين ، وهي تفترض أن الفرد الهجين يكون خليطاً ، وأن حالة الخلط (عدم التماثل) الوراثي تزيد من النشاط الفسيولوجي للنبات ؛ مما يؤدي إلى ظهور قوة الهجين . وتبعاً لهذه النظرية .. فإن الفرد الخليط يفوق كلاً من التركيبين الوراثيين الأصليين . ويفترض East وجود سلسلة من الأليلات لكل جين مثل A_1 ، و A_2 ، و A_3 ... إلخ ، يزداد فيها الاختلاف بين كل أليلين ؛


Self - pollination التلقيح الذاتي



Full - Sib mating تلقيح متبادل بين نباتين من نسل واحد



Half - Sib mating تلقيح جميع النباتات بحبوب لقاح مخلوطة من نفس النباتات



Backcrossing التلقيح الرجعي



شكل (٩ - ٥) : كيفية إجراء بعض طرق التربية الداخلية في النباتات مع استعمال الذرة كمثال

(عن Fehr ١٩٨٧) .

بزيادة المسافة بينهما في السلسلة ، وأن قوة الهجين تزداد كلما زاد الاختلاف بين الأليلين المتجمعين في التركيب الوراثي ؛ فمثلاً .. تقل قوة الهجين في الفرد A_1A_2 عما في الفرد A_1A_3 ، وهو الذي تقل فيه قوة الهجين كذلك عما في الفرد A_1A_4 . .. وهكذا ؛ وهو ما يعنى وجود درجات مختلفة من السيادة الفائقة ، تبعاً للآليات التي تدخل في التركيب الوراثي .

وقد ذُكرت أربعة أسس يمكن أن تُبنى عليها - وتفسر بها - نظرية السيادة الفائقة ، وهي كما يلي (عن Brewbaker ١٩٦٤) .

١- التفاعل الأليلي المكمل Supplementary Allelic Interaction :

تبعاً لهذا التفسير .. فإن أحد التركيبين الوراثيين الأصليين - وليكن A_1A_1 - يكون قادراً على إنتاج المادة X ، ويكون التركيب الوراثي الأصيل الآخر A_2A_2 قادراً على إنتاج المادة Y ، بينما يكون الهجين A_1A_2 قادراً على إنتاج كل من المادتين X ، و Y . ومن أمثلة ذلك .. حالات المقاومة لسلالات مختلفة من بعض مسببات الأمراض ؛ مثل المقاومة للفطر المسبب لمرض الصدأ في الكتان ، حيث تتحكم الآليات المختلفة لبعض الجينات المسؤولة عن المقاومة في المقاومة لسلالات مختلفة من الفطر ، وبذا .. يصبح التركيب الوراثي الخليط مقاوماً لسلالتين من الفطر ، بدلاً من سلالة واحدة ، كما في أى من التركيبين الوراثيين الأصليين .

٢- القدرة على تمثيل المركبات الضرورية في ظروف بيئية متباينة Alternate Synthetic Pathways :

تبعاً لهذا التفسير .. فإن أحد التركيبين الوراثيين الأصليين - وليكن A_1A_1 - يكون قادراً على إنتاج المادة الضرورية للنمو الجيد x في ظروف بيئية معينة ، ويكون التركيب الوراثي الأصيل الآخر A_2A_2 قادراً على إنتاج نفس المادة في ظروف بيئية أخرى ، بينما يكون التركيب الوراثي الخليط A_1A_2 قادراً على إنتاج هذه المادة الضرورية للنمو في كلتا البيئتين . ومما يدل على صحة هذا التفسير أن التباين البيئي V_E يكون أقل بكثير في الهجن عما في السلالات المرباة داخلياً المستعملة في إنتاجها .

٣- القدرة على تمثيل التركيز المثالي من المركبات الضرورية Optimum Amount : Concept

تبعاً لهذا التفسير .. فإن أحد التركيبين الوراثيين الأصليين - وليكن A_1A_1 - يكون قادراً على إنتاج تركيز منخفض مما يلزم من مادة ضرورية $\times$ ويكون التركيب الوراثي الأصلي الآخر A_2A_2 قادراً على إنتاج تركيز أعلى مما يلزم من نفس المادة ، بينما يكون التركيب الوراثي الخليط A_1A_2 قادراً على إنتاج التركيز المثالي من هذه المادة .

٤- القدرة على تمثيل المواد الهجين Synthesis of Hybrid Substances :

تبعاً لهذا التفسير .. فإن أحد التركيبين الوراثيين الأصليين - وليكن A_1A_1 يكون قادراً على إنتاج مادة ضرورية $\times$ ، ويكون التركيب الوراثي الأصلي الآخر A_2A_2 قادراً على إنتاج مادة ضرورية أخرى y ، بينما يكون الهجين A_1A_2 قادراً على إنتاج مادة أكثر تحفيزاً للنمو z .

نظرية السيادة

تقدم بنظرية السيادة Dominance Hypothesis : لتفسير قوة الهجين كل من Bruce ، و Keeble & Pellow فى عام ١٩١٠ كل على انفراد . تفترض هذه النظرية أن النقص فى قوة النمو المصاحب للتربية الداخلية يظهر بسبب انعزال جينات متنحية ضارة بحالة أصيلة ، يظهر تأثيرها فى الأفراد الأصلية ، فتؤدى إلى ضعف نموها ، وقلة حيويتها ، وعندما تهجن السلالات الأصلية معاً .. فإن تأثير الجينات المتنحية الضارة يختفى تحت تأثير جينات أخرى سائدة غير ضارة ، فتظهر بذلك قوة الهجين ، ويعنى ذلك وجود درجات مختلفة من التآلف Combining Ability بين السلالات المهجنة ؛ حيث تزداد قوة الهجين كلما تجمع فى الجيل الأول الهجين أكبر عدد من الجينات السائدة . ولايتحقق ذلك إلا إذا كانت السلالات المهجنة مختلفة أصلاً فى أكبر عدد من الجينات السائدة التى توجد فى كل منها . وتزيد القدرة على التآلف بين السلالات كلما ازداد الاختلاف بينها فى هذه الجينات السائدة .

تأخذ نظرية السيادة - فى الحسبان - احتمال حدوث تفاعلات غير أليلية nonallelic

interactions يمكن أن تساعد على التقلب على مشاكل أيضية معينة ؛ فلو فرض أن كان الجينان A_1 ، و B_1 ضروريين لإتمام تفاعل حيوى معين ، فإن أيّاً من التركيبين الوراثيين $A_1A_1 B_2B_2$ ، و $A_2A_2 B_1B_1$ لا يمكنه إكمال هذا التفاعل ، بينما يستطيع ذلك الهجين الناتج منهما ، الذى يكون تركيبه الوراثى $A_1A_2 B_1B_2$. أى إن قوة الهجين تظهر - تلقائياً - فى الهجين ؛ نتيجة للتقلب على مصادر الضعف الموجودة فى السلالات الداخلة فى إنتاج هذه الهجن . وكمثال على ذلك .. وجد أن معدل نمو جنود الطماطم (الجنود المفصولة عن النباتات excised roots) فى البيئات المغذية يتوقف على التركيب الوراثى للنبات ؛ فبينما نمت جنود الطماطم البرية - *Lycopersicon pimpinellifolium* فى البيئات التى أضيف إليها الفيتامين بيروبوكتس Pyrodoxin .. فإن جنود صنف الطماطم جوهانسفير Johannesfeuer نمت ببطء فى البيئة المغذية ، وازداد نموها عندما زودت البيئات بالفيتامين نيكوتيناميد Nicotinamide ، ولم تتأثر بإضافة البيروبوكتس . هذا .. بينما نمت جنود الهجين بينهما فى البيئة المغذية بصورة عادية ولم يتأثر نموها بإضافة أى من الفيتامينين ؛ ويعنى ذلك أن الهجين ظهرت فيه قوة الهجين ، التى تمثلت فى قدرة الجنود المفصولة على النمو الجيد فى البيئة الصناعية ؛ نتيجة لاحتوائه على عوامل وراثية غير أليلية ، حصل عليها من الأبوين ، وتفاعلت -معاً- لتعطى نمواً جندياً أفضل .

وقد ظهر اعتراضان على نظرية السيادة ، أمكن الرد عليهما ، وهما كما يلى :

١- وجد أن توزيع قوة النمو -فى نباتات الجيل الثانى للجيل الأول الهجين - يكون منتظماً وطبيعياً symmetrical دائماً ، بينما المفروض -حسب نظرية السيادة- أن يميل التوزيع إلى جانب الصفة السائدة ؛ فلو فرض وجود سيادة فى خمسة مواقع جينية .. فإن التوزيع المتوقع للأشكال المظهرية فى الجيل الثانى يكون كما يلى : $1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8 : 1/8$: أى يتوقع أن يكون التوزيع غير منتظم assymetrical ، وهو الأمر الذى لا يمكن ملاحظته أبداً .

وقد أمكن الرد على هذا الاعتراض على أساس أن ميل التوزيع إلى جانب الصفة السائدة يقل كثيراً بفعل العوامل التالية :

١- تأثير العوامل البيئية على الصفة .

ب- وجود حالات السيادة الجزئية .

ج- زيادة عدد الجينات التى تؤثر فى صفة قوة الهجين ، خاصة .. صفة المحصول .

د- الارتباط بين الجينات ، خاصة .. أن كثرة عدد الجينات التى تتحكم فى قوة الهجين تعنى احتمال وجود أعداد من الجينات ترتبط - معاً - على كروموسومات مختلفة . ويمنع الارتباط الانعزال الحر للجينات ، ويؤدى ارتباط جينات ذات تأثير إيجابى على قوة النمو مع جينات أخرى ذات تأثير سلبى إلى تقليل فرصة انعزال كل الجينات السائدة معاً .

٢- تبعاً لنظرية السيادة .. فإن من المفروض أن تكون بعض السلالات المرباة - داخلياً - على نفس درجة قوة نمو نباتات الجيل الأول الهجين - أو أعلى منها - إلا أن ذلك الأمر لم يلاحظ أبداً . وقد كان الرد على هذا الاعتراض هو صعوبة - بل استحالة - العثور على النبات ، الذى تتجمع فيه العوامل الوراثية السائدة ؛ نظراً لكثرة العوامل الوراثية التى تتحكم فى صفات قوة الهجين ، خاصة .. صفة المحصول ؛ فلو أن صفة المحصول فى الذرة - مثلاً - يتحكم فيها ٣٠ جيناً - وهو تقدير معقول - للزمت زراعة مساحة من الذرة تعادل مساحة الكرة الأرضية ٢٠٠٠ مرة ؛ لكى يمكن العثور على نبات واحد أصيل سائد فى الجيل الثانى يتساوى فى المحصول مع الجيل الأول الهجين . كما أوضح Jones أن الارتباط بين الجينات المفيدة والجينات الضارة - والتى يكون بعضها سائداً والبعض الآخر متنحياً - يجعل من الصعب العثور على السلالة الأصلية فى جميع العوامل الوراثية السائدة ، لما يتطلبه ذلك من حدوث عبور فى مناطق كثيرة معينة من الكروموسومات .

الأساس الفسيولوجى لقوة الهجين

رَبَطَ بعضُ الباحثين بين نشاط الميتوكوندريا وقوة الهجين ؛ فوجد - مثلاً - أن خلط الميتوكوندريا الأبوية لتسعة هجن من القمح (أى خلط ميتوكوندريا أبوى كل هجين معاً) يجعل نشاط المخلوط متوافقاً مع قوة الهجين الناتجة من تهجين الأبوين ، ولا يكون نشاط المخلوط وسطاً بين نشاط ميتوكوندريا كل من الأبوين على حدة ، وعليه .. فقد اقترح استخدام هذا الاختبار - وهو الذى يعرف باختبار Mitochondria Camplementation - فى التنبؤ بالتهجينات التى يمكن أن تعطى قوة هجين عالية ، إلا أن هذا الاختبار لم يكن ذا فائدة فى حالات أخرى ؛ حيث لم يمكن استخدامه - مثلاً - فى التنبؤ بقوة الهجين

(متمثلة فى وزن الجنور) فى بنجر السكر (Doney وآخرون ١٩٧٥) . ولزید من التفاصيل عن الأساس الفسيولوجى ، والكيميائى الحيوى ، والوراثى لقوة الهجين .. يراجع . Sinha & Khanna (١٩٧٥) ، و Sneep & Hendrkisen (١٩٧٩) .

حساب قوة الهجين

تقدر قوة الهجين بإحدى معادلتين كما يلى :

١- تقدر قوة الهجين كنسبة مئوية من الفرق بين الجيل الأول ومتوسط الصفة فى الأبوين كما يلى :

$$\text{Mid - parent Heterosis} = \frac{\bar{F}_1 - MP}{MP} \times 100$$

$$\text{حيث MP هو المتوسط الحسابى للأبوين أى} = \frac{\bar{P}_2 + \bar{P}_1}{2}$$

٢- تفضل - من الناحية الاقتصادية - تقدير قوة الهجين بالنسبة للأب الأعلى فى الصفة كما يلى .

$$\text{High-parent Heterosis} = \frac{\bar{F}_1 - \bar{HP}}{HP} \times 100$$

حيث HP هو متوسط الصفة فى الأب الأعلى أو الأفضل high parent فى هذه الصفة (Sinha & Khanna ١٩٧٥) .

الفصل العاشر

الأصناف الهجين والأصناف التركيبية

مقدمة عن الأصناف الهجين

يعرف الصنف الهجين Hybrid Variety بأنه الجيل الأول المستعمل فى الإنتاج التجارى ، الذى يحصل عليه : بتلقيح سلالتين خضريتين ، والإكثار الخضرى لأحد النباتات الجيدة الصفات الناتجة (فى المحاصيل الخضرية التكاثر) ، أو سلالتين مرباتين تربية داخلية (فى المحاصيل الخلطية التلقيح) ، أو سلالتين نقيتين (فى المحاصيل الذاتية التلقيح) ، أو صنفين محسنين (فى أى من العشائر التى سبق ذكرها) .

وقد حظيت التربية بطريقة إنتاج الأصناف الهجين -أكثر من غيرها- باهتمام المربين فى كافة أرجاء العالم ، وتوجد أسباب كثيرة لذلك ، سوف يأتى بيانها ، ولكن أهم هذه الأسباب - بلاشك - هو الزيادة الكبيرة التى تشاهد فى محصول هذه الأصناف ، مقارنة بالأصناف الأخرى .

وقد أجريت معظم الدراسات الأساسية الخاصة بطريقة إنتاج الأصناف الهجين على نبات الذرة ؛ ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة تتعلق بهذا المحصول ؛ منها ما يلى :

١- سهولة إجراء التلقيحات ، وكثرة كمية البذور التى تنتج من كل تلقيح .

٢- ينتج النبات الواحد كمية هائلة من حبوب اللقاح ، يمكن استخدامها فى إجراء عدة تلقيحات .

٣- الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمحصول الذرة .

٤- الزيادة الكبيرة فى المحصول التى نتجت من استعمال الأصناف الهجين ، والتى قدرت فى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف .

وقد أدى النجاح الكبير -الذى لقيته الأصناف الهجين فى الذرة - إلى انتشارها فى محاصيل أخرى كثيرة ؛ منها معظم محاصيل الخضر . ويعتقد Craig (١٩٦٨) أن إنتاج الأصناف الهجين فى معظم محاصيل الخضر الجنسية التكاثر يعد من أهم التطورات الحديثة فى تربية المحاصيل البستانية . وربما كانت بداية ذلك محاولات Hayes & Jones لإنتاج الجيل الأول الهجين فى الخيار فى عام ١٩١٦ ، ثم كان اقتراح Pearson عام ١٩٣٢ بالاستفادة من ظاهرة عدم التوافق الذاتى فى إنتاج هجن الصليبيات . وتلا ذلك .. قيام Jones & Clarke فى عام ١٩٤٣ بوصف الطريقة العملية لإنتاج هجن البصل ؛ بالاستفادة من ظاهرة العقم الذكري السيتوبلازمى . وقد اختلفت محاصيل الخضر بالنسبة للفترة التى استخدمت فيها الأصناف الهجين فى الزراعة التجارية كما يلى (عن Riggs ١٩٨٨) :

فترة وجود الأصناف الهجين فى الزراعة التجارية (بالسنة)	المحصول	فترة وجود الأصناف الهجين فى الزراعة التجارية (بالسنة)	المحصول
٢٥ - ٣٥	السبانخ	٤٥ - ٥٥	الذرة السكرية
٢٥ - ٣٠	البروكولى	٤٥ - ٥٥	البصل
٢٥ - ٣٠	الكرنب الصينى	٤٥ - ٥٥	الطماطم
٢٠ - ٢٥	الباذنجان	٤٥ - ٥٥	الكوسة
٢٠ - ٢٥	كرنب بروكسل	٤٠ - ٥٠	الكرنب
١٥ - ٢٥	الفجل الصينى	٣٥ - ٤٥	الخيار
١٥ - ٢٥	الجزر	٣٥ - ٤٠	البطيخ
١٠ - ١٣	بنجر المائدة	٣٥ - ٤٠	القاوون
١٠ - ١٣	الكرفس	٣٥ - ٤٠	الهليون
		٣٠ - ٣٥	الفلفل

العوامل التى تجعل الأصناف الهجين مرغوبة ومفضلة

من أهم العوامل التى تجعل الأصناف الهجين مرغوبة ومفضلة عن الأصناف الأخرى مايلى :

١- تتميز الأصناف الهجين بالتجانس مع قوة النمو ، وتلك صفتان لايمكن الحصول عليهما مجتمعتين بأية طريقة أخرى من طرق التربية ؛ فالسلالات المتجانسة المرباة تربية داخلية تكون ضعيفة النمو ، بنىما تكون الأصناف المفتوحة التلقيح القوية النمو غير متجانسة ، وتكون الأصناف التركيبية أقل تجانساً ، وأقل فى قوة النمو .

٢- الزيادة الكبيرة فى محصول الأصناف الهجين ، وهى أحد مظاهر قوة الهجين التى تتضمن - أيضاً - كل صفات الجودة ، والمقاومة للآفات ، والقدرة على تحمل الظروف البيئية القاسية ... إلخ .

٣- مرونة برنامج التربية بالتهجين ، مقارنة بالطرق الأخرى ؛ حيث يمكن للمربى جمع الصفات المرغوب فيها فى الهجن المنتجة ، بالاختيار الدقيق للآباء .

٤- لايمكن الحصول على بعض الصفات المرغوب فيها إلا فى الأصناف الهجين ، كما فى البطيخ العديم البذور (يراجع لذلك .. الفصل الخاص بالتضاعف) ، والبيتونيا المزوجة.

٥- يعد إنتاج الأصناف الهجين أفضل الطرق لحفظ حقوق المربى ، وربما كان ذلك من أهم الأسباب التى دفعت شركات البذور إلى التوسع فى إنتاج الأصناف الهجين ، حيث تستطيع السيطرة على إنتاجها ؛ لاحتفاظها بسرية آباء الهجن .

يلاحظ أن قسماً كبيراً من المزايا المذكورة آنفاً يعود على المربى وشركات البذور التى تقوم بإنتاج الهجن . كما يستفيد منتج المحصول فى الدول المتقدمة -التي تشجع فيها الميكنة الزراعية- من صفة التجانس فى النمو ، وموعد النضج . غير أن ذلك لا يكون ضرورياً فى الدول النامية . التى تجرى فيها معظم العمليات الزراعية يدوياً ، كما لا يكون التجانس فى موعد النضج أمراً مرغوباً فيه فى تلك الدول ؛ حيث تكون معظم الأسواق محلية ، وحيث لا تتوفر وسائل لحفظ المحصول وتخزينه بشكل جيد ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك الارتفاع الكبير فى أسعار بذور الهجن .. فإن هذا يعنى زيادة تكلفة الإنتاج بقدر ربما لايتناسب مع مستويات المعيشة فى بعض الدول النامية . ولهذا الأسباب .. يرى Riggs

(١٩٨٨) أن استعمال هجن الخضر ربما لا يكون ضرورياً أو مرغوباً فيه فى الدول النامية . وعلى أية حال .. فإن الجوانب الاقتصادية للعملية الإنتاجية هى التى تحكم هذا الأمر فى نهاية المطاف .

العوامل المؤثرة فى أسعار الهجن

ترتفع أسعار هجن بعض المحاصيل بدرجة كبيرة ؛ حيث تصل - مثلاً - إلى ٢٠ - ٣٠ دولاراً أمريكياً للجرام الواحد من بذور البتونيا ، و ٨٠٠٠ دولار لكل كيلو جرام من بذور بعض هجن الطماطم ، والخيار الأنثوى ، التى تستعمل فى الزراعات المحمية . وتبلغ أسعار الهجن نحو ٢٠ مثل سعر الأصناف العادية فى القاوون ، و ١٣ مثل السعر فى البطيخ والقلقل ، ونحو ١٠ أمثال السعر فى البروكولى ، وخمسة أمثال السعر فى الطماطم ، والجزر ، والباذنجان ، والكرنب ، واللفت . هذا .. بينما لايزيد سعر الهجن على ضعف سعر الأصناف العادية فى البصل ، والسبانخ ، ويقترب سعر الأصناف الهجين مع الأصناف المفتوحة التلقيح فى الذرة السكرية .

وترجع الزيادة فى تكلفة إنتاج الأصناف الهجين إلى الأسباب التالية :

- ١- تكاليف برنامج التربية لإنتاج السلالات المرباة داخلياً ، واختبار قدرتها على التألف .
 - ٢- تكاليف إكثار سلالات الآباء .
 - ٣- تكلفة زراعة نسبة من الحقل الإنتاجى بالسلالة المستخدمة كأب ، فى حين تحصد البذرة الهجين من السلالة المستخدمة كأم فقط .
 - ٤- تكلفة الرعاية الخاصة التى تعطى حقول إنتاج البذرة الهجين فى العزل ، والزراعة ، والحصاد .
 - ٥- تكاليف عمليتى الخصى والتلقيح (George ١٩٨٥) .
- ومن أهم العوامل التى تقلل من تكاليف إنتاج البذرة الهجين واستعمالها فى الزراعة التجارية ما يلى :
- ١- توفر الظواهر التى تجعل من غير الضرورى خصى الأزهار فى السلالات المستعملة كمهايات فى الهجن ؛ مثل العقم الذكري ، وعدم التوافق ، وانفصال الجنس .

- ٢- عندما ينتج من التلقيح الواحد عدد كبير من البذور .
٣- عندما تقل كمية التقاوى التى تلزم لزراعة وحدة المساحة .

طريقة إنتاج السلالات المرباة تربىة داخلية

قد ينتج الصنف الهجين فى المحاصيل الخلطية التلقيح بالتهجين بين صنفين محسنين . تُعطى بعض هذه الهجن محصولاً أعلى من محصول أى من أبوى الهجين ، إلا أن الأغلب هو استعمال السلالات المرباة تربىة داخلية Inbred Lines كآباء لهجن المحاصيل الخلطية التلقيح . وتنتج هذه السلالات بالتلقيح الذاتى المستمر لنباتات أحد الأصناف الهجين ، أو أحد الأصناف المفتوحة التلقيح open-pollinated . ويستمر التلقيح الذاتى لخمسة أجيال أو سبعة ، وبعد ذلك كافياً لجعل السلالات تامة التجانس وأصلية وراثياً . وقد يستمر التلقيح الذاتى لعدد آخر من الأجيال ؛ للتخلص من الاختلافات البسيطة ، التى قد تظهر بين نباتات السلالة . ويحافظ على السلالات - بعد ذلك - بجمع حبوب لقاح كل سلالة معاً ، واستعمالها فى تلقيح نباتات نفس السلالة .

يلزم - أولاً - انتخاب النباتات التى ستجرى عليها التربية الداخلية . توازى هذه الخطوة جيلاً واحداً من الانتخاب الإجمالى ، ويمكن تقدير أهميتها بتذكر مدى الجهد الذى سيبدل فى التربية الداخلية لهذه النباتات .

يجرى الانتخاب العيىنى Visual Selection فى أثناء التربية الداخلية على أساس المظهر العام ؛ للتخلص من السلالات التى تظهر بها عيوب واضحة ، وتنتخب النباتات التى تتميز بقوة النمو ، والصفات المهمة ؛ مثل موعد النضج ، وطول النبات ، ومثانة الساق ، وصفات الجودة ، والمقاومة للأمراض ... إلخ ؛ كما تعطى بعض الأهمية للقدرة الإنتاجية ؛ نظراً لأن السلالات العالية المحصول تعطى كمية كبيرة من بذور التقاوى - عند استعمالها كآباء فى الهجن - وهو ما يخفض من تكاليف إنتاج الهجن . يزرع - عادة - من ٢٠-٣٠ بذرة من كل نبات منتخب فى خط مستقل ، مع توسيع مسافة الزراعة - قليلاً - حتى يمكن دراسة كل نبات على حدة . وتنتخب - سنوياً - أفضل النباتات فى أفضل الأنسال (أفضل الخطوط) ، وهى التى تستمر فيها التربية الداخلية .

يؤدى استمرار التربية الداخلية إلى ازدياد التجانس فى نسل النباتات المنتخبة الملقحة

ذاتياً (progeny lines) ، ويفقد عدد من السلالات ؛ بسبب التدهور الشديد الذى يحدث لها نتيجة للتربية الداخلية ، وتستبعد سلالات أخرى لمظهرها غير المقبول . وبعد نحو ٥-٧ أجيال من التلقيح الذاتى .. تكون نباتات كل سلالة على درجة عالية من التجانس ، بينما تختلف السلالات -كثيراً- عن بعضها البعض .

أهمية الانتخاب بالنظر خلال مراحل التربية الداخلية

رغم اختلاف نتائج الدراسات بشأن أهمية الانتخاب بالنظر Visual Selection ، الذى يعتمد على الملاحظة والتقدير الشخصى للمربي .. إلا أنه يسود الاعتقاد بأنه يؤدي إلى استبعاد عديد من السلالات غير المرغوب فيها خلال مراحل التربية الداخلية ، ويجرى الانتخاب بالنظر على ثلاث مراحل ، هى :

١- انتخاب النباتات التى تبدأ فيها التربية الداخلية من الصنف المفتوح التلقيح ، وهى خطوة تعادل جيلاً واحداً من الانتخاب الإجمالى . وتكون لهذه الخطوة أهميتها بالنسبة للصفات ذات درجات التوريث المرتفعة ، وربما بالنسبة للمحصول أيضاً .

٢- استمرار الانتخاب خلال مراحل التربية الداخلية ، حتى إنتاج السلالات المرياة داخلياً .

٣- انتخاب السلالات التى تستعمل فى إنتاج الهجن .

ورغم أهمية الانتخاب فى المرحلتين : الأولى والثانية .. فإنه لا يهمل إلا بقدر يسير فى تحسين محصول الهجن المنتجة . فدورة واحدة من الانتخاب الإجمالى .. لا تؤثر كثيراً فى المحصول ، والانتخاب -خلال مراحل التربية الداخلية- لا يفيد سوى فى استبعاد السلالات الضعيفة ؛ وعليه .. فإن الزيادة الكبيرة التى تعطى فى محصول الصنف الهجين .. لا بد أنها ترجع إلى الانتخاب فى المرحلة الثالثة .

القدرة على التآلف بين السلالات المرباة داخلياً

تتوقف قوة الهجين - التى تظهر فى الجيل الأول الهجين - على مدى قدرة السلالات المهجنة على التآلف Combining Ability of Inbred Lines ؛ حيث تزداد قوة الهجين كلما كانت السلالات المهجنة أكثر تآلفاً ؛ أى كلما كانت تراكيبها الوراثية مكملية بعضها

بعضاً ، وأكثر تأثيراً فى قوة الهجين عند تواجدها - معاً - فى الفرد الهجين . وتوجد ثلاثة أنواع من القدرة على التآلف ، هى : متوسط القدرة على التآلف ، والقدرة العامة على التآلف ، والقدرة الخاصة على التآلف .

متوسط القدرة على التآلف

يعبر عن متوسط القدرة على التآلف Average Combining Ability لأية سلالة بمتوسط محصول الهجن الفردية التى تدخل فيها هذه السلالة ؛ فمثلاً .. إذا وجدت خمس سلالات هى أ ، ب ، ج ، د ، هـ .. فإن متوسط قدرة السلالة (أ) على التآلف يكون هو متوسط محصول الهجن الفردية أ ب ، أ ج ، أ د ، أ هـ .

وفى بداية العهد بإنتاج الأصناف الهجين .. كانت تختبر كل الهجن الممكنة لكل سلالة؛ لتقدير متوسط قدرة كل منها على التآلف ، وكان ذلك يتطلب جهداً كبيراً ؛ فعلى سبيل المثال .. لو أن لدينا ٢٠ سلالة فقط لتقييم قدرتها على التآلف -وهو رقم متواضع- لكان عدد الهجن الفردية التى يلزم إنتاجها (مع استبعاد الهجن العكسية) هو ٤٣٥ هجيناً . ويمكن حساب هذا العدد من المعادلة التالية :

$$هـ = \frac{س(س-١)}{٢}$$

حيث تمثل (هـ) عدد الهجن الفردية الممكنة ، و (س) عدد السلالات المطلوب تقييمها . ومن الطبيعى أنه يستحيل تقييم عدد كبير من السلالات بهذه الطريقة ؛ فلو فرض أن احتياج الأمر إلى تقييم ١٠٠ سلالة .. للزم إنتاج ٤٩٥٠ هجيناً فردياً وتقييمها . هذا فضلاً على أن التقييم قد يجرى فى مناطق مختلفة ، ولعدة سنوات .

القدرة العامة على التآلف

تقارن القدرة العامة على التآلف General Combining Ability - لعدد من السلالات - بمقارنة الهجن الفردية الناتجة من تلقيح كل من هذه السلالات مع صنف اختبارى Tester Variety . ويستعمل أى صنف تجارى ناجح مفتوح التلقيح ، أو هجين زوجى ، أو صنف تركيبى كصنف اختبارى . تنتج الهجن بين السلالات المرباة داخلياً

والصنف الاختبارى ؛ بواسطة ما يسمى بالتلقيح القمى Top Cross ؛ حيث تزرع ٣ - ٤ خطوط - بمعدل خط من كل سلالة - بالتبادل مع خط من الصنف الاختبارى ، وتزال النورات المذكورة (بفرض استعمال الذرة كمثال) من جميع السلالات ؛ حتى يكون الصنف الاختبارى هو مصدر حبوب اللقاح لجميع الهجن . أما إذا استعمل الصنف الاختبارى كأم .. فإنه يلزم - فى هذه الحالة - استعمال عشرة نباتات منه -على الأقل- فى التلقيح مع كل سلالة ؛ لتمثيل أكبر قدر من الاختلافات الوراثية التى توجد بين نباتاته .

وترجع أهمية القدرة العامة على التألف إلى أنها تستخدم فى التنبؤ بمتوسط القدرة على التألف ؛ لأن معامل الارتباط بينهما كبير؛ حيث يقدر بنحو ٠.٥٣ ، ٠.٩٠ ، ٠.٠٠ ، وهو مايعنى وجود علاقة مؤكدة بين محصول الهجن الناتجة من التلقيح القمى لعدد من السلالات ، وبين متوسط محصول الهجن الفردية التى تدخل فيها كل من هذه السلالات عند تهجينها مع بعضها البعض . ويتفق معظم مربى النبات على أنه يمكن استخدام تقديرات القدرة العامة على التألف بأمان فى استبعاد نصف السلالات المتوفرة التى يُراد تقييمها ، وقصر إنتاج الهجن الفردية وتقييمها على النصف الآخر المتبقى ؛ فمثلا.. لو كان لدينا ٣٠ سلالة .. فإنه يلزم إنتاج ٣٠ هجينا وتقييمها بالتلقيح القمى ، ثم يستفاد من نتيجة التقييم فى استبعاد ١٥ سلالة ؛ وهو مايعنى خفض عدد الهجن الفردية التى يلزم إنتاجها وتقييمها من ٤٣٥ هجينا إلى ١٠٥ هجينا فقط .

وأفضل الأصناف الاختبارية للاستعمال هى التى يمكن بواسطتها التنبؤ بمحصول الهجن الفردية للسلالات المتوفرة . لكن لا يوجد صنف اختبارى واحد يصلح لجميع الأغراض . فكما سبق الذكر .. تصلح الهجن الزوجية والأصناف المفتوحة التلقيح الناجحة -خاصة الأصناف التركيبية- لاختبار القدرة العامة على التألف ؛ لأنه يلزم أن يكون الصنف الاختبارى ذا قاعدة وراثية عريضة Broad Genetic Base . أما عندما يُراد البحث عن سلالة تصلح بديلاً لسلالة أخرى فى هجين زوجى معين .. فإن أفضل صنف اختبارى لهذا الغرض يكون هو الهجين الفردى الآخر (الذى لا تستعمل هذه السلالة فى إنتاجه) فى الهجين الزوجى ؛ فمثلا .. إذا ما رغب فى البحث عن سلالة بديلة لسلالة (أ) فى الهجين الزوجى أ ب × ج د .. فإن الصنف الاختبارى المناسب يكون هو الهجين الفردى ج د .

وفى بداية المعهد بإنتاج الأصناف الهجين .. كان يتم اختبار القدرة العامة على التآلف بعد ٣-٥ أجيال من التربية الداخلية . وكان Jenkins فى عام ١٩٣٥ هو أول من بين أن الاختبار المبكر للقدرة العامة على التآلف فى الذرة يكون فعالاً بعد الجيل الثانى للتربية الداخلية ؛ فقد وجد أنه من بين ١١ سلالة أجريت عليها الدراسة .. لم يختلف محصول التلقيح القمى لتسع من هذه السلالات ، عندما أجرى بعد جيلين ، أو بعد ستة -أو ثمانية- أجيال من التلقيح الذاتى . كما وجد Sprague فى عام ١٩٤٦ أن النباتات التى لم تلقح ذاتياً بعد (نباتات جيل الـ S_0) ذات القدرة العالية على التآلف .. تنقل هذه الصفة إلى نباتات جيل التلقيح الذاتى الأول (S_1) . كذلك وجد Lonnquist فى عام ١٩٥٠ أن نباتات جيل التلقيح الذاتى الأول تنقل صفة القدرة العالية على التآلف -بنفس الدرجة- إلى نباتات جيل التلقيح الذاتى الرابع .

وبرغم أن Richey قد أوضح عام ١٩٤٥ أن الاختبار المبكر للقدرة العامة على التآلف فى الذرة ، والانتخاب لهذه الصفة فى جيل التلقيح الذاتى الثانى (S_2) أو الثالث (S_3) .. يؤدى إلى استبعاد بعض السلالات الهامة .. إلا أن الاتجاه الغالب - الآن - هو تقدير هذه الصفة فى جيل التلقيح الذاتى الأول (S_1) أو الثانى (S_2) ، كما يقوم البعض بتقديرها فى النباتات المنتخبة ؛ لإجراء التربية الداخلية عليها (S_0) . ويستفاد من هذه الاختبارات المبكرة للقدرة العامة على التآلف فى استبعاد ما يصل إلى ٨٠٪ من النباتات ، التى يلزم إجراء التربية الداخلية عليها .

ومما يعزز أهمية الاختبار المبكر للقدرة العامة على التآلف .. أن الدراسات المستفيضة قد أوضحت وجود اختلافات حقيقية بين نباتات الـ S_1 وبعضها البعض ، وكذلك بين نباتات الـ S_0 وبعضها البعض ؛ من حيث قدرتها العامة على التآلف ، وأن هذه الاختلافات يمكن معرفتها ، برغم المشاكل الناجمة عن حالة الخلط الوراثى فى هذه النباتات ، وأنها تورث من جيل لآخر مع استمرار التربية الداخلية .

القدرة الخاصة على التآلف

يقصد بالقدرة الخاصة على التآلف Specific Combining Ability قدرة السلالات على التآلف مع السلالات الأخرى فى الهجن الفردية Single Crosses ، والهجن الثلاثية

Three-way Crosses ، والهجن الزوجية (الرباعية) Double Crosses . ويعبر عن هذه القدرة بقوة الهجين التي تظهر في الهجن .

تقدر القدرة الخاصة على التآلف في الهجن الفردية بإجراء الاختبار القمي أولاً ؛ لاستبعاد ٥٠٪ من السلالات ، وهي التي تكون أقل في القدرة العامة على التآلف ، ثم تجرى كل التلقيحات الممكنة بين السلالات المتبقية ؛ لتحديد أفضل الهجن الفردية لكل سلالة .

ويلزم لتقدير القدرة الخاصة على التآلف في الهجن الزوجية أن تهجن كل الهجن الفردية معاً بكل الطرق الممكنة . فلو فرض وتبقى ١٥ سلالة بعد الاختبار القمي .. فإنه يلزم - أولاً - إجراء $\frac{14 \times 15}{4} = 10.5$ هجيناً فردياً ، ثم تهجن الهجن الفردية - معاً - بكل الطرق الممكنة لإنتاج الهجن الزوجية ، التي يتحدد عددها بالمعادلة التالية :

$$\text{عدد الهجن الزوجية الممكنة} = \frac{\text{س}(\text{س}-1)(\text{س}-2)(\text{س}-3)}{8}$$

حيث (س) تمثل عدد السلالات المرباة داخلياً ؛ ويعنى ذلك أن عدد الهجن الزوجية الممكنة يكون $\frac{12 \times 13 \times 14 \times 15}{8} = 40.95$ هجيناً زوجياً ، بخلاف الهجن العكسية .

ونظراً لأن عدد الهجن الزوجية التي يلزم إنتاجها وتقييمها يكون كبيراً ، ويزداد كثيراً - مع أى زيادة في عدد السلالات (فهو يصبح - مثلاً - ١٤٥٣٥ هجيناً زوجياً عند زيادة عدد السلالات إلى ٢٠) ؛ لذا فقد حاول العلماء التوصل إلى وسائل ، يمكن بواسطتها التنبؤ بمحصول الهجن الزوجية قبل إجرائها ، وكانت دراسات Jenkins في عام ١٩٣٤ من أبرز ما قدم في هذا المجال . ولقد قام Jenkins بدراسة الارتباط بين محصول الهجن الزوجية وبين متوسط محصول كل مما يلي :

١- الهجن الستة الفردية الممكنة بين السلالات الداخلة في إنتاج الهجين الزوجي ؛ فمثلاً .. تكون الهجن الستة الفردية الممكنة في حالة الهجين الزوجي أ ب × ج د هي :

أ ب ، أ ج ، أ د ، ب ج ، ب د ، ج د .

٢- الهجن الأربعة الفردية الممكنة بين السلالات الداخلة في إنتاج الهجين الزوجي غير

الهجينين الفرديين المهجنين معاً لإنتاج الهجين الزوجى ؛ فمثلاً .. تكون الهجن الأربعة الفردية الممكنة فى حالة الهجين الزوجى أ ب × ج د هى : أ ج ، أ د ، ب ج ، ب د .

٣- كل الهجن الفردية الممكنة بين كل من السلالات الأربع الداخلة فى إنتاج الهجين الزوجى وبين عشر سلالات أخرى ؛ فمثلاً .. تكون الهجن اللازمة فى حالة الهجين الزوجى أ ب × ج د هى التى بين كل من السلالات أ ، ب ، ج ، د وعشر سلالات أخرى ؛ أى يؤخذ متوسط ٤٠ هجيناً فردياً .

٤- الهجن الفردية الممكنة بين كل من السلالات الأربع الداخلة فى إنتاج الهجين الزوجى وبين صنف اختبارى ؛ أى يؤخذ متوسط أربعة هجن فردية .

وقد قدر Jenkins الارتباط بين المحصول الفعلى والمحصول المتوقع لاثنتين وأربعين هجيناً زوجياً باستعمال الطرق الأربع السابقة ، ووجد أن معامل الارتباط كان ٠,٧٥ ، و٠,٧٦ ، و٠,٧٣ ، و٠,٦١ للطرق الأربع على التوالى .

وبناء على نتائج هذه الدراسة ودراسات أخرى كثيرة .. فقد أصبح عادياً أن يتنبأ المربى بمحصول الهجن الزوجية من متوسط محصول الهجن الأربعة الفردية الممكنة بين السلالات الداخلة فى إنتاج الهجين الزوجى غير الهجينين الفرديين المهجنين معاً لإنتاج الهجين الزوجى . ويكفى - فى هذه الحالة - إنتاج وتقييم كل الهجن الفردية الممكنة بين السلالات المتوفرة ؛ للتنبؤ بمحصول أى هجين زوجى بين هذه الهجن الفردية . ولكن ينبغى أن تقيم الهجن الفردية فى عدة مواقع ، وعلى مدى عدة سنوات ؛ ليتمكن التوصل إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها ، وبين جدول (١٠-١) مثلاً لتطبيق القاعدة السابقة فى التنبؤ بمحصول الهجن الزوجية الممكنة بين خمس سلالات من الذرة (Anderson عن Briggs & Knowles ١٩٦٧) .

طرق تحسين السلالات المرباة داخلياً

يتجه كثير من الباحثين نحو محاولة تحسين السلالات المتوفرة المرباة داخلياً ، التى أثبتت قدرة عالية على التألف ، بدلاً من محاولة إنتاج سلالات جديدة ؛ بسبب ندرة السلالات الممتازة ، وصعوبة إنتاج ما هو أفضل منها . وتبعاً لـ T.A. Kiesselbach (عن Briggs & Knowles ١٩٦٧) .. فإن عدد سلالات الذرة المرباة داخلياً التى أنتجت حتى

جنول (١٠-١): الحصول الحقيقي المتحصل عليه من الهجن الفردية والزوجية لخمس سلالات مرباة
تربية داخلية من الذرة (هى أرقام ٢٣ ، و ٢٤ ، و ٢٦ ، و ٢٧ ، و ٢٨) والمحصل المتوقع للهجن الزوجية
بينها .

المحصل (بوشل/فدان)		المحصل (بوشل/فدان)			
المتوقع	الحقيقى	الهجن الفردى أو الزوجى	المتوقع	الحقيقى	الهجن الفردى أو الزوجى
الهجن الفردية					
	٧٢,١	٢٧ × ٢٤		٤١,٧	٢٤ × ٢٣
	٦٩,٣	٢٨ × ٢٤		٦٢,٦	٢٦ × ٢٣
	٦٤,٢	٢٧ × ٢٦		٧٠,٨	٢٧ × ٢٣
	٦٠,٤	٢٨ × ٢٦		٦٤,٤	٢٨ × ٢٣
	٥٩,٦	٢٨ × ٢٧		٦٥,٦	٢٦ × ٢٤
الهجن الزوجية					
السلالات ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ :			السلالات ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ :		
٦٥,٠	٦٨,٢	(٢٨ × ٢٧) (٢٦ × ٢٣)	٦٧,٨	٦٨,٨	(٢٧ × ٢٦) (٢٤ × ٢٣)
٦٢,٧	٦٥,٠	(٢٨ × ٢٦) (٢٧ × ٢٣)	٦٠,٦	٦٢,٤	(٢٧ × ٢٤) (٢٦ × ٢٣)
٦٣,٤	٦٥,٧	(٢٧ × ٢٦) (٢٨ × ٢٣)	٦٠,٢	٦٢,٠	(٢٦ × ٢٤) (٢٧ × ٢٣)
السلالات ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٨ :			السلالات ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٨ :		
٦٦,٥	٧٠,٢	(٢٨ × ٢٧) (٢٦ × ٢٤)	٦٥,٥	٦٥,٠	(٢٨ × ٢٦) (٢٤ × ٢٣)
٤٧,٧	٦٢,٠	(٢٨ × ٢٦) (٢٧ × ٢٤)	٥٨,٠	٥٩,٨	(٢٨ × ٢٤) (٢٦ × ٢٣)
٦٤,٤	٦٢,٧	(٢٧ × ٢٦) (٢٨ × ٢٤)	٥٨,٥	٥٦,٠	(٢٦ × ٢٤) (٢٨ × ٢٣)
السلالات ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٨ :			السلالات ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٨ :		
	٧٩,٢	(٢٨ × ٢٧) (٢٤ × ٢٣)		٧١,١	(٢٨ × ٢٧) (٢٤ × ٢٣)
	٥٩,٤	(٢٨ × ٢٤) (٢٧ × ٢٣)		٥٨,١	(٢٨ × ٢٤) (٢٧ × ٢٣)
	٦٠,٤	(٢٧ × ٢٤) (٢٨ × ٢٣)		٥٨,٠	(٢٧ × ٢٤) (٢٨ × ٢٣)

عام ١٩٥١ قدر بنحو ١٠٠ ألف سلالة ، ولم يتفوق منها سوى ٦٠ سلالة ، وهى التى كان لها دور فى إنتاج أصناف الذرة الهجين . ويحاول المربون تحسين هذه السلالات فى الجوانب التالية :

١- زيادة إنتاجية السلالات ذاتها ؛ بغرض زيادة كمية البذرة الهجين من نفس التلقيح؛ فتتخفض بذلك تكاليف إنتاجها .

٢- تحسين السلالات فى صفات خاصة تعوزها ؛ مثل مقاومة الأمراض الهامة .

٣- تحسين قدرة السلالات على التألف ؛ وهو ما يعنى زيادة قوة الهجين فى الهجن التى تدخل فيها

هذا .. وتعامل السلالات المرباة تربية داخلية معاملة النباتات الذاتية التلقيح عند تحسينها؛ ذلك لأنها تكثر بالتلقيح الذاتى ، كما أن نباتات كل سلالة تكون متجانسة homogenous ، وأصلية وراثياً homozygous ؛ مثلها فى ذلك مثل العشائر المُحَسَّنة الثابتة وراثياً من المحاصيل الذاتية التلقيح . ومن أهم الطرق المستخدمة فى تحسين السلالات المرباة داخلياً ما يلى :

١- طريقة انتخاب النسب :

تجرى التربية بتتبع النسل الناتج من هجين فردى ناجح بين سلالتين مربيّتين تربية داخلية ، وإجراء الانتخاب مع استمرار التربية الداخلية للنباتات المنتخبة جيلاً بعد جيل (تراجع التربية بطريقة انتخاب النسب فى الفصل الحادى عشر) .

٢- طريقة التهجين الرجعى :

تعد تلك أنسب طرق التربية عند الرغبة فى تحسين السلالات المرباة داخلياً فى صفات معينة ؛ مثل صفة العقم الذكوى (لاستعمالها كأمهات فى الهجن) ، والمقاومة للأمراض الهامة (تراجع التربية بطريقة التهجين الرجعى فى الفصل الثانى عشر) .

٣- طريقة التحسين التجمعى Convergent Improvement :

اقترح Richey هذه الطريقة فى عام ١٩٢٧ ، وتجرى بتلقيح أحد الهجن الفردية الناجحة رجعيّاً إلى كل من أبويه على انفراد ؛ فيلقح الهجين أ ب - مثلاً - رجعيّاً مع كل

من السلالتين (أ) ، و (ب) مع الانتخاب للصفات المهمة ؛ مثل قوة النمو والمقاومة للأمراض ؛ وبذا .. تحسن كلتا السلالتين .

٤- طريقة انتخاب الجاميطات Gamete Selection :

اقترح Stadler هذه الطريقة فى عام ١٩٤٤ ، وتجرى بتلقيح سلالة جيدة بحبوب لقاح أحد الأصناف الناجحة المفتوحة التلقيح . وتختلف النباتات التى تنتج من هذا التلقيح عن بعضها البعض - وراثياً - بدرجة كبيرة . يُلَقَّح كل نبات منها - ذاتياً - كما يلحق أيضاً مع صنف اختبارى . ويُحْتَفَظُ بالبذور الناتجة من التلقيح الذاتى لحين تقييم البذور الناتجة من التلقيح الاختبارى . ويعنى تفوق نسل أى تلقيح اختبارى أن النبات الذى استخدم فى هذا التلقيح كان قد تلقى جينات مرغوباً فيها من الصنف المفتوح التلقيح ، الذى كان قد لُقِّح مع السلالة المراد تحسينها . وتزرع البذور الناتجة من التلقيح الذاتى لهذه النباتات فى الموسم التالى لبدء برنامج جديد من التربية الداخلية عليها . وترجع أهمية هذه الطريقة - كما بين Stadler - إلى أنه إذا وجدت التراكيب الوراثية المرغوب فيها فى الصنف المفتوح التلقيح بنسبة q^2 .. فإنها توجد فى جاميطات هذا الصنف بنسبة q ، وهى أعلى بكثير (يراجع لذلك قانون هاردي - فينبرج فى الفصل الثالث) .

إنتاج السلالات الأصلية من النباتات الأحادية

نظراً لأن إنتاج السلالات الأصلية المرباة داخلياً يتطلب جهداً كبيراً ، ويستغرق عدة سنوات ؛ لذا .. فقد اتجه تفكير بعض الباحثين نحو محاولة استخدام النباتات الأحادية (١ن) فى إنتاج نباتات ثنائية أصلية (٢ن) ؛ بمضاعفتها بالكولشيسين . وكان Chase - فى عام ١٩٤٩ - هو أول من نادى بهذه الطريقة وطبقها فى الذرة ، وهو محصول تظهر فيه النباتات الأحادية طبيعياً بطريقة التوالد البكرى parthenogenesis بمعدل ٨ ٪ . ويمكن معرفة النباتات الأحادية بسهولة إذا مازرعت نباتات أحد الأصناف المرغوب فيها المفتوحة التلقيح بالتبادل مع صنف آخر به جين سائد مُعَلَّم marker gene ، لا يوجد فى الصنف المفتوح التلقيح . وتُزال جميع النورات المذكرة من الصنف المفتوح التلقيح ؛ لئلا يُلَقَّح بالصنف الآخر ، ثم تحصد بنوره ، وتزرع؛ وبذا .. يمكن معرفة النباتات الأحادية الناتجة بطريق التوالد البكرى ، وهى التى لاتكون حاملة للصفة السائدة . وقد استخدم Chase لذلك صفة لون النبات القرمزى ، وهى صفة سائدة تظهر فى طور البادرة .

ويمكن مضاعفة النباتات الأحادية بسهولة بالكولشييسين (يراجع لذلك الفصل الثالث عشر) ؛ لإنتاج نباتات ثنائية أصيلة . كما أن نباتات الذرة الأحادية تميل بطبيعتها للارتداد إلى الحالة الثنائية ، لدرجة أن ١٠٪ من النباتات الأحادية غالباً ماتتنتج بنوراً ثنائية عند تلقيحها ذاتياً . وقد استخدمت السلالات الأصلية المنتجة بهذه الطريقة في إنتاج بعض الهجن (عن Burnham ١٩٦٦) ، إلا أن استعمالها لايزال محدود الانتشار .

مصادر النباتات الأحادية

يمكن الحصول على النباتات الأحادية من المصادر التالية :

- ١- من حالات التوالد البكرى لإحدى الخلايا الأحادية التي توجد في الكيس الجنيني ، وهي التي سبقت الإشارة إلى أنها تحدث طبيعياً في الذرة بنسبة تصل إلى ٠,١ ٪ .
- ٢- من النباتات الأحادية التي تنشأ بطريقة التوالد البكرى الذكرى *Androgenesis* ، وهي الحالات التي تفشل فيها النواة الذكرية في الاتحاد مع نواة البيضة ، وإنما تنمو النواة الذكرية إلى جنين أحادي مباشرة ، ويكون سيتوبلازم الخلايا الأحادية هو سيتوبلازم الجامطة المؤنثة . تحدث هذه الظاهرة بنسبة منخفضة في الطبيعة ، وقد اقترح Chase الاستفادة منها في نقل صفة العقم الذكرى السيتوبلازمي إلى السلالات المرباة داخلياً الأصلية الخصبة .
- ٣- من حالات تعدد الأجنة الأحادية *polyembryony* التي تكون مصاحبة للإخصاب ، وتكوين الجنين الثنائي الجنس في بنور بعض الأنواع النباتية . وتحدث هذه الظاهرة بنسبة أقل من ٠,١ ٪ في عدد من من الأنواع النباتية . إلا أنها وجدت بنسبة تزيد على ١٠٪ في الكتان .
- ٤- تظهر النباتات الأحادية طبيعياً في نسل الهجن النوعية والهجن الجنسية . وقد أمكن الاستفادة بهذه الظاهرة في إنتاج أصناف جديدة ؛ بمضاعفة النباتات الأحادية التي ظهرت في النسل الناتج من التلقيح بين الشعير المزروع *Hordeum vulgare* ، والشعير البرى *H. bulbosum* . وتعرف الطريقة المتبعة لإنتاج النباتات الثنائية الأصلية من هذا التهجين باسم طريقة بلبوزم *Bulbosum method* .
- ٥- يمكن إنتاج النباتات الأحادية بشكل روتيني ، بواسطة مزروعات المتزاوج وحسبوب اللقاح ، وهي التي استخدمت لأول مرة مع نوع الداتورة *Datura innoxia* .

مزايا السلالات الثنائية الأصلية المضاعفة وعيوبها

يمكن تلخيص مزايا النباتات الثنائية الأصلية الناتجة من مضاعفة النباتات الأحادية فيما يلي :

- ١- يتم الوصول إلى الأصالة الوراثية بعد عدد أقل من الأجيال عما يلزم في برامج التربية الداخلية ، ويمكن أن يقلل ذلك من الوقت اللازم لإنتاج سلالات أصلية .
- ٢- يمكن أن تكون عملية الانتخاب (المفاضلة) بين الأنسال المتجانسة للأفراد الأحادية المتضاعفة أكثر كفاءة من الانتخاب بين أنسال النباتات المرباة داخلياً ، أو بين نباتات كل نسل منها في برامج التربية الداخلية .
- ٣- قد تكون النباتات الأحادية المتضاعفة ذاتها أصنافاً جديدة ، يمكن إكثارها مباشرة.
- ٤- سهولة الانتخاب للصفات السائدة في النباتات الأحادية ؛ حيث لا توجد بها مشكلة التمييز بين الأفراد السائدة الأصلية ، والسائدة الخليطة .

أما عيوب النباتات الثنائية الأصلية الناتجة من مضاعفة النباتات الأحادية .. فيمكن تلخيصها فيما يلي :

- ١- يتطلب تقييم السلالات الثنائية الأصلية وقتاً طويلاً نسبياً ؛ حيث لا توجد أية فرصة لعملية التقييم ؛ على أساس الشكل الظاهري ؛ خلال مراحل إنتاج النباتات الأصلية المضاعفة . هذا .. بينما يتمكن المربي من ملاحظة سلوك السلالات في الحقل في كل جيل من أجيال التربية الداخلية . وحينما يحين وقت إنتاجها .. فإن المربي يكون قد كَوَّن فكرة جيدة عنها ؛ فلا يتطلب الأمر تقييماً كثيراً لها بعد ذلك ؛ مثلما تكون عليها الحال في السلالات الأصلية المضاعفة من النباتات الأحادية .
- ٢- قد يتطلب إنتاج السلالات الأصلية المضاعفة توفر أجهزة معينة ، وخبرة خاصة في بعض التقنيات الحديثة .
- ٣- قد يكون من الصعب التنبؤ بمعدل ظهور الأفراد الأحادية في العشيرة .
- ٤- ربما لا تفوق السلالات الأصلية المنتجة بمضاعفة النباتات الأحادية السلالات المرباة تربية داخلية .

ولزيد من التفاصيل عن إنتاج السلالات الأصلية من النباتات الأحادية .. يراجع Fehr (١٩٨٧) .

أنواع الهجن

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من الهجن ، هي : الهجن الفردية ، والهجن الثلاثية ، والهجن المزدوجة أو الرباعية .

الهجن الفردية

كان Shull - فى عام ١٩٠٩ - أول من اقترح إنتاج الهجن الفردية Single Crosses فى الذرة ؛ وذلك بتهجين سلالتين معاً ، على أن يكونا على درجة عالية من القدرة الخاصة على التالف . وتنتج الهجن الفردية بزراعة خطين من السلالة المستعملة كأم بالتبادل ، مع خط من السلالة المستعملة كأب ، مع إزالة الفورات من نباتات السلالة المستعملة كأم ، وهى التى تكون أعلاهما محصولاً .

تتميز الهجن الفردية بما يلى :

- ١- تظهر بها قوة الهجين بدرجة عالية .
- ٢- تكون على درجة عالية من التجانس ؛ لأن السلالات المستخدمة فى إنتاجها تكون أصيلة وراثياً ، ولا تحدث بها أية انحرافات وراثية عند إنتاج الجاميطات .
- ومن أهم عيوب الهجن الفردية ما يلى :

- ١- تكون أسعار تقاويها مرتفعة ، ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية :

- (أ) ضعف محصول السلالات المرباة داخلياً ؛ فتقل بذلك كمية البذرة الهجين التى يمكن إنتاجها من وحدة المساحة .
- (ب) يفقد ثلث الحقل الإنتاجى فى زراعة السلالة المستخدمة كأب ، ويعد ذلك أمراً ضرورياً ، نظراً لضعف قدرة السلالات المرباة داخلياً على إنتاج حبوب اللقاح ، بما لا يسمح بنقص نسبتها عن الثلث فى حقل إنتاج البذور .
- تنطبق هذه العيوب - خاصة على الهجن الفردية فى الذرة الشامية - لذا .. فإنها لم تعد

مستخدمة فى هذا المحصول ، ولكنها تنتج على نطاق واسع فى عديد من المحاصيل الأخرى ؛ مثل البصل ، والخيار ، والكوسة ، والكرنب ، والجزر ، والبنجر . كما تنتج الهجن الفردية كذلك فى الذرة السكرية ، التى تباع تقاويها بأسعار أكثر ارتفاعاً مما فى الذرة الشامية ، ولأن التجانس التام فى النمو -وكذلك موعد الحصاد- يعد شرطاً غاية فى الأهمية بالنسبة لعملية الحصاد الآلى فى هذا المحصول ، وهو أمر لايتوفر إلا فى الهجن الفردية .

الهجن الثلاثية

ينتج الهجين الثلاثى Three-way cross بتلقيح هجين فردى بحبوب لقاح من سلالة مربية داخلياً ، ويؤزَعُ لذلك خطان من الهجين الفردى - الذى تُزال نورات المذكره - بالتبادل مع خط من السلالة المستعملة كأم .

وتتميز الهجن الثلاثية بالانخفاض النسبى لأسعار تقاويها ؛ لأنها تنتج على هجن فردية قوية النمو . كما تتميز بذورها بأنها كبيرة الحجم ومنظمة الشكل -لنفس السبب السابق- وهى - بذلك - تصلح للزراعة الآلية . لكن يعيبها أن ثلث الحقل الإنتاجى يفقد فى زراعة السلالة المستخدمة كأم ، وهو أمر ضرورى لضعف قدرتها على إنتاج حبوب اللقاح ، بما لا يسمح بنقص نسبتهما عن الثلث فى حقل إنتاج البنور .

هذا .. وقد أنتجت الهجن الثلاثية فى الذرة ، إلا أن استعمالها كان محدوداً ، ولايزال كذلك .



الهجن الزوجية (الرباعية)

اقترح Jones فى عام ١٩١٨ إنتاج الهجن الزوجية Double Crosses فى الذرة ؛ بتلقيح هجينين فرديين معاً ، واستعمال البنور الناتجة كصنف تجارى . وتلزم لإنتاج الهجن الزوجية زراعة أربعة خطوط من الهجين الفردى المستعمل كأم بالتبادل ، مع خط من الهجين الفردى المستعمل كأم ، مع إزالة النورات المذكره من خطوط الأمهات (شكل ١٠-١) .

السنة الأولى

تزال نورته المذكرة

تزال نورته المذكرة




السنة الثانية

بنور الهجين الفردي

تزال نورته المذكرة

$B \times A$

$C \times D$



$B \times A$ الهجين الفردي

$C \times D$ الهجين الفردي

بنور الهجين الزوجي

$(B \times A) \times (C \times D)$

التي تزرع في الحقول التجارية

شكل (١٠ - ١) : طريقة إنتاج الهجين الزوجية في الذرة .

تتميز الهجن الزوجية بانخفاض أسعارها ؛ للأسباب التالية :

- ١- تنتج تقاويها على هجن فردية قوية النمو وعالية المحصول .
- ٢- يستغل ٨٠٪ من الحقل فى إنتاج البنور ؛ لأن الهجين الفردى المستعمل يكون قوى النمو ، وينتج حبوب لقاح بوفرة ، تسمح بقصر زراعته فى خمس الحقل الإنتاجى فقط .

وأهم عيوب الهجن الزوجية ما يلى :

- ١- تقل درجة التجانس بين نباتات الهجن الزوجى ؛ لكثرة ما به من انحرافات وراثية ؛ نظراً لأنه ينشأ بتجهين هجينين فرديين . ويمكن الحد من حالة عدم التجانس هذه بالاختيار الدقيق للسلالات الأربع التى تستخدم فى إنتاج الهجين ، بما لا يسمح بحدوث انحرافات فى الصفات الاقتصادية والمورفولوجية الهامة .
- ٢- يقل محصول الهجن الزوجية عن الهجن الثلاثية ، أو الفردية . ولكن يمكن الارتفاع بمحصول الهجن الزوجية إلى مستوى يقارب الهجن الفردية بالاختيار الدقيق للسلالات الداخلة فى إنتاجها ؛ فقد أوضحت الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن أن محصول الهجين الزوجى يزداد بازدياد التباعد الوراثى بين السلالات الداخلة فى إنتاجه . ويحسن - فى حالة اشتراك بعض السلالات فى أصل واحد - أن تستعمل السلالات القريبة من بعضها البعض وراثياً فى إنتاج الهجن الفردية ؛ بحيث تكون الهجن الفردية المستعملة فى إنتاج الهجين الزوجى بعيدة وراثياً عن بعضها البعض ؛ فمثلاً : لو أن السلالات الداخلة فى إنتاج الهجين الزوجى هى أ ، ب ، ج ، د ، وكانت أ ، ب تربطهما صلة قرابة ، وكذلك ج ، د فإن الهجين الزوجى يجب أن ينتج بتجهين الهجين الفردى أ ب مع الهجين الفردى ج د .

هذا .. وينتشر استعمال الهجن الزوجية فى الذرة الشامية على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم ، وتستعمل على نطاق ضيق فى الذرة السكرية ، وبعض الصليبيات ، إلا أنها قلما تستعمل فى المحاصيل الأخرى .

وسائل الاستفادة من الجيل الثانى للهجن

لاينصح باستعمال الجيل الثانى للهجن فى الزراعة ؛ للأسباب التالية :

- ١- يحتوى الجيل الثانى - نظرياً - على نصف قوة الهجين التى توجد فى الجيل الأول

، وقد قدر النقص فى المحصول - عملياً - بنحو ٢٦٪ فى الهجن الزوجية ، و ٣٦٪ للهجن الثلاثية ، و ٤٨٪ للهجن الفردية . وتجدر الإشارة إلى أن عشائر الجيل الثانى لهذه الهجن ليست سوى أصناف تركيبية ، تعتمد - فى تكوينها - على عدد من السلالات أقل مما يوصى به (يراجع موضوع الأصناف التركيبية فى هذا الفصل) .

٢- تزيد الاختلافات الوراثية بين أفراد الجيل الثانى ؛ بدرجة كبيرة لايحقق معها التجانس المطلوب فى الأصناف المحسنة .

هذا .. إلا أن الجيل الثانى يستعمل تجارياً فى الحالات التى ترتفع فيها أسعار الهجن بدرجة كبيرة حيث تقترب أسعار تقاوى الجيل الثانى من أسعار تقاوى الأصناف العادية ، بينما تحتفظ النباتات بنصف قوة الهجين . ولا يمكن -فى هذه الحالة- إكثار الصنف بمزيد من التلقيح الذاتى . ومن أمثلة الهجن التى يستعمل فيها الجيل الثانى -تجارياً- صنف الطماطم Foremost ، والقاوون Market Pride ، والبتونيا Violet Blue ، والبانسية Seven-Eleven .

كما يستخدم الجيل الثانى فى أغراض التربية ؛ حيث يمكن أن يبدأ منه برنامج للتربية الداخلية ؛ لإنتاج سلالات جديدة فائقة مرباة داخلياً . كذلك .. قام بعض الباحثين بإنتاج الجيلين الثانى والثالث من الهجن الفردية ، ثم إنتاج هجن زوجية بتلقيح نباتات من أى من هذين الجيلين . ومن الطبيعى أن تكون هذه النباتات (آباء الهجن الزوجية) خليطة ؛ وبذا .. لا يمكن المحافظة عليها ؛ لتكرار إنتاج الهجن للاستعمال التجارى . ونظرياً .. فإن هذه الهجن يجب أن تتساوى - فى غياب الانتخاب لأبائها - مع الهجن الزوجية الناتجة من تلقيح هجن فردية . وقد تأكد ذلك - عملياً - بعدد من الدراسات (عن Allard ١٩٦٤) .

أما محاولات إنتاج الجيل الثانى والأجيال التالية - بالتربية الداخلية - بهدف التوصل إلى آباء الهجن ؛ لإعادة إنتاجها ؛ فهى محاولات مقضى عليها بالفشل ، ولا يمكن أن يفكر فيها شخص ملم بمبادئ التربية ؛ فمن المتوقع أن يظهر فى الجيل الثانى للهجن ٣^٢ تركيب وراثى مختلف ؛ حيث (ن) هى عدد العوامل الوراثية الخليطة فى الجيل الأول الهجين ؛ وعليه .. فإن عدد التراكيب الوراثية التى يمكن ظهورها فى الجيل الثانى يكون كبيراً للغاية ؛ فلو كانت (ن) تساوى ٣٠ - وهو تقدير متواضع للغاية - فإن عدد التراكيب الوراثية التى يحتمل ظهورها يصبح ٢.٠٥٨٩ × ١٠^{٤١} . ولن يمكن معرفة التراكيب

المرغوب فيها منها - للجهل بها ابتداءً - فضلاً على استحالة زراعة هذا العدد من النباتات ، أو إخضاع بعضها للتربية الداخلية ؛ لعزل سلالتى الآباء بحالة أصيلة .

الظواهر التى يستفاد بها فى إنتاج الأصناف الهجين

يستفيد المربي ببعض الظواهر النباتية ؛ مثل العقم الذكري ، وعدم التوافق (الفصل الثامن) ، وانفصال الجنس (الفصل الثانى) فى إنتاج الهجن . ونبتال بالشرح - فيما يلى - كيفية الاستفادة بهذه الظواهر -وغيرها- فى عملية إنتاج البذرة الهجين .

العقم الذكري الوراثى

يستفاد من ظاهرة العقم الذكري الوراثى فى إنتاج الهجن ، باستعمال سلالات أمهات ، تكون أصيلة فى صفة العقم الذكري (ms ms) ، بينما تكون سلالات الآباء خصبة أصيلة (Ms Ms) ؛ وبذا .. تكون البذرة الهجين - وهى التى تحصد من سلالات الأمهات - خليطة وخصبة (Ms ms) . تنتج هذه الهجن بونما حاجة إلى خصى الأزهار المذكرة ، أو إزالة النورات المذكرة من نباتات الأمهات .

وقد استخدمت ظاهرة العقم الذكري الوراثى فى إنتاج الهجن الفردية فى كثير من المحاصيل ، إلا أنها لاتصلح لإنتاج الهجن الزوجية ؛ لأن كلا الهجينين الفرديين المستعملين فى إنتاج الهجين الزوجى يكون كل منهما خصب الذكر ، فى حين يلزم أن يكون أحدهما عقيم الذكر ؛ حتى يمكن إنتاج الهجين الزوجى .

ولكى تكون الاستفادة بظاهرة العقم الذكري الوراثى تامة .. فإنه تلزم توفر وسيلة فعالة لنقل حبوب اللقاح من السلالة الخصبة الذكر إلى السلالة العقيمة الذكر المستعملة كأم ، وإلا تطلب الأمر إجراء عملية التلقيح يدوياً ؛ لهذا السبب .. فإنه لم يمكن الاستفادة - حتى الآن - من صفة العقم الذكري فى بعض المحاصيل الذاتية التلقيح ؛ مثل الطماطم . فبرغم توفر عديد من جينات العقم الذكري فى هذا المحصول .. إلا أن جميع الأصناف الهجين المتداولة -تجارياً- تنتج بنورها بالتلقيح اليدوى ، ويرجع ذلك إلى قلة النشاط الحشرى فى الطماطم ، وضعف قدرة زهرة الطماطم على إنتاج حبوب اللقاح - مقارنة بالمحاصيل الخلطية التلقيح - كما أن برامج مكافحة الآفات المتبعة فى حقول الطماطم تتعارض مع إمكان استخدام الحشرات فى التلقيح .

كذلك توجد محاصيل خلطية التلقيح - كالقرعيات - تتوفر فيها جينات العقم الذكري ، إلا أن جميع أصنافها الهجين المتداولة تجارياً تنتج بذورها بالتلقيح اليدوى . ومن أهم الأسباب التى جعلت مربى النبات يعزفون عن الاستفادة بظاهرة العقم الذكري - عوضاً عن عملية الخصى فى بعض المحاصيل الذاتية التلقيح كالطماطم ، أو عوضاً عن عمليتى الخصى والتلقيح فى بعض المحاصيل الخلطة التلقيح كالقرعيات - مما يلى :

- ١- تميز هذه المحاصيل بإنتاجها أعداداً كبيرة من البنور من كل تلقيح ، مع عدم حاجتها إلى كميات كبيرة من التقاوى لزراعة وحدة المساحة .
- ٢- سهولة إجراء التلقيحات اليدوية فيها .

فإذا أضفنا إلى ذلك ضرورة إدخال صفة العقم الذكري فى سلالات الأمهات ، والجهود التى تبذل للتخلص من النباتات الخصبة الذكر التى تظهر فى خطوطها .. لوجدنا أن التلقيح اليدوى يعد أفضل لإنتاج الهجن فى مثل هذه المحاصيل .

ويتطلب الاعتماد على ظاهرة العقم الذكري الوراثى - فى إنتاج الهجن التجارية- نقل صفة العقم الذكري لسلالات الآباء . ونظراً لأن السلالات العقيمة الذكر لا يمكن إكثارها - للمحافظة عليها - بالتلقيح الذاتى ؛ لذا .. فإنها تكثر بتلقيحها مع نباتات خصبة خلطية فى صفة العقم الذكري (Msms) ؛ حيث تكون نصف نباتات النسل الناتج عقيمة الذكر أصيلة (msms) ، ونصفها الآخر خصبة الذكر خلطية (Ms ms) . ويتطلب الإنتاج التجارى للهجن ضرورة التخلص من هذه النباتات الخصبة فى مرحلة مبكرة من النمو ؛ لأن وجودها يعنى حدوث التلقيح الذاتى ، ويجرى ذلك باتباع إحدى الوسائل التالية :

١- بإزالة النباتات الخصبة الذكر بمجرد ملاحظتها عند الإزهار . وتتطلب هذه الطريقة أيدى عاملة كثيرة ، الأمر الذى يقلل من مزايا الاعتماد على ظاهرة العقم الذكري فى إنتاج الهجن .

٢- بربط جين الخصوبة -إن أمكن- مع جين يتحكم فى الحساسية لأحد المركبات الكيميائية ، ثم التخلص من النباتات الخصبة ، بمعاملتها بهذا المركب . وقد اقترح - فى هذا المجال - ربط جين الخصوبة فى الشعير بالجين المسئول عن الحساسية لمركب الـ D.D.T .

٣- بإدخال جينات معلمة ، ترتبط ارتباطاً قوياً بصفة العقم الذكري فى السلالات

العقيمة الذكر ؛ حتى يمكن تمييز النباتات الخصبة الذكر . ومن أمثلة ذلك جين يتحكم فى لون الااليرون فى حبة الذرة ؛ مما يسمح بفرز البنور اليكترونيا قبل زراعتها .

٤- باستعمال جينات معلمة تكون ذات تأثير متعدد ؛ بحيث يسهل تمييز النباتات العقيمة الذكر من النباتات الخصبة . ومن أمثلة ذلك .. ظهور صفة الأوراق الملساء الخالية من الشعيرات فى إحدى سلالات البطيخ العقيمة الذكر ، وكذلك ظهور صفة الأوراق الضيقة فى الخس ، عند وجود صفة العقم الذكري ، التى يتحكم فيها ثلاثة أزواج من العوامل الوراثية المتنحية .

٥- بربط جين العقم الذكري بإحدى حالات الكروموسومات غير العادية ، التى قد تؤثر فى صفة ظاهرة كجحم البذرة على سبيل المثال . وقد أمكن ربط صفة خصوبة الذكر فى الذرة بكروموسوم ، يوجد به نقص مزدوج duplicate-deficient (Dp-Df) لاينتقل خلال الجامطة المذكرة . وتحصد البنور التى تحمل جين العقم الذكري بحالة أصيلة من الهجين :

الأب $ms\ ms \times Dp-Df\ Ms\ ms$ الأم

وتكثر السلالة ذات النقص الكروموسومى المزدوج بالانتخاب فى نسل السلالة المستخدمة كأب (عن Duvick ١٩٦٦ ، Welsh ١٩٨١) .

العقم الذكري السيتوبلازمى

يستفاد من ظاهرة العقم الذكري السيتوبلازمى فى إنتاج هجن بعض المحاصيل ؛ مثل البصل ، وبنجر السكر ؛ حيث تكون سلالات الأمهات عقيمة الذكر (S) وتصل إليها حبوب اللقاح من سلالات الآباء الخصبة الذكر (F) . وهنا .. لابد أيضاً من وسيلة طبيعية لنقل حبوب اللقاح ، ويتم ذلك إما بواسطة الحشرات كما فى البصل وإما بواسطة الهواء كما فى البنجر .

يكون الهجين الناتج - فى حالة استعمال ظاهرة العقم الذكري السيتوبلازمى - عقيم الذكر ؛ لأنه يتلقى السيتوبلازم من الأم التى تحمل العامل (S) ؛ ولذا .. فإن استعمال هذه الظاهرة فى إنتاج الهجن مقصور على المحاصيل التى تزرع لأجل أجزائها الخضرية ، أو أزهارها ؛ مثل البصل ، والبنجر ، ونباتات الزينة . ولايمكن الاعتماد على هذه الظاهرة فى

إنتاج الهجن الفردية من المحاصيل التي تزرع لأجل بنورها ، أو ثمارها ، إلا إذا خلطت البذرة الهجين الناتجة (وهي التي تحمل العامل S) مع بنور أخرى من الهجين ذاته ، يكون قد استعمل التلقيح اليدوي في إنتاجها ؛ حيث تشكل الأخيرة مصدراً محبوب اللقاح في المزارع التجارية لهذا الهجين ؛ لأنها تكون خصبة الذكر . ويطلق على هذه الطريقة اسم الخلط Blending .

وقد اتبعت طريقة الخلط هذه - على نطاق واسع - في إنتاج الهجن الزوجية من الذرة ، قبل اكتشاف ظاهرة العقم الذكري الوراثي السيتوبلازمي . وكان ذلك يجري بإدخال صفة العقم الذكري السيتوبلازمي إلى إحدى السلالات الأربع التي تدخل في تكوين الهجين الزوجي ؛ فلو فرض أن كان الهجين الزوجي المراد إنتاجه هو $A \times B$ ج د ، وأدخلت صفة العقم الذكري السيتوبلازمي إلى السلالة أ .. فإن هذه السلالة تستعمل كأنم في إنتاج الهجين الفردي $A \times B$ ، الذي يكون عقيم الذكر ؛ لأنه يتلقى عامل العقم (s) من سيتوبلازم الأم . أما الهجين الفردي ج د .. فإنه ينتج بطريقة التلقيح اليدوي ، ويكون خصب الذكر ، يستعمل الهجين الفردي العقيم $A \times B$ كأنم في إنتاج الهجين الزوجي $A \times B$ ج د الذي يكون عقيم الذكر ؛ لأنه يتلقى عامل العقم (s) من الأم العقيمة التي هي الهجين الفردي $A \times B$. ويخلط بذرة الهجين الزوجي $A \times B$ ج د المنتجة بهذه الطريقة (وهي التي تحمل العامل s) مع بنور أخرى من الهجين نفسه يكون قد استعمل التلقيح اليدوي في إنتاجها .. فإن المخلوط الناتج (blend) يمكن زراعته كصنف هجين ؛ حيث تشكل البنور الناتجة من التلقيح اليدوي مصدراً محبوب اللقاح ؛ لأنها تكون خصبة الذكر .

العقم الذكري الوراثي - السيتوبلازمي

يستفاد من ظاهرة العقم الذكري الوراثي - السيتوبلازمي في إنتاج هجن المحاصيل ، التي تزرع لأجل بنورها أو ثمارها ؛ مثل الذرة ، وذرّة المكناس (السروغوم) . ويكون التركيب الوراثي للسلالة العقيمة الذكر المستعملة كأنم هو Srr ، بينما يكون التركيب الوراثي للسلالة الخصبة الذكر المستعملة كأنم إما FRR ، أو SRR . ويكون الهجين الناتج - في أي من الحالتين - خصب الذكر ، وذا تركيب وراثي SRR .

كما يستفاد من هذه الظاهرة في إنتاج الهجن الزوجية أيضاً ؛ فلو كان الهجين

الزواجى المطلوب هو أ ب × ج د فإن الأمر يتطلب -أولاً- إدخال صفة العقم الذكري الوراثى - السيتوبلازمى إلى إحدى سلالتى كل هجين فردى ؛ ليصبح تركيبهما الوراثى Srr . أما التركيب الوراثى للسلالة الأخرى -لكل هجين فردى- فيكون FRR فى أحد الهجينين الفرديين ، و Frr فى الهجين الآخر ، وتكون التراكيب الوراثية للسلالات والهجن الفردية كما يلى :

السلالة	التركيب الوراثى	الشكل الظاهرى	استعمالها
أ	Srr	عقيمة الذكر	أم فى الهجين الفردى أ ب
ب	FRR	خصبة الذكر	أب فى الهجين الفردى أ ب
ج	Srr	عقيمة الذكر	أم فى الهجين الفردى ج د
د	Frr	خصبة الذكر	أب فى الهجين الفردى ج د

وبذا .. فإن الهجين الفردى أ ب يكون خصب الذكر ، وذا تركيب وراثى Srr ، أما الهجين الفردى ج د .. فإنه يكون عقيم الذكر ، وذا تركيب وراثى Srr (يراجع ذلك تحت موضوع العقم الذكري الوراثى - السيتوبلازمى فى الفصل الثامن) . وباستعمال أم جين الفردى ج د كأم مع الهجين الفردى أ ب الذى يستعمل كأب .. فإن نصف نباتات الهجين الزواجى أ ب × ج د تكون خصبة الذكر ، وذا تركيب وراثى Srr ، بينما تكون نباتات نصفه الآخر عقيمة الذكر ، وذات تركيب وراثى Srr ، ويقوم النصف الخصب بإمداد جميع النباتات فى الحقل بحبوب اللقاح اللازمة .

وتتميز هذه الطريقة بعدم الحاجة إلى إزالة النورات المذكورة من السلالات ، أو الهجن الفردية المستعملة كأمهات فى جميع مراحل إنتاج الهجين الزواجى . ولكن يعاب عليها صعوبة إدخال الجين R إلى السلالات المستعملة كأباء ؛ لأن الجين لا يمكن تتبعه إلا باختبار النسل .

كذلك .. يستفاد من ظاهرة العقم الذكري الوراثى - السيتوبلازمى فى إنتاج الهجن الفردية التجارية من البصل ؛ حيث تلزم ثلاث سلالات لإنتاج كل هجين ، وهى كما يلى :

السلالة	التركيب الوراثى	الشكل الظاهرى
أ	Srr	عقيمة الذكر
ب	Frr	خصبة الذكر
ج	FRR	خصبة الذكر

تتعاثل السلالتان (أ ، ب) تماماً في كل صفاتها فيما عدا صفة العقم الذكري . أما السلالة (ج) .. فتسمى القرين المفضل good combiner ، وتكون ذات قدرة عالية على التوافق مع السلالة (أ) ؛ تمنح الهجين المرغوب فيه وتزرع السلالتان (أ ، ب) في خطوط بالتبادل ، وتحصد بذور كل سلالة على حدة ؛ فتكون البذور الناتجة من السلالة (أ) نسلًا للسلالة (أ) ، والبذور الناتجة من السلالة (ب) نسلًا للسلالة (ب) ، علماً بأن حبوب لقاح السلالة (ب) تلقح كلاً من السلالتين (أ ، ب) . أما السلالة (ج) .. فإنها تزرع في قطعة أرض منعزلة ؛ لإكثارها ، والمحافظة عليها بالتلقيح الخلطي الطبيعي بين نباتاتها . وإنتاج بذرة الهجين التجاري .. تزرع السلالتان (أ ، ج) معاً في قطعة أرض معزولة ، بمعدل خط من السلالة (ج) لكل ٤-٦ خطوط من السلالة (أ) ، أو بمعدل خطين من السلالة (ج) لكل ثمانية خطوط من السلالة (أ) . ولزيد من التفاصيل عن إنتاج هجن البصل .. يراجع Pike (١٩٨٦) .

عدم التوافق

كان O.H. Pearson في عام ١٩٣٢ هو أول من اقترح الاستفادة من ظاهرة عدم التوافق في إنتاج الهجن التجارية . كما ذكر Attia & Munger (عن Wallace & Nasrallah ١٩٦٦) أن هذه الظاهرة تتسبب في حدوث التلقيح الخلطي في الكرنب بنسبة ٩٠-١٠٠٪ ، وأن هذه النسبة تعد جيدة للبدء في إنتاج البذرة الهجين . وتشيع -حالياً- الاستفادة من هذه الظاهرة في إنتاج هجن عديد من المحاصيل ، خاصة النباتات الصليبية ؛ مثل الكرنب ، وكرنب بروكسل ، والكرنب الصيني التي توجد فيها ظاهرة عدم التوافق الاسيبوروفيتي . ويشترط لإنتاج الهجين أن تكون سلالتا الأبوين غير متوافقتين ذاتياً ، بينما تكونان متوافقتين خلطياً مع بعضيهما ؛ أي إن كلاً منهما تكون ملقحة للآخرى ؛ وبذا .. تحصد البذرة الهجين من كلتا السلالتين في حقل إنتاج البذور .

ومن أهم المشاكل التي تواجه إنتاج هجن الصليبيات -بالاعتماد على ظاهرة عدم التوافق- ما يلي :

١- يلزم دراسة نوع التفاعل الأليلي ، الذي يوجد بكل سلالة قبل البدء في إنتاج البذرة الهجين .

٢- لا تكون صفة عدم التوافق ثابتة فى كل الظروف البيئية .

٣- ضعف السلالات المرباة داخلياً .

ويستفاد من ظاهرة عدم التوافق فى إنتاج الهجن الفردية ، والثلاثية ، والزوجية (الرباعية) . وتنتج الهجن الثلاثية بالتلقيح بين هجين فردى غير متوافق ذاتياً كأم ، وسلالة مرباة داخلياً كآب ، بينما تنتج الهجن الزوجية بالتلقيح بين هجينين فرديين ، على أن يكون الهجين الفردى المستعمل كأم غير متوافق ذاتياً . ويمكن حصاد البذرة الهجين من كلا الأبوين - أيأ كان نوع الهجين- إذا كان الأبوان غير متوافقين ذاتياً ؛ فحينئذ .. يصبح كل منهما ملقحاً للآخر ، وتكون البذرة الهجين الناتجة من كليهما متماثلة فى تركيبها الوراثى، إلا إذا وجدت صفات معينة تتأثر بالأم ، أو تورث عن طريقها .

هذا .. إلا أن أغلب هجن الصليبيات التى تنتج فى الولايات المتحدة - حالياً - هى من نوع التلقيحات القمية Topcrosses ؛ حيث يستخدم صنف تجارى ناجح مفتوح التلقيح كملقح لسلالة عديمة التوافق ذاتياً تستخدم كأم . كما تنتج -أيضاً- تلقيحات قمية ثلاثية باستخدام صنف تجارى مفتوح التلقيح كملقح لهجين فردى غير متوافق ذاتياً (Dickson & Wallace ١٩٨٦) .

انفصال الجنس

يستفاد من حالات انفصال الجنس فى إنتاج الهجن على النحو التالى :

١- حالات النباتات الوحيدة الجنس الوحيدة المسكن Monoecious :

عندما يكون النبات وحيد الجنس وحيد المسكن (أى عندما يحمل أزهاراً مذكرة وأخرى مؤنثة) .. فإن إنتاج الهجين يكون أمراً ميسوراً ؛ حيث لايلزم سوى إزالة الأزهار المذكرة - أولاً بلول - من السلالة المستعملة كأم . ويستفاد من هذه الظاهرة فى إنتاج الهجن التجارية من الذرة ؛ وذلك بإزالة النورة المذكرة detassling من خطوط سلالات الأمهات قبل تفتح أزهارها . وتتطلب هذه العملية كثيراً من الأيدى العاملة ، إلا أنها تجرى ألياً . وتحصد البذرة الهجين من النباتات التى أزيلت نوراتها المذكرة .

ومن أهم متطلبات هذه الطريقة توفير عزل جيد لحقل إنتاج البنور ؛ حتى لاتصله

حبوب لقاح من مصادر أخرى خارج الحقل . ويتم العزل إما بتوفير مسافة كبيرة خالية من نباتات الذرة حول حقل إنتاج البنور ، وإما بزراعة المنطقة المحيطة بحقل إنتاج التقاوى بالسلالة المستخدمة كأب ؛ لضمان تواجد كثافة عالية من حبوب لقاح الأب المرغوب فيه . كذلك .. تجب العناية بإزالة النورات المذكورة ؛ بحيث لا تتسبب فى حدوث أضرار للنباتات . وتجرى هذه العملية على مراحل ؛ لأن النباتات لاتزهر كلها فى وقت واحد . ورغم إمكان إجراء هذه العملية -ألياً- إلا أنه يجب أن تؤخذ فى الحسبان احتمالات إجرائها -يدوياً- فى حالة سقوط الأمطار فى وقت حرج ؛ حيث يستحيل -حينئذ- مرور الآلات فى الحقل .

ويزرع حقل إنتاج البنور -عادة- بستة خطوط من سلالة الأم ، بالتبادل مع خطين من سلالة الأب . ويمكن بهذه الطريقة حصاد الآباء منفردة مع المحافظة على نقاوة البذرة الهجين . ويُتخلصُ -أحياناً- من نباتات سلالة الأب ؛ بحرثها فى الأرض ، أو تكسير سيقانها بعد التلقيح (عن Welsh ١٩٨١) .

٢- حالات النباتات الوحيدة الجنس الثنائية المسكن Dioecious :

عندما يكون النبات وحيد الجنس ثنائى المسكن (أى عندما توجد نباتات مذكرة وأخرى مؤنثة) .. فإن إنتاج البذرة الهجين يتم بزراعة سلالات الآباء فى خطوط متبادلة ، ثم إزالة النباتات المذكرة من خطوط السلالة المستعملة كأب ، قبل انتشار حبوب اللقاح منها . وتتبع هذه الطريقة فى إنتاج هجن السبانخ التى يكون التلقيح فيها -خلطياً- بالهواء .

٣- حالات النباتات المؤنثة :

تستعمل السلالات المؤنثة gynoeceious فى إنتاج هجن الخيار ؛ حيث تزرع كأمهات فى خطوط متبادلة مع سلالات الآباء ، ويترك الحقل للتلقيح الخلطى الطبيعى بالحشرات . ونظراً لأن حالة الأنوثة صفة بسيطة ؛ لذا .. فإنها تظهر فى الجيل الأول الهجين ، الذى لا يحمل بدوره سوى أزهار مؤنثة فقط . ويتطلب عقد الثمار فى الحقول التجارية للأصناف الهجين الأنثوية- توفر أحد الشروط التالية :

- (أ) أن يكون الصنف قادراً على العقد البكرى للثمار parthenocarpic ، وتتوفر هذه الصفة فى معظم أصناف الخيار الأنثوية التى تزرع فى البيوت المحمية .
- (ب) أن تخلط البذرة الهجين ببنور أحد الأصناف الشبيهة الوحيدة الجنس الوحيدة

المسكن ؛ حتى تكون مصدراً لحبوب اللقاح . وتقوم شركات البنور -عادة- بخلط بنور الملقحات - هذه - بنسبة ١٢-١٥٪ مع الهجن الأنثوية .

(ج) ألا يكون الصنف تام الأنوثة ؛ حيث لا تظهر صفة الأنوثة كاملة وهي بحالة خليطة في بعض الخلفيات الوراثية . ويمكن بالاختيار الدقيق للسلالة المستعملة كأب إنتاج هجن لا تكونه تامة الأنوثة ، بل تحمل عدداً قليلاً -نسبياً- من الأزهار المذكرة التي تنتج حبوب اللقاح اللازمة للتلقيح (عن Duvick ١٩٦٦) .

التقارن التفضيلي الكامل

يحدث - أحياناً - عند إجراء تهجين بين صنفين ، ثم مضاعفة كروموسومات الجيل الأول أن تفضل الكروموسومات الآتية -من كل صنف- الاقتران مع بعضها البعض عند الانقسام . وتعرف هذه الظاهرة باسم التقارن التفضيلي الكامل Complete Preferential Pairing . وإذا حدثت الظاهرة بشكل تام .. فإنه لا تحدث أية انعزالات في نسل الجيل الأول الهجين ؛ وبهذا .. يمكن المحافظة عليه وإكثاره ، دونما حاجة إلى إعادة التهجين سنوياً .

النباتات الثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة

تحتوى النباتات الثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة Tertiary Trisomics على كروموسوم واحد زائد ، يتكون من جزأين من كروموسومين غير متماثلين ، وهي حالة نادرة الوجود في الطبيعة . وقد اقترح الاستفادة من هذه الظاهرة في إكثار سلالات الأمهات العقيمة الذكر ؛ لأنها لا تسمح بظهور نباتات خصبة الذكر في خطوط الأمهات ، وهي النباتات التي يلزم التخلص منها -عند اتباع طريقة الإكثار العادية للنباتات العقيمة الذكر- بذل جهد كبير ، وقد بدأ تطبيقها في الشعير .

يعتمد تطبيق هذه الظاهرة - في إكثار السلالات العقيمة الذكر- على أساس أن التراكيب الكروموسومية غير الطبيعية ، لا تنتقل - عادة - عن طريق حبوب اللقاح ؛ حيث تكون جميع حبوب اللقاح الخصبة طبيعية . ويؤدي التلقيح الذاتي للنباتات الثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة إلى إنتاج بنور طبيعية ، وأخرى بها الظاهرة . وتكون البنور الأخيرة في الشعير صغيرة

ومتفضنة (مجمدة) ، ويسهل فصلها - ألياً - عن البذور الطبيعية .


يتطلب الأمر بعض الهندسة الكروموسومية لوضع الأليل السائد للخصوبة (Ms) بالقرب من موقع الالتحام بين جزأى الكروموسومين غير المتماثلين فى الكروموسوم الزائد ، بينما يكون أليل العقم الذكري المتنحى (ms) فى الكروموسوم الطبيعى . ونظراً لأن العبور يقل بشدة فى أجزاء الكروموسوم الزائد القريبة من منطقة الالتحام ، لذا .. فإنه يتكون نوعان فقط من الجاميطات ، يكون أحدهما طبيعياً والآخر يحتوى على الكروموسوم الزائد . وكما سبق الذكر .. فإن حبوب اللقاح التى تحتوى على الكروموسوم الزائد لاتكون خصبة ، ولاتشارك فى تكوين النسل ؛ وينتج من ذلك .. أن تكون نصف البذور الناتجة من التلقيح الذاتى لهذا النبات (الثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثالثة) طبيعية ، وتحمل جين العقم الذكري بحالة أصيلة ، بينما يحمل نصفها الآخر الكروموسوم الزائد - المحتوى على أليل الخصوبة السائد - وتكون صغيرة ومتفضنة (شكل ١٠-٢) ، ويسهل فصلها - ألياً - قبل الزراعة . وبهذه الطريقة يسهل إكثار السلالات العقيمة الذكر بطريق التلقيح الذاتى .

التكاثر اللا إخصابى

تنتشر ظاهرة التكاثر اللاإخصابى فى كثير من الأنواع النباتية (تراجع الظاهرة فى الفصل الثانى) ، وقد اقترح البعض الاستفادة بها ؛ كوسيلة لإكثار الصنف الهجين بعد إنتاجه ؛ ذلك لأن الأجنة اللاإخصابية تكون مشابهة للأم تماماً فى تركيبها الوراثى . ويذكر Sprague (١٩٦٧) أن ظاهرة التكاثر اللاإخصابى تستخدم فى إنتاج بنور هجن حشيشة . Argentina Bahia Grass .

استخدام هبيدات الجاميطات فى إنتاج الهجن

يستعمل مصطلح مييدات الجاميطات gametocides فى وصف المركبات الكيميائية التى تحدث المعاملة بها عقماً ذكرياً ، دون أن يكون لها تأثير فى خصوبة البويضة . وإذا كانت هذه المركبات على درجة عالية من الكفاءة .. فإنها يمكن أن تحدث عقماً ذكرياً فى أية سلالة تربية ، يراد استخدامها كأم فى الهجن ، وهو ما يلغى الحاجة إلى الهجن الرجعية التى تلزم لإدخال صفة العقم الذكري فى هذه السلالات .



شكل (١٠ - ٢) : تخطيط يبين كيفية استعمال النباتات الثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة tertiary trisomics فى إكثار السلالات العقيمة الذكر .

ولكى تكون هذه المركبات نافعة حقاً .. فإنها يجب أن تكون مؤثرة فى حبوب اللقاح ، دون أن يكون لها تأثير فى البويضات ، وألا يكون لها تأثير مَطْفَر ، وأن يكون استعمالها اقتصادياً وسهلاً ، وألا يكون لها تأثيرات جانبية ضارة . ونظراً لأن الإزهار يمتد فترة طويلة فى عديد من المحاصيل ؛ لذا .. فإنه يفضل أن تكون هذه المركبات جهازية ، أو أن تربى سلالات من النباتات يتركز فيها الإزهار خلال فترة قصيرة نسبياً ؛ وإلا فإنه قد تلزم

يقتصر استعمال مبيدات الجاميطات - فى الوقت الحاضر- على إنتاج هجن بعض محاصيل الحبوب . وفى محاصيل الخضر .. اختبر ١٥ مركباً كمبيدات جاميطات ، ووجد أن المالك هيدرازيد - بتركيز ١٠٠-٥٠٠ جزء فى المليون - كان أكثرها فاعلية ؛ حيث أحدث نسبة عالية من العقم فى حبوب اللقاح فى الباذنجان ، والفلفل ، والطماطم ، دون أن يؤثر - سلبياً - فى الأعضاء الزهرية الأنثوية ، وكانت أفضل المعاملات هى رش النورات الخضرية قبل تفتح الأزهار بتركيز ١٠٠ جزء فى المليون فى الباذنجان ، والبصل ، و ١٠٠-١٥٠ جزء فى المليون فى الطماطم ، و ٤٠٠-٥٠٠ جزء فى المليون فى الباميا والفلفل . كما أفاد -أيضاً- استعمال مركب 2,3-dichloroisobutyrate (الذى يعرف باسم Mendox) مع الطماطم ؛ حيث أحدث نسبة عالية من العقم فى حبوب اللقاح ، إلا أنه كان له تأثير سلبى فى النمو النباتى وعقد الثمار (George ١٩٨٥) . واستُخدم -أيضاً- كل من GA_3 ، و $GA_{4/7}$ مع كل من الخس والطماطم . كما استعملت منظمات النمو - مثل الإيثيفون - فى تثبيط إنتاج الأزهار المذكورة فى سلالات الأمهات من القرعيات .

العوامل المؤثرة فى كفاءة عملية التلقيح بين سلالات آباء الهجن

تتأثر كفاءة عملية التلقيح - بين سلالات آباء الهجن - بعدد من العوامل ، لعل من أبرزها ضرورة توافق موعد الإزهار فى سلالتى الآباء ، وهو ما يعرف باسم nicking . هذا .. علماً بأن توافق الإزهار فى موسم معين ، وفى منطقة معينة لايعنى بالضرورة أن يستمر التوافق فى مواسم أو مناطق أخرى ، ويستدل على ذلك بالخبرة . ويمكن تعديل موعد زراعة إحدى السلالتين ؛ بحيث تزهر فى موعد إزهار السلالة الأخرى .

وتحدث معظم المشاكل حينما يُعتمد على الحشرات فى عملية التلقيح ؛ فالنحل الذى يجمع حبوب اللقاح يميل إلى الإكثار من زيارة السلالات الخصبة الذكر ، بينما يقضى وقتاً أقل مع السلالات العقيمة الذكر . وحتى حينما تكون سلالتا الآباء خصبتين - كما فى حالة الاعتماد على ظاهرة عدم التوافق فى إنتاج الهجن - فإن النحل قد يفضل إحدى

السلالتين على الأخرى لأسباب قد ترجع إلى لون البتلات ، أو تركيز الرحيق بها ، أو ارتفاع النبات . كما يميل النحل - أحياناً - إلى البقاء على السلالة التي بدأ بها في أول زيارته للحقل بدلاً من التحرك بطريقة عشوائية .

كذلك لايفيد النحل في التلقيح داخل أقفاص العزل السلكية ، أو المصنوعة من الشاش ، أو القماش (Cages) ، بل على العكس .. فإنه يضر فيها الأزهار ؛ نظراً لأنه لايميل إلى البقاء داخل الأماكن الصغيرة المغلقة . وقد أوضحت الدراسات -التي أجريت في هذا المجال- أن النحل يحدث أضراراً بمياسم أزهار البصل ، ويتسبب في نقص محصول البذور . وأفضل الحشرات للتلقيح داخل الأماكن الضيقة كهذه .. الذبابة السروء Blowfly ، وهي ذبابة تضع بيضها على اللحم .

هذا .. إلا أنه يمكن استخدام النحل في التلقيح عند إنتاج التقاوى في البيوت المحمية ؛ فقد أنتج Dowker وآخرون (١٩٨٥) تقاوى هجن البصل في بيوت بلاستيكية ، أبعادها ٥ × ١٦ م . وكان محصول البذرة الهجين ومحصول بذرة السلالة الخصبة الذكر المستعملة كأب أعلى -عندما استخدم النحل في التلقيح- عما كانت عليه الحال عندما استخدمت الذبابة السروء . وقد بدا واضحاً في هذه الدراسة أن النحل كان أكثر نشاطاً في الجو الصحو . وأن الذبابة كانت أقل نشاطاً عند ارتفاع درجة الحرارة داخل الأنفاق . وتعارض هذه النتائج مع نتائج دراسة مماثلة ، أجريت على إنتاج بذور الكرنب بروكسل الهجين داخل الأنفاق ، والتي كانت فيها الذبابة السروء أفضل كثيراً من النحل ، الذي كان يميل إلى زيارة أزهار إحدى سلطى الآباء فقط ، ولايتحرك بينهما لإتمام التلقيح .

أنصاف الهجن المتعددة السلالات

تُعرف أنصاف الهجن المتعددة السلالات Composite Varieties بأنها : الأنصاف التي تنتج من تهجينات مركبة بدرجة أكبر من الهجن الزوجية (الرباعية) مثل : تهجين هجين زوجي مع هجين فردي ؛ أو هجين زوجي مع هجين زوجي آخر ، أو هجين سداسي أو ثماني مع هجين فردي ، أو زوجي ، أو سداسي ، أو ثماني ؛ فإذا استخدمت ثمان سلالات في إنتاج الصنف .. فإن تكوين الصنف قد يكون على النحو التالي :

$$[(١ \times ب) \times (ج \times د)] \times [(هـ \times و) \times (ز \times ح)]$$

يشترط في هذه السلالات أن تكون على درجة عالية من التوافق ، ولا يستعمل الهجين المتعدد السلالات نفسه في الزراعة التجارية ، بل يكثر بالتلقيح المفتوح ، ثم يستعمل لعدة أجيال في الزراعة ، قبل إعادة تكوينه من جديد . وقد تستعمل مثل هذه الهجن المتعددة السلالات لبدء برنامج تربية بطريقة انتخاب النسب ، أو انتخاب التجميع (يراجع لذلك الفصل الحادى عشر) ولا تلزم -في هذه الحالة- أن تكون السلالات متوافقة معاً ، وإنما يشترط أن تكمل بعضها بعضاً فيما يتعلق بالصفات التى ينبغى توفرها فى الصنف الذى يراد إنتاجه .

الأصناف التركيبية Synthetic Varieties

تنتج الأصناف التركيبية (أو المخلقة) فى المحاصيل الخلطية التلقيح فقط ؛ لأن الصنف يتم تركيبه - أولاً - من كل التهجينات الممكنة بين مجموعة من التراكيب الوراثية المتألفة ، ثم يترك - بعد ذلك - للتلقيح المفتوح لإكثاره . وتُسْتَعْمَل الأصناف التركيبية - تجارياً - لعدة أجيال قبل إعادة تركيبها من جديد . ويختلف الصنف التركيبى عن الأصناف المنتجة بطريقة الانتخاب الإجمالى فى أن الأول يُركب من تراكيب وراثية ، سبق اختبار قدراتها على التألف فى كل التلقيحات الممكنة ، بينما يتكون الصنف الناتج من الانتخاب الإجمالى من تراكيب وراثية جديدة مخلوطة - معاً - دون سابق معرفة بقدرتها على التألف .

وقد أنتجت الأصناف التركيبية فى محاصيل المراعى ، خاصة : البقولية ، والنجيلية ، كما أنتجت فى عباد الشمس ، والكرنب ، وغيره من الصليبيات ، ولكنها لم تكن ذات شأن كبير فى النرة ، برغم أنه هو المحصول الذى أجريت عليه الدراسات الأساسية الخاصة بطريقة إنتاج الأصناف التركيبية .

خطوات إنتاج الصنف التركيبى

يمر الصنف التركيبى عند إنتاجه بالمراحل التالية :

١- اختيار الآباء :

غالباً ماتكون الآباء عبارة عن سلالات أصيلة مربية داخلياً ، إلا أنها قد تكون على درجة أقل من الأصالة الوراثية ، وناتجة من التربية الداخلية بين نباتات النسل الواحد

(sibling) ، وقد تستعمل السلالات الخضرية . ويشترط فى الآباء أن تكون على درجة عالية من التآلف فى جميع التلقيحات الممكنة بين بعضها البعض . تلك هى المكونات الأساسية للصنف التركيبى ، وهى التى يطلق عليها اسم مكونات الأساس للصنف التركيبى أو Syn-O . ويتراوح عدد الآباء التى تدخل فى تكوين الصنف التركيبى - عادة - من ٤-١٠ ، ويفضل العدد الكبير من السلالات مادامت السلالات على درجة عالية من التآلف . لكنه كثيراً ما يصعب التوصل إلى هذا العدد من السلالات المتآلفة ، ويحسن - فى هذه الحالة - الاكتفاء بعدد أقل من السلالات على أن تكون على درجة عالية من التآلف .

٢- إنتاج الهجن الفردية :

تنتج كل الهجن الفردية الممكنة بين السلالات التى اختيرت ، ثم تخلط كميات متساوية من بذور كل هجين معاً . ويطلق على هذا الجيل اسم الجيل التركيبى الأول Syn-1 .

٣- تزرع بذور الجيل التركيبى الأول للتقييم ، وتترك للتلقيح الخلطى العشوائى ؛ لإنتاج الجيل التركيبى الثانى Syn-2 .

٤- تزرع بذور الجيل التركيبى الثانى للتقييم ، وتترك للتلقيح الخلطى العشوائى ؛ لإنتاج الجيل التركيبى الثالث Syn-3 .

وتستعمل بذور الجيل التركيبى الثالث Syn-3 ، وبذور الجيل التركيبى الرابع Syn-4 فى الإنتاج التجارى . كما تستعمل - كذلك - بذور الجيل التركيبى الثانى فى الإنتاج التجارى ، عند إعادة تكوين الصنف . ولكن لاستعمل بذور الجيل التركيبى الخامس ، أو الأجيال التركيبية التالية له فى الإنتاج التجارى .

اختبار القدرة على التآلف بين السلالات المكونة للصنف التركيبى

يتبع فى اختبار القدرة على التآلف للسلالات الداخلة فى تكوين الصنف التركيبى نفس الخطوات التى ذكرت آنفاً بالنسبة لاختبار القدرة على التآلف فى الهجن الفردية ، علماً بأن اختبار التلقيح القمى topcross يفيد كثيراً فى خفض عدد السلالات ، التى يلزم

اختبار قدرتها الخاصة على التآلف . كما يتبع اختبار آخر يعرف باختبار التلقيح المتعدد polycross test ، للوصول إلى نفس الهدف .

ويجرى الاختبار بزراعة جميع السلالات التى يُراد اختبار قدرتها على التآلف معاً ، فى قطعة أرض معزولة وصغيرة نسبياً ومقسمة إلى مساحات متساوية ، تتوزع فيها السلالات عشوائياً مع تكرار زراعة كل منها فى نفس العدد من المكررات . وأفضل التصميمات الإحصائية للاستعمال فى هذا الاختبار تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ، وتصميم المربع اللاتينى . ويعد العزل ضرورياً ؛ حتى لاتصل إلى السلالات حبوب لقاح من أى مصدر آخر ، ويفيد صغر مساحة الحقل فى جعل جميع السلالات قريبة من بعضها ، حتى تتلقح معاً ، بينما يساعد التوزيع العشوائى للسلالات والمكررات على إعطاء كل منها فرصة متساوية لكى تلقح بأية سلالة أخرى ؛ وبذا .. فإن نسل كل نبات من السلالة يمثل هجيناً مع سلالة أخرى ، ويكون متوسط محصول نسل كل نباتات السلالة دالاً على قدرتها العامة على التآلف مع جميع السلالات الأخرى .

ويعاب على هذا الاختبار .. أن التزاوج العشوائى التام بين السلالات .. ربما لا يحدث؛ لأسباب تتعلق باختلاف السلالات فيما يلى :

١- كمية حبوب اللقاح التى تنتجها كل منها .

٢- موعد انتشار حبوب اللقاح .

٣- درجة عدم التوافق بينها .

٤- مستوى التلقيح الذاتى فى كل منها .

٥- ارتفاع نباتات السلالة ، ومدى تعرضها للرقاد .

تؤخذ كميات متساوية من البنور من مكررات كل سلالة ، وتخلط -معاً- لأجل اختبار نسل التلقيح المتعدد polycross progeny test . ويمكن -فى هذه المرحلة- استبعاد أى من السلالات التى يتضح احتواؤها على أية صفة غير مرغوب فيها ، خاصة مايتعلق بالقابلية للإصابة بالأمراض والحشرات الهامة .

ويكون اختبار نسل التلقيح المتعدد فى مكررات ، وفى أكثر من موقع تجريبى ؛ بغرض تقييم المحصول والصفات الكمية الهامة الأخرى . يُضمّن الاختبار - عادة - أهم

الأصناف التجارية المستعملة في الزراعة للمقارنة ؛ وبذلك .. يمكن تعرّف أفضل السلالات - وهي التي تتميز بالقدرة العالية على التوافق - أو يمكن على الأقل استبعاد نصف السلالات التي تكون أقل من غيرها ، وهي التي تعاد عليها الدراسة في اختبار تلقيح متعدد جديد (عن Briggs & Knowles ١٩٦٧) .

وتجدر الإشارة إلى أن عدد توافيق الآباء (السلالات) - التي يمكن أن يتشكل من كل منها صنف تركيبى - تزيد بدرجة كبيرة مع كل زيادة في عدد السلالات المتوفرة ؛ فيكون عدد الأصناف التركيبية الممكنة ١١ عند توفر ٤ سلالات للاختيار منها ، و ٥٧ عند توفر ٦ سلالات ، و ٢٤٧ عند توفر ٨ سلالات ، و ١٠١٢ عند توفر ١٠ سلالات . والمعادلة العامة لذلك هي :

$$\text{عدد الأصناف التركيبية الممكنة} = \frac{n(n-1)}{2}$$

حيث تمثل (ن) عدد السلالات المتوفرة .

إنتاج بذور الجيل التركيبى الأول Syn-1

توجد طريقتان لإنتاج بذور الجيل التركيبى الأول ، هما :

- ١- إجراء كل التلقيحات الممكنة بين جميع السلالات المكونة للصنف التركيبى يدوياً ، ثم خلط كميات متساوية من بذور كل تلقيح معاً .
- ٢- اتباع طريقة التلقيح المتعدد polycross method التي سبق بيانها . وتقتصر الزراعة - في هذه الحالة - على السلالات التي يقع عليها الاختيار ؛ ليتكون منها الصنف التركيبى ، ثم تحصد بذور كل قطعة تجريبية على حدة ، ويلي ذلك .. خلط كميات متساوية من بذور كل وحدة تجريبية معاً . ويعنى ذلك خلط كميات متساوية من بذور تلقيحات كل سلالة مع جميع السلالات الأخرى ، وهي التي تكوّن الجيل التركيبى الأول . ويعيب هذه الطريقة .. احتمال عدم عشوائية التلقيح الخلطى بين السلالات ؛ للأسباب التي سبق بيانها .

التنبؤ بمحصول الصنف التركيبى فى الأجيال التى تستعمل فى الزراعة

أعطى Wright فى عام ١٩٢٢ المعادلة التالية ؛ للتنبؤ بمحصول الصنف التركيبى فى

الجيل التركيبى الثانى Syn-2 (عن Allard ١٩٦٠) :

$$\bar{F}_2 = \bar{F}_1 - \frac{(\bar{F}_1 - \bar{P})}{n}$$

حيث تمثل :

$\bar{F}_2$: المحصول المتوقع فى الجيل التركيبى الثانى Syn-2 .

$\bar{F}_1$: متوسط محصول الهجن الفردية التى تشكل - معاً - الجيل التركيبى الأول Syn-1 .

$\bar{P}$: متوسط محصول سلالات الآباء التى تكُون مكونات الأساس للصنف أو Syn-0 .
n : عدد سلالات الآباء .

تعنى هذه المعادلة أن محصول الصنف التركيبى يقل فى الجيل التركيبى الثانى بمقدار $\frac{1}{n}$ من قوة الهجين ، وهى الفرق بين متوسط محصول الجيل التركيبى الأول Syn-1 ومتوسط محصول الآباء .

ومن المتوقع - نظرياً - ألا يختلف محصول الجيل التركيبى الثالث Syn-3 ، أو الرابع Syn-4 (وكذلك الأجيال التالية لذلك) عن محصول الجيل التركيبى الثانى ؛ لأن العشيرة تصل إلى حالة من التوازن الوراثى بعد جيل واحد من التلقيح الخلطى العشوائى ، حسب قانون هاردي - فينبرج ، وهو التوازن الذى تصل إليه العشيرة فى الجيل التركيبى الثانى ويختل هذا التوازن إن لم تتحقق شروط معينة للقانون ، سبق بيانها فى الفصل الثالث هذا .. ولايكفى التنبؤ بمحصول الصنف المخلوق من المعادلة ، بل يلزم إجراء التقييم له الجيل عند إنتاج الصنف لأول مرة .

ولايمكن استخدام المعادلة السابقة فى التنبؤ بمحصول الصنف التركيبى فى الحالة التالية :


١- عند استخدام السلالات الخضرية فى إنتاج الصنف ؛ كما فى البرسيم الحجازى الذى لايتحمل التربية الداخلية .

٢- عندما لاتكون السلالات المستخدمة -كآباء- على درجة عالية من التربية الداخلى

وتستعمل هذه السلالات -أحياناً- كبديل للسلالات الأصلية ، التى يكون محصولها منخفضاً ؛ وذلك لتجنب ارتفاع سعر التقاوى .

وترجع أهمية هذه المعادلة إلى أن عدد الأصناف التركيبية -التى يمكن إنتاجها- يزيد زيادة كبيرة مع كل زيادة فى عدد السلالات المتوفرة ، كما سبق أن أسلفنا . وتفيد المعادلة فى التنبؤ بمحصول الصنف التركيبى قبل إنتاجه من واقع البيانات المتوفرة عن محصول سلالات الآباء والهجن الفردية الممكنة بينها ؛ وبذا .. يمكن اختيار السلالات التى يستدل - من تطبيق المعادلة عليها - أنها تعطى أفضل الأصناف التركيبية الممكنة محصولاً .

كما توصل Bubice & Gurgis فى عام ١٩٧٦ (عن Fehr ١٩٨٧) إلى معادلات معادلة للتنبؤ بمحصول الأصناف التركيبية فى حالة النباتات المتضاعفة ذاتياً Autotetraploids . ويبين شكل (١٠-٢) التغير المتوقع فى قوة الهجين فى النباتات المتضاعفة خلال الأجيال التركيبية من الثانى Syn-2 إلى الثامن Syn-8 مقارنة بالجيل التركيبى الأول Syn-1 لدى تطبيق هذه المعادلات .



شكل (١٠ - ٢) : التغير المتوقع فى قوة الهجين خلال ثمانية أجيال من الإكثار المفتوح التلقيح لأصناف تركيبية نشأت من : (أ) آباء متضاعفة ذاتياً غير مرباة داخلياً ولا تربطها صلة قرابه ، (ب) آباء متضاعفة ذاتياً أصيلة ، ولا تربطها صلة قرابه . هذا .. مع افتراض حدوث التلقيح العشوائى التام ، وانعدام التلقيح الذاتى . تدل الأرقام المبينة على يمين كل شكل على عدد الآباء التى تدخل فى تكوين الصنف (عن Fehr ١٩٨٧) .

وقد يتراوح عدد الآباء فى الصنف التركيبى من ٢ إلى أكثر من ١٠٠ . ويقل النقص فى قوة الهجين (عن الجيل التركيبى الأول Syn-1) مع زيادة عدد الآباء ، التى لاتربطها صلة قرابة ، والتى تدخل فى تكوين الصنف التركيبى . إلا أن زيادة عدد الآباء - التى لاتربطها قرابة - على ١٦ .. لايسهم كثيراً فى خفض النقص فى قوة الهجين (شكل ١٠-٣) . أما إذا كانت الآباء ترتبط ببعضها بصلة قرابة ، أو كانت قرابتها من بعضها غير معلومة .. فإنه يوصى -حينئذ- بزيادة عدد سلالات الآباء على ١٦ سلالة .

العوامل المؤثرة فى محصول الصنف التركيبى

يتأثر محصول الصنف التركيبى فى الجيل التركيبى الثانى Syn-2 ، والأجيال التالية - وهى التى تستعمل تجارياً - بالعوامل التالية :

١- عدد سلالات الآباء :

فكلما زاد عدد السلالات .. قل مقدار المفقود فى قوة الهجين فى الجيل التركيبى الثانى ؛ حسب معادلة Wright ؛ وعليه .. فإنه تفضل السلالات الكثيرة ، إلا أن ذلك يتداخل مع العامل الثانى .

٢- متوسط محصول الهجن الفردية :

فكلما زاد محصول الهجن الفردية .. قل مقدار المفقود فى قوة الهجين فى الجيل التركيبى الثانى ، حسب المعادلة أيضاً ... إلا أن محصول الهجن الفردية يتوقف على درجة التآلف بين جميع سلالات الآباء . ويصعب -عادة- إيجاد عدد كبير من السلالات المتوافقة معاً بدرجة عالية ؛ لذا .. فإنه يفضل -غالباً- الاكتفاء بعدد أقل من السلالات التى توجد بينها درجة عالية من التوافق .

٣- متوسط محصول سلالات الآباء :

فكلما زاد متوسط محصول سلالات الآباء .. قل مقدار المفقود فى قوة الهجين فى الجيل التركيبى الثانى . ويتعارض هذا العامل - كذلك - مع العامل الأول الخاص بعدد السلالات ؛ لصعوبة إيجاد عدد كبير من السلالات العالية المحصول .

هذا .. ومن المعروف أنه يمكن التنبؤ بالقدرة العامة على التآلف فى النباتات التى لم تخضع بعد للتربية الداخلية (نباتات جيل الـ S_0) ، كما سبق أن أوضحنا تحت موضوع القدرة على التآلف ؛ وعليه .. فإن زيادة القدرة على التآلف أمر ممكن . وربما يكون من الأفضل استعمال سلالات على درجة أقل من التربية الداخلية - مادم فى الإمكان اختبار قدرتها على التآلف - علما بأن هذه السلالات تكون أعلى محصولاً من السلالات التى أخضعت للتربية الداخلية لعدة أجيال . وقد اقترح Jenkins إنتاج الأصناف التركيبية بهذه الطريقة ، كما يلى :

- ١- عزل سلالات من نسل النباتات الملقحة ذاتياً لجيل واحد S_1 .
- ٢- اختبار القدرة العامة على التآلف لهذه السلالات بالاختبار القمى top cross بالنسبة للصفات الهامة ، خاصة المحصول .
- ٣- تهجين السلالات التى تتميز بقدرتها العالية على التوافق معاً ؛ لإنتاج الجيل التركيبى الأول ؛ ثم تستمر خطوات إنتاج الصنف التركيبى بعد ذلك بالطريقة العادية .
- ٤- تكرر الخطوات السابقة ، بعد كل جيلين من التلقيح الخلطى المفتوح للصنف التركيبى .

ولاشك فى أن من أهم عيوب هذه الطريقة عدم إمكان إعادة إنتاج الصنف التركيبى كما كان ؛ لأن السلالات التى تستعمل فى تكوينه ليست صادقة التربية .

وقد يستغنى عن التربية الداخلية كلية ، كما هى الحال فى الأنواع التى تتكاثر خضرياً ، وهى التى تستعمل فيها السلالات الخضرية كآباء . ورغم أن هذه الآباء تكون عالية المحصول - وينعكس ذلك إيجابياً على محصول الصنف المخلوق - إلا أنها تكون خليطة وراثياً ، وهو ما يعنى توقع بعض التغيرات الطفيفة فى صفات الصنف التركيبى ، كلما أعيد إنتاجه .

إعادة تكوين الأصناف التركيبية

نادراً ما يستعمل الصنف التركيبى بعد الجيل التركيبى الرابع Syn-4 ؛ بسبب احتمال تغير الهيكل الوراثى للصنف ؛ نتيجة لتعرضه لعوامل الانتخاب الطبيعى ؛ ويعنى ذلك ضرورة إكثار السلالات التى تدخل فى تكوين الصنف ، والمحافظة عليها ؛ ليتمكن إعادة

إنتاجه فى أى وقت . ولا يمر الصنف - عند إعادة إنتاجه - بمراحل التقييم المختلفة التى يمر بها عند إنتاجه لأول مرة ؛ حيث يمكن - عند إعادة الإنتاج - استعمال الجيل التركيبى الثانى فى الزراعة التجارية ... إلا أن المربى قد يرى إضافة - أو استبعاد - بعض السلالات عند إعادة تكوين الصنف ، ويلزم - فى هذه الحالة - إعادة التقييم من جديد .

ويمكن إحداث تقدم سريع فى الأصناف التركيبية ؛ بإخضاعها لدورة أو دورتين من الانتخاب المتكرر (يراجع لذلك الفصل الحادى عشر) ، بعد إكثارها لعدة سنوات . كما يمكن استخدام الصنف التركيبى فى بدء دورة من التربية الداخلية والانتخاب ؛ لإنتاج سلالات لصنف تركيبى جديد .

مزايا الأصناف التركيبية

تتوفر فى الأصناف التركيبية المزايا التالية :

١- تتحمل الأصناف التركيبية التقلبات الجوية بدرجة أكبر من درجة تحمل الهجن الزوجية ؛ بسبب كثرة الاختلافات الوراثية فيها عما فى الأصناف الهجين ؛ فبينما تتلقى الهجن الزوجية العوامل الوراثية من سلالات الآباء الأربعة فقط .. نجد أن فرصة التلقيح الخلطى المفتوح تتيح لنباتات الجيلين التركيبيين الثالث والرابع تلقى عوامل وراثية من أكبر عدد ممكن من سلالات الآباء الداخلة فى تكوين الصنف التركيبى .

٢- تقل تكاليف إنتاج بنور الصنف التركيبى عن الهجن الزوجية ؛ لكونها تستعمل لعدة أجيال ؛ وعليه .. فإنه يفضل استعمالها فى المناطق التى لم تقم فيها برامج لإنتاج النرة الهجين .

٣- تفضل الأصناف التركيبية فى المحاصيل ذات الأجزاء الزهرية الصغيرة ، التى يصعب إجراء التهجين فيها ، كما فى بعض محاصيل العلف . أما فى النرة .. فقد فاق استخدام الهجن الأصناف التركيبية ، إلا أن الأخيرة يمكن الاستفادة بها كمستودع للجينات المرغوب فيها .

مقارنة بين الأصناف الهجين ، وأصناف الهجين المتعدد السلالات ، والأصناف التركيبية

يبين جدول (١٠-٢) مقارنة بين الأصناف الهجين Hybrid Varieties وأصناف الهجن المتعددة السلالات Composites ، والأصناف التركيبية Synthetic Varieties (عن Chaudhari ١٩٧٨).

جدول (١٠-٢) : مقارنة بين الأصناف الهجين ، وأصناف الهجن المتعددة السلالات Composites ، والأصناف التركيبية .

وجه المقارنة	الأصناف الهجين	الهجن المتعددة السلالات	الأصناف التركيبية
عدد سلالات الآباء	٢ - ٤	٦ أو أكثر	٤ - ١٠
التلقيح بين السلالات	متحكم فيه	متحكم فيه	عشوائي
الخلفية الوراثية	ضيقة	عريضة	عريضة
قوة الهجين	عالية	عالية	أقل
تكلفة الإنتاج	عالية	أكثر تكلفة	أقل تكلفة منهما
استعمال البذور	تنتج سنوياً	تكثر بالتلقيح المفتوح لعدة سنوات	تكثر بالتلقيح المفتوح لعدة سنوات
جهود المحافظة على الصنف	كبيرة	أكبر	أقل
الانتشار	منتشرة	غير منتشرة	غير منتشرة

الفصل الحادى عشر

طرق التربية بالتهجين والانتخاب

نتناول بالدراسة فى هذا الفصل طرق التربية التى تعتمد على التهجين بين تراكيب وراثية معينة ، ثم الانتخاب فى الأجيال الانعزالية . وقد يجرى التهجين مرة واحدة فى بداية برنامج التربية كما فى طريقتى انتخاب النسب وانتخاب التجميع ، أو قد يتكرر عدة مرات خلال برنامج التربية كما فى طريقة الانتخاب المتكرر .

انتخاب النسب

تتبع التربية بطريقة انتخاب النسب Pedigree Selection فى تحسين كل من النباتات الذاتية التلقيح ، والنباتات الخلطية التلقيح ، التى لا تتدهور بالتربية الداخلية - كالقرعيات - ؛ لأن التلقيح الذاتى ضرورى فى جميع مراحل التربية . ويجرى برنامج التربية بتلقيح صنفين أو سلالتين - أو أكثر - معاً - بغرض جمع صفات مرغوب فيها فى تراكيب وراثية جديدة ، مع تسجيل نسب النباتات فى جميع الأجيال التالية للتلقيح الأول . ونبين - فيما يلى - الخطوات التفصيلية لمراحل التربية بهذه الطريقة .

اختيار الآباء

يعنى بالآباء : الأصناف أو السلالات التى تهجن - معاً - لبدء برنامج التربية . ويتعين

لاختيارها تحديد الهدف من برنامج التربية ، والصفات التى يرغب المربي فى تجميعها - معاً - فى الصنف الجديد . ويكون أحد الآباء - عادة - هو الصنف الشائع فى الزراعة التجارية ، ويكون الأب الثانى مكملأله فى الصفة - أو الصفات - التى يُرغب فى تحسينها فى الصنف التجارى . وقد يتطلب الأمر إدخال أب ثالث ، أو رابع فى التلقيحات ، لإضافة الصفات المرغوب فيها ، وهذا هو الأمر الغالب بالنسبة لمعظم الأصناف المنتجة حديثاً . ولايدل مظهر الآباء - عادة - على قدرتها على التألف وتكوينها لانعزالات جيدة مرغوب فيها عند تهجينها معاً ، لذا .. فإن تحديد الهجن التى تعطى انعزالات جيدة يعد أولى مهام المربي فى برنامج التربية .

تهجين الآباء وزراعة الجيل الأول

قد يبدأ برنامج التربية بتهجين فردى (فى حالة استعمال سلالتين فقط كآباء) ، أو هجين ثلاثى (فى حالة استعمال ثلاث سلالات) ، أو هجين زوجى (فى حالة استعمال أربع سلالات) ، أو هجين متعدد السلالات Composite ناتج من تلقيح متعدد multiple cross (عندما يزيد عدد السلالات المستعملة على ست ؛ يراجع الموضوع فى الفصل العاشر) . وقد يرغب المربي فى إجراء التحسين المطلوب على مرحلتين ، بدلاً من محاولة تجميع عدد كبير من الصفات المرغوب فيها مرة واحدة ؛ حيث يكتفى -فى هذه الحالة- بتهجين عدد أقل من الآباء ، ثم تُهجن السلالات المحسنة الناتجة من برنامج التربية مع سلالات أخرى تحتوى على بقية الصفات المرغوب فيها .

وفى محاولة للتوصل إلى أفضل طريقة لتهجين ثلاث سلالات (هى : A ، B ، و C) تحتوى كل منها على جين واحد سائد مرغوب فيه يراد تجميعها فى صنف جديد .. قارن Bos (١٩٨٧) - فى مثال نظرى - بين كفاءة ثلاث طرق للتهجين - وهى المبينة فى شكل (١١-١) - لأجل التوصل إلى التركيب الوراثى الأصيل السائد فى الجينات الثلاثة المرغوب فيها فى حالات : الانتخاب ، أو عدم الانتخاب فى الجيل الثانى ، والتلقيح الذاتى فى الجيل الثانى وفى الأجيال التالية ، أو التزاوج العشوائى فى الجيل الثانى ثم التلقيح الذاتى فى الأجيال التالية .

وقد توصل Bos إلى أن طرق التهجين الثلاث تتطلب جهداً واحداً لإنتاج كمية البذور

اللازمة في الجيل الأول (يراجع شكل ١١-١) ، وأنها تعطى نسبة واحدة هي $\frac{1}{32}$ (أو ٠.٠٣١٢) من النباتات ذات التركيب الوراثي الأصيل السائد المرغوب فيه في غياب الانتخاب والتزاوج العشوائي بين نباتات الجيل الثاني . أما في حالة غياب الانتخاب مع وجود التزاوج العشوائي .. فإن طريقة التهجين الثالثة تعطى نباتات من التركيب الوراثي المرغوب فيه بنسبة تزيد بمقدار ٨.٣٪ على الطريقتين الأولى ، والثانية للتهجين . وفي وجود الانتخاب مع غياب التزاوج العشوائي بين نباتات الجيل الثاني .. فإن طريقتي التهجين الثانية ، والثالثة تزيدان على طريقة التهجين الأولى بمقدار ٢٠٪ في إعطاء التركيب الوراثي المرغوب فيه في الأجيال التالية للجيل الثاني . وأخيراً .. فإنه في وجود كل من الانتخاب والتزاوج العشوائي .. تزيد طريقة التهجين الثانية على الأولى بمقدار ٢١٪ ؛ وتفوق طريقة التهجين الثالثة الأولى بمقدار ٢١٪ ؛ أي تفضل طريقتا التهجين الثانية والثالثة في حالة الانتخاب أو التزاوج العشوائي في الجيل الثاني ، أو في حالة وجودهما معاً .

طريقة التهجين	الأولى	الثانية	الثالثة
الموسم الأول	$A \times B$	$A \times C \quad B \times C$	$A \times B \quad A \times C \quad B \times C \quad B \times A \quad C \times A \quad C \times B$
الموسم الثاني	$\downarrow$ $AB \times C$ $\downarrow$ F_1	$\downarrow \quad \downarrow$ $AC \times BC$ $\downarrow$ F_1	$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$ $AB \times AC \quad BC \times AB \quad AC \times BC$ $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$ F_1

شكل (١١-١) : الطرق الممكنة لإنتاج الجيل الأول الناتج من تهجين ثلاث سلالات معاً لبدء برنامج تربية بالتهجين والانتخاب .

ولا يلزم تسجيل أرقام النباتات المستعملة في كل تلقيح إذا كانت هذه النباتات من سلالة نقية واحدة ، ولكن نظراً لأن عشائر النباتات الذاتية التلقيح تتكون - عادة - من خليط من السلالات النقية المختلفة وراثياً ؛ لذا .. يلزم إجراء عدد كبير من التلقيحات ، مع تسجيل رقم كل نبات في هذه التلقيحات الأولية ؛ ليتمكن الاحتفاظ بنسب كل تلقيح منفصلاً عن الآخرين .

هذا .. ويلزم إنتاج كمية من بنور الجيل الأول ، تكفى للحصول على العدد اللازم من نباتات الجيل الثانى ، ولعمل مخزون من بنور الجيل الأول يكفى لإعادة الزراعة فى حالة فشل الزراعة الأولى .

تزرع بنور الجيل الأول ؛ للحصول على بنور الجيل الثانى . ويجب مقارنة نباتات الجيل الأول بالآباء ؛ للتأكد من كونها هجناً فعلاً .

الجيل الثانى

يزرع عدد من نباتات الجيل الثانى يقدر بنحو ١٠ - ١٠٠ مثل عدد العائلات ، التى ينتظر انتخابها فى الجيل الثالث ، ويتوقف ذلك على مدى سهولة إجراء عملية التقييم فى الجيل الثانى ؛ حيث يزيد العدد كلما كان التقييم أسهل . كما تزيد النسبة كلما ازدادت الاختلافات بين الآباء المهجنة معاً ... مع العلم أنه تنتخب - عادة - ٥٠ سلالة على الأقل فى الجيل الثالث . وتجدر الإشارة إلى أن الجيل الثانى هو الجيل الذى يحدث فيه القدر الأكبر من الاختلافات الوراثية ، وأن كل ما يظهر من اختلافات -بعد ذلك- ما هو إلا تكرار لما يظهر فى الجيل الثانى .

تزرع نباتات الجيل الثانى على مسافات واسعة نسبياً ؛ ليمكن ملاحظة كل نبات وتقييمه منفرداً . كما يزرع خط من صنف اختبارى check variety كل ١٠ خطوط للمقارنة . ويعد الصنف التجارى الشائع فى الزراعة هو أفضل الأصناف الاختبارية .

وإذا كان اختيار الآباء الداخلة فى التهجين الأول يحدد الحد الأقصى للتحسين الممكن فى الصنف الجديد .. فإن انتخاب النباتات التى تحمل الصفات المرغوب فيها - خاصة فى الأجيال الانعزالية الأولى - يكون ذا تأثير أكيد على إمكان الوصول إلى هذا الهدف من عدمه ؛ لذا .. فإن المربى يجب أن يكون على دراية تامج بالصفات الطبيعية والفسولوجية للمحصول الذى يقوم بتحسينه ، ويعرف مدى تأثرها بالعوامل البيئية ؛ بحيث يمكنه تمييز الاختلافات الوراثية المرغوب فيها التى يؤمل فيها خيراً ، بمجرد الفحص المظهرى .

ويفيد الانتخاب فى الجيل الثانى فى التنبؤ بمحصول الأجيال التالية فى بعض المحاصيل ؛ كالقمح ، والشعير ، وغيرها من الحبوب الصغيرة ، بينما لم يمكن التوصل

إلى علاقة كهذه فى محاصيل أخرى ؛ كقول الصويا . ويستنتج من ذلك أن الانتخاب فى الأجيال الانعزالية الأولى ليس قاعدة للتمييز بين الهجن الممتازة فى كل المحاصيل .

وكقاعدة عامة .. فإنه لا يمكن الاعتماد على مظهر النباتات فى الجيل الثانى للتنبؤ بالمحصول فى الأجيال التالية ؛ خاصة أنها تكون مزروعة على مسافات واسعة . ويجرى الانتخاب فى هذا الجيل للصفات ذات درجات التوريث المرتفعة ؛ مثل الصفات النوعية والمقاومة للأمراض . ويمكن - بعد ذلك فى الجيلين الثالث والرابع - الانتخاب بفاعلية للصفات ذات درجات التوريث المتوسطة . أما الانتخاب للمحصول .. فلايجرى بفاعلية إلا بعد الجيل الرابع .

ولا تسمح الظروف البيئية - فى أغلب الأحيان - بظهور الصفات المرغوب فيها ، وتميزها عن الصفات غير المرغوب فيها ؛ مثل صفات المقاومة للأمراض ، والحشرات ، والصقيع ، والرقاد ... إلخ ؛ حيث يلزم فى هذه الحالات تعريض النباتات للظروف التى تسمح بظهور الصفات المرغوب فيها ؛ كأن تعرض للعدوى الصناعية بالآفات بدلا من الاعتماد على الإصابة الطبيعية التى ربما لا تحدث فى الوقت المناسب ، أو بالشدة الكافية ، أو بالسلاطة المطلوبة . وقد يجرى الانتخاب فى ظروف يمكن التحكم فيها داخل البيوت المحمية (الصوبات) ، ويعيب ذلك قلة عدد النباتات التى يمكن اختبارها ، إلا إذا أجرى الاختبار على النباتات وهى فى طور البادرة ؛ وبذا .. يمكن تقييم عدد كبير منها فى وقت قصير نسبياً .

تُزال نباتات الجيل الثانى التى تبو غير مرغوبة - مظهرياً - بمجرد ملاحظتها ، وتنتخب من النباتات المتبقية ما يتميز منها بقوة النمو والصفات المرغوبة . ورغم أن حالة الخلط (عدم التماثل) الوراثى heterozygosity تؤثر فى الانتخاب فى هذه المرحلة .. إلا أن اختبارات النسل فى الجيل الثالث تؤدى إلى التخلص من حالات قوة النمو التى يكون مردها إلى الخلط الوراثى . هذا .. وتكون بداية الانتخاب فى الحقل ثم يُستبعد مزيد من النباتات بعد الاختبارات المعملية .

يجب أن يكون الانتخاب فى هذه المرحلة حاسماً ، ويعتمد على الاختبارات ، والخبرة الشخصية للمربي ، وقدرته على الملاحظة الدقيقة . ويجب على المربي المبتدئ أن يتغلب

على الشعور بأن النباتات المرغوب فيها قد تظهر فى نسل النباتات التى يجرى استبعادها فى الجيل الثانى ؛ لأن عدم التخلص من هذا الشعور يعنى زيادة حجم العمل المطلوب بشدة فى الأجيال التالية إلى درجة تستنفذ معها كل وقت المربى وجهده .

يُحتفظ فى هذا الجيل - وكذلك فى الأجيال التالية - بسجلات كاملة للنسب ، تدون فيها أرقام النباتات المنتخبة فى الجيل الثانى (وأرقام العائلات والسلالات المنتخبة فى الأجيال التالية) ، بحيث يمكن تتبع نسب أى نبات فى أى جيل . ويجب أن تتضمن السجلات بيانات عن كل الصفات الهامة ؛ مثل قوة النمو ، وموعد النضج ، والمقاومة للآفات ... إلخ ، مع تسجيل لكمية المحصول فى الأجيال المتأخرة .

الأجيال الثالث والرابع والخامس

تزرع بنور الجيل الثالث (وكذلك بنور الجيل الرابع بعد ذلك) على مسافات أوسع مما فى الزراعة التجارية ، ولكن أضيق مما فى الجيل الثانى . ويزرع - عادة - من ١٠-٣٠ نباتاً - أو أكثر - من نسل كل نبات منتخب فى الجيل الثانى ، ويكون كل نسل فى خط واحد . وتعد هذه الخطوط عائلات الجيل الثالث F₃ families . ويراعى أن يكون عدد النبات فى كل عائلة بالقدر الذى يسمح بتحديد درجة الخلط الوراثى فيها . كما يزرع خط من أحد الأصناف الاختبارية فى مقابل كل ١٠ خطوط للمقارنة .

وتتحدد - فى الجيل الثالث - قيمة التلقيح ؛ فإن لم تظهر فيه نباتات تحمل جميع الصفات المرغوب فيها .. فإنه يكون من المفضل إعادة البرنامج من جديد .

يتم الانتخاب فى الجيل الثالث على أساس أفضل النباتات فى أفضل العائلات ؛ فتُحدد - أولاً - أفضل العائلات ، ثم تنتخب منها أحسن النباتات . كما يجب أن تؤخذ فى الحسبان كذلك النباتات الممتازة ، التى قد توجد فى عائلات ضعيفة . ويستبعد جزء آخر من النباتات بعد الفحص المختبرى ؛ بحيث لايزيد عدد النباتات المنتخبة على عدد عائلات الجيل الثالث .

تعامل نباتات الجيل الرابع معاملة نباتات الجيل الثالث . وإذا ظهر أن بعض عائلات الجيل الرابع قد نشأت من نبات واحد مشترك فى الجيل الثانى ، وكان سلوك العائلات

متشابهاً في الجيلين الثالث والرابع .. فإنه يمكن في هذه الحالة استبعاد بعض هذه العائلات مادامت متماثلة .

وتعامل نباتات الجيل الخامس معاملة نباتات الجيل الرابع ، إلا أنها تزرع على مسافات مشابهة لتلك المتبعة في الزراعة التجارية ، وتكون المساحة المخصصة لكل عائلة أكبر حتى يمكن الانتخاب لصفة كمية المحصول ، وجدير بالذكر .. أن الانتخاب حتى هذه المرحلة يجرى على أساس النباتات الفردية ؛ أى على أساس اختيار أفضل النباتات من أحسن العائلات ، وزراعة بنورها منفصلة .

زراعة الجيل السادس إلى الجيل الثامن عشر

يبدأ من الجيل السادس الانتخاب على أساس السلالات ؛ لأنها تكون قد وصلت إلى درجة عالية من التجانس الوراثي ، وذلك بعد أن أجرى الانتخاب على أساس النباتات الفردية مع التلقيح الذاتى للنباتات المنتخبة من الجيل الثانى إلى الجيل السادس . ويتم تحديد أفضل العائلات ، ثم تحصد بذور جميع نباتات كل عائلة معاً ، وهى التى يطلق عليها - من الآن فصاعداً - اسم سلالة line (يعتبر البعض العائلة مجموعة من السلالات ، تمثل أسال نباتات ، انتخبت من نسل نبات واحد في الجيل السابق) .


وتكون زراعة سلالات الجيل السادس (أنسال النباتات الفردية المنتخبة من الجيل الخامس) فى مساحات كبيرة نسبياً ؛ بدرجة تسمح بدراستها دراسة وافية ، ويفضل أن تكون زراعتها فى مكررات إذا وجدت كميات كافية من البذور لذلك . ويبدأ -فى هذا- الجيل تسجيل بيانات وافية عن كمية المحصول ، وتؤخذ بيانات وافية عن الصفات الاقتصادية الهامة فى كل من الحقل والمختبر ، يتم على أساسها تخفيض عدد العائلات المنتخبة إلى ١٥ عائلة كحد أقصى ، وهى التى تحصد بنورها معاً ؛ لتعطى سلالات الجيل السابع .

وتزرع سلالات الجيل السابع فى مكررات ، مع مقارنتها بالأصناف التجارية الهامة . وتؤخذ بيانات عن المحصول وجميع الصفات الاقتصادية الهامة ، وتحلل النتائج إحصائياً . وبناءً على النتائج المحققة .. تخفض عدد السلالات المنتخبة إلى ٤-٥ سلالات فقط .

وتعامل الأجيال من الثامن إلى العاشر معاملة الجيل السابع ، مع امتداد الاختبارات

إلى مناطق الإنتاج المختلفة . وبناء على النتائج المحققة .. تخفض عدد السلالات المنتخبة إلى سلالة واحدة أو سلالتين فقط .

يزرع الجيلان الحادى عشر والثانى عشر فى تجارب موسعة على مساحة أفدان أو أكثر (الفدان = ٢٤٢٠٠ م^٢ = ٠,٤٢ هكتار) بالطرق المتبعة فى الزراعة التجارية ، مع مقارنتها بالأصناف الهامة . وبناء على النتائج المحققة .. يتم الاختيار النهائى لسلالة واحدة ، تعطى اسماً ؛ لتصبح بذلك صنفاً جديداً (شكل ١١-٢) .



شكل (١١-٢) : تخطيط لخطوات برنامج التربية بطريقة انتخاب النسب .

التقييم النهائى

يجرى التقييم النهائى للصنف الجديد فى عدة مناطق ، وعلى مدى عدة سنوات ، إلى أن يتأكد المربى من تفوقه على الأصناف المستعملة فى الزراعة التجارية . ويكتفى المربى - عادة - بتقييم الصنف الجديد فى خمس مناطق رئيسية من مناطق إنتاج المحصول ، وعلى مدى خمس سنوات .

مزايا طريقة التربية بانتخاب النسب وعيوبها

تتميز التربية بطريقة انتخاب النسب بما يلى :

١- يمكن عن طريقها إجراء مقارنة دقيقة بين السلالات من واقع سجلات النسب ، ويمكن الاستفادة من ذلك فى توسيع رقعة الاختلافات الوراثية بين السلالات خلال مراحل الانتخاب .

٢- يكون التقييم والانتخاب على أساس سلوك النباتات والعائلات والسلالات فى الأجيال السابقة ، وهى التى يمثل كل منها موسماً زراعياً مختلفاً ؛ مما يسمح بظهور الاختلافات الوراثية للصفات الهامة .

٣- تسمح هذه الطريقة بالتخلص من معظم التراكيب الوراثية غير المرغوب فيها فى الأجيال الأولى لبرنامج التربية وقبل الوصول إلى مراحل التقييم الموسعة للسلالات التى يتم انتخابها .

٤- تسمح هذه الطريقة -كذلك- بدراسة وراثية بعض الصفات الهامة من واقع البيانات المتجمعة فى سجلات النسب .

أما عيوب هذه الطريقة .. فهى كثرة الوقت والجهد الذى تتطلبه من المربى للاحتفاظ بسجلات النسب ، وزيادة مساحة الأرض التى تلزم لإجراء برنامج التربية . كما أن هذه الطريقة لاتسمح بزراعة بعض أجيال التربية فى غير المواسم الزراعية المعتادة التى تظهر فيها صفات المحصول ، وهو ما يعنى زيادة برنامج التربية عدة سنوات بالنسبة لطرق التربية الأخرى .

طرق التربية المحورة من طريقة انتخاب النسب

أدخل بعض المربين تحورات -بعضها جذرى- على التربية بطريقة انتخاب النسب . وتهدف هذه التحورات إما إلى إبطاء الوصول إلى حالة الأصالة الوراثية ، مع زيادة الفرصة لظهور الانعزالات المرغوب فيها ، وإما إلى تسهيل عملية الوصول إلى الأصالة الوراثية قبل بدء عملية الانتخاب . ونذكر -فيما يلي- أهم هذه التحورات .

انتخاب النسب المتكرر

يجرى انتخاب النسب المتكرر Recurrent-Pedigree Selection فى الحالات التى يسهل فيها إجراء التلقيحات ، وعندما يعطى كل تلقيح عدداً كبيراً من البذور . لا تختلف هذه الطريقة عن انتخاب النسب العادى ، إلا فى الأجيال المبكرة لعملية الانتخاب حيث تلقح النباتات المنتخبة مع بعضها بصورة منظمة ، أو بشكل عشوائى ، ثم يستمر برنامج التربية بطريقة انتخاب النسب بشكل عادى بعد ذلك . وتؤدى عملية تلقيح النباتات المنتخبة - معاً - إلى إبطاء الوصول إلى حالة الأصالة الوراثية ، مع زيادة فرصة ظهور انعزالات فائقة .

انتخاب النسب الرجعى

يجرى انتخاب النسب الرجعى Backcross-Pedigree Selection عندما يفوق أحد الأصناف التى يبدأ بها برنامج التربية بدرجة ملحوظة الأصناف الأخرى ؛ حيث يفضل - حينئذ - تلقيح الجيل الأول والجيل الثانى -وربما الجيل الثالث أيضاً- رجعيًا إلى الأب الفائق ؛ بغرض استرجاع أكبر قدر من صفاته ، ويستمر برنامج التربية - بعد ذلك - بطريقة انتخاب النسب بشكل عادى ؛ لإعطاء الفرصة لظهور انعزالات فائقة الحدود .

التحدر من بذرة واحدة

كان Goulden هو أول من اقترح هذه الطريقة لتحسين القمح فى عام ١٩٤١ ؛ كبديل لطريقة انتخاب النسب العادية ، ولكنه لم يسمها بهذا الاسم . ولم يظهر الإسم الذى عرفت به هذه الطريقة - وهو التحدر من بذرة واحدة - إلا فى سنة ١٩٦٢ ؛ بواسطة Johnson & Bernard . وكان Brim هو أول من استعملها فى برنامج للتربية (لتحسين فول الصويا)

في عام ١٩٦٦ ، ولكنه أشار إليها كطريقة انتخاب نسب محورة modified pedigree method (عن ١٩٨٧ Fehr) .

تتلخص الطريقة الكلاسيكية للتحدّر من بذرة واحدة Single Seed Descent كما اقترحها Brim في عام ١٩٦٦ (عن ١٩٨٦ Gritton) لتحسين فول الصويا في زراعة عدد من نباتات الجيل الأول يكفي لإنتاج ٥٠٠ بذرة أو أكثر من الجيل الثاني ؛ تحصد بذرة واحدة من كل نبات من الجيل الثاني ، وتخلط معاً وتزرع لإنتاج الجيل الثالث . وتكرر هذه العملية حتى الجيل السادس . حينئذ تستبعد النباتات التي تبدو غير مرغوبة من شكلها الظاهري ، وتنتخب النباتات التي تبدو فائقة مظهرياً لمزيد من التقييم بعد ذلك . هذا .. علماً بأن السلالات الرديئة جداً .. يمكن أن يجرى استبعادها أولاً بأول ، قبل الوصول إلى الجيل السادس .

وتعد هذه الطريقة من أسهل الطرق للوصول إلى الأصالة الوراثية بأقل جهد . كما يمكن اختصار الوقت بزراعة جيلين أو أكثر في كل عام ، يكون أحدهما فقط تحت ظروف الحقل ، وتكون الأجيال الأخرى في البيوت المحمية ، دونما اعتبار لتأثير الظروف البيئية على الشكل الظاهري . ويمكن اختصار الوقت اللازم للوصول إلى الأصالة الوراثية بحصاد البنور أو الثمار ، بعد تكون الأجنة مباشرة ، ثم فصل الأجنة منها وزراعتها في بيئات خاصة . ويعقب الوصول إلى الأصالة الوراثية الاستمرار في التربية بأي نظام للانتخاب . وتناسب هذه الطريقة كلا من النباتات الذاتية التلقيح والخلطية التلقيح (التي لاتندهر بالتربية الداخلية) ، مع إخضاعها - بطبيعة الحال - للتلقيح الذاتي الصناعي .

توجد ثلاث طرق رئيسية لتطبيق مبدأ التحدّر من بذرة واحدة للوصول إلى الأصالة الوراثية ، وهي كما يلي :

١- طريقة البذرة الواحدة Single-Seed Procedure :

تلك هي الطريقة الكلاسيكية التي سبق وصفها . ويجب أن يراعى - عند اتباعها - أن عدد النباتات المزروعة يقل - تدريجياً - جيلاً بعد جيل ، إما بسبب عجز بعض النباتات عن عقد البنور ، وإما لعدم قدرة بعض البنور على الإنبات ؛ لذا .. فإن هذا الأمر يجب أن يؤخذ في الحسبان منذ البداية ، بحيث يتوفر للمربي في نهاية الأمر العدد المطلوب من

السلالات الأصلية التي يرغب في تقييمها .

ولحساب عدد البذور التي ينبغي زراعتها في كل جيل يلزم أن نبدأ بالجيل الأخير ، ثم نعود إلى الخلف حتى الجيل الثاني ، كما يتطلب الأمر افتراض نسبة معينة لبذور النباتات التي تثبت وتعطى نباتاتها بذرة واحدة على الأقل في كل جيل ؛ فلو فرض أن كانت هذه النسبة ٨٠٪ ، وكان المطلوب هو توفير ٢٠٠ سلالة في الجيل الخامس .. فإن ذلك يعنى ضرورة زراعة ٢٥٠ بذرة ($200 \div 0,8 = 250$) في الجيل الخامس ، و ٣١٢ بذرة ($250 \div 0,8 = 312$) في الجيل الرابع ، و ٣٩٢ بذرة ($312 \div 0,8 = 392$) في الجيل الثالث ، و ٤٩٠ بذرة ($392 \div 0,8 = 490$) في الجيل الثاني .

ويلزم حصاد عينة أخرى إضافية (بذرة إضافية) من كل نبات في كل جيل ، تخطط - معاً - للاحتياط في حالة فشل الزراعة . ويمكن -في حالة فول الصويا مثلاً- حصاد قرن واحد به ٢-٣ بذرات من كل نبات ؛ حيث تستعمل من كل قرن بذرة واحدة ، ويحتفظ ببقية البذور كاحتياطي .

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة البذرة الواحدة تعنى أن كل نبات في الجيل الأخير ينتسب إلى نبات مختلف من نباتات الجيل الثاني ، إلا أنها لاتسمح بتمثيل كل نبات من الجيل الثاني في الجيل الأخير ؛ لأن عدم إنبات أية بذرة في أى جيل يعنى استبعاد نبات الجيل الثاني الذى انحدرت منه هذه البذرة تلقائياً . وتسمح هذه الطريقة بمزاولة الانتخاب في أى جيل ، لاستبعاد النباتات التى تحمل صفات غير مرغوب فيها .

٢- طريقة الجورة الواحدة Single-Hill Procedure :

تزيد طريقة الجورة الواحدة - كثيراً - من فرصة تمثيل كل نبات من الجيل الثاني في كل جيل من أجيال التربية الداخلية . وقد اقترح هذه الطريقة Jones & Singleton عام ١٩٣٤ ، وفيها يزرع نسل كل نبات -في أى جيل- كسلالة مستقلة . ويجرى ذلك بزراعة ٣-٤ بنور من كل نبات في جورة واحدة ، وتحصد منها البذور الناتجة من التلقيح الذاتى ، لـ تزرع ٣-٤ بنور منها في جورة أخرى في الجيل التالى ... وهكذا . وتحصد بنور النباتات الفردية مستقلة ، حينما تصل العشيرة إلى الدرجة المرغوبة من الأصالة الوراثية .

ويمكن بهذه الطريقة تتبع نسب أى نبات من أى جيل حتى الجيل الثانى ، ولكن يلزم فى هذه الحالة الاحتفاظ بسجلات للنسب ، وهو مالا يعمل به فى طريقة البذرة الواحدة .

٣- طريقة البذور المتعددة Multiple-Seed Procedure :

يتطلب اتباع طريقة البذرة الواحدة زراعة عدد كبير من البذور فى الجيل الثانى عما فى الأجيال التالية ، مع جمع عينة إضافية من البذور فى كل جيل ، تستعمل كاحتياطى فى حالة فشل الزراعة . ولتجنب ذلك .. تتبع طريقة البذور المتعددة ، وفيها تحصد ٣-٤ بنور من كل نبات ، وتخلط معاً ، ثم يزرع جزء من البذور ، ويحتفظ بالباقى كاحتياطى . ويتوقف عدد البذور التى تزرع وتحصد فى كل جيل على عدد السلالات التى يرغب فى الحصول عليها من العشيرة لتقييمها ، وعلى نسبة الإنبات المتوقعة للبذور .

وعلى خلاف طريقة البذرة الواحدة .. فإن عدد البذور التى تزرع فى طريقة البذور المتعددة يمكن أن يبقى ثابتاً فى كل جيل . فلو فرض أن رغب المربي فى الحصول على ٢٠٠ سلالة فى الجيل الخامس ، وكانت نسبة الإنبات المتوقعة ٨٠٪ .. فما عليه سوى زراعة ٢٥٠ بذرة ($250 = 200 \div 0.8$) فى الجيل الثانى ؛ لكى يحصل منها على ٢٠٠ نبات ، ثم يحصد ثلاث بنور من كل نبات منها ؛ ليتجمع لديه ٦٠٠ بذرة جيل ثالث . وتزرع ٢٥٠ من بنور الجيل الثالث ؛ لكى يحصل منها على ٢٠٠ نبات ، ثم تحصد ثلاث بنور من كل نبات منها ؛ ليتجمع لديه ٦٠٠ بذرة جيل رابع ... وهكذا إلى أن يصل إلى المستوى المطلوب من التربية الداخلية . وقد أطلق على هذه الطريقة أسماء مختلفة ، منها طريقة التحدر المحورة من بذرة واحدة Modified Single-Seed Descent ، وطريقة القرون المجمعة pod-bulk method ، نسبة إلى تجميع بنور قرن واحد من كل نبات ؛ كما يتبع فى فول الصويا .

وتتميز جميع الطرق - التى شرحت آنفاً لتطبيق مبدأ التحدر من بذرة واحدة - بما يلى :

- ١- سهولة إدامة العشائر والمحافظة عليها ، خلال مراحل التربية الداخلية .
- ٢- لا يؤثر الانتخاب الطبيعى فى العشائر إلا إذا اختلفت التراكيب الوراثية فى قدرتها على إنتاج بذرة واحدة على الأقل .

٣- تناسب جميع الطرق الزراعة فى البيوت المحمية فى غير المواسم العادية ؛ وبذلك.. يمكن تقصير الفترة التى تلزم للوصول إلى الأصالة الوراثية .

يعاب على هذه الطرق مايلى :

١- يعتمد الانتخاب الصناعى على مظهر النباتات الفردية ، وليس على اختبارات النسل .

٢- لاتسمح هذه الطرق بأن يأخذ الانتخاب الطبيعى مجراه فى التأثير الإيجابى فى العشائر .

وتتميز طريقة البذرة الواحدة بما يلى :

١- تتطلب هذه الطريقة وقتاً أقل ومساحة أقل بكثير من طريقة الجورة الواحدة .

٢- ينتسب كل نبات فى الجيل النهائى إلى نبات مختلف من الجيل الثانى ؛ وبذلك .. تزيد الاختلافات الوراثية فى العشيرة .

ولكن يعاب على طريقة البذرة الواحدة ما يلى :

١- ربما لايمثل نبات من نباتات الجيل الثانى بنات فى الجيل النهائى ؛ بسبب فشل بعض النباتات فى إنتاج بذرة واحدة على الأقل فى كل جيل من أجيال التربية الداخلية .

٢- يجب تعديل عدد البنور التى ينبغى زراعتها فى كل جيل تبعاً لنسبة الإنبات .

٣- تتطلب هذه الطريقة وقتاً أطول عند الحصاد عن طريقة البنور المتعددة لتحضير عينتين من البنور واحدة للزراعة ، والأخرى تترك كاحتياطى .

وتتميز طريقة الجورة بأن كل نبات فى العشيرة ينتسب إلى نبات مختلف فى الجيل الثانى ؛ مما يزيد الاختلافات الوراثية فى العشيرة . ولكن يعيب هذه الطريقة أنها تتطلب وقتاً أطول عند الزراعة والحصاد ، ومساحة أكبر للزراعة عن الطريقتين الأخرين (Fehr ١٩٨٧) .

انتخاب التجميع

تتبع التربية بطريقة انتخاب التجميع Bulk Population Breeding فى تحسين النباتات الذاتية التلقيح فقط ؛ لأنها تعتمد على خاصية التلقيح الذاتى الطبيعى خلال فترة

زراعة العشائر الانعزالية متجمعة in bulk ، إلى أن تصل النباتات إلى حالة الأصالة الوراثية قبل بدء عملية الانتخاب ، وتناسب هذه الطريقة المحاصيل البذرية ، خاصة الحبوب والبقول .

خطوات برنامج التربية

١- اختيار الآباء وإنتاج الجيل الأول :

تختار الآباء بعناية كما سبق بيانه بالنسبة للتربية بطريقة انتخاب النسب . وقد يبدأ برنامج التربية بهجين متعدد السلالات Composite (يراجع الموضوع فى الفصل العاشر) يدخل فى تكوينه ١٦ صنفاً ، أو سلالة ، وربما أكثر من ذلك . والمهم أن تحتوى الآباء على كافة الصفات التى يرغب فى تجميعها فى الصنف الجديد .

ويطلق اسم الجيل الأول على نسل أول تلقيح شامل لكل السلالات التى يُراد استعمالها كآباء ، سواء كان الهجين فردياً ، أم ثلاثياً ، أم زوجياً ، أم متعدد السلالات . وقد يتم تهجين كل سلالتين معاً توفيراً للوقت ، ثم تخطط كميات متساوية من بذور كل تهجين ؛ لتشكّل معاً الجيل الأول ، ولكن هذا الخلط لا يوصى به فى حالة تقييم واختبار الأجيال المبكرة . ويعنى إجراء التهجينات بين الآباء بهذه الطريقة أن أى نبات - أو سلالة - تنتخب من برنامج التربية لن تحتوى إلا على جينات من سلالتين فقط ، هما سلالتا الآباء .

٢- اختبار الأجيال المبكرة Early Generation Testing :

يجرى اختبار مبكر لعشائر الجيل الثانى المتحصل عليها من تلقيحات مختلفة إن توفرت كميات كافية من بذورها لذلك . وتزرع العشائر فى تجربة بمكررات ، ويفضل أن تنفذ الدراسة فى عدة مواقع ؛ ويستدل من بيانات المحصول على التلقيحات التى تحتوى على عدد كبير من الانعزالات الجيدة المرغوب فيها ، وتلك هى التى يستمر معها برنامج التربية بعد ذلك ، بينما تستبعد العشائر الأخرى .

وفى حالة عدم توفر كميات كافية من بذور عشائر الجيل الثانى .. يتم إنتاج عشائر الجيل الثالث ، ثم يجرى عليها الاختبار كما سبق بيانه . ويفيد اختبار الأجيال المبكرة فى

تحديد التلقيحات التي يؤمل أن تعطى انعزالات جيدة ، خاصة وأن البرنامج يستمر بعد ذلك لعدة سنوات دون أية دراية بمدى جدواه ، خلال الفترة التي تزرع فيها النباتات متجمعة ، وهي التي تمتد حتى الجيل الخامس أو السادس .

وقد جرى التقييم المبكر للأصناف التي تدخل في التلقيحات لمعرفة مدى صلاحيتها؛ بعمل تلقيحات بنيتها بكل الطرق الممكنة (Diallel Crosses) ، ثم يزرع الجيلان الأول والثاني لكل تلقيح في تجربة بمكررات ، وتقارن متوسطات كل صنف عند اشتراكه في هجن مع الأصناف الأخرى . ويعاب على هذه الطريقة احتياجها إلى جهد كبير ، كما يصعب اتباعها عند زيادة عدد الأصناف على ١٠ ؛ لأن عدد الهجن الممكنة تصبح - مثلاً - ١٠٥ ، و ١٩٠ عند زيادة عدد الأصناف إلى ١٥ ، و ٢٠ على التوالي .

٢- الأجيال المتجمعة Bulk Populations :

تزرع نباتات الجيل الثاني والأجيال التالية حتى الجيل الخامس أو السادس متجمعة معاً ؛ فتحصد بنور الجيل الثاني (التي تنتجها نباتات الجيل الأول) ، وتخلط معاً وتزرع ، ثم تحصد بنور الجيل الثالث (التي تنتجها نباتات الجيل الثاني) ، وتخلط معاً ، وتزرع ... وهكذا تستمر الحال على هذا الوضع ، إلى أن تصل النباتات إلى الدرجة المطلوبة من الأصالة الوراثية قبل أن يبدأ انتخاب النباتات الفردية .

ونظراً لأن كمية البنور التي تحصد من جيل ما تكون أكبر بكثير مما يلزم للزراعة في الجيل التالي ؛ لذا .. فإن البنور تخلط - معاً - بشكل جيد ، وتؤخذ منها عينة عشوائية تكفي لزراعة المساحة التي تزرع سنوياً ؛ والتي تظل ثابتة جيلاً بعد جيل . وتجدر الإشارة إلى أن اختبار الأجيال المبكرة - إن أجرى - تزرع فيه النباتات متجمعة كذلك .

وتحقق فترة الزراعة المتجمعة عدة مزايا ، هي :

أ- وصول جميع النباتات في العشيرة إلى الأصالة الوراثية ، دون أن يتحمل المربي مشقة الاحتفاظ بسجلات النسب . ورغم أن النباتات الخليطة قد تتميز بقدرة أكبر على البقاء والتكاثر لقوة لنموها .. إلا أن ذلك لا يؤثر كثيراً في سرعة الوصول إلى الأصالة الوراثية .

ب- يمكن الاستفادة من الانتخاب الطبيعي في استبعاد التراكيب الوراثية ، التي

لا تتحمل الظروف البيئية السائدة ، أو التي لا تقاوم الأوبئة المرضية أو الحشرية التي يتكرر حدوثها . كما يفيد الانتخاب الطبيعي في خفض معدل تكاثر التراكيب الوراثية التي تكون أقل تأقلاً على الظروف البيئية ؛ فنقل نسبتها تبعاً لذلك في عشيرة الجيل السادس ، التي يبدأ فيها الانتخاب .

ج- يمكن إجراء الانتخاب الصناعي لبعض الصفات بسهولة كبيرة خلال الأجيال المتجمعة ، لكن يشترط أن تكون هذه الصفات أساسية بالنسبة للصنف الجديد ، الذي يرغب في إنتاجه ، لأن كافة النباتات الأخرى - التي لا تحتوى على هذه الصفات - يتم استبعادها جملة واحدة ، ويعد ذلك انتخاباً إجمالياً ضمن برنامج انتخاب التجميع . ومن أمثلة الصفات التي يسهل الانتخاب لها ما يلي :

- (١) المقاومة للآفات بإجراء العلوى الصناعية بالحشرات أو بمسببات الأمراض .
- (٢) التبكير في النضج بإجراء الحصاد في الموعد المرغوب للنضج ، وهو ما يؤدي إلى استبعاد النباتات المتأخرة النضج تلقائياً ؛ لأنها لا تسهم في إنتاج البنور للجيل التالي .
- (٣) طول النبات في بعض الأنواع النباتية كمحاصيل الحبوب الصغيرة ، وهي صفة مهمة لمنع الرقاد ، وتجرى بحصاد السنابل ، التي تكون عند الارتفاع المرغوب فيه فقط ، مع إزالة السنابل التي تتكون على النباتات الأطول من ذلك ، والاستغناء عن السنابل التي تتكون على ارتفاع يقل عن المطلوب .
- (٤) انتخاب البنور الكبيرة الحجم ، أو التي تكون بأشكال معينة ، ويجرى ذلك - بسهولة - بغربة البنور بعد الحصاد ، ولا تزرع سوى البنور التي تبلغ الحجم المطلوب ، أو التي تكون بالشكل المطلوب .

د- استبعاد النباتات التي يكون واضحاً من شكلها المظهرى أنها غير مرغوبة ؛ حتى تكون نسبتها منخفضة في العشيرة ، حينما تبدأ عملية الانتخاب . ومن أمثلة ذلك .. صفة النمو غير المحدود في الفاصوليا ، حينما يراد إنتاج صنف محدود النمو ؛ خاصة أن النباتات ذات النمو المحدود لا يمكنها منافسة النباتات ذات النمو غير المحدود .

لكن يعاب على فترة الزراعة المتجمعة ما يلي :

أ- ربما لا تمثل جميع النباتات من جيل ما في الجيل التالي له بمحض الصدفة .

- ب- لا يمكن تحديد نسب التراكيب الوراثية ومدى الاختلافات الوراثية فى العشيرة .
ج- قد يناسب الانتخاب الطبيعى صفات غير مرغوبة .

٤- الأجيال الانتخابية :


يبدأ الانتخاب فى الجيل السادس أو السابع ، ويستمر إلى الجيل الثانى عشر ، وتعامل النباتات خلال هذه المرحلة كما فى المرحلة الماثلة فى طريقة انتخاب النسب . وتكون الزراعة فى الجيل الذى تبدأ فيه عملية الانتخاب على مسافة أوسع مما فى الزراعة التجارية ؛ ليمكن دراسة كل نبات على حدة . يعطى كل نبات منتخب سلالة أصيلة ومتجانسة ، لا تتغير خصائصها فى الأجيال التالية . ورغم أن الأصالة الوراثية لاتكون كاملة فى الجيل السادس .. إلا أنها تكون قريبة من ذلك ، ولا يحدث فى نسل النباتات المنتخبة انعزالات يمكن أن تؤثر فى عملية التقييم فى الأجيال التالية . وبوصول النباتات إلى الجيل الثانى عشر .. يكون قد انتخبت سلالة واحدة ، وهى التى تعطى اسماً ؛ لتصبح صنفاً جديداً . ويبين شكل (١١-٣) تخطيطاً لخطوات برنامج التربية بطريقة انتخاب التجميع .

٥- التقييم النهائى :

يجرى التقييم النهائى للصنف الجديد ؛ بمقارنته بأهم الأصناف التجارية ، على مساحة فدان فى كل موقع من خمسة مواقع إنتاجية ، وعلى مدى خمس سنوات .

دور الانتخاب الطبيعى فى التربية بطريقة انتخاب التجميع

كثيراً ما يُغالى فى تقدير الدور الى يمكن أن يؤديه الانتخاب الطبيعى فى زيادة نسبة التراكيب الوراثية الأكثر قدرة على البقاء خلال مرحلة الأجيال التى تزرع متجمعة ، ولكن الواقع أن هذه الفترة لاتتعدى ستة أجيال ، وهى لا تكفى لأن يؤدي الانتخاب الطبيعى دوراً فعالاً فى استبعاد النباتات غير المرغوب فيها . فمن الخطأ - ابتداءً - مقارنة الدور الذى يؤديه الانتخاب الطبيعى فى خليط من السلالات الأصيلة بالدور الذى يؤديه خلال فترة الزراعة المتجمعة ، ففى الحالة الأولى .. تزيد نسبة السلالات الأكثر قدرة على البقاء على حساب السلالات الأخرى ، التى تختفى نهائياً بعد عدد محدود من الأجيال . أما فى الحالة الثانية .. فإن النباتات تكون خليطة وراثياً ، وتعطى انعزالات كثيرة بصفه



شكل (١١ - ٣) : تخطيط لخطوات برنامج التربية بطريقة انتخاب التجميع (من Briggs & Knowles ١٩٦٧).

مستمرة ، فتظهر بذلك تراكيب وراثية جديدة مختلفة جيلاً بعد الآخر ، ولا يعطى هذا الوضع فرصة للانتخاب الطبيعي كى يؤدى دوره فى الإبقاء على التراكيب الوراثية المرغوب فيها . وحينما تصل النباتات الى درجة عاليه من الأصالة الوراثية فى الجيل السادس أو السابع .. فإن الزراعة المتجمعة تتوقف حينئذ - وتبدأ عملية الانتخاب الصناعى . وحتى فى ذلك الوقت .. فإن عدد السلالات المتنافسة يكون كثيراً جداً ، بدرجة لا تسمح للسلالات المرغوب فيها بمزاحمة كافة السلالات الأخرى بفاعلية . وإلى جانب ماتقدم .. فإن الانتخاب الطبيعي قد يكون له تأثيرات سلبية ، كما فى الحالات التالية :

١ - قد يؤدى الانتخاب الطبيعي إلى إلبقاء على مجموعة من السلالات التى قد تكون ناجحة وصالحه للبقاء وهى مختلطة مع بعضها ، ولكن ذلك لايعنى أن أياً منها تكون ناجحة لو زرعت بمفردها بعد ذلك .

٢ - ربما لاتكون السلالات الأكثر قدرة على البقاء هى الأفضل من الوجهة الستانية أو الزراعية . ومن أمثلة ذلك .. أن الانتخاب الطبيعي يكون فى صالح النباتات السريعة الإزهار - كما فى الخس - ويكون فى صالح النباتات التى تنتج بنوراً صغيرة ؛ لأنها تتكون بأعداد أكبر مما فى حالة النباتات التى تنتج بنورا كبيرة ، كما فى الفاصوليا . وتتوقف القدرة على البقاء فى خليط من التراكيب الوراثية على عاملين ، هما :

١ - عدد البذور التى ينتجها كل تركيب وراثى .

٢ - نسبة البذور المنتجة التى تعطى نباتات تصل إلى مرحلة الإزهار والإثمار والنضج . فإذا اعتبرنا أن P ، و Q تمثلان نسبة تركيبين وراثيين يتنافسان على البقاء ، وأن sp ، و sq هى قيمة الانتخاب selective value لكل منهما على التوالى ، فإنه يمكن حساب نسبتهما فى جيلين متعاقبين (n) ، $(n + 1)$ بالمعادلة التالية :

$$P_{n+1} = sp P_n / T$$

$$Q_{n+1} = sq Q_n / T$$

حيث T هى معامل لتعديل النسب بحيث يصبح مجموعها واحداً صحيحاً .

وكمثال على ذلك (عن Allard ١٩٦٠) .. نفترض أننا خلطنا - معا - تركيبين وراثيين ، هما P ، و Q بنسب متساوية ، أى إن $Q_0 = P_0 = 0.5$ ، وأن قيمتى الانتخاب


للمنافس القوى - وليكن P- والمنافس الضعيف - وليكن Q هما ١,٠ و ٩,٠ على التوالي ..
فإننا نجد - بتطبيق المعادلة الخاصة بالمنافس القوى (P) إن نسبته تتغير من ٠,٥ في
الجيل الأول (جيل الأساس) إلى ٠,٥٢٦٣ في الجيل الثاني ، و ٠,٥٥٢٥ في الجيل
الثاني ، و ٠,٥٧٨٤ في الجيل الرابع ، و ٠,٦٠٣٩ في الجيل الخامس . أما نسبة Q
(المنافس الضعيف) فإنها تحسب في أى جيل بالمعادلة التالية :

$$Q_n = 1 - P_n$$

ويبين شكل (١١-٤) النسب النظرية المتوقعة للمنافس الضعيف (Q) حتى ٢٥ جيلاً
في حالات قيم انتخابية (s) تتراوح من ٠,٥ إلى ٠,٩٩ : علماً بأن القيمة الانتخابية
للمنافس القوى تبقى ثابتة عند ١,٠ . ويتضح من الشكل أنه عندما يكون الفرق في القيم
الانتخابية بين التركيبين الوراثيين المتنافسين كبيراً .. فإن النقص في نسبة التركيب
الوراثي الأقل قدرة على المنافسة (Q) يكون كبيراً خلال الأجيال الأولى ، بينما يقل معدل
النقص في نسبة هذه الأفراد بعد ذلك ؛ بحيث لاتختفى الأفراد الأخيرة من المنافس
الضعيف إلا ببطء شديد . أما عندما يكون الفرق في القيم الانتخابية بين التركيبين
الوراثيين المتنافسين صغيراً .. فإن التغير في نسبة كل منهما يكون صغيراً على الدوام ؛
فمثلاً نجد في حالة اختلاف القيمة الانتخابية بين التركيبين الوراثيين بمقدار ٥٪ فقط
(s = ٠,٩٥) أنه يلزم ١٤ جيلاً فقط لخفض نسبة المنافس الضعيف (Q) من ٥٠٪ إلى
٢٥٪ ، ولكنه يستمر يُشكل نحو ٤٪ من النباتات في العشيرة بعد ٥٠ جيلاً .

وعندما يتنافس أكثر من تركيبين وراثيين على البقاء .. فإن منحنيات نسب أكثر
التركيب الوراثية وأقلها قدرة على البقاء تكون مشابهة لما في الحالة السابقة (حالة تنافس
تركيبين وراثيين فقط) . أما التراكيب الوراثية الوسطية في القدرة على المنافسة .. فإنها
تظل وسطية ، وتنخفض نسبتها ببطء إلى أن يقضى على أضعف المتنافسين . وقد ترتفع
نسبة بعضها قليلاً ؛ حتى يقترب المنافس الضعيف من الاختفاء . حينئذ .. تنخفض نسبته
مرة أخرى ، بينما تنخفض نسب التراكيب الوراثية الأضعف منه ؛ لأن المنافسة تكون
محصورة بينها وبين المنافس القوى .. وهكذا تستمر الحال إلى أن يسود المنافس القوى
فقط .


ويبين شكل (١١-٥) الوضع الذي تصير إليه نسب خمسة تراكيب وراثية ، خلال عشرة



شكل (١١ - ٤) : التغير في نسبة التركيب الوراثي الأقل قدرة على البقاء والمخلوط - ابتداءً - بنسبة ٥٠٪ مع تركيب وراثي آخر عند اختلاف القيمة الانتخابية (s) للمنافس الضعيف (عن Allard ١٩٦٠).

أجيال من الانتخاب الطبيعي ، علماً بأنها خلطت في البداية بنسب متساوية (٢ ، ٠ لكل منها) ، وأن التركيبين الوراثيين الأعلى قدرة ، والتركيبين الوراثيين الأقل قدرة على البقاء تختلف في القيمة الانتخابية عن التركيب الوراثي الوسطى بمقدار ٤٠٪ ، و ٢٠٪ بالزيادة ، ٤٠٪ و ٢٠٪ بالنقص على التوالي .

وتجدر الإشارة إلى أن القيم الانتخابية لا تبقى ثابتة ، بل تتغير بتغير العوامل البيئية من موسم إلى آخر . كما أن التفاعل بين العوامل البيئية والتراكيب الوراثية يجعل هذا التغير في القيم الانتخابية مختلفاً من تركيب وراثي إلى آخر .



شكل (١١ - ٥) : التغير المتوقع في نسب خمسة تراكيب وراثية مختلطة معاً خلال عشرة أجيال من الانتخاب الطبيعي . انظر المتن للتفاصيل .

طرق التربية المحدورة من طريقة انتخاب التجميع

أدخل بعض مربى النبات تعديلات على التربية بطريقة انتخاب التجميع : لجعلها أكثر كفاءة . ونذكر فيما يلي أهم هذه التعديلات .

طريقة انتخاب التجميع المحدورة Modified Bulk Method

يتم في هذه الطريقة انتخاب النباتات التي تحمل الصفات المرغوب فيها سنوياً (خلال

فترة الزراعة المتجمعة) ، وتخلط بنورها - معاً - لتزرع فى الجيل التالى ، ويستمر البرنامج بعد الجيل الخامس أو السادس كالعادة .

طريقة انتخاب التجميع والنسب Bulk-Pedigree Method

تزرع النباتات فى هذه الطريقة متجمعة ، خلال الأجيال الأولى من برنامج التربية ، إلى أن تكون الظروف البيئية مناسبة لظهور الصفات المرغوب فيها ؛ حيث يبدأ - حينئذ - انتخاب النباتات الفردية ، ثم يستمر برنامج التربية - بعد ذلك - بطريقة انتخاب النسب . وقد تنتهى الزراعة المتجمعة فى الجيل الثانى ؛ فتتبع التربية بطريقة انتخاب النسب ، أو تنوم إلى الجيل السادس ، وفى هذه الحالة .. تكون التربية بطريقة انتخاب التجميع . وتناسب هذه الطريقة الانتخاب لمقاومة الأمراض ، حين يكون الاعتماد على الأوبئة الطبيعية لانتخاب صفة المقاومة .

طريقة انتخاب النسب والتجميع Pedigree-Bulk Method

تتبع فى هذه الحالة طريقة انتخاب النسب فى بداية برنامج التربية ، إلى أن يتم التخلص من النباتات غير المرغوب فيها ، ثم يستمر البرنامج - بعد ذلك - بطريقة انتخاب التجميع .

طريقة انتخاب التجميع الرجعى Bacross-Bulk Method

تتبع هذه الطريقة حينما يكون أحد الآباء المهجنة معاً لبدء برنامج التربية صنفاً تجارياً ناجحاً ذا صفات مرغوب فيها ؛ حيث يفضل إجراء تلقيح أو تلقيحين رجعيين معه ؛ لجمع أكبر قدر من صفاته قبل الاستمرار فى برنامج التربية بعد ذلك كالمعتاد .

الانتخاب المتكرر

كان Hayes & Garber هما أول من اقترح التربية بطريقة الانتخاب المتكرر فى عام ١٩١٩ . كما اقترحها - أيضاً - بدون علم سابق East & Jones فى عام ١٩٢٠ . وكان Jenkins هو أول من وصف هذه الطريقة بالتفصيل فى عام ١٩٤٠ ، وكان Hull هو الذى اقترح لها الاسم الذى تعرف به ، وهو الانتخاب المتكرر Recurrent Selection ، وكان ذلك فى عام ١٩٤٥ (عن Briggs & Knowles ١٩٦٧) .

وتتبع التربية بطريقة الانتخاب المتكرر فى تحسين المحاصيل الخلطية التلقيح فقط ؛ مثل الذرة ، والبرسيم الحجازى ؛ لأن إكثار الصنف الناتج يعتمد على التلقيح الخلطى العشوائى بين نباتاته ، بينما يودى التلقيح الذاتى إلى فقدان خصائص الصنف . وتناسب هذه الطريقة كثيراً من المحاصيل الخلطية التلقيح ؛ مثل السبانخ ، والبنجر ، والجزر ، والكرنب . وتوجد أربعة أنواع رئيسية للانتخاب المتكرر ، هى : الانتخاب المتكرر للشكل الظاهرى ، والانتخاب المتكرر للقدرة العامة على التألف ، والانتخاب المتكرر للقدرة الخاصة على التألف ، والانتخاب المتكرر المتبادل .

الانتخاب المتكرر للشكل الظاهرى

يطلق على طريقة التربية بالانتخاب المتكرر للشكل الظاهرى Recurrent Selection for Phenotype - أيضاً - اسم الانتخاب المتكرر البسيط Simple Recurrent Selection ، وتكون خطواته كما يلى :

١- ينتخب عدد من النباتات التى تحمل الصفات المرغوب فيها من أحد الأصناف التجارية الهامة الذى قد يكون مفتوح التلقيح ، أو هجيناً فردياً ، أو هجيناً زوجياً ، أو صنفاً تركيبياً . ويكون انتخاب النباتات على أساس الشكل الظاهرى للصفات المرغوب فيها .

٢- يلقح كل نبات من النباتات المنتخبة ذاتياً . وتخلط البنور - معاً - لتكون مايعرف باسم بنور الأساس للورة الانتخاب الأولى Syn-I-O .

٣- تزرع بنور الأساس للورة الانتخاب المتكرر الأولى فى العام التالى ، وتجرى بينها كل التلقيحات الممكنة - يدياً - ثم تخلط كميات متساوية من بنور كل تلقيح ؛ لتكون بنور الجيل الأول للورة الانتخاب المتكرر الأولى Syn I-1 .

٤- تبدأ الورة الثانية للانتخاب بزراعة بنور الجيل الأول للورة الانتخاب الأولى ، ثم تنتخب منها أفضل النباتات ، وتلقح ذاتياً ، وتخلط البنور الناتجة - معاً - لتكون بنور الأساس للورة الانتخاب المتكرر الثانية Syn-II-0 .

٥- تزرع بنور الأساس للورة الانتخاب المتكرر الثانية ؛ لإنتاج بنور الجيل الأول للورة الانتخاب المتكرر الثانية 1 - Syn - II ... وهكذا .

تستكمل كل دورة في موسمين زراعيين ، وتستمر الدورات إلى أن يصبح الانتخاب غير مُجدٍ . يقتصر استعمال هذه الطريقة في التربية على تحسين الصفات ذات درجات التوريث المرتفعة ، التي يمكن تمييزها على أساس الشكل الظاهري . أما صفة المحصول والصفات الكمية الأخرى .. فلا يمكن إحراز تقدم كبير في تحسينها باتباع هذه الطريقة .

إن الميزة الأساسية لهذه الطريقة في التربية -مقارنة بطرق التربية الأخرى- أن كل دورة انتخاب تسمح بظهور تراكيب وراثية جديدة .. يكون من بينها تراكيب أفضل من تلك التي كانت موجودة في الجيل السابق ؛ ذلك لأنه يتم انتخاب أفضل النباتات في كل دورة انتخاب ، وهي نباتات خليطة - وراثياً - بطبيعتها (لأنها من عشيرة محصول خلطي التلقيح) ، ويؤدي تلقيحها - ذاتياً - إلى المحافظة عليها من التلقيح مع نباتات أخرى غير منتخبة ، بينما يؤدي تلقيح أنسالها -معاً- إلى ظهور انعزالات وراثية كثيرة جديدة ، يكون من بينها انعزالات فائقة الحدود Transgressive Segregations ، تجمع الصفات الممتازة من أبويها ؛ وبذا .. توجد في كل دورة للانتخاب فرصة لظهور تراكيب وراثية أفضل مما ظهر في الدورة السابقة لها .

وتستمر الحال على هذا الوضع إلى حين الوصول إلى أفضل حالة توازن بين آليات الصفات المرغوب فيها .. حينئذ .. يتوقف الانتخاب ، ويبدأ أكتار العشيرة النهائية التي تصبح بعدها صنفاً جديداً .. ويستمر ثبات خصائص هذا الصنف على حالة التوازن الوراثي التي وصلت إليها العشيرة في آخر دورة للانتخاب، وبعد جيل واحد من التلقيح الخلطي العشوائي حسب قانون هاردي - فينبرج .

لا تتبع هذه الطريقة -عادة- في تحسين المحاصيل الذاتية التلقيح ، إلا أنها استعملت من قبل Lyons وآخرين (١٩٨٧) في تحسين صفة المقاومة لفطر *Sclerotinia sclerotiorum* ، المسبب لمرض العفن الأبيض في الفاصوليا ، بنسبة نحو ٥٠% في خلال دورتين فقط من الانتخاب . وقد اعتمد الباحثون على إجراء تلقيحات يدوية بين ٢٠ تركيباً وراثياً منتخباً في كل دورة انتخاب .

الانتخاب المتكرر للقدرة العامة على التألف

كان Jenkins هو الذي اقترح طريقة الانتخاب المتكرر للقدرة العامة على التألف

Recurrent Selection for General Combining Ability ، حينما أوضح طريقة التقييم المبكر للقدرة العامة على التآلف . وتختلف هذه الطريقة عن الانتخاب المتكرر للشكل الظاهري في أن الانتخاب يجري في كل دورة جديدة على أساس قدرة النباتات المنتخبة على التآلف مع أحد الأصناف الاختبارية Tester Variety في تلقيح قمى Top Cross . وتكون خطوات برنامج التربية كما يلي :

- ١- ينتخب عدد من النباتات التي تحمل الصفات المرغوب فيها من أحد الأصناف التجارية الهامة ، وهي التي يطلق عليها بنور الأساس لبرنامج التربية الداخلية (S_0) .
- ٢- يلحق كل نبات من النباتات المنتخبة - ذاتياً - لإنتاج بنور جيل التلقيح الذاتى الأول (S_1) ، كما يُلحق كل نبات منها في الوقت ذاته مع صنف اختباري يستخدم كأم .
- ٣- يحتفظ في العام التالي بينور جيل التلقيح الذاتى الأول ، بينما تزرع البنور الناتجة من التلقيح القمى ، ويُقيّم محصولها . ويستفاد من نتائج هذا التقييم في معرفة أفضل النباتات التي كانت ذات قدرة عالية على التوافق مع الصنف الاختباري . وتخلط بنور التلقيح الذاتى الأول لهذه النباتات معاً ؛ لتشكيل بنور الأساس لدورة الانتخاب المتكرر الأولى Syn-I-O .

- ٤- تزرع بنور الأساس لدورة الانتخاب المتكرر الأولى في العام الثالث ، وتجرى بينها كل التلقيحات الممكنة يويماً ، ثم تخلط كميات متساوية من بنور كل تلقيح ؛ لتكون بنور الجيل الأول لدورة الانتخاب المتكرر الأولى Syn-II-1 .. وهكذا .

تستكمل كل دورة في ثلاثة مواسم زراعية ، وتستمر الدورات إلى أن يتوقف التحسين في القدرة العامة على التآلف .

هذا .. ويمكن - في حالة توفر الإمكانيات البشرية والمادية - زراعة البنور الناتجة من التلقيح الذاتى في كل دورة انتخاب مع البنور الناتجة من التلقيح القمى - معاً - في نفس الموسم ؛ فتزرع - على سبيل المثال - بنور جيل التلقيح الذاتى الأول (S_1) مع البنور الناتجة من التلقيح القمى في العام الثانى لدورة الانتخاب الأولى . وتلقيح نباتات جيل التلقيح الذاتى - ذاتياً - لإنتاج بنور جيل التلقيح الذاتى الثانى (S_2) ، في الوقت الذى تقيم فيه النباتات الناتجة من التلقيح القمى . وبناء على نتائج هذا التقييم .. تخلط بنور التلقيح الذاتى الثانى لأفضل النباتات التي كانت ذات قدرة عالية على التوافق مع الصنف

الاختبارى ؛ لتكون معاً بنور الأساس لدورة الانتخاب المتكرر الثانية .

الانتخاب المتكرر للقدرة الخاصة على التآلف

اقترح Hull طريقة الانتخاب المتكرر للقدرة الخاصة على التآلف Recurrent Selection for Specific Combining Ability فى عام ١٩٤٥ ، وهى تتشابه مع طريقة الانتخاب المتكرر للقدرة العامة على التآلف من جميع الوجوه ، فيما عدا أن سلالة أصيلة (مرباة داخلياً) تستعمل فى التلقيح القمى ، بدلاً من الصنف المفتوح التلقيح . وأفضل سلالة لهذا الغرض هى التى يتوقع استعمالها فى هجن فردية مع السلالات التى تنتج من البرنامج . وقد يستعمل هجين فردى معين كصنف اختبارى ، إذا كان الغرض من البرنامج هو إنتاج سلالات أصيلة ، يمكن أن تتآلف معه بدرجة عالية فى هجين زوجى .

ويجب العناية باختيار السلالة الأصلية التى تستعمل فى التلقيح القمى ، مع المحافظة عليها من أى تغير وراثى ؛ ذلك لأن البرنامج كله يبنى على أساس إيجاد سلالات متوافقة معها ؛ فيجب أن تكون هذه السلالة جيدة أصلاً ، وأن تستمر المحافظة عليها دون أى تغير وراثى ، وإلا .. فقد البرنامج قيمته . أما إذا ظهرت فى أثناء البرنامج سلالة أخرى أفضل منها .. فإنه تلزم إعادة العمل من جديد . ويعد ذلك من أكبر عيوب هذه الطريقة للتربية .

الانتخاب المتكرر المتبادل

تفيد التربية بطريقة الانتخاب المتكرر المتبادل Reciprocal Recurrent Selection فى الانتخاب لكل من القدرة العامة والقدرة الخاصة على التآلف . تتضمن الطريقة وجود عشيرتين من العشائر الوراثية التى تكون على درجة عالية من الخلط (عدم التماثل) الوراثى ؛ مثل الأصناف المفتوحة التلقيح ، على ألا يكون بينهما صلة قرابة . تستعمل العشيرتان فى برنامجين منفصلين للتربية ، يتشابه كل منهما مع برنامج الانتخاب المتكرر للقدرة العامة على التآلف ، مع استعمال كل من العشيرتين - فى الدورة الأولى للتربية - كصنف اختبارى للعشيرة الأخرى فى تلقيحات قمية ؛ كما تستعمل النباتات التى تبدأ بها كل دورة تالية من الانتخاب المتكرر فى أى من البرنامجين كصنف اختبارى فى البرنامج الآخر .

وعليه .. فإذا كانت العشيرتان هما A ، و B .. فإن أحد البرنامجين يبدأ بتلقيح بعض النباتات من العشيرة A ذاتياً ، مع تلقيحها - في الوقت نفسه - مع عينة من نباتات العشيرة B ، بينما يبدأ البرنامج الآخر بتلقيح بعض النباتات من العشيرة B ذاتياً مع تلقيحها - في الوقت نفسه - مع عينة من نباتات العشيرة A ، ويحتفظ - في موسم الزراعة التالي - ببذور جيل التلقيح الذاتي الأول (S_1) لكل من العشيرتين ، بينما تزرع البذور الناتجة من التلقيحات القمية ، ويُقِيم محصولها . ويستفاد من هذا التقييم في معرفة أفضل نباتات كل عشيرة ، التي كانت ذات قدرة عالية على التوافق مع العشيرة الأخرى . تخطط بذور التلقيح الذاتي الأول - معاً - بالنسبة لكل عشيرة على حدة ؛ لتشكيل بذلك بذور الأساس لدورة الانتخاب الأولى (Syn A-I-0) بالنسبة للعشيرة A ، و (Syn-B-I-0) بالنسب للعشيرة B) . وتزرع هذه البذور في موسم الزراعة الثالث ، وتجرى بين نباتات كل منها كل التلقيحات الممكنة يدوياً ، ثم تخطط كميات متساوية من بذور كل تلقيح معاً بالنسبة لكل عشيرة على حدة ؛ لتكون بذلك بذور الجيل الأول لدورة الانتخاب المتكرر الأولى (Syn A-I-1) بالنسبة للعشيرة A ، و (Syn B-I-1) بالنسبة للعشيرة B) .

تستمر دورات الانتخاب المتكرر بعد ذلك مع الاستمرار في استعمال النباتات التي تبدأ بها كل دورة انتخاب - في أى من البرنامجين - كصنف اختباري في البرنامج الآخر . ويلزم انتخاب عدد كاف من النباتات في كل دورة انتخاب ؛ لتلقيحها ذاتياً بغرض الحد من التربية الداخلية وما يصاحبها من تدهور في قوة النمو . كما يجب - قدر الإمكان - ألا تكون النباتات المنتخبة للتلقيح الذاتي في كل دورة ذات أصل مشترك ، لتحقيق الهدف نفسه .

وتستخدم السلالات من برنامجي التربية - في نهاية الأمر - في إنتاج هجن فردية ، أو هجن زوجية ، تكون على درجة عالية من التآلف . وتكون الهجن الزوجية بين هجن فردية استخدم في إنتاجها سلالات من نفس العشيرة ؛ فبينما تكون الهجن الفردية هكذا : $A_1 \times B_1$ ، أو $A_2 \times B_2$.. فإن الهجين الزوجي يكون هكذا : $(A_1 \times A_2) \times (B_1 \times B_2)$. علماً بأن A_1 ، A_2 ... إلخ .. هي سلالات منتخبة من برنامج العشيرة A ، B_1 ، B_2 ... إلخ .. هي سلالات منتخبة من برنامج العشيرة B .

الفصل الثانى عشر

التهجين الرجعى

تعد طريقة التهجين الرجعى Backcross Method هى طريقة التربية الوحيدة التى تعطى نتائج يمكن التنبؤ بها . وهى تستعمل فى تحسين كل من النباتات الذاتية التلقيح ، والنباتات الخلطية التلقيح ، ولكن بشروط خاصة فى الحالة الأخيرة . وتتبع طريقة التلقيح الرجعى لتحقيق هدف معين ، هو تحسين صنف تجارى ناجح ، أو سلالة أصيلة مرغوبة ؛ وذلك بأن يضاف إليها - بطريق التلقيح الرجعى - صفة واحدة ، أو صفتان أحياناً ، أو ثلاث صفات على الأكثر ، من مصدر آخر تتوافر فيه هذه الصفات ، ولكنه لا يكون مرغوباً من الوجهة الزراعية فيما عدا ذلك من صفات ، وقد يكون برياً .

وتتلخص التربية بطريقة التهجين الرجعى فى تلقيح الصنف الذى يُراد تحسينه - والذى يطلق عليه اسم الأب الرجعى Recurrent Parent - مع الصنف الذى يحتوى على الصفة التى يُراد نقلها - والذى يطلق عليه اسم الأب المعطى Donar Parent ؛ ثم تلقيح نباتات الجيل الأول - وكذلك الأجيال التالية التى تحتوى على الصفة التى يُراد نقلها - مع الأب الرجعى .

يلزم لنجاح التربية بطريقة التهجين الرجعى .. أن يكون الأب الرجعى ناجحاً ومرغوباً ، وأن تكون الصفة التى يُراد نقلها ذات درجة توريث عالية ، وأن يجرى عدد كاف من

التلقيحات الرجعية ؛ لاستعادة جميع صفات الأب الرجعى ، يكتفى عادة بنحو ٥ - ٦ تلقيحات رجعية ، إلا أن العدد قد يصل إلى ١٠ تلقيحات .

ولقد كان Harlan & Pope هما أول من اقترح هذه الطريقة للتربية فى عام ١٩٢٢ . وقد استخدمها Briggs فى السنة نفسها لتحسين أصناف القمح والشعير ، بإكسابهما صفات المقاومة لبعض الأمراض الهامة .

برنامج التهجين الرجعى لنقل صفة بسيطة سائدة

خطوات برنامج التربية

تكون خطوات برنامج التربية لنقل جين سائد (وليكن A) من الأب المعطى (الذى يكون تركيبه الوراثى AA) إلى الأب الرجعى (الذى يكون تركيبه الوراثى aa) كما يلى :

١- يلقح الأب الرجعى مع الأب المعطى لإنتاج نباتات الجيل الأول (F_1) التى يكون تركيبها الوراثى Aa .

٢- تلقح نباتات الجيل الأول - رجعيًا - إلى الأب الرجعى ؛ لإنتاج بنور الجيل الأول للتهجين الرجعى الأول ($F_1 BC_1$) ، التى تكون منعزلة إلى متنتحية أصيلة (aa) ، وخليطة (Aa) - بنسبة ١ : ١ - فى الصفة التى يراد نقلها .

٣- تلقح نباتات الجيل الأول للتهجين الرجعى الأول الحاملة للصفة (أى التى يكون تركيبها الوراثى Aa) رجعيًا إلى الأب الرجعى لإنتاج بنور الجيل الأول للتهجين الرجعى الثانى ($F_1 BC_2$) التى تكون منعزلة إلى متنتحية أصيلة (aa) ، وخليطة (Aa) - بنسبة ١ : ١ - فى الصفة التى يراد نقلها .

٤- يستمر برنامج التهجين الرجعى على النحو السابق إلى حين إنتاج بنور الجيل الأول للتهجين الرجعى السادس $F_1 BC_6$ ، التى تكون هى الأخرى منعزلة إلى متنتحية أصيلة (aa) ، وخليطة (Aa) - بنسبة ١ : ١ - فى الصفة التى يراد نقلها .

٥- تزرع بنور الجيل الأول للتهجين الرجعى السادس ، وتستبعد النباتات الحاملة للصفة المتنتحية غير المرغوب فيها ، وتلقح النباتات الحاملة للصفة السائدة ذاتيًا ؛ لإنتاج بنور الجيل الثانى للتهجين الرجعى السادس $F_2 BC_6$ التى تكون منعزلة إلى متنتحية أصيلة (aa) ، وخليطة (Aa) ، وأصيلة (AA) - بنسبة ١ : ٢ : ١ - فى الصفة التى يراد نقلها .

٦- تزرع بذور الجيل الثانى للتهجين الرجعى السادس ، وتستبعد النباتات التى تكون حاملة للصفة المتنحية غير المرغوبة ، وتلقح النباتات الحاملة للصفة السائدة ذاتياً ؛ لإنتاج بذور الجيل الثالث للتهجين الرجعى السادس F_3BC_6 .

٧- تزرع بذور الجيل الثالث للتهجين الرجعى السادس (وهى أنسال النباتات الفردية الحاملة للصفة المرغوب فيها من الجيل الثانى للتلقيح الرجعى السادس) . يلاحظ أن ثلثي الأنسال تنعزل نباتاتها بنسبة ٢ تحمل الصفة السائدة : ١ تحمل الصفة المتنحية ، وهى التى تنتج من نباتات الجيل الثانى للتهجين الرجعى السادس ($F_2 BC_6$) التى كان تركيبها الوراثى Aa ، وتستبعد جميع هذه الأنسال التى تظهر بها انعزالات فى الصفة التى يُراد نقلها ، أما الثلث المتبقى من الأنسال .. فإن جميع نباتاته تكون حاملة للصفة السائدة ، ويكون تركيبها الوراثى AA ، وتلقح هذه الأنسال - ذاتياً - لإنتاج بذور الجيل الرابع للتهجين الرجعى السادس $F_4 BC_6$ ، وهى التى تخلط معاً ، وتشكل بذور المربى Breeder Seed للصنف الجديد ، الذى يكون مماثلاً للأب الرجعى فى جميع الصفات ، فيما عدا احتوائه على الصفة السائدة المرغوب فيها بحالة أصيلة .

ولكن كيف تُسترد جميع صفات الأب الرجعى بعد أن كان قد لُقح مع الأب المعطى فى بداية برنامج التربية ؟ هذا ما نوضحه فى الجزء التالى .

استرداد صفات الأب الرجعى وتتبعها

نظراً لأن الغرض من برنامج التربية هو إنتاج صنف جديد يماثل الصنف الأصيل (الأب الرجعى) فى جميع الصفات ، ولكن مع إضافة الصفة المطلوبة من الأب المعطى ؛ لذا .. يكون من المهم تتبع صفات الأب الرجعى خلال أجيال التربية ، ويؤدى التلقيح الأول بين الأب الرجعى ، والأب المعطى إلى إنتاج جيل ، يكون قد تلقى نصف أليلاته (عوامله الوراثية) من الأب الرجعى ، والنصف الآخر من الأب المعطى ويلاحظ عدم وجود فرصة للانتخاب لصفات الأب الرجعى فى هذا الجيل ؛ نظراً لأن نباتاته تكون متجانسة ولا تظهر بينها أية انعزالات وراثية ، أما عند تلقيح نباتات الجيل الأول رجعياً إلى الأب الرجعى فإن النسل الناتج من هذا التلقيح (وهو $F_1 BC_1$) يكون قد تلقى نصف أليلاته (عوامله الوراثية) من الأب الرجعى والنصف الآخر من الجيل الأول ، ونظراً لأن الجيل الأول كان قد تلقى نصف أليلاته من الأب الرجعى ؛ لذا .. فإن نباتات الجيل الأول للتلقيح الرجعى

الأول تتلقى ٧٥٪ من أليلاتها من الأب الرجعى ، بينما تحصل على ٢٥٪ فقط من أليلاتها من الأب المعطى ، ومع كل تلقيح رجعى .. تقل نسبة الأليلات المتحصل عليها من الأب المعطى بمقدار النصف ؛ لتصبح ١٢.٥٪ فى الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثانى F_1BC_2 ، و ٦.٢٥٪ فى الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثالث F_1BC_3 ... وهكذا ، وترتفع فى الوقت نفسه نسبة الأليلات المتحصل عليه من الأب الرجعى ؛ لتصبح ٨٧.٥٪ فى الـ F_1BC_2 ، و ٩٣.٧٥٪ فى الـ F_1BC_3 ... وهكذا . والمعادلة العامة لذلك - فى غياب الانتخاب لصفات الأب الرجعى ، والارتباط بين الصفة التى يراد نقلها ، وصفات أخرى غير مرغوبة - هى كما يلى :

$$\text{نسبة الأليلات المتحصل عليها من الأب المعطى} = \left(\frac{1}{p} \right)^{1+t} \times 100$$

حيث تمثل (ت) عدد التلقيحات الرجعية (فمثلا .. ت = صفر للتلقيح الأسمى بين الأب الرجعى والأب المعطى ، و ١ للتلقيح الرجعى الأول ... وهكذا) .

أما نسبة الأليلات المتحصل عليه من الأب الرجعى .. فيحصل عليها بطرح نسبة الأليلات المتحصل عليها من الأب المعطى من مئة .

فلو فرض أن أجريت ستة تلقيحات رجعية .. تكون ت = ٦ ، وتكون نسبة الأليلات المتحصل عليها من الأب المعطى $= \left(\frac{1}{p} \right)^{1+6} \times 100 = 0.78\%$ ، وتكون نسبة الأليلات المتحصل عليها من الأب الرجعى $= 100 - 0.78\% = 99.22\%$ بعد ستة تلقيحات رجعية ، وتصل هذه النسبة إلى ٩٩.٩٥٪ بعد ١٠ تلقيحات رجعية .

يتضح مما تقدم بيانه أن التلقيحات الرجعية تؤدي فى نهاية الأمر إلى استرداد جميع صفات الأب الرجعى . ومع ذلك .. فإنه يمكن الإسراع فى استرجاع هذه الصفات ، بانتخاب النباتات التى تكون أقرب فى صفاتها إلى الأب الرجعى خلال الأجيال الأولى من برنامج التربية . ومن المعتقد أن كل دورة من الانتخاب لصفات الأب الرجعى تعادل - فى فاعليتها - تلقيحين رجعيين . ويكون الانتخاب لصفات الأب الرجعى غير مُجْدٍ - عادة - بعد التلقيح الرجعى الثالث ؛ لأن النباتات تكون قد أصبحت متجانسة إلى حد كبير .

هذا .. ولا يؤثر التلقيح الذاتى بعد أى تلقيح رجعى على نسبة الأليلات المتحصل عليها

من الأب الرجعى ؛ حيث تبقى كما هى ، إلا إذا أخضع النسل الناتج من التلقيح الذاتى للانتخاب ، ويكون للانتخاب لصفات الأب الرجعى - فى هذه الحالة - نفس التأثير الذى سبق بيانه .

ونظراً لأن الأب الرجعى يتكون - عادة - من خليط من السلالات النقية (فى حالة المحاصيل الذاتية التلقيح) ؛ لذا .. كان من الضرورى استعمال عدد كاف من نباتاته فى كل تلقيح رجعى لكى تمثل ما يوجد به من اختلافات ، ولكى يمكن استعادة جميع صفاته ، ولذلك أهمية خاصة فى التلقيح الرجعى الأخير ؛ حيث يجب ألا يقل عدد نباتات الصنف الرجعى التى تستخدم فى هذا التلقيح عن ٢٠ نباتاً .

وجدير بالذكر .. أن الصفات التى تورث عن طريق السيتوبلازم لا تورث إلا عن طريق جاميطات الأم ؛ لذا .. فإنه يلزم - حينما يحتوى الأب الرجعى على صفات تورث عن طريق السيتوبلازم - أن يستعمل هذا الصنف كأم عند تلقيحه مع الأب المعطى فى بداية برنامج التربية ، ثم فى كل تلقيح رجعى بعد ذلك .

أهمية تتبع الصفات المنقولة

إن الهدف من برنامج التربية كله هو نقل صفة معينة مرغوب فيها إلى صنف جيد تنقصه هذه الصفة ؛ لذا .. فإن تتبع هذه الصفة يجب أن يكون هو الهدف الأول للمربى فى جميع مراحل التربية ، فيجب توخى الحرص التام على أن تكون النباتات المنتخبة لتلقيحها - رجعياً - تحتوى - فعلاً - على الصفة التى يراد نقلها ، وبالتركيز الذى توجد عليه فى الأب المعطى . ويؤدى الفشل فى انتخاب هذه النباتات فى أية مرحلة من مراحل برنامج التربية إلى ضياع كل الجهود السابقة لتلك المرحلة ، إن لم يوجد لدى المربى احتياطى من البذور فى كل جيل ، لإعادة التقييم ، والانتخاب - عند الضرورة - للصفة التى يراد نقلها .

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخاب لصفات الأب الرجعى لا يمارس إلا على النباتات التى تحمل الصفة المنقولة ، أى تحدد - أولاً - النباتات التى تحمل الصفة التى يراد نقلها فى كل جيل ، ثم تنتخب من بينها النباتات التى تكون أقرب فى صفاتها إلى الأب الرجعى ؛ وذلك لأن جميع صفات الأب الرجعى يمكن أن تسترجع - تلقائياً بالتلقيح الرجعى - دون

أى انتخاب بينما يمكن أن تفقد الصفة التى يراد نقلها - بسهولة - إن لم يجر التقييم بعناية : لمعرفة النباتات الحاملة لها لتلقيحها رجعىاً .

مدى الحاجة إلى التلقيح الذاتى بعد كل جيل من أجيال التلقيح الرجعى

عندما يكون الأمر متعلقاً بنقل صفة بسيطة سائدة بطريقة التهجين الرجعى .. فإنه لا توجد حاجة إلى إجراء التلقيح الذاتى ، بعد أى من التلقيحات الرجعية ، باستثناء التهجين الرجعى الأخير كما سبق بيانه . ويرجع ذلك إلى أن جميع النباتات التى تهجن - رجعىاً - فى أى جيل تكون دائماً خليطة بالنسبة للصفة التى يراد نقلها : أى إنها تحمل الأليل المرغوب .

هذا .. إلا أن التلقيح الذاتى بعد التلقيحات الرجعية يكون أمراً مرغوباً فى الحالتين التاليتين :

- ١- فى الأنواع التى يصعب إجراء التلقيح الصناعى فيها .. خاصة ، حينما لا يعطى التلقيح سوى بذرة واحدة أو عدد قليل من البنور : حيث يوصى - فى هذه الحالة - بإنتاج الجيلين الثانى والثالث بعد كل تلقيح رجعى : لإتاحة الفرصة لانتخاب نباتات تحتوى على الصفة التى يراد نقلها مع أكبر قدر ممكن من صفات الأب الرجعى .
- ٢- فى الحالات التى يكون فيها الأب المعطى برئاً ، أو يحتوى على صفات كثيرة غير مرغوبة : يوصى - فى هذه الحالة - بإنتاج الجيلين الثانى والثالث بعد كل من التلقيح الرجعى الأول ، والثالث ، والسادس لإتاحة فرصة أكبر لانتخاب صفات الأب الرجعى .

وبالإضافة إلى ما تقدم .. فإن التلقيح الذاتى يكون ضرورياً فى حالات نقل الصفات المتنحية ، والكمية ، وذات درجات التوريث المنخفضة كما سيأتى بيانه فيما بعد .

عدد التلقيحات الرجعية اللازمة

يختلف عدد التلقيحات الرجعية التى تجرى - عادة - من ثلاثة إلى عشرة ، ويكتفى بالعدد القليل من التلقيحات الرجعية فى الحالات التالية :

- ١- عندما يكون الأب المعطى صنفاً تجارياً يحتوى على بعض الصفات الأخرى

الهامة ، التى يُرغب فى الاحتفاظ بها فى الصنف الجديد .

٢- عندما لاتوجد اختلافات كثيرة بين الأب الرجعى والأب المعطى .

٣- عندما تكون الصفة التى يُراد نقلها مرتبطة بصفات أخرى غير مرغوب فيها ؛ حيث يفضل فى هذه الحالة الاكتفاء بثلاثة تلقيحات رجعية لإنتاج الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثالث $F_1 BC_3$ الذى تكون نباتاته قد تلقت ٧٥,٩٣٪ من أليلاتها (عواملها الوراثية) من الأب الرجعى ، ثم تجرى عليها التلقيح الذاتى لعدة أجيال بعد ذلك ؛ لإعطاء فرصة لحدوث عبور يؤدى إلى كسر الارتباط بين الأليل الذى يتحكم فى الصفة التى يراد نقلها ، والأليلات التى تتحكم فى الصفات الأخرى غير المرغوبة .

ونجد فى الحالات السابقة أن الصنف الجديد لا يكون تام التشابه مع الأب الرجعى نظراً لأنه لا يتم استعادة كل صفاته ، إما عن قصد كما فى الحالتين الأولى والثانية ، وإما لكسر ارتباط غير مرغوب فيه كما فى الحالة الثالثة .

وإذا أُجريت ستة تلقيحات رجعية ، مع الانتخاب الشديد لصفات الأب الرجعى فى الأجيال الأولى من برنامج التربية .. فإن ذلك يكون كافياً لاستعادة كل صفات الأب الرجعى تقريباً ؛ لأن كل دورة من الانتخاب لصفات الأب الرجعى تعادل تلقيحاً أو تلقيحين رجعيين ، أما عند إجراء عشرة تلقيحات رجعية .. فإن الصنف الجديد يكون مماثلاً للصنف الأسمى ، فيما عدا الصفة التى نقلت إليه ، وبعد ذلك ضرورياً عندما يكون فى النية إعطاء الصنف الجديد اسم الصنف السابق نفسه مضافاً إليه رقماً أو حرفاً ، كما يكون ضرورياً كذلك عندما يكون الأب المعطى سلالة غير مزروعة أو نوعاً برياً يحتوى على صفات كثيرة غير مرغوبة .

أعداد النباتات التى تلزم زراعتها خلال برنامج التربية

يعطى Allard (١٩٦٤) أعداد النباتات التى تجب زراعتها فى كل جيل من برنامج التربية عند الرغبة فى نقل صفة بسيطة سائدة (AA) إلى الأب الرجعى على النحو التالى :

٥٣ نباتاً من كل تلقيح رجعى (BC_n) .

٩٦ نباتاً من كل جيل ثان بعد أى تلقيح رجعى ($F_2 BC_n$) .

٦٨ عائلة من الجيل الثالث لأى تلقيح رجعى (F3 BC_n) ، بكل منها ٢٤ نباتاً .

تعنى زراعة هذه الأعداد من النباتات احتمال قدره ٠.٩٩٩ . لظهور نبات واحد على الأقل تركيبه الوراثى Aa⁺ بعد كل تلقيح رجعى ، أو نبات واحد على الأقل تركيبه الوراثى (AA) فى الجيل الثالث لأى تلقيح رجعى ، كما تتيح زراعة هذه الأعداد من النباتات فرصة أكبر لانتخاب صفات الأب الرجعى .

ولمزيد من التفاصيل عن أعداد النباتات التى تلزم زراعتها للحصول على عدد معين من النباتات التى تحمل الصفة التى يراد نقلها عند اختلاف نسب ظهور هذه النباتات ، وعند اختلاف احتمالات الفشل فى العثور على هذه النباتات .. يراجع جدول (٣ - ٤) .

تأثير التلقيح فى الأصالة الوراثية

كما أن التلقيح الرجعى يؤدى إلى استرجاع جميع صفات الأب الرجعى .. فإنه يؤدى كذلك إلى زيادة نسبة الأصالة الوراثية - تدريجياً - فى حالة إجراء البرنامج على النباتات الذاتية التلقيح . ويمكن الاستدلال على درجة الأصالة الوراثية فى أى جيل من المعادلة التالية :

$$\text{نسبة التراكيب الوراثية الأصلية} = \left(\frac{1 - \frac{1}{2^n}}{2} \right) \times 100$$

حيث تمثل (م) مجموع عدد التلقيحات الرجعية والذاتية التى سبقت الوصول إلى الجيل الذى يراد حساب نسبة التراكيب الوراثية الأصلية فيه ، و (ن) عدد أزواج العوامل الوراثية التى يختلف فيها الأب الرجعى عن الأب المعطى . وتلك هى نفس المعادلة التى سبق ذكرها فى الفصل التاسع . وهى تطبق فى هذا المقام : لأن التلقيح الرجعى لا يختلف من حيث تأثيره فى الأصالة الوراثية - عن التلقيح الذاتى . ويعنى ذلك أن الجيل الرابع للتلقيح الرجعى السادس (F4BC6) - الذى تم التوصل إليه فى برنامج التربية المشروح آنفاً لنقل صفة بسيطة سائدة - تكون فيه م = ٦ (تلقيحات رجعية) + ٣ (تلقيحات ذاتية) = ٩ . هذا .. ويكون من غير الممكن تطبيق هذه المعادلة فى معظم برامج التربية بالتهجين الرجعى ؛ نظراً لأن الأبوين : الرجعى ، والمعطى يختلفان - عادة فى عدد كبير - غير معلوم - من العوامل الوراثية ، وبذا .. تكون (ن) غير معلومة القيمة .

برنامج التهجين الرجعى لنقل الصفات فى الحالات الأخرى

كانت حالة نقل صفة بسيطة سائدة التى سبق شرحها أبسط الحالات التى يجرى فيها برنامج التربية بالتهجين الرجعى ؛ لسهولة تمييز النباتات التى تحمل الصفة التى يُراد نقلها بعد كل تلقيح رجعى مباشرة . ولايختلف برنامج التربية بالتهجين الرجعى لنقل أية صفة أخرى - فى جوهره - عما سبق بيانه بالنسبة للصفة البسيطة السائدة ، وتنحصر أوجه الاختلاف - دائماً - فيما يجب عمله لمعرفة النباتات التى تحمل الصفة المرغوبة خلال أجيال التربية .

نقل صفة بسيطة ذات سيادة غير تامة

عندما تكون الصفة المراد نقلها بسيطة ، وذات سيادة غير تامة Incomplete Dominance - أى حينما يكون الفرد الخليط (Aa) متميزاً فى شكله المظهري عن الفردين : السائد الأصيل (AA) ، والمتنحى الأصيل (aa) - فإن تمييز النباتات الحاملة للتركيب الوراثى المرغوب يكون أسهل لغياب السيادة . ولايوجد - فى هذه الحالة - أى داع للتلقيح الذاتى بعد أى تلقيح رجعى ، سوى بعد التلقيح الرجعى الأخير - وليكن السادس $F_1 BC_6$ الذى تظهر فيه نباتات متنحية أصيلة (aa) وخليطة (Aa) بنسبة ١ : ١ ، فإذا كانت الصفة المرغوبة هى المتنحية .. تستعمل النباتات الحاملة لهذه الصفة مباشرة ، كبنور مربى لإكثار الصنف الجديد . أما إذا كانت الصفة المرغوبة هى السائدة .. فإنه يلزم فى هذه الحالة تلقيح النباتات التى تحمل الصفة بحالة خليطة (Aa) تلقحياً ذاتياً لإنتاج الجيل الثانى للتلقيح الرجعى السادس ($F_2 BC_6$) ، الذى تنعزل فيه النباتات إلى متنحية أصيلة (aa) وخليطة (Aa) ، وسائدة أصيلة (AA) بنسبة ١ : ٢ : ١ ، وتستعمل الفئة الأخيرة من النباتات (وهى السائدة الأصيلية) كبنور مربى ، حيث يمكن تمييزها عن النباتات الخليطة لغياب السيادة .

نقل صفة بسيطة متنحية

تُتبع فى نقل الصفة البسيطة المتنحية نفس الخطوات التى سبق بيانها بالنسبة للصفة البسيطة السائدة ، مع مراعاة أن تحمل النباتات المنتخبة فى كل جيل - لتلقيحها رجعياً - أليلاً واحداً على الأقل للصفة المتنحية التى يراد نقلها ؛ أى إن هذه النباتات إما أن تكون

خليطة Aa ، وإما متنحية أصيلة aa . ونظراً لأن نباتات الجيل الأول (التي تنشأ من تلقيح الأب المعطى aa مع الأب الرجعى AA) تكون خليطة (Aa) ؛ لذا .. فإنها تلقح رجعياً مباشرة لإنتاج نباتات الجيل الأول للتلقيح الرجعى الأول F_1BC_1 ، وهى التى تنعزل إلى خليطة (Aa) ، وسائدة أصيلة (AA) بنسبة ١ : ١ ، ولكنها تكون جميعها متشابهة مظهرياً . وهنا يتعين على المربي أن يتبع إحدى ثلاث طرق لضمان استمرار وجود الأليل المتنحى (a) فى النباتات التى تلقح رجعياً ، وهى كما يلى :

١- تلقيح كل نبات من نباتات الجيل الأول للتلقيح الرجعى الأول F_1BC_1 ذاتياً ؛ لإنتاج بنور الجيل الثانى للتلقيح الرجعى الأول F_2BC_1 : تنقسم الأنسال المنتجة إلى فئتين متساويتين : فئة تظهر بجميع نباتاتها الصفة السائدة ، وهى التى تنتج من التلقيح الذاتى للنباتات السائدة الأصلية ، ويتم استبعادها ، وفئة ينعزل فيها النسل إلى نباتات متنحية وأخرى سائدة ، بنسبة ١ : ٣ ، وهى التى تنتج من التلقيح الذاتى للنباتات الخليطة . وتنتخب النباتات الحاملة للصفة المتنحية - لأنها تكون أصيلة (aa) - وتلقيح رجعياً لإنتاج بنور الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثانى ، F_1BC_2 ، ويستمر اتباع الأسلوب نفسه مع بقية التلقيحات الرجعية . ويفضل اتباع هذه الطريقة ، عندما لا توجد حاجة ملحة إلى العجلة فى برنامج التربية .

٢- اتباع نفس الطريقة السابقة - أى تلقيح نباتات الجيل الأول للتلقيح الرجعى الأول F_1BC_1 ذاتياً - ولكن مع تلقيح كل نبات منه - كذلك - فى نفس الوقت - رجعياً إلى الأب الرجعى ، لإنتاج بنور الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثانى F_1BC_2 . وبناء على نتائج الانعزالات المشاهدة فى الجيل الثانى للتلقيح الرجعى الأول F_1BC_2 .. يستمر برنامج التربية مع نباتات الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثانى F_1BC_2 التى استخدم فى إنتاجها نباتات ظهر فى نسلها - الناتج من التلقيح الذاتى - أى فى الجيل الثانى للتلقيح الرجعى الأول F_2BC_1 - انعزالات متنحية (يكون تركيبها الوراثى aa) ، وسائدة (يكون تركيبها الوراثى Aa ، و AA) بنسبة ١ : ٣ ؛ ويعنى ذلك أن هذه النباتات التى ظهرت الانعزالات فى نسلها عند تلقيحها ذاتياً كانت خليطة Aa . وقد لقحت هذه النباتات ذاتها - وهى من الجيل الأول للتلقيح الرجعى الأول F_1BC_1 - رجعياً إلى الأب الرجعى AA ، وهو ما يعنى أن نباتات الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثانى - التى استخدمت هذه النباتات

الخليطة Aa فى إنتاجها - تنعزل إلى خليطة Aa وسائدة أصيلة بنسبة ١ : ١ . يستمر برنامج التربية مع هذه النباتات ، ويتبع نفس الأسلوب مع بقية التلقيحات الرجعية .

يؤدى اتباع هذه الطريقة إلى تقصير المدة اللازمة لإجراء التلقيحات الرجعية إلى النصف ، ولكنها تتطلب جهداً إضافياً فى إنتاج الجيل الثانى بعد كل تلقيح رجعى مع زيادة عدد التلقيحات التى ينبغى إجراؤها عند كل تهجين رجعى ، وزيادة أعداد النباتات التى تلزم زراعتها . ويوصى - عند اتباع هذه الطريقة - بالعدول عنها إلى الطريقة الأولى بعد كل تلقيحين رجعيين ، لانتخاب نباتات متنحية أصيلة aa ، هى التى يستمر معها برنامج التربية لى تشاهد النباتات الحاملة للصفة التى يراد نقلها - على فترات - خلال برنامج التربية .

٢- يمكن الاستمرار فى برنامج التربية كما لو كانت الصفة سائدة ، ولكن مع إجراء التلقيح الذاتى لإنتاج الجيل الثانى بعد كل تلقيحين رجعيين ، فيلقح الأب المعطى (aa) مع الأب الرجعى Aa ، ثم يلقح الجيل الأول Aa رجعياً إلى الأب الرجعى لإنتاج الجيل الأول للتلقيح الرجعى الأول F_1BC_1 الذى ينعزل إلى نباتات خليطة Aa وسائدة أصيلة AA بنسبة ١ : ١ ، وتبدو جميعها - مظهرياً - سائدة بالنسبة للصفة التى يراد نقلها . يلقح عدد كبير من نباتات هذا الجيل - رجعياً - إلى الأب الرجعى لإنتاج الجيل الأول للتلقيح الثانى F_1BC_2 . تبدو جميع نباتات هذا الجيل - مظهرياً - سائدة بالنسبة للصفة التى يراد نقلها ولكن تركيبها الوراثى يتوقف على النبات الذى استخدم فى التلقيح الرجعى الثانى : فالنباتات السائدة الأصيلة AA تعطى عند تلقيحها رجعياً نباتات سائدة أصيلة أيضاً ، أما النباتات الخليطة Aa فإنها تعطى عند تلقيحها رجعياً نباتات تنعزل إلى خليطة Aa ، وسائدة أصيلة ، بنسبة ١ : ١ : أى إن نباتات الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثانى F_1BC_2 تنعزل - عملياً - إلى خليطة Aa وسائدة أصيلة بنسبة ١ : ٢ . يلقح عدد كبير من نباتات هذا الجيل ذاتياً ؛ لإنتاج الجيل الثانى للتهجين الرجعى الثانى F_2BC_2 ، وتستبعد جميع الأنسال التى تبدو سائدة بالنسبة للصفة التى يراد نقلها ، سواء أكانت خليطة Aa ، أم أصيلة AA ، ويحتفظ فقط بالنباتات التى تحمل الصفة التى يراد نقلها ، والتى تكون متنحية أصيلة aa وتلقح هذه النباتات - رجعياً - إلى الأب الرجعى ؛ لإنتاج الجيل الأول للتلقيح الرجعى الثالث F_2BC_3 ... وهكذا . يستمر برنامج التربية على هذا النحو ، بإنتاج الجيل الثانى بعد كل تلقيحين رجعيين .

ويتعين - فى جميع الحالات - إجراء التلقيح الذاتى بعد التلقيح الرجعى الأخير ؛ لعزل النباتات التى تحمل الصفة المرغوب فيها بحالة أصيلة ؛ فلو كان التلقيح الرجعى الأخير هو السابع .. فإن نباتاته تلقح ذاتياً لإنتاج الجيل الثانى F_2BC_7 الذى تنتخب منه النباتات الحاملة للصفة المتنحية بحالة أصيلة aa ، وتلقح ذاتياً لإنتاج بذور الجيل الثالث F_3BC_7 التى تعد بذور المربى .

نقل صفة كمية

يتطلب نقل الصفات الكمية إنتاج الجيلين الثانى والثالث ، بعد كل تلقيح رجعى ؛ ليتمكن تأصيل الصفة التى يُراد نقلها فى النباتات التى تلقح رجعياً ؛ فتلقح النباتات الناتجة من أى تلقيح رجعى ذاتياً ؛ لإنتاج الجيل الثانى الذى تنتخب منه أكثر النباتات إظهاراً للصفة التى يراد نقلها ، وهى التى تلقح ذاتياً لإنتاج الجيل الثالث ؛ لتحقيق هدفين ، هما : اختبار نسل النباتات المنتخبة للتأكد من حملها للصفة ، وانتخاب نباتات أصيلة فى جميع الجينات التى تتحكم فى الصفة التى يُراد نقلها لتلقيحها رجعياً ، ويتكرر هذا الإجراء بعد جميع التلقيحات الرجعية ، بما فى ذلك التلقيح الرجعى الأخير - وليكن السابع - ثم تلقح النباتات المنتخبة من التلقيح الرجعى الأخير (أى F_3BC_7) ذاتياً لإنتاج بذور الجيل الرابع (F_4BC_7) ، التى تعد بمثابة بذور المربى .

يتبع نفس الأسلوب السابق عند الرغبة فى نقل الصفات الكمية ذات درجات التوريث المنخفضة ، ولكن يلزم - فى هذه الحالة - زراعة أعداد كبيرة من نباتات الجيلين الثانى والثالث بعد كل تلقيح رجعى ؛ لأن درجة التوريث المنخفضة تؤدى إلى صعوبة معرفة التراكيب الوراثية المرغوب فيها . وقد يتطلب الأمر إنتاج الجيل الرابع بعد كل تلقيح رجعى للتأكد من تواجد الصفة بحالة أصيلة فى النباتات المنتخبة قبل تلقيحها رجعياً .

وجدير بالذكر أن درجة توريث الصفة تعد أكثر أهمية من كونها بسيطة ، أو كمية ؛ إذ يكون من الأسهل تتبع صفة كمية ذات درجة توريث مرتفعة عن صفة بسيطة ذات درجة توريث منخفضة .

نقل صفتين أو أكثر إلى صنف واحد

إذا احتوى الصنف المعطى على صفتين هامتين أو أكثر ، ورغب المربى فى نقلها معاً

إلى الصنف الرجعى .. فإنه يسلك فى سبيل تحقيق ذلك إحدى طريقتين : هما :

١- نقل الصفات معاً فى برنامج تربية واحد :

يلزم فى هذه الحالة زراعة أعداد كبيرة من نباتات كل جيل رجعى ، وكذلك عند إنتاج الجيلين الثانى أو الثالث بعد كل تلقيح رجعى : لإتاحة الفرصة لظهور انعزالات تجمع الصفات المراد نقلها معاً . ويراعى - عند نقلها - كل ما سبق بيانه بالنسبة لنوعيات الصفات المختلفة .

٢- نقل الصفات فى برامج تربية مستقلة ومتوازية :

تعامل كل صفة مستقلة فى برنامج تهجين رجعى منفصل ، وفى نهاية البرامج .. نحصل على أصناف جديدة ، لا تختلف عن الأب الرجعى إلا فى احتواء كل منها على صفة جديدة من الصفات المراد نقلها . ويتلقيح هذه الأصناف معاً ، ثم إنتاج الجيل الثانى .. نحصل على انعزالات وراثية ، تجمع الصفات المرغوبة معاً بحالة أصيلة بالإضافة إلى بقية صفات الأب الرجعى . هذا .. ويفضل اتباع هذه الطريقة على الطريقة الأولى : لأنه قد يصعب تقييم النباتات فى كل الصفات التى يراد نقلها فى آن واحد ، ولأنها - أى الطريقة الأولى - تحتاج إلى زراعة أعداد كبيرة من النباتات بعد كل تلقيح رجعى للحصول على نبات واحد على الأقل من التركيب الوراثى المرغوب : فعلى سبيل المثال .. تلزم زراعة ٧٢ نباتاً على الأقل بعد كل تلقيح رجعى للعثور على نبات واحد - على الأقل - خليط فى أربعة عوامل وراثية - مع احتمال فشل $\frac{1}{8}$ - عند الرغبة فى نقل أربع صفات بسيطة سائدة - معاً - مرة واحدة .. بينما تلزم زراعة ٧ نباتات فقط بعد كل تلقيح رجعى للعثور على نبات واحد على الأقل خليط فى إحدى هذه الصفات - مع احتمال فشل $\frac{1}{8}$ عند الرغبة فى نقلها فى برامج تربية مستقلة ومتوازية : فيكون - بالتالى - عدد النباتات التى تلزم زراعتها فى البرامج الأربعة هو $4 \times 7 = 28$ نباتاً فقط .

تأثير الارتباط بين الصفة المنقولة وغيرها من الصفات على برنامج التربية

تنتقل الصفات المرتبطة بالصفة التى يراد نقلها بالتلقيح الرجعى - تلقائياً - مع الصفة المطلوبة جيلاً بعد جيل . وغالباً ما تكون هذه الصفات غير مرغوب فيها ، خاصة أن طريقة

التهجين الرجعى تستخدم فى نقل بعض الصفات من الأنواع البرية القريبة إلى الأنواع المزروعة ، بينما تحتوى الأنواع البرية على صفات كثيرة غير مرغوب فيها قد تكون مرتبطة بالصفات التى يُراد نقلها . وبالرغم من ذلك .. فإن فرصة التخلص من الصفات غير المرغوبة تكون كبيرة ، ويتوقف ذلك على نسبة العبور بين هذه الجينات والجين المرغوب فيه ، وعدد التلقيحات الرجعية ؛ فبافتراض قصر الانتخاب على الصفة التى يُراد نقلها فقط (أى عدم إجراء أى انتخاب ضد الصفات غير المرغوب فيها) .. فإن احتمال التخلص من الصفات المرغوبة $= 1 - (1 - c)^n$ ؛ حيث تمثل (ع) نسبة العبور ، و (ت) عدد التلقيحات الرجعية .

يبين جدول (١٢-١) احتمالات التخلص من الجينات غير المرغوب فيها فى حالتى التلقيح الرجعى لخمسة أجيال ، والتلقيح الذاتى بفرض حدوث عبور بنسب تتراوح من ٠.٠٠١ إلى ٠.٥ ، مع الانتخاب للصفة المرغوبة فقط . ويتبين من الجدول أن التهجين الرجعى يزيد من فرصة التخلص من الصفات غير المرغوبة عن التلقيح الذاتى . أما عندما يجرى الانتخاب ضد الصفات غير المرغوب فيها أيضاً .. فإن التلقيح الذاتى يزيد من فرصة التخلص منها ؛ لأن العبور يمكن أن يحدث - فى هذه الحالة - بين الصفة المرغوبة وغير المرغوبة فى كلا الأبوين ، بينما لا يحدث العبور - فى حالة التلقيح الرجعى - سوى فى الأب الرجعى فقط .

جدول (١٢-١) : احتمال التخلص من الجينات غير المرغوبة المرتبطة مع الجين الذى يُراد نقله فى حالتى التلقيح الرجعى لخمسة أجيال ، والتلقيح الذاتى مع الانتخاب للصفة المرغوبة فقط (عن Allard ١٩٦٠).

احتمال التخلص من الجينات غير المرغوبة

نسبة العبور	عند إجراء خمسة تلقيحات رجعية	فى حالة التلقيح الذاتى
٠.٥٠	٠.٩٨	٠.٥٠
٠.٢٠	٠.٧٤	٠.٢٠
٠.١٠	٠.٤٧	٠.١٠
٠.٠٢	٠.١١	٠.٠٢
٠.٠١	٠.٠٦	٠.٠١
٠.٠٠١	٠.٠٠٦	٠.٠٠١

برنامج التهجين الرجعى مع مختلف العشائر النباتية

عشائر النباتات الذاتية التلقيح

ينطبق كل ما سبق بيانه عن التربية بالتهجين الرجعى على عشائر النباتات الذاتية التلقيح . ويراعى - عندما تتكون العشيرة من عدد من السلالات النقية - وهو ما يحدث غالباً - أن يستعمل عدد من نباتات الأب الرجعى فى كل تلقيح رجعى ، للإبقاء على أكبر قدر من التباينات التى قد توجد فيه .

عشائر النباتات الخلطية التلقيح

تستخدم طريقة التهجين الرجعى فى تحسين السلالات المرباة تربية داخلية من عشائر النباتات الخلطية التلقيح ، وتكون طريقة التربية - فى هذه الحالة - مماثلة تماماً للطريقة التى تتبع مع النباتات الذاتية التلقيح . أما عند تحسين عشائر النباتات الخلطية التلقيح بطريقة التهجين الرجعى .. فإنه تلزم مراعاة أمرين ؛ هما :

١- تكون عشائر النباتات الخلطية التلقيح على درجة عالية من عدم التجانس الوراثى highly heterogenous ؛ لذا .. يجب استخدام عدد كبير من نباتات الصنف الذى يُراد تحسينه ؛ لتمثيل ما توجد به من اختلافات وراثية ، وللمحافظة على نسب الأليلات allelic frequencies للمواقع الجينية المختلفة فى العشيرة .

٢- تفقد بعض المحاصيل الخلطية التلقيح قوة نموها بسرعة شديدة بالتربية الداخلية ، وتصعب - فى هذه الحالات - نقل الصفات الكمية ، والصفات ذات درجات التوريث المنخفضة ، وهى التى تتطلب إجراء التلقيح الذاتى لإنتاج الجيل الثالث - وربما الرابع - بعد كل تلقيح رجعى ؛ ذلك لأن التربية الداخلية تؤدي إلى تدهور النباتات ، مع صعوبة تمييز التراكيب الوراثية المرغوبة .

وقد اتبعت طريقة التهجين الرجعى فى تحسين عديد من النباتات الخلطية التلقيح ؛ مثل القرعيات (القرع ، والخيار ، والشمام ، والبطيخ) ، والبرسيم الحجازى . لإدخال صفات مهمة إليها ، خاصة صفات المقاومة للآفات ؛ فأمكن فى البرسيم الحجازى - مثلاً - إدخال صفات المقاومة لأمراض الذبول البكتيرى ، واثبياض ، وتبقع الأوراق إلى الصنف

كاليفردى Caliverde ، وقد استخدم فى هذا البرنامج أكثر من ٢٠٠ نبات من الأب الرجعى فى كل تهجين رجعى .

عشائر النباتات الخضرية التكاثر

يستحيل إجراء التربية بطريقة التهجين الرجعى - كما سبق بيانها فى هذا الفصل - لنقل صفة من صنف غير مرغوب فيه إلى صنف مرغوب فيه ، يكثر - تجارياً - بطرق التكاثر الخضرى ؛ ذلك لأن مثل هذه النباتات تكون خليطة (غير متماثلة) Heterozygous بدرجة عالية (يراجع لذلك الفصل الثالث) ، ويؤدى اللجوء إلى التكاثر الجنسى - كما هو متوقع عند التربية بطريقة التهجين الرجعى - إلى ظهور انعزالات وراثية كثيرة ، يصل عددها إلى ٣^٥ ؛ حيث تمثل (ن) عدد المواقع الجينية الخلية فى الأب الرجعى ، وهى التى يمكن أن تزيد على مئة جين ، ويتبين من ذلك .. استحالة العثور على التركيب الوراثى المماثل للأب الرجعى بعد التلقيح الرجعى ، فضلاً على عدم العلم أصلاً بهذا التركيب الوراثى فى كُليته . كما يؤدى التلقيح الرجعى (وهو بين نباتات، منتخبة خلية والأب الرجعى ، وهو خليط أيضاً) إلى ظهور بعض الانعزالات الوراثية الاصلية ، مما يؤدى إلى ضعف قوة النمو .

وخلاصة القول إنه يستحيل إنتاج صنف جديد من محصول خضرى التكاثر - بطريقة التهجين الرجعى - يكون مماثلاً للصنف الأسمى (الرجعى) فى جميع الصفات ما عدا الصفة التى يراد نقلها إليه .

هذا .. إلا أن طريقة التهجين الرجعى تستخدم مع المحاصيل الخضرية التكاثر لنقل صفات مرغوبة من الأنواع البرية ، أو من أصناف غير محسنة إلى جيرمبلازم محسن ، فيلقح الصنف التجارى (الأب الرجعى) مع السلالة المحتوية على الصفة التى يراد نقلها (الأب المعطى) ويستمر برنامج التربية - بعد ذلك - كالعادة ، وإذا حدث تدهور فى قوة النمو يستخدم صنف محسن جديد من نفس النوع المحصولى فى كل تهجين رجعى . وتؤدى الطريقة فى كلتا الحالتين إلى إدخال الصفة المرغوبة فى تراكيب وراثية جديدة كثيرة محسنة ، يمكن انتخاب أفضلها ، وإكثاره خضرىاً ليصبح صنفاً جديداً . ولكن هذا الصنف الجديد لا يكون مماثلاً للصنف الأسمى (الرجعى) ، وقد اتبعت هذه الطريقة فى تحسين بعض المحاصيل التى تتكاثر خضرىاً مثل البرتقال والجريب فروت .

مزايا التربية بطريقة التهجين الرجعى وعيوبها

توفر طريقة التهجين الرجعى المزايا التالية :

- ١- تعطى نتائج يمكن التنبؤ بها وتكرارها .
 - ٢- تعد طريقة سريعة للتربية ؛ حيث تتطلب عدداً أقل من الأجيال ، مع زراعة عدد أقل من النباتات فى كل جيل ، عما فى طرق التربية الأخرى .
 - ٣- تفيد هذه الطريقة فى إضافة صفات جيدة باستمرار إلى صنف ناجح ، كما تفيد - بالتالى - فى خفض عدد الأصناف المتداولة من المحصول .
 - ٤- يمكن تنفيذ برنامج التربية بالتهجين الرجعى فى ظروف مخالفة للظروف التى يزرع فيها المحصول ؛ كأن يجرى فى البيوت المحمية ، أو فى مناطق أخرى غير مناطق إنتاج المحصول .
 - ٥- تجعل هذه الطريقة إجراء اختبارات الجودة على صفات الأب الرجعى غير ضرورية ، بعد الانتهاء من برنامج التربية ، كما لا تتطلب إجراء تقييم موسع للصنف الجديد ، قبل نشر زراعته ، لأنه يكون ذا مواصفات معروفة مقدماً .
- ومن أهم عيوب هذه الطريقة أنها لاتمكن المربى من الحصول على تراكيب وراثية جديدة غير عادية ؛ لأن الغرض منها محدد منذ البداية .

الفصل الثالث عشر

الطفرات

تعرف الطفرة بأنها أى تغير فجائى فى التركيب الوراثى للفرد ، يترتب عليه تغير مُناظر فى شكله الظاهرى . ويوجد نوعان من الطفرات هما :

١- الطفرات العاملة Intragenic Mutations ، أو Gene Mutations :

وهى الطفرات التى تتضمن تغيرات فى التركيب الجزيئى للجين ، يترتب عليها تغيرات فى نشاطه ، ويستدل على هذه النوعية من الطفرات من الأثر الذى تحدثه فى الشكل المظهرى للأفراد الحاملة لها .

٢- الطفرات غير العاملة Extragenic Mutations :

وهى الطفرات التى تتضمن تغيرات كروموسومية عديدة أو تركيبية ؛ مثل حالات التضاعف ، والنقص والإضافة ، والانقلابات ، والانتقالات الكروموسومية ... إلخ . ويمكن الاستدلال على هذه النوعية من الطفرات بالدراسات السيتولوجية ، ومن الأثر الذى تحدثه فى الشكل المظهرى للأفراد الحاملة لها .

تحدث الطفرات تلقائياً فى الطبيعة ، وتختلف معدلات حدوثها ، باختلاف الأنواع النباتية ، وباختلاف الصفات فى النوع الواحد ، وتعد هى الأصل فى جميع الاختلافات

الوراثية المشاهدة ، ويرجع إليها الفضل الأكبر في تطور محاصيلنا الزراعية ، وتحسينها . وقد حاول الإنسان - كذلك - استحداث الطفرات بواسطة العوامل المطفرة Mutagenic Agents ؛ بهدف استحداث تغيرات وراثية ، يمكن الاستفادة منها في برامج التربية .

أنواع الطفرات غير العارلية

يطلق على الطفرات غير العارلية - سواء أكانت طبيعية أم مستحدثة - أسماء مختلفة، منها الاختلافات الكروموسومية العددية ، والتركيبية (وهي التحويلات الكروموسومية Chromosomal Aberrations) ويتطلب النوع الثاني حدوث كسر في موضع واحد أو موضعين في كروموسوم واحد أو في كروموسومين . تبدو أطراف الكروموسومات التي كسرت - حديثاً - كأنها لزجة ؛ لأن هذه الأطراف تميل إلى الالتحام ثانياً مع بعضها ، لكن الالتحام قد يحدث مع أى طرف كروموسومى آخر مكسور . وينشأ من ذلك عدد من الاختلافات الكروموسومية التركيبية ، هي :

النقص أو الاقتضاب

تظهر حالات النقص أو الاقتضاب Deficiency إذا فقدت قطعة من الكروموسوم . فإذا فصلت قطعة كروموسومية عن جزء الكروموسوم الحامل للسنترومير .. فإن هذه القطعة اللاسنتروميرية (أى التي لاتحمل السنترومير) تصبح غير قادرة على التوجه نحو أى من قطبي الخلية ، وتبقى سابحة في السيتوبلازم ، إلى أن تفقد بعد تكوين الغشاء النووي .

وقد يحدث كسر واحد عند أحد طرفي الكروموسوم ؛ وبذا .. يكون النقص طرفياً terminal ، أو قد يحدث كسر ، وتفقد القطعة الوسطية ، ويلتحم الطرفان المكسوران ؛ وبذا .. يكون النقص وسطياً intercalary ، ويعرف بالاقتضاب ، وتكون غالبية أنواع النقص الكروموسومى من النوع الوسطى . وتتكون حالات النقص الكروموسومى فى أثناء الانقسام الاختزالي للنباتات الخليطة فى الانتقالات ، أو الانقلابات الكروموسومية . كما تظهر طبيعياً ، أو بعد المعاملة بالعوامل المطفرة . ويبين شكل (١٣ - ١٨) السلوك السيتولوجى للكروموسومات فى حالة النقص الكروموسومى .


ونجد فى حالات النقص الكروموسومى أن الجينات التى كانت تحمل على القطعة

أ- التقوس

١ كروموسوم به ١ جينات

٢ كسور كروموسومية في موقعين

٣ فقد الجزء CD والتحام الطرفين المكسورين



ب- الإضافات

١ A B C D E F


٢ A B C C D E F

مضاعفة أحد الجينات

ج- الانقلاب

١ كروموسوم عادي

٢ انقلاب



الاقتران الكروموسومي في الانقسام الاختزالي

١- زوجان من الكروموسومات العادية

A B C D E F A B C D E F

٢- انتقال أصيل


A B C D E F A B C D E F

يكون التئام الكروموسومي عاديًا في الانقسام الاختزالي

٣- انتقال خليط

A B C D E F A B C D E F

٤- الاقتران الكروموسومي في الانقسام الاختزالي



شكل (١-١٢) : كيفية حدوث التغيرات الكروموسومية (النقص ، والإضافة ، والانقلاب ، والانتقالات) ويظهر الكروموسومات في النور التزاحشي من النور التمهيدى للانقسام الاختزالي .

الكروموسومية المفقودة قد فقدت تبعاً لذلك ، وقد يحدث ذلك تأثيراً ضاراً ، ولكن الأمر يتوقف على الأهمية الفسيولوجية للجينات التي فقدت . وربما يموت الفرد ، وتزداد احتمالات ذلك فى الأفراد الأصلية فى الاقتضاب عما فى الأفراد الخليطة . وتنطبق المبادئ نفسها على الجاميطات الحاملة للاقضاب ، إلا أن الجاميطات المؤنثة تكون أكثر قدرة على البقاء من الجاميطات المذكرة . وتعطى الاقتضابات غير المميتة مظاهر غير عادية ، وتظهر الصفات التى تتحكم فيها الأليلات المتنحية ؛ نقيجة لغياب الأليل السائد (hemizyosity) ، وتعرف هذه الحالة بالسيادة الكاذبة Pseudodominance .

ويستفاد من حالات النقص الكروموسومى فى رسم الخريطة الكروموسومية ، على اعتبار أن غياب أليل سائد من مقطع كروموسومى يسمح للأليل المتنحي الذى قد يوجد فى الكروموسوم المماثل بإظهار تأثيره ، وتكون نسب الانعزالات فى هذه الصفة مختلفة فى الأفراد الخليطة فى حالات النقص الكروموسومى ، عما فى الأفراد العادية .

الإضافة

تتكون حالات الإضافة Duplication عندما يحتوى الكروموسوم على مقطع مكرر أكثر من مرة ، وهى تظهر فى أثناء الانقسام الاختزالى للنباتات الخليطة فى الانتقالات أو الانقلابات الكروموسومية . وتستعمل الإضافة فى دراسة العلاقة الكمية لتأثير جين معين ، وسواء أكانت الإضافة أصيلة ، أم خليطة .. فلا يكون لها - عادة - أى تأثير ضار على الفرد . ولكن الإضافة تغير - فى كثير من الأحيان - من الشكل الظاهرى لبعض الصفات ، وهو ما يعرف بالتأثير الموضعى Position Effect ، كما تغير الإضافة من النسب المندلية العادية ، وتكون حبوب اللقاح المحتوية على الإضافة - عادة - أقل حيوية من حبوب اللقاح الطبيعية ، ولكن لم يلاحظ أى تأثير ضار للإضافة فى حيوية البويضات .

الانتقالات الكروموسومية

يوجد نوعان من الانتقالات الكروموسومية Translocations ، هما :

١- انتقال بسيط simple translocation :

تنشأ حالات الانتقال البسيط عندما تكسر قطعة كروموسومية ، وتنتقل إلى كروموسوم

آخر غير مماثل له . لكن يلزم - فى هذه الحالة - حدوث كسر فى طرف الكروموسوم الذى انتقلت إليه القطعة الكروموسومية ؛ لأن أطراف الكروموسومات المكسورة لاتتصل إلا بأطراف كروموسومية مكسورة أيضاً . ولا يعد هذا النوع من الانتقالات الكروموسومية شائعاً .

٢- الانتقال المتبادل reciprocal translocation :


تنشأ حالات الانتقال المتبادل حينما تتبادل أجزاء متساوية أو غير متساوية بين كروموسومين غير متماثلين . وقد يكون الانتقال خليطاً أو أصيلاً . ويؤدى الانتقال المتبادل إلى تغير الارتباط ، لأن القطعة المتبادلة تصبح - بما تحمله من جينات - مرتبطة بمجموعة جديدة من الجينات ، كما أن الأفراد الخليطة للانتقال فى كروموسومين ، تكون نصف عقيمة ؛ بسبب حالات النقص والإضافة الكروموسومية التى تظهر فى الجاميطات . وتزيد نسبة العقم على ٥٠٪ ، إذا شمل الانتقال أكثر من كروموسومين .

يبين شكل (١٣-٢) طريقة تزاوج الكروموسومات فى حالة الانتقال المتبادل ، وأنواع الجاميطات التى تتكون بعد انعزال الكروموسومات ؛ فالكروموسومات تتزاوج على شكل صليب لكى تقترب الأجزاء المتناظرة من بعضها ، ثم تنعزل الكروموسومات - بعد ذلك - بواحدة من طرق ثلاث ، هى الانعزال المتقابل ، أو الانعزال المتجاور ، مع وجود طريقتين للانعزال المتجاور ، كما هو مبين فى الشكل . وتنتج نصف الجاميطات من حالات الانعزال المتقابل ، وتكون خصبة ، بينما ينتج النصف الآخر من الجاميطات من حالتى الانعزال المتجاور ، وتكون عقيمة لما تحتويه من حالات إضافة أو نقص كروموسومى . ويكون عقم هذه الجاميطات تاماً بالنسبة لحبوب اللقاح ، بينما قد تكون بعض البيضات خصبة ، ويمكن تلقيحها بحبوب لقاح من تلك التى تنتج من الانعزال المتبادل ، وهو مايسمح بإنتاج نباتات بها نقص أو إضافة فى كل جيل .


هذا .. ويستفاد من حالات الانتقالات الكروموسومية فيما يلى :

أ - الدراسات الوراثية :


يستفاد من حالات الانتقالات الكروموسومية فى دراسة وضع السنتروميرات وغيرها من المناطق الكروموسومية المميزة سيتولوجياً بالنسبة للجينات ، ومعرفة المجموعة





الانعزال المتقابل




(١) الانعزال المتجاور




(٢) الانعزال المتجاور



جاميطات كاملة



جاميطات بها
نقص مزدوج



جاميطات بها
نقص مزدوج

حية

غير حية

غير حية

شكل (١٣ - ٢) : كيفية اقتران الكروموسومات وانعزالها في الانقسام الاختزالي الأول في حالة الانتقال الكروموسومي المتبادل . يراجع المتن للتفاصيل .

الارتباطية التى تنتمى إليها الجينات ، والمجموعة الارتباطية التى يحملها الكروموسوم ، واستقلالية المجموعات الارتباطية .

ب - إنتاج السلالات الأصلية :

أُقترح استعمال الانتقالات الكروموسومية المتعددة فى إنتاج السلالات الأصلية . ويلزم لذلك توفر سلالة تحتوى على عدة انتقالات كروموسومية ؛ بحيث تعطى حلقة من جميع الكروموسومات عندما تلقح مع نبات عادى . ويمكن إنتاج مثل هذه السلالات بتلقيح أباء تحتوى على انتقالات كروموسومية مختلفة . وإذا لقحت سلالة كهذه مع سلالة خليطة heterozygous .. فإن الجاميطات الخصبة الوحيدة التى تنتجها نباتات الجيل الأول تكون هى التى تحتوى على جميع الكروموسومات العادية (+) ، أو التى تحتوى على جميع الكروموسومات غير العادية (-) ، أى الانتقالية ؛ وعليه .. فإن التلقيح الذاتى لنباتات الجيل الأول يعنى إنتاج نسل تكون كروموسوماته إما (+ +) ، أو (+ -) ، أو (- -) بنسبة ١ : ٢ : ١ . وتكون الأفراد الطبيعية (++) أصيلة وراثياً بالنسبة لجميع الجينات ؛ وبذا .. يمكن إنتاج سلالات أصيلة فى جيل واحد .

ج - إنتاج البذرة الهجين :

اقترح استخدام الانتقالات الخليطة فى إنتاج الهجن ، علماً بأن الانتقال الكروموسومى - فى هذه الحالة - يكون فى كروموسوم زائد ، يتكون من نصفى كروموسومين غير متماثلين ، أى يكون النبات ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثالثة tertiary trisomic (يراجع لذلك الفصل الرابع عشر) .

الانقلاب

يحدث الانقلاب الكروموسومى Inversion حينما ينعكس وضع مقطع كروموسومى ١٨٠ درجة على نفس الكروموسوم ، وهو على نوعين كما يلى :

١- انقلاب سنتروميبرى pericentric inversion :

وهو الذى تشتمل فيه القطعة المنقلبة على منقطة السنتروميبر .

٢- انقلاب لاسنتروميرى paracentric inversion :

وهو الذى لاتشتمل فيه القطعة المنقلبة على منطقة السنترومير .

قد يكون الفرد أصيلاً أو خليطاً للانقلاب ، وقد يحدث انقلاب مركب ؛ فتقلب قطعة داخل الانقلاب الأول .

يؤدى الانقلاب الخليط - عادة - إلى إحداث عقم بنسبة ٥٠٪ فى كل من الجاميطات المذكورة والمؤنثة ؛ ويرجع ذلك إلى تكوين كروماتيدات ، تحتوى على إضافة أو نقص . كما يؤدى الانقلاب إلى تغيير العلاقة الارتباطية بين الجينات الموجودة على نفس الكروموسوم ؛ كذلك .. يحدث الانقلاب نقصاً كبيراً فى نسبة العبور المقدره عن طريق التراكيب العبورية ؛ ويرجع ذلك إلى قلة الحصول على هذه التراكيب فى الجاميطات المتحصل عليها ؛ إذ إن الكروماتيدات المتحصل عليها تكون دائماً غير عبورية ؛ أى يؤدى الانقلاب إلى نقص كبير فى العبور الوراثى ، دون أن يكون له بالضرورة ، أى تأثير فى العبور السيتولوجى ، ويتبين من ذلك أهم تأثير للانقلاب الخليط ، ألا وهو تقليل التراكيب العبورية أو منعها كلية . كما يحدث الانقلاب الخليط درجة من التعارض interference ؛ نظراً لأنه يؤدى إلى تقليل العبور خارج المنطقة التى حدث فيها الانقلاب ، ويستفاد من حالات الانقلاب الكروموسومى فى دراسة سلوك الكروموسومات ، وموقع الجينات على الكروموسات بالنسبة لكل من الصفات النوعية والكمية (عن طنطاوى وحامد ١٩٦٣ ، Fehr ١٩٨٧) . ولزيد من التفاصيل .. يراجع Elliott (١٩٥٨) ، و Swanson وآخرون (١٩٦٧) .

ويبين شكل (١٣-١) كيفية حدوث التحورات الكروموسومية السابقة ، ومظهر الكروموسومات فى الدور التزاوجى من الدور التمهيدى الأول للانقسام الاختزالى (عن Birkett ١٩٧٩) .

الطفرات الطبيعية

يتراوح معدل حدوث الطفرات الطبيعية Naturally Occurring Mutations فى النباتات من ٠.٠١٪ إلى ٠.٠٠١٪ من الجاميطات ، ويتوقف ذلك على النوع المحصولى والصفة ذاتها ، وتوجد حالات يكون معدل حدوث الطفرات فيها أقل ، أو أكثر من ذلك ، ويبين جدول (١٢ - ١) معدلات حدوث الطفرات الطبيعية فى بعض الجينات التى تتحكم

فى صفات الحبة فى الذرة . ويتبين من الجدول أن نسبة الطفرات المشاهدة تتراوح من أقل من واحد إلى ٤٩٢ طفرة فى كل مليون جاميطة .

جدول (١٢-١) : معدل حدوث الطفرات الطبيعية فى بعض الجينات التى تتحكم فى صفات الحبة فى الذرة .

الجين وتأثيره المظهرى	عدد الجاميطات المختبرة	عدد الطفرات المشاهدة	نسبة الطفرات لكل مليون جاميطة
R عامل يتحكم فى لون الحبة	٥٥٤٧٨٦	٢٧٢	٤٩٢
I عامل يمنع تكوين اللون	٢٦٥٣٩١	٢٨	١.٦
P ₂ لون الحبة القرمزى	٦٤٧١.٢	٧	١١
S _u الأندوسبيرم السكرى	١٦٧٨٧٣٦	٤	٢.٤
Y اللون الأصفر	١٧٤٥٢٨٠	٤	٢.٢
Sh الإندوسبيرم المنكمش	٢٢٤٩٢٨٥	٣	١.٢
Wx الإندوسبيرم الشمعى	١٥.٣٧٤٤	صفر	صفر

وقد تنشأ الطفرات فى الأنسجة الجسمية Somatic Tissues ، ويطلق عليها اسم طفرات برعمية Bud Sports أو Sport Mutations . وهى قد تكون شاملة لكل أنسجة الفرخ النامى من البرعم ، أو توجد فى بعض أنسجته فقط ، بينما تبقى بقية الأنسجة على حالتها الأصلية ، وتعرف الطفرة فى هذه الحالة باسم كيميرا Chimera .

الطفرات البرعمية والكيميرا

قد تشمل الطفرة البرعمية كل نسيج الفرخ النامى إذا حدثت فى مرحلة مبكرة من نمو البرعم ، ويؤدى ذلك إلى احتواء كل خلايا البرعم أو معظمها على هذه الطفرة ؛ فتظهر - بالتالى - فى جميع خلايا الفرخ الذى ينمو منه . ورغم انخفاض نسبة حدوث هذه النوعية من الطفرات .. إلا أنه يمكن الاستفادة منها بسهولة ؛ فالثمار التى تنتج على الفرخ المطفّر تحتوى بنورها على العامل أو العوامل الوراثية المسئولة عن الطفرة ؛ وهو ما

يعنى إمكان إكثارها جنسياً . كما يمكن باتباع طريقة التكاثر الخضرى المناسبة إنتاج سلالة خضرية جديدة من الفرخ المطفر ، يمكن أن تصبح صنفاً جديداً إذا كانت الطفرة جيدة ومرغوبة .

أما الكيميرا فإنها تظهر عندما تحدث الطفرة الجسمية فى مرحلة متأخرة من تكوين البرعم ؛ مما يؤدى إلى ظهورها فى بعض خلاياه فقط ، ويؤدى نمو هذا البرعم إلى تكوين فرخ يحتوى على الطفرة فى بعض أنسجته ، بينما تكون الأنسجة الأخرى على حالتها الأصلية . وكلما تأخر وقت حدوث الطفرة أثناء تكون البرعم .. قلت نسبة النسيج الذى يحتوى على الطفرة فى الفرع المتكون من هذا البرعم . كما قد تظهر الكيميرا فى عضو نباتى واحد ، مثل الورقة أو الثمرة ؛ فتبدو الورقة مبرقشة ، أو تحتوى الثمرة على جزء مطفر وجزء عادى ؛ كأن تحتوى ثمرة التفاح - مثلاً - على جزء حامض وجزء حلو ، أو تحتوى ثمرة الخوخ على جزء زغبى وجزء أملس . ولا يشترط لظهور الكيميرا أن تحدث الطفرة فى البرعم الإبطى الذى يعطى - عند نموه - فرخاً يحتوى على الطفرة فى بعض أنسجته ، بل إن الطفرة قد تحدث - كذلك - فى القمم النامية (البراعم القمية) للسيقان ، مما يؤدى إلى ظهور الكيميرا فجأة فى الساق بعد فترة من النمو الطبيعى . ولا تكون معظم أنواع الكيميرا ثابتة عند إكثارها . هذا .. وتظهر حالات الطفرات التى سبق ذكرها - تلقائياً - فى الطبيعة ، كما يمكن إحداثها صناعياً ، بمعاملة الأجزاء الخضرية للنبات بالعوامل المطفرة .

كيفية ظهور الكيميرا

تحتوى قمم أفرخ النباتات نوات الفلقتين من مغطاة البنور على ثلاث طبقات (توجد طبقتان فقط فى معراة البنور ونوات الفلقة الواحدة) تعرف معاً باسم تونيكـا Tunica ، تعلو كتلة من خلايا أقل تنظيماً ، تعرف باسم كورپس Corpus ، والطبقات الثلاث هى :

١- الطبقة الخارجية (تعطى الرمز L-I) :

تنقسم خلايا الطبقة الخارجية - محيطياً - بصفة أساسية ، وبذا .. تكون هى المسئولة عن تكوين طبقة البشرة ، بينما لاتسهم فى تكوين أنسجة أخرى تحت البشرة إلا فى حالات نادرة . وتنقسم خلايا هذه الطبقة قطرياً .

٢- الطبقة الوسطى (تعطى الرمز II - L) :

تنقسم خلايا الطبقة الوسطى - محيطياً - أثناء تكوين مبادئ الأعضاء النباتية ، كما تنقسم - قطرياً - عند تكوين مبادئ الأوراق ؛ وعليه .. فإن هذه الطبقة تعد مسئولة عن تكوين النسيج الوسطى (الميزوفيل) فى الأوراق ، والطبقات الخارجية من القشرة ، وبعض أجزاء الأسطوانة الوعائية ، كما تنشأ منها الخلايا الجنسية (حبوب اللقاح والبويضات).

٣- الطبقة الداخلية (تعطى الرمز III - L) :

تنقسم خلايا الطبقة الداخلية - قطرياً - بشكل أساسى ، وتكون هى المسئولة عن الزيادة فى حجم مبادئ الأعضاء النباتية . تحتفظ الخلية الخارجية - بعد كل انقسام لخلايا هذه الطبقة - بطبيعتها الميرستيمية ، بينما تصبح الخلية الداخلية جزءاً من النسيج الداخلى للعضو النباتى ، ولذا .. تعد هذه الطبقة مسئولة عن تكوين جميع الأنسجة الداخلية فى السيقان والأوراق ، بما فى ذلك الطبقات الداخلية من القشرة والأسطوانية الوعائية والنخاع .

أنواع الكيميرا


توجد ثلاثة أنواع من الكيميرا ، تظهر عند عمل قطاع فى العضو النباتى المحتوى على الطفرة . وهى :

١- الكيميرا القطاعية (أو المخروطية) Sectorial chimera :

يحتوى العضو النباتى الذى تظهر به الكيميرا القطاعية على نسيجين مختلفين فى تركيبهما الوراثى ، يكون أحدهما على شكل مخروط ، ويمتد هذا المخروط - غالباً - من البشرة إلى منتصف العضو النباتى ، سواء أكان ورقة ، أم ساقاً ، أم جذراً . وتختلف النموات التى تنتج من هذا النوع من الكيميرا تبعاً للنسيج الذى تنشأ منه . وقد تظهر مختلف أنواع الكيميرا بهذه النموات كما هو مبين فى شكل (١٣ - ٢) .

٢- الكيميرا المحيطية Periclinal Chimera :

يحتوى العضو النباتى الذى تظهر به الكيميرا المحيطية على نسيجين مختلفين فى تركيبهما الوراثى ، يحيط أحدهما بالآخر إحاطة تامة . ويتكون النسيج الخارجى - عادة -



شكل (١٢ - ٣) : تخطيط لقطاع عرضي (الدائرة الوسطى) في ساق توجد بها كيميرا مقطعية . يمثل الجزء الأبيض النسيج الذي توجد فيه الطفرة ، بينما يمثل الجزء المظلل النسيج الأصلي للنبات . يبين الشكل أنواع الكيميرا التي يمكن أن تظهر بالفروع ، التي تنمو من براعم ، تتكون في مواضع مختلفة من الساق الأصلية ، وتبين الدوائر الجانبية شكل القطاعات العرضية لهذه الفروع وهي التي تظهر بها مختلف أنواع الكيميرا (عن Hartmann & Kester ١٩٨٢) .


من طبقة واحدة إلى عدة طبقات من الخلايا ، وغالباً ما تكون الطبقة الخارجية هي التي تحتوى على النسيج المطفّر ، إلا أن الطفرة قد تكون في النسيج الداخلي في أحيان قليلة .

٢- الكيميرا الناقصة Mericlinal Chimera :

تشابه الكيميرا الناقصة مع الكيميرا المحيطية في وجود نسيجين مختلفين في تركيبهما الوراثي ، يحيط أحدهما بالآخر ، ولكن الإحاطة في حالة الكيميرا الناقصة تكون في جزء صغير فقط من النسيج الخارجى للعضو الذي تظهر به الطفرة . ويعنى ذلك أن الطفرة تكون قد حدثت أصلاً في إحدى الخلايا المستنولة عن تكوين جزء من نسيج البشرة . وتعتبر تلك هي أكثر أنواع الكيميرا - شيوماً - في الطبيعة .

ويتوقف تطور الكيميرا على النبات على موقع البراعم العرضية التي تعطى النموات الجديدة بالنسبة للنسيجين المطفّر والعادى . ويبدو ذلك جلياً في شكل (١٢ - ٣) .

وتجدر الإشارة إلى أن كيميرا التطعيم Graft Chimera تتشابه مع كيميرا الطفرات في المظهر العام ، وفي إمكان ظهور الأنواع الثلاثة من الكيميرا في أى منهما . وتحدث كيميرا التطعيم حينما ينشأ برعم من منطقة التحام الأصل بالطعم . وتتكون مثل هذه البراعم بصورة طبيعية - أحيانا - إلا أنه يمكن دفعها للظهور بقطع الطعم حتى منطقة الالتحام في النباتات الصغيرة المطعمة . ويتكون - حينئذ - نسيج كالوس Callus Tissue على السطح المقطوع ، تتكون فيه براعم عرضية ، يكون بعضها من نسيج الأصل فقط ، وبعضها من نسيج الطعم فقط ، إلا أن بعضها يتكون من نسيجى الأصل والطعم معاً ، وهى التى تعطى فروعاً تظهر فيها الكيميرا (شكل ١٣ - ٤) .



شكل (١٣ - ٤) : كيفية ظهور كيميرا التطعيم .

طرق إكثار الكيميرا

سبق أن أوضحنا أن القمة النامية في البرعم تحتوى على ثلاث طبقات من الخلايا ، وأن الطبقة الخارجية تنتج نسيج البشرة ، بينما تنتج الطبقة الوسطى النسيج التمثيلي في الورقة والأنسجة التناسلية في كل من الطلع والمتاع ، وتنتج الطبقة الثالثة الأنسجة

الداخلية ، وعليه .. فإن ظهور الطفرة فى كل خلايا الطبقة الخارجية يعنى ظهورها فى طبقة البشرة فقط ، ومثل هذه الطفرات لا تنتقل إلى الأنسجة التناسلية ، ولا يمكن إكثارها بالبذور ؛ ولكن يمكن المحافظة عليها بالإكثار الخضرى بواسطة العقل الساقية ، أو بالترقيد القمى ، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن المحافظة على هذا النوع من الطفرات بالعقل الجذرية ؛ لأن النموات الجديدة التى تتكون من العقل الجذرية تنشأ من الأنسجة الداخلية التى لا تحتوى على الطفرة .

أما إذا ظهرت الطفرة فى خلايا الطبقتين الخارجية والوسطى .. فإنها تظهر بعد ذلك فى كل من خلايا البشرة وخلايا النسيج التناسلى ، ويمكن - بالتالى - إكثار هذه النوعية من الطفرات - خضرياً بالعقل الساقية ، وجنسياً بالبذور - ولكنها -كسابقتها- لا يمكن إكثارها بالعقل الجذرية .

وإذا ظهرت الطفرة فى خلايا الطبقة الداخلية فقط .. فإنها لا توجد بعد ذلك إلا فى الأنسجة الداخلية ، ولا يمكن إكثار هذا النوع بالعقل الساقية ، أو بالبذور ، ولكنه يكثر بالعقل الجذرية التى تنشأ فيها براعم عرضية من الأنسجة الداخلية . وتعطى هذه البراعم نموات تحتوى كل خلاياها على الطفرة ، بما فى ذلك البذور التى تتكون عليها . كذلك .. يمكن إكثار الطفرات الداخلية بالعقل الساقية بعد إزالة براعمها ؛ حتى تتكون بها براعم عرضية بديلة من أنسجتها الداخلية المحتوية على الطفرة .

وجدير بالذكر .. أن جميع خلايا النبات تحتوى على نفس الجينات ، إلا أن الجين لا يظهر تأثيره إلا فى عضو نباتى معين ؛ فقد تحدث - مثلاً - طفرة خاصة بلون مختلف لبتلات الأزهار فى خلايا الطبقة الداخلية ، إلا أنها لا تظهر على النبات ، لأن بتلات الأزهار لا تتكون من خلايا الطبقة الداخلية ، ولا يمكن ظهور هذه الطفرة إلا إذا أكثر النبات الحامل لها بالعقل الجذرية ، حيث تنشأ النموات الجديدة من الأنسجة الداخلية .

وتحتوى بعض أصناف البطاطس على كيمييرا محيطية غير ظاهرة ، ويمكن التحقق من ذلك بإزالة العيون من الدرنات لدفعها إلى تكوين عيون عرضية جديدة من الأنسجة الداخلية ؛ - فمثلاً - تؤدى إزالة العيون من درنات الصنف نورتون بيوتى Norton Beauty ذى الدرنات المبرقشة إلى تكوين نموات ، تعطى درنات ذات جلد أحمر مماثلة

لدرنات الصنف تراييف Triumph ؛ وكذلك تؤدي إزالة عيون من درنات الصنف جولدن وندر Colden Wonder ذي الدرنات البنية والجلد السميك الخشن إلى تكوين نموات ، تعطى درنات ذات جلد رقيق أبيض وناعم ، معاملة لدرنات الصنف لانج ورثى Langworthy .

وجدير بالذكر .. أن حالات التبرقش Variegation - التي تشاهد في أوراق عديد من النباتات - تعد كيميائياً أيضاً ، وهي تظهر عند حدوث طفرات في الجينات السيتوبلازمية Plasmagenes (وهي التي تتحكم في الصفات التي تورث عن طريق الأمهات) ، المسؤولة عن محتوى الخلايا من البلاستيدات الخضراء ؛ فيقل محتوى الكلورفيل - بالتالي - في الخلية التي تحدث فيها الطفرة ، وفي جميع الخلايا التي تنشأ منها (Hartmann & Kester ١٩٨٣ ، Vaughn ١٩٨٣) .

أمثلة للطفرات الطبيعية في المحاصيل الزراعية

يبين جدول (١٣ - ٢) قائمة ببعض الأصناف المهمة التي ظهرت كطفرات طبيعية وانتخبت منها ، لتصبح أصنافاً جديدة (عن Elliott ١٩٥٨ ، و Edmond وآخرين ١٩٧٥ ، و Welsh ١٩٨١) .

الطفرات المستحدثة

إن الطفرات المستحدثة Induced Mutations هي التي يتم إنتاجها صناعياً عن طريق المعاملة بواسطة العوامل المطفرة Mutagenic Agents . وكانت أولى محاولات استحداث الطفرات في عام ١٩٢٧ حينما نشر Muller أن معدل الطفرات يمكن زيادته في حشرة الدروسفيلا لدى معاملتها بأشعة إكس X - rays ، ثم حصل Stadler على نتائج مماثلة على نبات الشعير في العام التالي ، وقد أعقب ذلك محاولات كثيرة جادة لاستحداث الطفرات في المحاصيل الزراعية بغرض تحسينها ، ويستخدم لذلك نوعان رئيسيان من العوامل المطفرة Mutagenic Agents هما : الأشعة ، والمركبات الكيميائية .

أهمية استحداث الطفرات

إن الفائدة الرئيسية التي ترجى من محاولات استحداث الطفرات صناعياً هي

جدول (١٣-٢) : قائمة ببعض الأصناف الهامة التي نشأت كطفرات طبيعية ، ثم أكثر لتصبح أصنافاً جديدة .

المحصول	الصنف الأصلي	الصنف المنتخب كطفرة	الصفات المميزة للطفرة
التفاح	Delicious	Starking	ثمرة جذابة اللون
	Northern Spy	Graham	
الخوخ	Halehaven	عدة أصناف	النمو المتدمج المتقدم
		Early Halehaven	التبكير في النضج
		Washington Navel	خلو الثمرة من البذور
	Washington Navel	Robertson Navel	اللب الجذاب
الجريب فروت		Thompson	اللب الوردي اللون
	Thompson	Thompson Seedless	خلو الثمرة من البذور
	Thompson Seedless	Texas Seedless	اللب الجذاب
	Emperor	Seedless Emperor	خلو الثمرة من البذور
العنب		Thompson Seedless	خلو الثمرة من البذور
	Little Stem Jersey	Orils	ارتفاع محتوى الكاروتين
البطاطا	Nancy Hall	Red Nancy	ارتفاع محتوى الكاروتين
	Centennial	Rose Centennial	الجلد ذو لون وردي فاتح
البطاطس	De Sota	Red Desota	الجلد ذو لون أحمر جذاب
	Burbank	Russet Burbank	الجلد ذو ملمس خشن جذاب
	Early Rose	Clobber	
	Triumph	Red Triumph	الجلد ذو لون أحمر
	Warba	Red Warba	الجلد ذو لون أحمر
	Sebago	Russet Sebago	الجلد ذو ملمس خشن مرغوب
النورد	Pontiac	Red Pontiac	الجلد ذو لون أحمر
	Briarcliff	Better Times	بتلات الزهرة ذات لون أحمر قاتم

الحصول على اختلافات وراثية جديدة ، يمكن استخدامها فى برامج التربية لإنتاج أصناف جديدة محسنة ، إلا أن فريقاً من العلماء يرون أن الطفرات الطبيعية تحدث بصفه دائمة ، وأنها حدثت مرات عديدة خلال آلاف السنين التى زرعت فيها محاصيلنا الزراعية ، وأن الطبيعة والإنسان قد قاما - دائماً - بانتخاب أفضلها وأكثرها تأقلاً مع الظروف البيئية ؛ أى إن كل الطفرات التى نحاول استحداثها لابد أن تكون موجودة بالفعل فى الجيرمبلازم المتوفر لدينا ، ولا يتطلب الأمر أكثر من تقييم هذا الجيرمبلازم ، للبحث عن الصفات المرغوبة . ومما يؤيد هذا الاعتقاد .. أن الغالبية العظمى من الطفرات المستحدثة تكون لصفات غير مرغوبة ؛ حيث تزيد كثيراً نسبة الطفرات غير المرغوبة (الضارة) إلى الطفرات المرغوبة (المفيدة) - لدى استعمال أشعة إكس - عن ٨٠٠ : ١ .

وتجدر الإشارة إلى أنه لايمكن توجيه العوامل المطفرة نحو جين معين لتغييره وإنتاج أليل جديد منه ، وإنما تحدث الطفرات بصورة عشوائية ، ويكون للظروف السابقة للمعاملة تأثير بالغ فى مدى الاستجابة لها . ومن أهم العوامل المؤثرة التغذية المعدنية للنبات ، والتضاعف Polyploidy . هذا .. ولاتجب التربية باستحداث الطفرات إلا بعد أن يعجز المربي عن تحسين المحصول بالطرق الأخرى .

مدى سلامة التربية بالطفرات لمختلف المجاميع المحصولية

تعد النباتات الذاتية التلقيح أكثر المجاميع المحصولية ملائمة للتربية بالطفرات ؛ لأن الطفرات المتنحية تنعزل فيها بحالة أصيلة فى الجيل التالى ، دونما حاجة إلى إجراء التلقيح الذاتى يدوياً ، بالإضافة إلى أنها متجانسة ولايجدى معها الانتخاب إلا بعد استحداث الاختلافات الوراثية فيها ؛ كما يمكن التعرف على الطفرات التى تظهر فيها بسهولة ؛ لأنها صادقة التربية .

كما تناسب التربية بالطفرات النباتات الخضرية التكاثر ؛ لأن النباتات التى تظهر بها طفرات مرغوبة يمكن إكثارها خضرياً ؛ لتصبح صنفاً جديداً . وتجدر الإشارة إلى أن التربية بالطفرات فى المحاصيل الخضرية التكاثر تعادل فى تأثيرها التربية بطريقة التهجين الرجعى فى المحاصيل الجنسية التكاثر ؛ ذلك لأن الإكثار الخضرى للطفرة يجعل منها صنفاً جديداً مشابهاً تماماً للصنف الأصيل (الذى عومل بالعوامل المطفرة) ، فيما عدا الصفة المرغوبة وهى الطفرة .

كذلك .. تتبع التربية بالطفرات فى تحسين نباتات الزينة ، إذ إن التشوهات التى قد تحدثها المعاملة بالعوامل المطفرة قد تكون - فى حد ذاتها - صفات مرغوبة فى هذه النباتات .

أما المحاصيل الخلطية للتلقيح .. فلا تناسبها التربية بطريقة الطفرات ، لما تتطلبه من جهد كبير لتلقيح أعداد كبيرة منها ذاتياً ؛ لعزل الطفرات المتنحية بحالة أصيلة ، كما تكثر بها الاختلافات الوراثية بطبيعتها . وبالرغم من ذلك .. فقد أمكن الوصول إلى نتائج مرضية مع هذه النباتات عند زراعتها متجمعة in bulk .

وتجدر الإشارة إلى أنه يكون من الأسهل اكتشاف الطفرات فى الصفات النوعية البسيطة عما فى الصفات الكمية التى يتحكم فيها عدد كبير من العوامل الوراثية .

هذا .. وتختلف الحساسية للعوامل المطفرة باختلاف الأنواع النباتية . وقد بين كثير من أن النباتات ذات الكروموسومات الكبيرة أكثر حساسية من النباتات ذات الكروموسومات الصغيرة ، بينما تقل الحساسية فى النباتات المتضاعفة عما فى أصولها الثنائية ، وفى الهجين عما فى أبائها ، وتزيد معدلات استحداث الطفرات فى العشائر القليلة التجانس عما فى السلالات النقية .

تأثير العوامل المحدثّة للطفرات

يكون للعوامل المحدثّة للطفرات تأثيرات فسيولوجية ، وأخرى وراثية على النباتات المعاملة .

١- التأثير الفسيولوجى :

تحدث معظم العوامل المطفرة تأثيرات فسيولوجية فى النباتات المعاملة ، تظهر على شكل زيادة فى قوة النمو النباتى فى الجيل المعامل ، فتؤدى معاملة البذور إلى زيادة فى قوة نمو البادرات التى تنمو منها ، وتؤدى معاملة الأجزاء الخضرية المستخدمة فى التكاثر إلى زيادة فى قوة نمو النباتات التى تنتج منها ، مع زيادة فى سمك الأوراق أو ظهور تعريق غير عادى بها . ويختفى هذا التأثير الفسيولوجى فى مرحلة متأخرة من حياة النبات ، ولا يظهر فى الجيل التالى ، سواء أكان التكاثر جنسياً ، أم خضرياً . ولا يمكن

التمييز بين التأثير الفسيولوجى للعوامل المطفرة ، والطفرات الحقيقية إلا فى الجيل الثانى بعد المعاملة .

٢- التأثير الوراثى :

تحدث المعاملة بالعوامل المطفرة تأثيرات وراثية تكون على شكل طفرات عاملية ، أو تحورات كروموسومية أو كليهما معاً . وتكون معظم الطفرات ضارة ، وغالبيتها متنحية ، خاصة فى النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية ، بينما تكثر الطفرات السائدة سيادة تامة أو جزئية فى النباتات المتضاعفة ، ويدل عديد من الدراسات على أن كثيراً من الطفرات التى يحدثها الإشعاع تكون على صورة نقص فى جزء صغير من الكروموسوم ، إلا أنه حدث ارتداد للحالة الأصلية فى بعض الطفرات ؛ مما يدل على عدم صحة الرأى القائل بالنقص الكروموسومى ، وإذا حدثت الطفرات نتيجة للنقص الكروموسومى .. فإنها تكون غير ذات قيمة فى تحسين المحصول . ويكون لبعض الطفرات تأثير متعدد Pleiotropic ، ويكون بعضها مرتبطاً بطفرات أخرى ، كما يمكن أن تحدث الطفرات فى الصفات الكمية ؛ ومن أمثلة ذلك أنه أمكن الحصول على سلالات من الفول السودانى - بعد معاملته بالإشعاع - كانت أعلى محصولاً من الصنف الأصلى . أما التحورات الكروموسومية .. فإنها تكون ذات تأثير سلبي غالباً ، إلا أنها تسمح للمربى بتغيير تركيب الكروموسومات بالطريقة التى يراها مفيدة لتحقيق أهداف برنامج التربية .

كيفية حدوث الطفرات

يحدث التأثير المطفر للمعاملة بالعوامل المطفرة بإحدى طريقتين أو بكليتهما ، كما يلى :

١- التأين Ionization :

يحدث التأين حينما تتصادم الأشعة ذات الموجات الضوئية القصيرة جداً مع الذرات التى يتكون منها النسيج النباتى المعامل ؛ حيث يؤدى هذا التصادم إلى إطلاق أليكترونات من هذه الذرات مخلقة وراءها أيونات . وتتصادم الأليكترونات المنطلقة بدورها ، مع ذرات وجزيئات أخرى ؛ لتخلف وراءها مزيداً من الأيونات ، وينطلق منها مزيد من الأليكترونات ؛

وبذا .. تتجمع الاليكترونات فى مسار الأشعة ، وتكون الذرات المتأينة أكثر قابلية للتفاعلات الكيميائية ، وإذا حدث ذلك فى الذرات التى يتكون منها جزئى الحامض النووى DNA .. فإنه يؤدى إلى ظهور الطفرات .

وتختلف الطريقة التى يحدث بها التأين باختلاف الأشعة المؤينة ؛ فتحدث الأشعة الجزيئية Particulate radiation تأثيرها عندما يمر جزئى سريع ذو شحنة موجبة فى المادة ؛ حيث يقوم بجذب اليكترون من مدار إحدى الذرات ؛ فتصبح تلك الذرة أيوناً موجباً . أما الأيون المنطلق منها .. فإنه يتصل بذرة أخرى ، فتصبح بذلك أيوناً سالباً . أما النيوترونات السريعة الحركة .. فإنها تتصادم مع نواة الذرة ؛ مما يؤدى إلى إثارتها ، وانطلاق الجزيئات الموجبة الشحنة منها ، وهو ما يؤدى إلى مزيد من التأين بإزالة الأليكترونات من المدار الخارجى للذرات أخرى ... وهكذا . أما الأشعة الكهرومغناطيسية .. فإنها تحدث التأين بطريقة ثانوية ؛ حيث تؤدى الطاقة التى يكتسبها الوسط من هذه الموجات إلى إحداث حالة من عدم الثبات ، يتبعها فقدان أليكترونات من المدارات الخارجية للذرات ، تحدث بدورها مزيداً من التأين .

٢- الإثارة Excitation :

تحدث الإثارة عند المعاملة بالأشعة فوق البنفسجية ؛ حيث تمتصها البيورينات purines والبيريميدينات pyrimidines التى توجد فى الحامض النووى DNA ، وتؤدى الأشعة إلى رفع أليكترونات الذرات التى تكون فى طريقها إلى مدارات أعلى يكون مستوى الطاقة فيها أكبر وتكون هذه الذرات المثارة أكثر قابلية للتفاعلات الكيميائية ، وهو ما يزيد من فرصة حدوث الطفرات (Gardner & Sunstad ١٩٨٤) .

الأشعة المحدثه للطفرات

يعد الإشعاع Radiation من أهم العوامل المطفرة ؛ حيث تحدث الأشعة فوق البنفسجية وجميع أنواع الأشعة ذات الموجات الضوئية الأقصر منها طفرات فى الكائنات الحية التى تتعرض لها .

تقسيم الأشعة حسب طريقة تأثيرها

تقسم الأشعة حسب طريقة تأثيرها إلى مجموعتين هما :

- ١- الأشعة غير المؤينة Non - ionizing Radiations : ومن أمثلتها الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet Rays .
- ٢- الأشعة المؤينة Ionizing Radiations : ومن أمثلتها : أشعة ألفا alpha rays ، وأشعة بيتا beta rays ، وأشعة إكس X-rays ، وأشعة جاما gamma rays ، والنيوترونات neutrones .

تعتبر النظائر المشعة Isotopes من أهم مصادر الأشعة المؤينة ؛ إذ إنها تنتج طاقة في صورة جزيئات particles ، أو موجات waves ، وكلاهما يعد إشعاعاً radiation . تكون الجزيئات المنطلقة من العناصر المشعة ذات طاقة عالية ، ويمكنها أن تنقل طاقتها الكامنة هذه إلى أى وسط تمر فيه ، وتعرف هذه الأشعة باسم الأشعة الجزيئية Particulate or corpuscular radiations . أما الموجات التي تنطلق من العناصر المشعة .. فإنها تكون قصيرة جداً ، وذات طاقة عالية أيضاً ، وتحدث اضطرابات كهربائية ومغناطيسية في تركيب الوسط الذي تمر فيه ، وتعرف هذه الأشعة باسم الأشعة الكهرومغناطيسية electromagnetic raditions .

وتشتمل الأشعة الجزيئية Corpuscular Radiations على كل من النيوترونات البطيئة slow neutrons ، وجزيئات ألفا ، وبيتا . أما الأشعة الكهرومغناطيسية .. فإنها تتضمن كلا من أشعة x ، وأشعة جاما .

وحدات قياس الأشعة المؤينة

تستخدم الوحدات التالية في قياس جرعات الأشعة المؤينة :

- ١- الرونتجن Rontgen (r) : تقاس به جرعات أشعة إكس ، وأشعة جاما خاصة في الهواء .
- ٢- مكافئ الرونتجن الفيزيائي Rontgen Equivalent Physical (rep) : تقاس به الأشعة الجزيئية particulate irradiation ، خاصة في الأنسجة الطرية soft tissues

فى الدراسات البيولوجية .

٣- جرعة الإشعاع الممتصة Radiation Absorbed Dose (راد rad) : تقاس بها كل أنواع الأشعة فى الدراسات البيولوجية والفيزيائية ، وتعتبر (الراد) وحدة امتصاص ، وهى أكثر الوحدات استعمالاً .

أنواع الأشعة

فيما يلى بيان بأهم أنواع الأشعة المستخدمة فى استحداث الطفرات :

١- الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet Radiation :

تولد الأشعة فوق البنفسجية بواسطة لمبات بخار الزئبق ، وتتراوح أطوال موجاتها من ١٠٠ - ٤٠٠ مللى ميكرون ، ولكن أكثر موجاتها تأثيراً هى التى تكون بطول ٢٥٤ مللى ميكرون ؛ لأنها أكثرها امتصاصاً بواسطة البيورينات والبيريميدينات التى يتكون منها الحامض النووى DNA . وتحدث الأشعة فوق البنفسجية تأثيرها بواسطة الإثارة التى تسرع من التفاعلات الكيميائية فى الأنسجة التى تتعرض لها . وهى لاتعتبر من الأشعة المؤينة باستثناء ما يكون منها فى مدى الموجات القصيرة جداً . وتكون أغلب الطفرات التى تحدثها الأشعة فوق البنفسجية من النوع العالى ، وإذا أحدثت الأشعة كسوراً كروموسومية .. فإنها تكون طرفية عادة ، وغالباً ما يلتحم الجزء المكسور فى مكانه الأسمى ، أو يفقد بما يحمله من جينات .

ويُعاب على الأشعة فوق البنفسجية أنها لاتتعمق كثيراً فى الأنسجة المعاملة ، وهو ما يحد من استعمالها ، ويقتصر استعمالها - غالباً - على معاملة حبوب اللقاح .

٢- أشعة ألفا Alpha Rays :

يحصل على أشعة ألفا من النظائر المشعة مثل الفوسفور ٣٢ ؛ والكربون ١٤ وهى أشعة جزيئية Particulate ، وهى عبارة عن أنوية الهليوم ؛ إذ تتكون من جزيئات ، يحتوى كل منها على عدد (٢) بروتون ، و(٢) نيوترون ، وتكون - بالتالى - ذات شحنة موجبة . وهى خطيرة جداً إذا وصلت إلى جسم الإنسان ، ولكن يمكن الحماية منها بورقة رقيقة ، ولايتعدى اختراق هذه الأشعة للأنسجة النباتية أكثر من جزء صغير من المليمتر ؛ ذلك

لأنها تحمل شحنة موجبة ؛ فتقل سرعتها تحت تأثير الشحنات السالبة التي توجد في المادة . تحدث أشعة ألفا تأيئاً شديداً ، وتتسبب في حدوث تحورات كروموسومية غالباً .

٣- أشعة بيتا Beta Rays :

يُحصل على أشعة بيتا (أو أشعة الكاثود) من النظائر المشعة مثل الفوسفور المشع (^{32}P) ، والكبريت المشع (^{35}S) ، وهي أشعة جزيئية ، عبارة عن أليكترونات سريعة الحركة تقذفها أنوية الذرات غير الثابتة للعناصر المشعة . وقد تكون هذه الأشعة خطيرة على الإنسان ، ويمكن الحماية من أخطارها بلوح سميكة من الكرتون . وتخترق أشعة بيتا الأنسجة النباتية لمسافة عدة ملليمترات فقط ، لأنها تحمل شحنات سالبة ؛ فتقل سرعتها تحت تأثير الشحنات الموجبة التي توجد في المادة . وتحدث أشعة بيتا تأثيرها بطريق التأيين ، ولكن بدرجة أقل من أشعة ألفا ، وتتسبب في حدوث طفرات عاملية وتحورات كروموسومية . وتعامل بأشعة بيتا كل من البذور والبادرات ، ولكن يغلب استعمالها في معاملة البذور . وتغمر الأجزاء النباتية التي يراد معاملتها مدة مناسبة في تركيز مناسب من محلول مائي لأحد المركبات التي يدخل العنصر المشع في تكوينها ، وقد يضاف المحلول للتربة التي تنمو فيها النباتات في بعض الحالات .

٤- أشعة جاما Gamma Rays :

يُحصل على أشعة جاما من النظائر المشعة في المفاعلات النووية ؛ حيث تنطلق من العنصر المشع كوبالت ^{60}Co ، أو سيزيوم ^{137}Cs ، وهي أشعة كهرومغناطيسية ، تشبه الضوء العادي ، إلا أن طاقتها عالية ، وموجاتها أقصر بكثير ، وتعتبر بمثابة أشعة إكس طبيعية ، إلا أن موجاتها أقصر منها كثيراً أيضاً ، ولها قدرة أكبر على اختراق الأنسجة . وبينما تتراوح أطوال موجات الضوء العادي من ٤٠٠ - ٧٠٠ مللي ميكرون ، ويصل طول موجة أشعة إكس إلى ٠.٠٥ مللي ميكرون ، فإن معظم أشعة جاما تقل أطوال موجاتها عن ٠.٠٠١ مللي ميكرون ، وتعد أشعة جاما خطيرة على الإنسان ؛ إذ إنها تخترق الجسم بقوة ، ولا يمكن الحماية منها إلا بعازل من الرصاص ، يبلغ سمكه عدة سنتيمترات ، أو بعازل من الأسمنت ، يبلغ سمكه عدة أقدام .

تخترق أشعة جاما الأنسجة النباتية لعدة سنتيمترات . وتجرى معاملة النباتات وهي في

حقول المفاعلات النووية ؛ حيث تعرض للأشعة المنطلقة من مفاعل ذرى به الكوبالت المشع ^{60}Co يوجد المفاعل تحت الأرض ؛ حيث يوجد العنصر المشع فى صندوق سميك من الرصاص ، ويرفع ألياً من بعد إلى أن تتم المعاملة ، ثم يعاد إلى مكانه تحت الأرض . تحدث الأشعة تأثيراتها بطريق التآين ، وينتج عنها طفرات عاملية وتحورات كروموسومية كثيرة . تستعمل أشعة جاما فى معاملة البنور والبادرات والنباتات النامية فى الأصص فى بوانر حول المفاعل ، وتكون جرعة الإشعاع أعلى مايمكن بالقرب من المفاعل ، ونقل شدتها كلما ابتعدنا عنه .

هـ - أشعة إكس x-Rays :

تُولد أشعة إكس بواسطة أجهزة خاصة ، وهى أشعة كهرومغناطيسية ، ذات طاقة عالية ، وتنتج على مستويات مختلفة من الطاقة بحسب طول الموجة المطلوبة ، وتتراوح أطوال الموجات من ٠,٠٠٥ - ٠,٠١ ميكرون فى أشعة إكس ذات الموجات القصيرة hard x-rays إلى ٠,١ - ١,٠ مللى ميكرون فى أشعة إكس ذات الموجات الطويلة soft x-rays . وتزيد طاقة الأشعة وقدرتها على اختراق الأنسجة وإحداث التآين كلما قصرت موجاتها . وتعتبر أشعة إكس خطرة على الإنسان ؛ إذ إنها تخترق الجسم ، ويكفى للحماية منها عازل من الرصاص يبلغ سمكه عدة ملليمترات .

يبلغ مدى اختراق أشعة إكس الأنسجة النباتية من بضعة ملليمترات إلى عدة سنتيمترات ، وهى تحدث تأثيرها بطريق التآين ، وينتج عنها طفرات عاملية ، وتحورات كروموسومية . وبينما تتناسب أعداد التحورات الكروموسومية التى تحدثها أشعة إكس - لوغاريتمياً - مع الجرعة .. فإن أعداد الطفرات العاملية تتناسب - خطياً - معها ؛ لذا نجد أن العدد الأكبر من التحورات الكروموسومية التى تحدثها المعاملة يضع حداً أعلى للجرعة التى يمكن استعمالها ، وهو ما يحد من عدد الطفرات العاملية التى يمكن إحداثها .

هذا .. وتختلف الجرعة التى يتعين استعمالها من أشعة إكس باختلاف النوع النباتى وللجزء المعامل من النبات والعوامل البيئية ؛ فيمكن - مثلاً - تعريض البنور الجافة لجرعات أعلى من الأشعة عن البنور المستنبطة أو الأجزاء الخضرية ؛ لأن البنور الجافة أقل

حساسية للأشعة . والقاعدة العامة هي أن يعرض أى نسيج أو عضو نباتى إلى أكبر جرعة يمكن أن يتحملها ، دون أن تلحق به أضرار من جراء المعاملة ؛ ذلك لأن عدد الطفرات المستحدثة يتناسب - خطياً - مع الجرعة كما سبق بيانه ، وتحدد الجرعة المناسبة بواسطة تجارب أولية لكل محصول على حدة . وعلى سبيل المثال .. فإن الجرعة المناسبة قدرت بنحو ٧٥٠٠ رونتجن فى البسلة ، و ١٠٠٠٠ رونتجن فى الفاصوليا .

وتفضل أشعة إكس عن غيرها من الأشعة المحدث للطفرات ؛ للأسباب التالية :

- أ- تعتبر الأجهزة المولدة لأشعة إكس فى متناول اليد ، ويسهل تشغيلها .
 - ب- تسهل معاملة البذور والأجزاء النباتية الأخرى بالأشعة .
 - ج- من السهل تقدير الجرعة المناسبة من الأشعة وقياسها .
 - د- يمكن وقف تشغيل الأجهزة المولدة لأشعة إكس عند انتهاء المعاملة ، بخلاف العناصر المشعة التى تشع بصورة مستمرة .
 - هـ- لا توجد مشاكل تتعلق ، باستعمال أشعة إكس ؛ كتلك الخاصة بمشاكل التداول أو التلوث بالعناصر المشعة ، ويلزم - مع ذلك - الحرص عند تشغيل الأجهزة المولدة لأشعة إكس .
- وتستعمل أشعة إكس فى معاملة البذور والبادرات ، ويغلب استعمالها فى معاملة البذور .

٦- البروتونات أو الديوترونات :

تولد البروتونات أو الديوترونات بواسطة المفاعلات النووية ، وهى أشعة جزيئية ؛ عبارة عن أنوية ذرات الأيدروجين العادى بالنسبة للبروتونات ، وأنوية ذرات الأيدروجين الثقيل بالنسبة للديوترونات ، وهى خطيرة جداً على الإنسان ، ويمكن الحماية من أخطارها ؛ بعازل من الماء ، أو البارافين ، يبلغ سمكه عدة سنتيمترات ، وهى تخترق الأنسجة النباتية لعدة سنتيمترات . وتعد من الأشعة المؤينة ، وينتج عنها طفرات عاملية ، وتحورات كروموسومية .

٧- النيوترونات البطيئة والسريعة :

تولد النيوترونات - البطيئة منها والسريعة - بالتحلل النووى لعنصر اليورانيوم ٢٣٥ فى

مفاعل نووى ، وهى أشعة جزيئية عبارة عن جسيمات عديمة الشحنة ، أثقل قليلاً من البروتونات ، ولايستدل عليها إلا من أثار تفاعلها مع أنوية ذرات المادة التى تكون فى مسارها ؛ حيث تطلق البروتونات من الأنوية التى تصيبها . وهى خطيرة جداً على الإنسان ، ويمكن الحماية منها بحاجز سميك من عناصر خفيفة ؛ مثل الملح . وهى تخترق الأنسجة النباتية لعدة سنتمترات ، وتعد من الأشعة المؤينة ، وينتج عنها طفرات عاملية وتحورات كروموسومية . وتستعمل هذه الأشعة فى معاملة البنوز والبادرات ، خاصة البنوز (Elliott ١٩٥٨ ، Herskowitz ١٩٦٥ ، و Grosch ١٩٦٥ ، و Briggs & knowles ١٩٦٧ ، و Chaudhari ١٩٧١ ، و Lapins ١٩٨٣) . ولزيد من التفاصيل عن الإشعاع وتأثيره البيولوجى .. يراجع Grosch (١٩٦٥) ، و Drake (١٩٦٩) ، و Lapins (١٩٨٣) .

المركبات الكيميائية المحدثة للطفرات

تقسم المركبات الكيميائية المحدثة للطفرات - حسب فاعليتها - إلى الأقسام التالية :

١- مركبات شديدة الفاعلية فى إحداث الطفرات ، ولكنها خطيرة الاستعمال ، وسامة ، وقد تسبب الإصابة بالسرطان لو تعرض لها الإنسان ، ومن أمثلتها ما يلى :

ethylenimine (EI)

N - nitroso - N - ethylurea (NEU)

N - nitroso - N - methylurea (NMU)

1.4 - bisdiazaoacetylbutane

٢-مركبات فعالة فى إحداث الطفرات ، وشائعة الاستعمال ، ومن أمثلتها :

diethyl sulphate (DES)

ethyl methane sulphonate (EMS)

إيثيل ميثان سلفونيت

methyly methane sulphonate (MMS)

isopropyl methane sulphonate (iPMS)

azide

colchicine

الكولشيسين

٣- مركبات أقل فاعلية في إحداث الطفرات وأقل استعمالاً ، ومن أمثلتها ما يلي :

caffeine	الكافين
paraxanthine	
adenine	
formalin	الفورمالين
phenols	الفينولات
maleic hydrazide	الماليك هيدرازيد
Potassium thiocyanate	ثيوسيانات البوتاسيوم
dichloroacetone	
chloroacetone	

يعد الإيثيل ميثان سلفونيت (EMS) أهم المركبات المحدث للطفرة، وأكثرها استعمالاً ، وهو غير سام نسبياً . يستخدم المركب على صورة محلول مائي تنقع فيه البنور أو الجنور الصغيرة للنباتات التي يراد معاملتها ، وأكثر الطفرات التي يحدثها هي من النوع العاقل .

كما تقسم المركبات المحدث للطفرة حسب المجموعة الكيميائية التي تنتمي إليها إلى المجموع التالية :

١- مجموعة شبيهات القواعد Base analogues : تحل محل القواعد النيتروجينية في الأحماض النووية ، ومن أمثلتها ما يلي :

- 5-bromo-uracil
- 5-bromodexoyuridine
- 2-amino - purine

ومن المركبات القريبة من شبيهات القواعد ما يلي :

- 8- ethoxy caffeine
- maleic hydrazide

Theophylline

Paraxanthine

Theobromine

Tetramethyluric acid

Nebularine

٢- مجموعة مضادات الحيوية Antibiotics ، ومن أمثلتها ما يلي :

Azaserine

mitomycin C

streptonigrin

actinomycin D

٣- مجموعة المركبات القلوية Alkylating Agents :

تنتمي المركبات القلوية المحدث للطفرات إلى مجاميع كيميائية مختلفة : منها مركبات المسترد الكبريتية Sulfur Mustards ، ومركبات المسترد النيتروجينية Nitrogen Mustards ، والإيبوكسيدات Epoxides ، والإيثيلين إيمينات Ethyleneimines ، والكبريتات Sulfates والسلفونات Sulfonates ، والسلفونات Sulfones ، واللاكتونات Lactones ، والديازو ألكينات Diazoalkanes ، ومركبات النيتروزو Nitrozo compounds . ومن أهم المركبات الكيميائية القلوية المحدث للطفرات ما يلي :

Ethyl - 2 - chloroethyl sulfide

2- chloroethyl-dimethyl amine

Ethylene oxide

Ethyleneimine

Ethyl methanesulfonate

Diazomethane

N-ethyl-N-nitroso urea

n-Butylmethanesulphonate

cis- 1 : 4 - Dimethanesulphonoxybut - 2 - ene

p - N - di - (Choloroethy) - phenyl propionic acid

1 : 4 - Dimethanesulphonoxybutane

p - N - di (Chloroethyl) - phenylamino butyric acid

trans - 1 : 4 - Dimethanesulphonoxy but-2-ene

p - N - di - (Choloroethyl) - phenyl valeric acid

p - N - di - (Chloroethyl) - phenyl acetic acid

1 : 2 و 3 : 4 - Diepoxybutane

D : p - N - di - (Chloroethyl) - phenylalanine

L : p - N - di - (Chloroethyl) - phernylalanine

1 : 4 - Dimethanesulphonoxybut - 2 - ene

p - N - di - (Chloroethyl) - phenyl butyric acid

2 : 4 : 6- tri- (Ethyleneimino) - 1 : 3 : 5 - Triazine .

٤- مجموعة الأزيد Azide : ومن أمثلتها مايلي :

Sodium azide

٥- مجموعة الهيدروكسيل أمين Hydroxylamine .. من أمثلتها ما يلي :

Hydroxylamine

٦- مجموعة حامض النيتروز Nitrous Acid .. من أمثلتها ما يلي :

Nitrous Acid

٧- مجموعة الاكريدينات Acridines .. ومن أمثلتها ما يلي :

Acridine orange

٨- مركبات أخرى مثل :

Chloroacetone

Dichloroacetone

Potassium Thiocyanate

Ethyl Carbamate

Formalin

Phenolo (عدة فينولات)

Manganous chloride

يجب تداول جميع المركبات المحدث للطفرات بحذر شديد ؛ فتؤخذ كافة الاحتياطات ؛
كى لا تصل منها أية كمية إلى جوف الإنسان ، أو تلامس جلده ، كما ترتدى القفازات عند
زراعة البنور المعاملة .

وبصورة عامة .. فإن المركبات الكيميائية تحدث تأثيرها بطريقتى التأين والإثارة ، وينتج
عنها طفرات عاملية أكثر من التحورات الكروموسومية ، إلا أن النسبة بين نوعى الطفرات
تختلف باختلاف المركب المستعمل (Williams ١٩٦٤ ، Lapins ١٩٨٣) . ولدراسة فعل
المركبات الكيميائية المحدث للطفرات على المستوى الجزيئى .. يراجع Drake (١٩٦٩) .

برنامج التربية باستحداث الطفرات

أهداف البرنامج

لايلجأ المربي إلى التربية باستحداث الطفرات إلا بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى
الممكنة لتحسين المحصول . ويجرى برنامج التربية بالطفرات - عادة - لتحقيق واحد أو
أكثر من الأهداف التالية :

١- إحداث طفرات فى جين واحد ، أو فى عدد محدود من الجينات :

يكون ذلك هو الهدف الأمثل ، عندما يرغب المربي فى تحسين أحد الأصناف الجيدة فى
إحدى الصفات المهمة التى تنقصه ؛ خشية أن تؤدى التربية بالطرق الأخرى إلى فقدان
الصنف بعض خصائصه التى تميزه عن غيره . وكثيراً ما يفاضل المربي بين طريقتى
التربية بالتلقيح الرجعى وبالطفرات ، أخذاً فى الحسبان مدى سهولة إحداث الطفرة
المرغوبة ، ومدى ارتباطها بالطفرات الأخرى غير المرغوبة .

وتجدر الإشارة إلى أن التربية بالطفرات لاستحداث طفرة فى جين واحد .. هى
الطريقة الوحيدة الممكنة لتحسين الأصناف الممتازة من المحاصيل الخضرية التكاثر : نظراً

لأن اللجوء إلى التكاثر الجنسي عند تربيتها يعنى الابتعاد كثيراً عن التركيب الوراثى للصنف . وعملياً .. تعتبر التربية بالطفرات فى المحاصيل الخضرية التكاثر بديلة للتربية بطريقة التهجين الرجعى فى المحاصيل الجنسية التكاثر .

هذا .. وقد تستحدث الطفرات العاملة ؛ بغرض الاستفادة منها فى تحسين المحصول فى برامج التربية الأخرى .

٢- تحسين الصفات الكمية :

على الرغم من أن الصفات الكمية يتحكم فيها عدة جينات .. إلا أنه أمكن إحراز تقدم كبير فيها بالتربية بالطفرات ؛ فمثلاً .. تمكن Gregory فى عام ١٩٥٦ من إنتاج طفرات من الفول السودانى بالمعاملة بأشعة إكس ، وكانت هذه الطفرات أعلى محصولاً من الصنف الأصيل (عن Briggs & Knowles ١٩٦٧) .

٣- إحداث زيادة فى نسبة العبور :

قد يكون الغرض من تعريض النباتات للعوامل المطفرة - خاصة الإشعاع - هو إحداث زيادة فى نسبة العبور ؛ لإعطاء الفرصة لحدوث عبور بين الجينات المرتبطة بشدة وبين الجينات التى توجد فى المناطق القريبة من السنترومير ، وهى التى تقل فيها نسبة العبور الطبيعى . ويساعد العبور - فى هذه الحالات - على انعزال تراكيب وراثية جديدة ، قد يرغب المربى فى الحصول عليها .

٣- إحداث تحورات كروموسومية :

تحدث المعاملة بالعوامل المطفرة تحورات كروموسومية كثيرة يمكن الاستفادة بها فى برامج التربية ؛ فمثلاً .. أمكن - عن طريق إحداث كسور كروموسومية فى أماكن معينة من الكروموسومات - نقل صفة المقاومة لصدأ الأوراق فى القمح من أحد الأنواع البرية إلى القمح المزروع .

٤- إحداث طفرات فى الجينات السيتوبلازمية التى تتحكم فى الصفات التى تورث عن طريق الأم . ويذكر أنه حتى عام ١٩٧٣ أمكن إنتاج ٩٨ صنفاً محصولياً ، و٤٧ صنفاً من نباتات الزينة من طفرات مستحدثة . ومن الأصناف المحصولية .. أنتج ٨٥ صنفاً منها

بالانتخاب المباشر للطفرات المستحدثة ، بينما أنتجت الثلاثة عشر صنفاً الأخرى من برامج تربية ، تضمنت تهجينات بين الطفرات وأصناف - أو سلالات - أخرى (Welsh ١٩٨١).

ويمكن القول إنه فى حالات عدم وجود الصفات المرغوبة ، فى جبرمبلازم المحصول (المحلى والعالمى) ، أو عندما لا يرغب فى إحداث أى تغيير وراثى فى صنف تجارى هام (ولو بطريقة التهجين الرجعى) .. فإن التربية بالطفرات تعد هى الطريقة المثلى لتحسين المحصول وإكسابه الصفات المطلوبة . ولا يعتد - فى هذا الشأن - بانخفاض معدل حدوث الطفرات ، أو بزيادة نسبة الطفرات الضارة ، فإن طفرة واحد مفيدة من كل ألف طفرة يمكن أن تسهم فى تحسين المحصول بشكل جوهري ، خلال فترة زمنية وجيزة ، وبجهد أقل مما فى طرق التربية الأخرى .

طرق المعاملة بالعوامل المطفرة

توجد ثلاث طرق رئيسية لمعاملة النباتات بالعوامل المطفرة هى :

١ - معاملة حبوب اللقاح :

تتميز طريقة معاملة حبوب اللقاح بسهولتها وإمكان التحكم فى العوامل البيئية المحيطة من رطوبة ، وحرارة ، وضغط جوى ... إلخ ، كما تعامل كميات كبيرة من حبوب اللقاح فى حيز صغير . وتنفرد طريقة معاملة حبوب اللقاح بميزة أخرى ، وهى أن الطفرات المحدثة فى حبة اللقاح تنتقل إلى كل خلايا الجنين الذى ينشأ منها (بعد إخصابها إحدى البيضات) ، ثم إلى كل خلايا النبات الذى ينمو منه .

٢ - معاملة البذور :

تتميز طريقة معاملة البذور - مثل الطريقة السابقة - بسهولتها وإمكان التحكم فى العوامل البيئية المحيطة ، مع معاملة كميات كبيرة من البذور فى حيز صغير؛ إلا أن الطفرة إن حدثت فى إحدى خلايا الجنين فى البذرة .. فإنها لا تظهر إلا فى جزء من النبات الذى ينمو منها ؛ فلا يكون النبات كله ذا تركيب وراثى واحد ، كما يحدث عند معاملة حبوب اللقاح . وتختلف الجرعة المناسبة من الإشعاع لمعاملة البذور باختلاف النوع المحصولى ،

وأفضلها هي التي تؤدي إلى فقدان حيوية ٥٠% من البنور ، وهي التي تعرف باسم Lethal Dose 50 (LD₅₀) . وقد تحددت بالفعل الجرعة المناسبة من أشعة إكس بالنسبة لمعظم الأنواع المحصولية . ويراعى أن تكون البنور التي يراد معاملتها عالية الحيوية ، وتحتوى على قدر مناسب من الرطوبة ، ولا تكون رطوبتها شديدة الانخفاض أو عالية بدرجة كبيرة .

٣ - معاملة الاجزاء الخضرية :

تختلف الجرعة المناسبة لمعاملة الاجزاء الخضرية باختلاف النوع والصنف ، وتزيد في الأنسجة المتخشبة عما في الأنسجة العشبية ، وتتراوح الجرعة المناسبة غالباً من ٢٠٠٠ - ٤٠٠٠ رونتجن ، ويحسن أن تجرى المعاملة في أولى مراحل تكوين البرعم ، وأفضل وقت لذلك هو عندما يكون برعم المستقبل عبارة عن خلية واحدة ، أما إن كان ذلك صعب التحقيق فيجب محاولة تطوير طرق جديدة لتشجيع تكوين براعم عرضية من الاجزاء المعاملة (IAEA ١٩٦٨) ، ويفضل إجراء المعاملة على البادرات الصغيرة ؛ لسهولة تداولها وإحضارها للمفاعلات فى أوص . كما يعامل خشب الطعوم لأشجار الفاكهة أثناء الشتاء والربيع ، ثم يطعم على الأصل المناسب ، تبدو النموات الأولى التي تظهر من البراعم المعاملة طبيعية عادة ، وتجب إزالة هذه النموات حتى الطعم المعامل تقريباً ؛ لأن ذلك يزيد من فرصة ظهور الطفرات فى النموات الجديدة . ومع تكرار التقليم حتى الطعم المعامل .. فإن خشب الطعم قد يستمر فى إنتاج نموات تظهر فيها طفرات جديدة وغالباً ما تكون معظم الطفرات المتكونة على شكل كيمييرا محيطية . هذا .. ولايكون من اليسير معاملة الشجيرات والأشجار بالإشعاع ؛ لصعوبة تداولها .

ولاستخدم النظائر المشعة بكثرة فى إحداث الطفرات ؛ نظراً لصعوبة التخلص منها ، وهي تفضل عند الرغبة فى إحداث الطفرات فى الأنسجة الداخلية للنبات ، وذلك بتغذية النبات بأحد العناصر المشعة ؛ مثل الفوسفور المشع ³²P أو الكبريت المشع ³⁵S ؛ حيث يمتصها النبات كما لو كانت عناصرها ثابتة ، ويتحرك العنصر مع الماء الممتص إلى الأنسجة الميرستيمية . وتنتقل هذه النظائر مع تيار الماء فى النبات كأيونات لهذه العناصر ، ولكنها تتغير أثناء وجودها فى النبات - بسبب عدم ثباتها - إلى عناصر أخرى ؛ فيتغير ³²P إلى كبريت ، ويتغير ³⁵S إلى كلورين عندما تشع منها جزيئات بيتا .

وتجدر الإشارة إلى أفضلية معاملة النباتات المزهرة ؛ لأن الانقسام الميوزى (الاختزالي) يكون أكثر حساسية للإشعاع من الانقسام الميوزى .

هذا .. ولاتجب معاملة الأجزاء الخضرية المصابة بالفيروسات إلا عند الضرورة القصوى ، ويلزم - فى هذه الحالة - التمييز بين أعراض الإصابة الفيروسية والطفرات التى يمكن أن تظهر نتيجة للمعاملة . ولمزيد من التفاصيل عن برامج التربية بالطفرات فى الفاكهة والمحاصيل الحقلية التى تتكاثر خضرياً .. يراجع IAEA (١٩٧٣) .

٤- معاملة مزارع الخلايا والأنسجة :

تعامل مزارع الخلايا أو الأنسجة بالعامل المطفر ، ثم تقيم المزرعة بعد المعاملة فى بيئات تسمح بالتعرف على الصفات المرغوبة ، وتنمى الخلايا أو الأنسجة الحاملة للطفرة المرغوبة ، إلى أن تصبح نباتات كاملة .

وأياً كانت طريقة المعاملة بالعوامل المطفرة .. فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى ضرر للقائمين بها .

العوامل المؤثرة فى فاعلية العوامل المطفرة

تتأثر مدى فاعلية العوامل المطفرة فى إحداث الطفرات بالعوامل التالية :

١- مستوى الأكسجين :

يؤثر مستوى الأكسجين فى الجزء النباتى المعامل على مدى الضرر الذى يمكن أن يحدثه العامل المطفر له . فكلما ارتفع مستوى الأكسجين .. زادت الأضرار ، وزادت معدلات التحورات الكروموسومية ، نسبة إلى الطفرات العاملة . ويمكن تقليل - أو تجنب - أضرار الأكسجين بمعاملة البذور ، وهى مشبعة بالרטوبية ، أو وهى فى حيز خال من الأكسجين . أما إذا رغب فى زيادة فاعلية وجود الأكسجين .. فإن المعاملة إما أن تجرى على البذور الجافة ، وإما أن توضع البذور فى محاليل المركبات الكيميائية المطفرة ، مع دفع فقائيع الهواء بها .

٢- المحتوى الرطوبى :

يرتبط تأثير المحتوى الرطوبى مباشرة بمستوى الأكسجين فى النسيج النباتى المعامل ؛ إذ إن المحتوى الرطوبى المرتفع يصاحبه انخفاض فى مستوى الأكسجين ، ويختلف مدى تأثير المحتوى الرطوبى باختلاف الأنواع النباتية ، والعوامل المطفرة المستخدمة ؛ فهو أكثر أهمية بالنسبة لأشعة إكس ، وأشعة جاما منه بالنسبة للنيترونات السريعة .

٣- درجة الحرارة :

ليس لدرجة الحرارة أهمية تذكر عند المعاملة بالإشعاع ، ولكنها على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمعاملة بالمركبات الكيميائية المطفرة ؛ حيث تؤثر فى الفترة الزمنية اللازمة لحدوث التفاعل بين المركب والنسيج النباتى ، ويطلق على الفترة الزمنية اللازمة لتفاعل نصف كمية المركب مع النسيج النباتى اسم نصف الحياة half - life ، وتتراوح هذه المدة بالنسبة لمركب الـ EMS من ٧ر٩ ساعة عند درجة حرارة ٤٠°م إلى ٧٩٦ ساعة عند درجة حرارة ٥°م ، وتبلغ مدة نصف الحياة للمسترد الكبريتى sulfur mustard ثلاث دقائق فقط عند درجة حرارة ٣٧°م .

٥- الظروف السابقة للمعاملة :

يؤدى نقع البذور فى الماء فترة - قبل تعريضها للعوامل المطفرة - إلى زيادة نسبة رطوبتها ، وفقدان بعض المركبات القابلة للذوبان فى الماء ، وبدء نشاط الإنبات وتمثيل الحامض النووى DNA . وكل هذه التغيرات تؤثر فى معدل حدوث الطفرات . ويمكن زيادة رطوبة البذور دون أن تباشر فى الإنبات ؛ بنقعها فى الماء على درجة الصفر المئوى . ويراعى - فى هذه الحالة - أن يكون الماء متحركا حول البذور مع تغييره كل ١٥ - ٣٠ دقيقة .

٦- الظروف التالية للمعاملة :

يجب ألا تخزن البذور المعاملة بالإشعاع لأكثر من أسابيع قليلة قبل زراعتها ، ويفضل أن يكون تخزينها فى وسط خال من الأكسجين . وإذا كان من الضرورى تخزينها لفترات

أطول من ذلك .. فيجب أن يكون التخزين على درجة الصفر المئوى .

أما فى حالات المعاملة بالمركبات الكيميائية .. فإنه يراعى غسيل البذور بماء جارٍ لمدة ثمانى ساعات ، إذا رغب فى تجفيف البذور وتخزينها قبل الزراعة ، ولكن الأفضل هو غسيل البذور بالماء لفترة قصيرة ، ثم زراعتها مباشرة .

٤- ال pH :

للـ pH أهمية كبيرة بالنسبة للمركبات الكيميائية المطفرة ؛ لأنه يؤثر فى مدى الضرر الفسيولوجى ، ومعدلات الطفرات العاملة والتحورات الكروموسومية التى يمكن أن يحدثها المركب ، وتختلف المركبات فى هذا الشأن ؛ فبينما يستعمل مركب الـ EMS عند pH ٧ .. فإن أزايد الصوديوم sodiom azide يكون أكثر فاعلية عند PH ٢ . ويفضل - إذا استعملت المحاليل المنظمة - أن يستعمل منظم الفوسفات بتركيز لايزيد على ١ ، ٠ مولار .

تداول أجيال التربية بالطفرات

يعطى الجيل الأول الذى ينتج من زراعة بذور سبقت معاملتها أو معاملة حبوب اللقاح التى استخدمت فى إنتاجها الرمز M_1 (نسبة إلى كلمة mutation أى طفرة) ، وتعطى الأجيال التالية الرموز M_2 ، و M_3 ... إلخ ، كما يفضل البعض استعمال الرموز : R_1 ، و R_2 ، و R_3 ... إلخ (نسبة إلى كلمة radiation أى إشعاع) . وقد تستعمل الرموز X_1 ، و X_2 ، و X_3 ... إلخ عند استعمال أشعة إكس فى إحداث الطفرات ، كما تستخدم الرموز نفسها كذلك فى حالات معاملة الأجزاء الخضرية ، مع الإكثار الخضرى للنباتات الناتجة ، رغم أن نباتات الـ M_2 أو الـ M_3 لا تختلف وراثياً - فى حالات الإكثار الخضرى - عن نباتات الـ M_1 .

نادراً ما تظهر أية طفرات على نباتات الجيل الطفرى الأول (M_1) ؛ لأن معظم الطفرات تكون متنحية ، بينما تظهر على نباتات هذا الجيل التغيرات الفسيولوجية التى لاتورث (ويراعى - مع ذلك - انتخاب نباتات الجيل الطفرى الأول التى يشتبه فى أن بها طفرات) . تلحق جميع نباتات الـ M_1 ذاتياً ، أو يجرى التلقيح فيما بينها فى حالات العقم أو عدم التوافق الذاتى .

وأيّاً كانت الطريقة التى اتبعت فى المعاملة بالعامل المطفر .. فإنه لابد من زراعة نباتات

غير معاملة من نفس الصنف للمقارنة ؛ لأن تلك هي الوسيلة الوحيدة الممكنة للتمييز بين الطفرات الحقيقية والاختلافات الوراثية الطبيعية ، التي قد توجد في الصنف ، وتستمر زراعة نباتات المقارنة في الأجيال الطفرية التالية كذلك .

يبدأ الانتخاب في الجيل الثانى M_2 ؛ لأن ذلك هو الجيل الذى تنعزل فيه الطفرات المتنحية بحالة أصيلة في حالة التكاثر الجنسي ، ولأنه يكون الجيل الذى يختفى فيه التأثير الفسيولوجى للمعاملة بالعوامل المطفرة أيًا كانت طريقة تكاثر المحصول . وتزرع نباتات الجيل الطفرى الثانى على مسافات واسعة ، حتى يمكن دراسة كل منها على انفراد ، مع زراعة نحو ١٠-١٢ نباتاً من كل نسل في خط مستقل . ويكفى هذا العدد للعثور على نبات واحد أصيل متنح - على الأقل - في الطفرة . لكن نظراً لأن نسبة بسيطة للغاية من نباتات الجيل الطفرى الأول هي التي تحدث بها الطفرات ، لذا .. تجب زراعة عدة آلاف من الأنسال في الجيل الطفرى الثانى ؛ لإعطاء الفرصة لظهور الطفرات إن وجدت . وإذا تعارض ذلك مع الإمكانيات المتاحة .. فإنه تفضل زراعة ٢ بنور M_2 من كل من ١٠٠٠ نبات M_1 عن زراعة أعداد كبيرة من بنور الـ M_2 من كل من عدد محدود من نباتات الـ M_1 ، وتنتخب النباتات المرغوبة فقط ، وتلقح ذاتياً لإنتاج بنور الجيل الطفرى الثالث M_3 ، وتستبعد جميع النباتات التي يكون نموها طبيعياً . وإذا كان المطلوب هو العثور على طفرة في جين واحد فقط بأحد الأصناف المرغوبة .. فإنه تلزم زراعة ١٠٠٠٠ نسل M_2 على الأقل ؛ لأن معدل ظهور الطفرة المرغوبة في غياب الطفرات الأخرى غير المرغوبة يكون منخفضاً للغاية .

يقتصر برنامج التربية بعد ذلك على تقييم الطفرات التي أمكن استحداثها ؛ فتزرع عدة خطوط من كل طفرة في الجيل الطفرى الثالث M_3 ، وتقارن الطفرات المرغوبة منها مع الأصناف التجارية المهمة في تجارب صغيرة بمكررات في الجيل الطفرى الرابع M_4 ، والخامس M_5 . وتقارن الطفرات المتميزة منها في تجارب موسعة في الجيلين الطفرين السادس M_6 والسابع M_7 .

وعموماً .. فإن تداول النباتات ابتداء من الجيل الطفرى الثانى يكون بإحدى أربع طرق هي :

١- انتخاب النسب .

٢- انتخاب التجميع .

٣- التحدر من بذرة واحدة .

٤- اختبار الأجيال المبكرة .

هذا .. وقد تكثر الطفرة المتتحة ، وتستعمل كصنف ، جديد مباشرة ، أو تستخدم كسلالات تربية فى برامج أخرى لتربية المحصول ، إن لم تكن صالحة للاستعمال كصنف جديد . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Fehr (١٩٨٧) .

الأمر الذى يجب مراعاتها فى برنامج التربية بالطفرات

تجب أن تتوفر لدى المربي رؤية واضحة بالنسبة للأمور التالية فى برنامج التربية بالطفرات :

١- اختيار الجيرمبلازم المناسب لمعاملته :

إذا كان المطلوب هو تحسين صنف جيد فى صفة مرغوبة تنقصه .. فإن أفضل جيرمبلازم للمعاملة هو ذلك الصنف . وإذا كانت الصفة التى يُراد تحسينها كمية .. فإن على المربي أن يقارن بين مستوى الصفة فى الصنف التجارى ، ومستواها فى السلالات والأصناف الأخرى ، حتى إن لم تكن تصلح للزراعة التجارية ؛ فإذا كان مستوى الصفة المرغوبة أعلى فى سلالة غير مزروعة مما فى الصنف التجارى .. فإن فرصة تحسين مستوى الصفة إلى الدرجة المطلوبة بالطفرات تكون أكبر فى السلالة عما فى الصنف التجارى ، ويقابل ذلك ؛ أن السلالة لن يمكن استخدامها فى الزراعة بعد اكتسابها الصفة ، وإنما تستخدم كمصدر للصفة فى برنامج للتربية ، بينما يستعمل الصنف التجارى فى الزراعة مباشرة بعد اكتسابه الصفة بالطفرات .

٢- اختيار مصدر البنور :

تجب العناية باختيار البنور من أفضل المصادر الموثوق بها ، لكى تمثل الصنف تمثيلاً صادقاً . وأفضل البنور لهذا الغرض هى بنور الأساس Foundation Seed ، أو حتى بنور المربي Breeder seed إن أمكن ؛ لتجنب وجود أية نباتات مخالفة للصنف يمكن أن تعتبر - خطأً - طفرات مستحدثة .

٣- اختيار العامل المطفر والجرعة المناسبة :

يلزم - إن لم تتوفر معلومات كافية عن أنسب العوامل المطفرة والجرعة المناسبة منها - أن تتم المعاملة بأكثر من عامل مطفر ، وبعدة جرعات من كل منها ، كما تجب زراعة نباتات المقارنة بعد معاملة بنورها بالطريقة ذاتها ، ولكن بون التعرض للعامل المطفر .

٤- اختيار عدد البنور المناسب للمعاملة :

يتوقف عدد البنور المناسب التي تجب معاملتها على حيوية البنور بعد المعاملة ، وعدد النباتات والأنسال التي يمكن تقييمها في الجيل الطفرى الثانى ، ومعدل حدوث الطفرات في الصفات المرغوب فيها ، ومدى سهولة تقييم هذه الصفات . ومن الطبيعى أن عدد البنور التي تجب معاملتها يزيد عند نقص حيوية البنور المعاملة بدرجة كبيرة ، وعندما يقل معدل حدوث الطفرات في الصفات المرغوبة .

٥- طريقة التلقيح لإنتاج بنور الجيل الطفرى الثانى :

بينما تترك نباتات الجيل الأول من النباتات الداتية التلقيح على طبيعتها لإنتاج بنور الجيل الطفرى الثانى فإن النباتات الخلطية التلقيح إما أن تلقح ذاتيا يدويا ، وإما أن تترك للتلقيح الخلطى فيما بينها ، ولكن يلزم في هذه الحالة تأمين مسافة عزل كافية بين حقل نباتات الجيل الطفرى الأول ، وأية حقول أخرى من النوع نفسه ؛ لمنع التلقيح الخلطى الخارجى .

مزارع الأنسجة كمصدر للطفرات

من المعروف أن مزارع الأنسجة يمكن أن تكون مصدرا غنيا بالاختلافات الوراثية التي تحدث بفعل الطفرات . ويستخدم المصطلح Somaclonal Variation لوصف مثل هذه النوعية من الاختلافات . وقد ظهرت اختلافات كثيرة بهذه الطريقة في مزارع أنسجة لمحاصيل متباينة ؛ مثل قصب السكر ، والبطاطس ، والأرز ، والدخان ؛ فأمكن -مثلا- العثور على سلالات من قصب السكر مقاومة لمرض فيجى (وهو مرض فيروسى تنقله نطاطات الأوراق) ، والبياض الدقيقى ؛ وكانت بعض هذه السلالات أعلى محصولاً من الصنف الاصلى المستخدم في عمل مزارع الأنسجة . كما عثر على سلالات من البطاطس

من صنف رست بيربانك Russet Burbank (الذى يعد أكثر الأصناف انتشاراً في الزراعة في أمريكا الشمالية) ، اختلفت عن الصنف الأصلي في بعض الصفات ؛ مثل اندماج النمو ، وموعد النضج ، وتجانس الدرناات ، ولون جلد الدرنة ، واحتياجات الفترة الضوئية ، وإنتاج الثمار . وتعتبر بعض هذه الصفات (مثل تجانس الدرناات ، والتبكير في وضع الدرناات) بمثابة تحسن عن الصنف الأصلي . كما أمكن عزل سلالات بطاطس من مزارع الأنسجة ، كانت مقاومة لمرض الندوة المبكرة ، تحت ظروف الحقل ، كما كان بعضها مقاوماً لعدة سلالات من الفطر المسبب لمرض الندوة المتأخرة ، وقد اختلفت إحدى السلالات الناتجة من مزارع الأنسجة عن الصنف رست بيربانك في ١٧ صفة . وأمكن الحصول على سلالات من الأرز ، تختلف عن الصنف الأصلي في عدد الخلفات ، وطول السنبلة ، وطول ورقة العلم flag leaf وصفات أخرى . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Scowcroft & Larkin (١٩٨٢) ، و Maliga وآخرون (١٩٨٢) ، والفصل الثامن عشر من هذا الكتاب .

الفصل الرابع عشر

التضاعف

تسمى جميع النباتات -التي تحتوى على ضعف العدد الأساسى للكروموسومات- ثنائية الهيئة الكروموسومية diploid . ويزمر لكل هيئة كروموسومية بالرمز س (أو X)؛ وبذا .. فإن النباتات الثنائية تكون $2s$. هذا .. بينما تحتوى كثير من النباتات على عدد من الكروموسومات ، يختلف عن ضعف العدد الأساسى ؛ فقد تحتوى على أربعة أضعاف - أو ستة أضعاف - العدد الأساسى للكروموسومات ؛ أى تحتوى على أربع (4س) أو ست (6س) هيئات كروموسومية كاملة على التوالى . وتعرف هذه النباتات بأنها متضاعفة. وسواء أكان النبات متضاعفاً ، أم غير متضاعف .. فإنه يستعمل الرمز $2n$ (أو $2n$) للدلالة على عدد الكروموسومات فى الخلايا الجسمية ، والرمز n (أو n) للدلالة على عدد الكروموسومات فى الطور الجاميطى (البويضات وحبوب اللقاح) ؛ وعليه .. فإن البسلة - مثلاً - وهى نبات ثنائى عادى تكون فيها $2s = 2n = 14$ كروموسوماً ، بينما تكون جاميطاتها $1n = 1s = 7$ كروموسومات . أما فى نبات مثل البطاطس -وهى تحتوى على أربع هيئات كروموسومية كاملة- فإن فيها $2n = 4s = 48$ كروموسوماً ، بينما تكون فيها الجاميطات $1n = 2s = 12$ كروموسوماً .

تعرف جميع النباتات التى تحتوى على عدد من الكروموسومات -يختلف عن ضعف العدد الأساسى- بأنها متضاعفة polyploid ، وتقسم حالات التضاعف Polidy (أو

(polyploidy) إلى فئتين كما يلي :

١- التعدد الكروموسومى غير التام Aneuploidy :

لاحتوى النباتات -التي توجد بها ظاهرة التعدد الكروموسومى غير التام- على مضاعفات العدد الأساسى للكروموسوم ؛ كأن ينقصها -مثلا- كروموسوم أو أكثر ، أو يزيد فيها كروموسوم أو أكثر عن مضاعفات العدد الأساسى .

٢- التعدد الكروموسومى التام Euploidy :

تحتوى النباتات التى توجد بها ظاهرة التعدد الكروموسومى التام على هيئة كروموسومية واحدة ، أو أية مضاعفات للهيئة الكروموسومية غير الحالة الثنائية العادية .

تنتشر ظاهرة التضاعف انتشاراً كبيراً فى المملكة النباتية ، وبخاصة فى المحاصيل الاقتصادية المهمة ؛ مثل القمح ، والقطن ، والبطاطس ، والكاسافا ، والدخان . وتقدر نسبة النباتات المتضاعفة بنحو ٣٠-٣٥٪ من مغطاة البذور . وترتفع هذه النسبة إلى ٧٠٪ بين النجيليات .

تظهر النباتات المتضاعفة فى الطبيعة بمحض الصدفة ؛ فمثلاً .. تتكون النباتات التى ينقص منها كروموسوم ، أو يزيد فيها كروموسوم عند حدوث خلل فى الانقسام الميوزى (فى الحالات التى لا تنفصل فيها الكروموسومات الشبيهة عن بعضها البعض (Nondisjunction) يؤدى إلى تكوين جاميطات بها $n - 1$ ، أو $n + 1$ من الكروموسومات . كما تظهر حالات التضاعف الكروموسومى التام عند حدوث خلل فى الانقسام الميوزى ، يؤدى إلى تكوين جاميطات بها $2n$ من الكروموسومات .

التعدد الكروموسومى غير التام

يشتمل التعدد الكروموسومى غير التام Aneuploidy على الحالات التى لا يكون فيها عدد الكروموسومات الموجودة فى النواة الجسمية مساوياً تماماً لمضاعفات الهيئة الكروموسومية ؛ كأن يحتوى النبات على كروموسوم أو أكثر ، فى حالة نقص أو زيادة عن الحالة الثنائية Disomic ، بشرط ألا يتضمن النقص أو الزيادة هيئة كروموسومية كاملة .
ونبين - فيما يلى - مختلف أنواع التعدد الكروموسومى غير التام .

أحادى الكروموسوم

تحتوى النباتات الأحادية الكروموسوم monosomises على كروموسوم واحد أقل مما فى الحالة العادية (٢ن - ١) . وقد دُرِسَتْ أفراد من هذا النوع فى القمح ، والدخان ، وبعض النباتات الأخرى التى توجد بها ظاهرة التعدد الكروموسومى التام ، ولكنها نادراً ماتوجد فى النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية (التي يكون فيها ٢ن = ٢س) ؛ لأن نقص كروموسوم كامل فى مثل هذه النباتات يؤدى إلى عقمها ، وغالباً مايؤدى إلى موتها . أما فى النباتات المتضاعفة كالقمح .. فإن النقص فى كروموسوم كامل لا يكون له تأثير كبير فى الفرد ؛ حيث يقوم التكرار الموجود فى الهيئة الكروموسومية مقام الكروموسوم المفقود .

ونجد أن الكروموسوم المفرد يبقى غالباً فى أثناء الانقسام الاختزالى فى المحور الوسطى للخلية ، ولايتجه نحو أى من القطبين ؛ وبذلك .. يفقد فى السيتوبلازم ، وتتكون نتيجة لذلك حبوب لقاح تحتوى على العدد الأحادى الكامل من الكروموسومات ، وتكون طبيعية ، وحبوب لقاح أخرى ينقصها كروموسوم كامل (ن-١) وتكون عقيمة . إلا أن البويضات التى تكون بهذا الشكل ربما لاتكون عقيمة ، وحينما تُخصب بحبوب لقاح عادية (ن) .. تتكون زيجوتات أحادية الكروموسوم (٢ن-١) . هذا .. وتكون الأفراد الأحادية الكروموسوم غالباً أصغر حجماً من الأفراد العادية وغير مستقرة وراثياً ، وتصل نسبة العقم فيها إلى ٥٠٪ .

وتستعمل النباتات الأحادية الكروموسوم فى تحديد الكروموسومات التى توجد بها مختلف الجينات ؛ نظراً لأنها تعطى انعزالات غير عادية بالنسبة للجينات التى توجد على الكروموسوم الناقص . كما استخدمت النباتات الأحادية فى إحلال كروموسوم محل آخر ، ويتم الإحلال بالتلقيح الرجعى للسلالة الأحادية الكروموسوم . وقد يكون الكروموسوم الجديد -الذى يحل محل الكروموسوم الناقص- من نفس النوع أو الجنس النباتى ، أو من نوعٍ أو جنسٍ آخر .

أحادى - ثنائى الكروموسوم

تحتوى النباتات أحادية - ثنائية الكروموسوم Monoisodisomics على كروموسوم

متماثل الذراعين isochromosome مكان أحد أزواج الكروموسومات ؛ ويعنى ذلك أن نصف الكروموسوم المكرر فى هذا الكروموسوم يكون ممثلاً مرتين ، بينما يختفى - تماماً - النصف الآخر بما يوجد عليه من جينات .

غائب الكروموسومين


إن الأفراد الغائبة الكروموسومين Nullisomics هى التى يغيب فيها زوج كامل من الكروموسومات المتماثلة ؛ أى تكون (٢ن - ٢) ، وتنشأ عندما تخصب بيضة (ن-١) بحبة لقاح (ن-١) . لم يمكن إنتاج الأفراد غائبة الكروموسومين إلا فى النباتات المتضاعفة ؛ لأن عمل زوج الكروموسومات الناقص يمكن أن تقوم به -جزئياً- الكروموسومات الأخرى المثيلة homologous فى حالة التضاعف الذاتى ، أو الكروموسومات المناظرة من الهيئة الكروموسومية الأخرى homeologous فى حالة التضاعف الهجينى .

وتكون النباتات غائبة الكروموسومين -مثل بقية النباتات ذات التعدد الكروموسومى غير التام -أضعف نمواً من النباتات الثنائية العادية ، وغير ثابتة وراثياً ، ويكون انقسامها الاختزالى غير متوازن ؛ لذا .. فإنها تكون على درجة عالية من العقم ، وتكون عديمة القيمة كأصناف تجارية .

يستفاد من النباتات غائبة الكروموسومين فى تحديد الكروموسومات التى تحمل الجينات المختلفة (لأن وراثة الصفات فيها تشذ عن النسب العادية ، عندما تكون الجينات محمولة على زوج الكروموسوم الغائب ؛ شكل ١٤-١) ، وفى نقل كروموسومات كاملة -تحمل جينات مرغوباً فيها- من نفس النوع أو من نوع ، أو جنس آخر بطريقة التهجين . ويطلق على السلالات التى يحل فيها زوجاً أحد الكروموسومات من أحد الأنواع محل زوج شبيه من نوع آخر اسم Alien Substitution lines ، وهى غالباً ماتختلف فى صفاتها - بشدة - عن النوع الأسمى .

أحادى الكروموسوم المزدوج

إن الفرد الأحادى الكروموسوم المزدوج Double Monosomic ينقصه كروموسومان غير متماثلين non - homologous ؛ أى يكون (٢ن-١-١) . ولاتتوفر هذه الحالة إلا فى النباتات المتضاعفة ، وينطبق عليها كل ما سبق ذكره بالنسبة للأفراد غائبة الكروموسومين .



تنعزل جميع الكروموسومات طبيعياً ماعدا رقم II . لا يحدث انعزال فى الجين A وهو مايدل علي أن هذا الجين يحمل على الكروموسوم رقم II

شكل (١٤ - ١) : استعمال الأفراد الغائبة الكروموسومين فى تحديد الكروموسوم الحامل لجين معين . يفترض أن حالة غياب الكروموسوم لا تنتقل عن طريق الأم (عن Welsh ١٩٨١) .

ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الأولى

تحتوى الخلايا الجسمية للأفراد الثلاثية الكروموسوم من الدرجة الأولى Primary Trisomics على كروموسوم واحد زائد على الحالة الثنائية العادية (٢ن+١) ؛ أى يكون فيها أحد الكروموسومات ؛ ممثلاً ثلاث مرات . تنعزل الكروموسومات فى أثناء الانقسام الاختزالي الأول فى مثل هذه النباتات - عادة - بتوجه كروموسومين متماثلين إلى قطب ، وتوجه الكروموسوم الثالث المماثل إلى القطب المضاد . ويتوقف ذلك على الاقتران الكروموسومى الذى يكون -عادة- على هيئة وحدة ثلاثية الكروموسوم . trivalent

تنتقل الحالة ثلاثية الكروموسوم عن طريق الأمهات ؛ لأن الكروموسوم الزائد يكون - عادة - مميّناً لحبوب اللقاح . وعند تكون الجاميطات المؤنثة في نبات ثلاثى الكروموسوم .. يتوقع أن تكون نصف البيضات طبيعية ؛ أى تحتوى على العدد الأحادى (ن) من الكروموسومات ، والنصف الآخر يحتوى على (ن + ١) من الكروموسومات . وعندما تخصب البيضات بحبوب لقاح تحتوى على (ن) من الكروموسومات .. فإن النسل الناتج يكون من طرازين ، أحدهما ثنائى الكروموسوم (٢ن) ، والآخر ثلاثى الكروموسوم (ن + ١) ؛ وعليه .. فإنه يتوقع انتقال الحالة ثلاثية الكروموسوم إلى النسل بنسبة النصف ، إلا أنها تكون - فى الحقيقة - أقل من النصف ، ويرجع ذلك إلى أن الكروموسوم الزائد قد يفقد - أحياناً - فى أثناء الانقسام الاختزالى ؛ ولهذا السبب .. فإن النباتات ثلاثية الكروموسوم تكون غير ثابتة وراثياً ، وتعود - تدريجياً - إلى الحالة الثنائية ، إلا إذا حوفظ عليها بالانتخاب .

وقد لوحظت النباتات ثلاثية الكروموسوم من الدرجة الأولى فى كثير من النباتات ؛ مثل الداتورة ، والطماطم ، والذرة ، والقمح ، والدخان . وأمكن فى بعض النبات إنتاج عدد من الطرز ثلاثية الكروموسوم ، مساوٍ لعدد الكروموسومات فى الهيئة الكروموسومية للنوع . وكانت بداية الدراسات التى من هذا النوع على نبات الداتورة ؛ حيث تمكن Blackslee من التعرف على ١٢ سلالة طبيعية ثلاثية الكروموسوم، تمثل كل منها كروموسوماً زائداً من الاثنى عشر كروموسوماً التى تضمها الهيئة الكروموسومية للداتورة . كما ذكر Rick (١٩٨٧) مواصفات اثنتى عشرة سلالة مماثلة ثلاثية الكروموسوم فى الطماطم ، علماً بأن الطماطم تحتوى - فى الأخرى - على اثنى عشر زوجاً من الكروموسومات . وفى جميع الحالات .. كانت لكل سلالة ثلاثية الكروموسوم صفات مورفولوجية خاصة ، تميزها عن النباتات الثنائية العادية ، وعن غيرها من السلالات الثلاثية الكروموسوم ... إلا أن السمة المميزة الغالبة عليها جميعاً كان ضعف وبطء النمو .

ويستفاد من النباتات ثلاثية الكروموسوم فى تحديد الكروموسومات الحاملة لجينات معينة . ويجرى ذلك - بالنسبة لإحدى الصفات - بتلقيح نبات يحمل هذه الصفة بحالة متنتحية أصيلة (aa) مع جميع السلالات ثلاثية الكروموسوم الممكنة من هذا النوع ، على أن تكون جميعها أصيلة فى الأليل السائد A ، ثم تنتج بنور الجيل الثانى لكل تلقيح ، وتزرع

لدراسة الصفة فى مختلف عشائر الجيل الثانى .

ويلاحظ أن انعزال الصفة يكون عادياً ، وبنسبة ٣ سائداً : ١ متنحياً فى جميع عشائر الجيل الثانى ، فيما عدا واحدة منها ، هى التى تنتج من التلقيح مع السلالة الثلاثية الكروموسوم التى يُحمل الجين المدروس على كروموسومها المكرر بحالة ثلاثية ؛ إذ يكون التركيب الوراثى لهذه السلالة AAA ، ويكون التركيب الوراثى لبعض نباتات الجيل الأول Aa ، وبعضها الآخر AAa . والنوع الثانى من النباتات هو الذى يعطى انعزالات غير طبيعية فى الجيل الثانى ؛ لأنها تنتج نوعين من الجاميطات ، يكون بأحدهما (ن) ، وبالأخر (ن + ١) من الكروموسومات . ولتظهر الأفراد التى تحمل الصفة المتنحية فى الجيل الثانى إلا إذا لقحت بيضة (ن) تحمل الأليل (a) بحبة لقاح مماثلة ، وهى تتكون - نظرياً - بنسبة ١ متنحية : ٣٦ سائدة . وبرغم أن نسبة كبيرة من الجاميطات التى تحمل كروموسوماً زائداً (ن + ١) تكون عقيمة - وهو ما يترتب عليه أن تكون معظم الجاميطات المتكونة ثنائية (٢ن) - إلا أن نسبة النباتات المتنحية الأصلية aa تبقى أقل بكثير مما فى عشائر الجيل الثانى للطرز ، الأخرى الثلاثية الكروموسوم .

وراثه صفة الأزهار المزدوجة فى المنثور :

يوجد نوعان من الأزهار فى المنثور ، ينتج أحدهما أزهاراً مفردة ، وينتج الآخر أزهاراً مزدوجة . والنوع الثانى هو المرغوب تجارياً ، وهو خالٍ من أعضاء التذكير وأعضاء التأنث ، ويكثر من بذور منتجة على نباتات تحمل أزهاراً مفردة . وقد وجدت ثلاثة طرز من النباتات ذات الأزهار المفردة ، تختلف فيما تنتجه عند تلقيحها ذاتياً كما يلى : طراز يكون نسله الناتج من التلقيح الذاتى ذا أزهار مفردة فقط ، وطراز آخر ينعزل فيه النسل بنسبة (١) ذا أزهار مزدوجة : (٣) ذا أزهار مفردة ، وطراز ثالث تكون فيه ٥٤-٥٦٪ من النباتات التى تنتج من تلقيحه ذاتياً ذات أزهار مزدوجة . ومن الطبيعى أن الطراز الثالث هو الطراز الذى يفضل استخدامه فى إنتاج البذور ، ويطلق عليه اسم ever sprouting ؛ بسبب النسبة العالية للنباتات ذات الأزهار المزدوجة التى تظهر فى النسل .

وقد اقترحَ لتفسير هذه الحالة وجود جين مميت متنحٍ ، يؤدى إلى موت نصف حبوب اللقاح ، ونحو ٦-٨٪ من البيضات ، وأن هذا الجين يحمل على نفس الكروموسوم الذى يحمل عليه الجين الذى يتحكم فى حالة الأزهار المفردة ، وهو جين سائد ؛ وعليه .. فإن

النباتات ذات الأزهار المفردة إما أن تكون أصيلة ، وإما أن تكون خليطة فى الصفة .
وتنتج الأفراد الأصيلة نباتات ذات أزهار مزدوجة فقط (أى إنها تكون من الطراز الأول) ،
وتنتج الأفراد الخليطة نباتات ذات أزهار مزدوجة ، وأخرى ذات أزهار مفردة ؛ بنسبة ١ :
٢ (أى إنها تكون من الطراز الثانى) . أما الطراز الثالث من النباتات ذات الأزهار المفردة
(ال ever sprouting) ؛ فقد افترض أنه يكون خليطاً فى كل من الجين المميت والجين
الذى يتحكم فى نوع الأزهار ، وهى حالة يترتب عليها زيادة نسبة النباتات ذات الأزهار
المزدوجة فى النسل إلى ٥٤ - ٥٦ ٪ .

وقد تبين من الدراسات السيتولوجية التى أجريت على نباتات الطراز الثالث (ال ever
sprouting) أنه توجد بأحد الكروموسومات عقدة knob لاتوجد بالكروموسوم المماثل ho-
mologous chromosome فى نفس الخلية ، وأن وجود هذه العقدة كان ضرورياً لحيوية
حبوب اللقاح ؛ بمعنى أن حبوب اللقاح التى لا يصل إليها الكروموسوم الذى يحتوى على
العقدة لاتنتب . هذا .. بينما تكون جميع البويضات خصبة ، سواء احتوت على الكروموسوم
ذا العقدة ، أم على الكروموسوم الآخر . ويعنى ذلك أن العقدة تحمل الجين الذى يتحكم
فى صفة الأزهار المزدوجة - وهو جين متنح - ويؤدى موت حبوب اللقاح التى لاتحمل هذا
الجين (وهى الخالية من العقدة) إلى أن يكون نصف النسل أصيلاً فى هذا الجين المتنحى
وذا أزهار مزدوجة ، والنصف الآخر خليطاً ، وذا أزهار مفردة وهى الصفة السائدة . إلا
أن نسبة النباتات ذات الأزهار المزدوجة تزيد قليلاً على ٥٠ ٪ (تصل إلى ٥٤ - ٥٦ ٪) ،
ربما بسبب موت بعض البويضات ، التى تخلو من الكروموسوم ذى العقدة .

وقد وجد نبات من الطراز الثالث كانت أوراقه ضيقة جداً ، وقد أنتج هذا النبات لدى
تلقيحه ذاتياً نسلأ كانت ٤٧ ٪ من نباتاته ذات أزهار مفردة ، و ٥٣ ٪ ذات أزهار مزدوجة ،
وهى النسبة العادية . وقد كانت ٢٧ ٪ من نباتات النسل ذات أوراق ضيقة وضعيفة النمو ،
وكانت النباتات الباقية طبيعية الأوراق ، إلا أنها ضمت - فيما بينها - ٩٠ ٪ من النباتات
ذات الأزهار المزدوجة .

ونظراً لأن النباتات ذات الأوراق الضيقة يمكن التعرف عليها بسهولة ، حتى وهى فى
طور البادرة ؛ لذا .. فإنه يمكن التخلص منها بسهولة فى هذه المرحلة من النمو ؛ لتتبقى
- بعد ذلك - النباتات ذات الأوراق الطبيعية فقط ، وهى التى ترتفع فيها نسبة النباتات

وقد تبين من الدراسات السيتولوجية أن النباتات ذات الأوراق الضيقة .. تحتوى على كروموسوم زائد (٢٠ + ١) . ويبدو أن هذا الكروموسوم الذى يوجد ممثلاً ثلاث مرات هو الذى يحمل الجين المسئول عن نوع الأزهار ؛ كما يبدو أنه يحمل أيضاً الجين المسئول عن صفة الأوراق الضيقة ؛ لأنه لم يلاحظ إلا فى هذه النوعية من النباتات . ويتبين من ذلك كيف أن التخلص من النباتات ذات الأوراق الضيقة يؤدي - فى الوقت نفسه - إلى التخلص من معظم النباتات ذات الأزهار المفردة (عن Emsweller وآخرين ١٩٣٧) .

ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثانية

تحتوى النباتات ثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثانية Secondary Trisomics على كروموسوم زائد ، يكون عبارة عن نصف كروموسوم (ذراع كروموسومى) عادى مكرر مرتين ؛ أى إن الكروموسوم الزائد يكون متضاعف الذراعين isochromosome ؛ وبمعنى آخر .. فإن الذراع المكرر يكون ممثلاً فى الخلية الواحدة أربع مرات ؛ وبذلك .. يتوقع إمكان وجود طرز ثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثانية تساوى ضعف عدد أزواج كروموسومات النوع . وقد اكتشف Blackslee عدداً كبيراً من هذه الطرز فى الداتورة . والمعادلة العامة لحالة ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثانية هى : (٢٠ + ١٠١) ، أو (٢٠ + ٢٠٢) ؛ حيث تدل الأرقام ١ ، و ٢ ... إلخ على رقم الكروموسوم الذى يتكرر نصفه .

ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثالثة

تنشأ حالة ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثالثة Tertiary Trisomics من انتقال كروموسومى ؛ إذ إن الكروموسوم الزائد يتكون من نصفى كروموسومين غير متماثلين . والمعادلة العامة لهذه الحالة هى : (٢٠ + ٣٠١) ؛ حيث تدل الأرقام ١ ، و ٣ ... إلخ على أرقام الكروموسومات التى ترتبط أنصافها فى كروموسوم واحد زائد . يتوقع وجود طرز كثيرة جداً من هذه الحالة فى كل نوع نباتى ، وقد حصل Blackslee على بعضها فى الداتورة .


ويمكن الاستفادة من حالات النباتات ثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة فى إنتاج الهجن التجارية ، وقد سبق أن أوضحنا فى الفصل العاشر (شكل ١٠-٢) كيف يمكن

الاستفادة من هذه الظاهرة فى إكثار نباتات الشعير العقيمة الذكر . ويبين شكل (١٤-٢) الطريقة التى اقترحها Ramage ، واستخدمها لإنتاج هجن الشعير (عن Briggs & Knowles ١٩٦٧) . ويتطلب الأمر أن يكون طراز الثلاثى الكروموسوم من الدرجة الثالثة متوازناً *Balanced Tertiary Trisomic* ؛ فيحتوى على آليل العقم الذكري بصورة متحية أصيلة (*ms ms*) على زوج الكروموسومات الذى يحمل - طبيعياً - هذا الجين ، كما يحمل الأليل السائد لهذا الجين (*Ms*) على الكروموسوم الزائد . ويعنى ذلك أن النسل الثانى العادى لهذا النبات يكون - دائماً - عقيم الذكر ، بينما تكون النباتات الخصبة الذكر - دائماً - ثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة . ويتوزع النسل بينهما - غالباً - بنسبة ٧٠٪ ، و ٣٠٪ للنباتات العقيمة الذكر والخصبة الذكر على التوالى . كما يكون كل نسل النباتات الثنائية عقيم الذكر أيضاً .

وحقيقة الأمر أن ١٪ - أو أقل - من نسل النباتات ثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة يكون ثلاثى الكروموسوم من الدرجة الأولى ، ولكنها تكون عقيمة الذكر ؛ لأن كل كروموسوماتها تحمل الأليل *ms* . وكما فى جميع الحالات الثلاثية الكروموسوم .. فإن الكروموسوم الزائد لاينتقل خلال حبوب اللقاح ، ويحدث ذلك -على الأقل- فى النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية *diploids* .

وإذا حمل زوج آخر من الكروموسومات الأليل المتنحى (*r*) الذى يتحكم فى اللون النباتى الأخضر ، وحمل الكروموسوم الزائد الأليل الآخر السائد لهذا الجين (*R*) ، الذى يتحكم فى اللون النباتى الأحمر ؛ فحينئذ .. تكون كل النباتات الحمراء ثلاثية الكروموسوم ، بينما تكون كل النباتات الخضراء ثنائية المجموعة الكروموسومية .

وتحصّد النباتات الثلاثية الكروموسوم من خليط النباتات الثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة والثنائية المجموعة الكروموسومية يدوياً ، وتستعمل كمصدر للنباتات الثلاثية الكروموسوم وثنائية المجموعة الكروموسومية فى الموسم التالى . وتحصد النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية المتبقية ألياً ، وتستخدم كأم فى حقول إنتاج الهجن . ويتطلب استخدام النباتات الثلاثية الكروموسوم - من الدرجة الثالثة المتوازنة فى إنتاج بنور هجن الشعير - أن ينتج النباتات الثلاثى الكروموسوم حبوب اللقاح بوفرة ، وأن تتوفر الظروف البيئية التى تسمح بانتقال حبوب اللقاح إلى



شكل (١٤ - ٢) : طريقة استخدام النباتات الثلاثية الكروموسوم من الدرجة الثالثة المتوازنة
Balanced Tertiary Trisomics فى انتاج هجن الشعير . يراجع المتن للتفاصيل .

ثلاثى الكروموسوم المزدوج

يوجد فى النباتات الثلاثية الكروموسوم المزدوجة Double Trisomics كروموسومان ، يكون كل منهما ممثلاً ثلاث مرات ، والمعادلة العامة لهذه الحالة هى : $(2n + 1 + 1)$.

رباعى الكروموسوم

يكون أحد الكروموسومات فى النباتات الرباعية الكروموسوم Tetrasomics ممثلاً أربع مرات ، بينما توجد باقى الكروموسومات فى الحالة الثنائية ، والمعادلة العامة لذلك هى : $(2n + 2)$. ونظراً لوجود أربعة كروموسومات متماثلة .. فإنها غالباً ماتقترن ببعضها ؛ لتكون وحدة رباعية الكروموسوم quadrivalent أثناء الدور الضام من الانقسام الميوزى . ويتوجه -غالباً- زوج من الكروموسومات - من الوحدة الرباعية الكروموسوم - إلى كل قطب ؛ وبذا .. يكون النظام ثابتاً وراثياً ، إلا أن النسب الوراثية التى يتحصل عليها تختلف تماماً عما فى النباتات ثنائية المجموعة الكروموسومية العادية ؛ نظراً لوجود كل جين على الكروموسوم الزائد ممثلاً أربع مرات . هذا .. وقد تتكون -أحياناً- وحدة ثلاثية الكروموسوم ، وأخرى أحادية ، وقد تتكون وحدة مستقلة ثنائية الكروموسوم من زوج الكروموسوم الزائد ؛ لذا .. فإنه تلاحظ -أحياناً- نسبة من العقم . وتوجد الحالات الرباعية الكروموسوم بكثرة فى النباتات ، وتكون مختلفة - مظهرياً - عن قريناتها من النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية العادية ، ويطلق عليها اسم Chromosome Addition Lines .

وتوجد حالات رباعية الكروموسوم ، يكون فيها زوج الكروموسوم الزائد من نوع نباتى مختلف ، وهى التى يطلق عليها اسم Alien Addition Lines . وهى تختلف فى مظهرها وفى سلوكها السيتولوجى عن النوع الأول (Chromosome Addition Lines) ؛ نظراً لأن زوج الكروموسوم الزائد لايقترن بأى من الكروموسومات الأخرى أثناء الانقسام الميوزى ، وإنما يكون وحدة إضافية ثنائية الكروموسوم .

متعدد الكروموسوم

يحتوى الفرد المتعدد الكروموسوم Polysomic على أكثر من كروموسومين زائدين من أحد كروموسومات الهيئة الكروموسومية ، وهى قد تكون خماسية الكروموسوم Pentasomics ($2n + 3$) ، أو سداسية الكروموسوم Hexasomics ($2n + 4$) ... إلخ .

ولزيد من التفاصيل عن موضوع التعدد الكروموسومى غير التام واستخداماته فى مجال تربية النبات .. يراجع Elliott (١٩٥٨) ، Burnham (١٩٦٦) ، و Swanson وآخرون (١٩٧٦) ، و Peloquin (١٩٨١) .

تعدد المجموعة الكروموسومية التام

تحدث حالات تعدد المجموعة الكروموسومية التام Euploidy حينما يشمل التضاعف جميع كروموسومات الهيئة الكروموسومية للنبات ؛ وتوجد منها أنواع كثيرة . ورغم أن نقص عدد الكروموسومات إلى هيئة كروموسومية واحدة كاملة (n) يعد اختزالاً ، وليس تضاعفاً .. إلا أن حالات النباتات الأحادية هذه تدرج ضمن حالات تعدد المجموعة الكروموسومية التام . ونبين - فيما يلى - مختلف أنواع التعدد الكروموسومى التام .

أحادية المجموعة الكروموسومية

تحتوى الخلايا الجسمية للنبات الأحادية المجموعة الكروموسومية monoplids على العدد الأحادى من الكروموسومات (n) ، ويطلق عليها - بوجه عام - اسم Haploids . هذا .. إلا أن النباتات الأحادية المتحصل عليها من نباتات ثنائية يطلق عليها اسم Monohaploids (وفيه $n = 1s$) ، بينما يطلق على النباتات الأحادية المتحصل عليها من النباتات الرباعية tetraploids اسم dihaploid (وفيه $n = 2s$) ، ويطلق اسم trihaploid على النباتات الأحادية المتحصل عليها من النباتات السداسية hexaploids (وفيه $n = 3s$) ... إلخ .

تكون الأفراد الأحادية المجموعة الكروموسومية صغيرة الحجم - عادة - وأضعف نمواً من مثيلاتها الثنائية المجموعة الكروموسومية ، كما تكون على درجة عالية من العقم . ويرجع

العم إلى أن كل كروموسوم يوجد في هذه النباتات بحالة مفردة ؛ وبذلك .. لا يحدث أى اقتران كروموسومى ، ويكون الإنعزال الكروموسومى غير منتظم ، وتحتوى معظم الجاميطات التى تنتجها النباتات الأحادية على نقص فى كروموسوم واحد أو أكثر ؛ لذا .. فإنها تكون غالباً عديمة الحيوية . هذا .. إلا أن جميع الكروموسومات قد تتجه - أحياناً - إلى قطب واحد من قطبى الخلية فى الدور الانفصالى من الانقسام الميوزى ، وتتكون بذلك جاميطة طبيعية . ويؤدى تزاوج جاميطتين من هذا النوع إلى تكون فرد ثنائى المجموعة الكروموسومية .

ونظراً لأن احتمال توجه أى كروموسوم إلى أى من قطبى الخلية هو ٥٠ : ٥٠ ؛ لذا .. يكون احتمال توجه جميع الكروموسومات فى أثناء الانقسام الميوزى إلى أى من قطبى الخلية هو $(\frac{1}{2})^n$ ؛ حيث تمثل (ن) عدد الكروموسومات فى الهيئة الكروموسومية ؛ وعليه .. نجد فى نبات كالذرة (وهو يحتوى على ١٠ أزواج من الكروموسومات) أن هذا الاحتمال يساوى $(\frac{1}{2})^{10}$ ، أو جاميطة من كل ١٠٢٤ جاميطة . ويتضح من ذلك لم تكون نسبة العم عالية فى الأفراد الأحادية المجموعة الكروموسومية ؛ لذا .. فإنها تكثر بالطرق الخضرية كلما أمكن ذلك .

تكون جميع الجينات فى النباتات الأحادية ممثلة مرة واحدة ؛ ويعنى ذلك ظهور الصفات التى تتحكم فيها الأليلات المتنحية . ويوصف التركيب الوراثى فى هذه الحالة بأنه hemizygous . وتعتبر تلك هى الحالة الطبيعية فى النباتات الدنيئة ، إلا أنها تعد حالة شاذة بالنسبة للنباتات الاقتصادية .

تبلغ نسبة النباتات الأحادية التى تتكون طبيعياً بالتوالد البكرى (*in vivo*) parthenogenesis فى الذرة نحو ٠,١ ٪ ؛ وهى تتكون بنمو إحدى الخلايا الأحادية بالكيس الجنينى إلى جنين . وقد ينشأ الجنين الأحادى فى أحيان قليلة من الجاميطة المذكرة مع سيتوبلازم الجاميطة المؤنثة . كما يمكن إنتاج النباتات الأحادية صناعياً بواسطة مزارع المتوك والمبايض . ويستفاد من النباتات الأحادية فى الجوانب التالية :

١- تؤدى مضاعفتها بالكولشييسين إلى إنتاج نباتات ثنائية أصلية ، قد يمكن الاستفادة منها فى إنتاج الهجن الفردية والزوجية ، دونما حاجة لعمليات التربية الداخلية ،

التي تستغرق عدة سنوات ، وقد تستعمل كأصناف جديدة محسنة ؛ كـ بعض أصناف الدخان ، والأرز ، والقمح ، التي أنتجت بمضاعفة نباتات أحادية .

٢- تفيد النباتات الأحادية -المتحصل عليها من النباتات المتضاعفة- في إجراء الدراسات الوراثية للصفات الكمية ؛ مثل دراسات التباين الوراثي ، والارتباط ، وعدد الجينات ومواقعها (Dunwell ١٩٨٥) .

٣- نقل الجينات من نوع إلى آخر ، وإحلال كروموسوم من أحد الأنواع محل آخر .
٤- التربية بالطفرات :

يمكن معرفة الطفرات المتنحية التي تظهر في النباتات الأحادية مباشرة ، دونما حاجة إلى إنتاج الجيل الطفرى الثانى (M_2) ؛ لأن الطفرة تكون في حالة hemizygous . ويكون من الأفضل معاملة مزارع الخلايا الأحادية ، وإجراء التقييم والانتخاب وهي على هذه الصورة . وقد أمكن بهذه الطريقة التعرف على طفرات مقاومة لمضادات الحيوية ، وشبيهات الأحماض الأمينية ، ومبيدات الحشائش . ويعاب على هذه الطريقة في إنتاج الطفرات أن استعمالها مقصور على الأنواع القليلة التي يمكن أن تبقى مزارع خلاياها الأحادية على حالتها ، مع إمكان دفعها إلى تكوين نباتات أحادية .

وقد أمكن إنتاج أجنة أحادية *in vivo* من مبايض الأزهار بعد تعريضها لإحدى المعاملات التالية : تأخير التلقيح - التلقيح بحبوب لقاح معاملة بالإشعاع - التلقيح بحبوب لقاح من أنواع أخرى - تعريض الأزهار لدرجات حرارة منخفضة . وقد أمكن زيادة نسبة النباتات الأحادية (ن) بعد العثور على ما يسمى بالملقحات الفائقة superior pollinators لبعض النباتات ؛ مثل الذرة ، والبطاطس . كما أمكن الحصول على عدد كبير من النباتات الأحادية من الشعير من التلقيح *Hordeum vulgare x H . bulbosum* باستعمال مزارع الأجنة . وقد تبين أن الأجنة الأحادية نشأت من الأجنة الهجين باستعباد كروموسومات النوع *H . bulbosum* خلال المراحل الأولى لتكوين الأجنة .

ويذكر chu (١٩٨٢) أنه أمكن -حتى عام ١٩٨٢- إنتاج نباتات أحادية من حبوب اللقاح فيما لا يقل عن ١١١ نوعاً نباتياً ، ينتمى معظمها إلى العائلات الباذنجانية ، والنجيلية ، والصليبية . ومنها بعض الأنواع الخشبية ؛ مثل جنس الحمضيات *Citrus* ، والعنب *Vitis* . ويعطى المرجع قائمة كاملة بهذه الأنواع .

وقد أمكن إنتاج أجنة أحادية بكثرة فى الشمام بتلقيح الأزهار المؤنثة صباح يوم تفتحها بحبوب لقاح معاملة بأشعة إكس . وينتج هذا التلقيح ثماراً طبيعية المظهر ، تحتوى داخلها على بعض الأجنة الأحادية ، بالإضافة إلى الأجنة الثنائية العادية . هذا .. ويلزم التعرف على الأجنة الأحادية المتكونة بعد ثلاثة أسابيع من التلقيح اليدوى ، ونقلها إلى بيئة صناعية ، وإلا .. فإنها تنهار وتختفى إذا تركت فى الثمار لأكثر من ذلك .

وقد أمكن تقليل الجهد اللازم للتعرف على هذه الأجنة ؛ بجمع البذور من الثمار بعد ٤-٧ أسابيع من التلقيح ، وفحصها بجهاز أشعة إكس العادى الذى يستخدم فى الأغراض الطبية . وتكون الأجنة صغيرة جداً - قبل ذلك ، ويصعب تداولها ، بينما تبدأ الأجنة فى الانهيار لو تركت لأكثر من سبعة أسابيع . ويلزم تجفيف الأجنة - جزئياً - قبل فحصها ؛ حتى لا تبدو معتمة فى الفيلم ، مع مراعاة عدم الإفراط فى التجفيف ؛ حتى لا تفقد حيويتها ، ويكون التجفيف على درجة ٤م لمدة ١٥ ساعة . وتوضع البذور - بعد تجفيفها- على لوح من البوليسترين سمكه ٥ مم ، وتغطى بشريط لاصق شفاف ، ثم تعرض لأشعة إكس . وتبدو البذور -التي تحتوى على أجنة أحادية- أقل عتمة على الفيلم من البذور التى تحتوى على أجنة ثنائية (Savin وآخرون ١٩٨٩) .

متعددة المجموعة الكروموسومية ذاتياً أو الذاتية التضاعف

تحتوى النباتات المتعددة المجموعة الكروموسومية ذاتياً - أو الذاتية التضاعف - Autopobylids أو Autoploids على مضاعفات كاملة للهيئة الكروموسومية ؛ كأن تكون ٣س ، أو ٤س ... إلخ . وتأخذ الدرجات المختلفة من التضاعف أسماء مختلفة كما يلى :

عدد مضاعفات الهيئة الكروموسومية (س)	الاسم
٣س	ثلاثية المجموعة الكروموسومية
٤س	رباعية المجموعة الكروموسومية
٥س	خماسية المجموعة الكروموسومية
٦س	سداسية المجموعة الكروموسومية
٧س	سباعية المجموعة الكروموسومية
٨س	ثمانية المجموعة الكروموسومية
	Triplids
	Tetraploids
	Pentaploids
	Hexaploid
	Heptaploids
	Octaploids

توجد حالات التضاعف الذاتى فى كثير من النباتات ، خاصة تلك التى تتكاثر خضرياً ؛ لأنها غالباً ماتكون على درجة عالية من العقم .

تشابه النباتات الثلاثية المجموعة الكروموسومية مع النباتات الأحادية فى كونها على درجة عالية من العقم ، لكنها تتميز عنها بأنها تحتل مركزاً مهماً بين النباتات المزروعة؛ إذ ينشأ عن حالة التضاعف الثلاثى تأثيرات مورفولوجية وفسيولوجية مرغوبة . وتكون النباتات الثلاثية - غالباً - قوية النمو ، كما تكون ثمارها كبيرة الحجم ، وغالبية من البنور، وتوجد منها أصناف تجارية كثيرة تكثر خضرياً ، ومن أمثلتها : الموز ، ونحوربع أصناف التفاح الأمريكية الهامة ، وبعض أصناف الكمثرى والمشمش اليابانى ، وبعض أصناف الكريزانتيمم التى تتميز بإنتاج مرتفع من البيئرثيم ، وبعض أشجار الحور التى تتميز بسرعة النمو العالية ، وعديد من نباتات الزينة ؛ مثل العائق وبعض أصناف التيولب، والجلادبولس . وتزرع أصناف ثنائية مع أصناف التفاح والمشمش والكمثرى الثلاثية ؛ لتكون مصدراً لحبوب اللقاح فى الحقول الإنتاجية . أما الموز .. فإن ثماره تعقد بكرياً ، ولا توجد البنور إلا فى الموز الثنائى المجموعة الكروموسومية ، وهو لايزرع تجارياً .

ومن بين النباتات الاقتصادية الهامة المتضاعفة ذاتياً كل من : البطاطس ، والبن ، والبرسيم الحجازى ، والفلو السودانى وجميعها رباعية التضاعف ، والبطاطا وهى سداسية التضاعف .

وتتميز النباتات المتضاعفة - عامة - بزيادة طول الساق ، وحجم الأوراق والأزهار ؛ ويحدث ذلك نتيجة للزيادة فى حجم خلاياها ، وليس فى أعدادها . كما تظهر بها فروق فى أشكال الأعضاء النباتية المختلفة ، وتكون أبطأ نمواً ، وأصلب عوداً من نظيرتها الثنائية المجموعة الكروموسومية . كذلك يزيد تركيز بعض المركبات الكيميائية فى النباتات الرباعية مقارنة بالنباتات الثنائية ، ومن أمثلة ذلك ما يلى :

- ١- محتوى المطاط فى الداىدليون الروسى .
- ٢- محتوى الأتروبين والقلوانيات الأخرى فى أوراق الداتورة .
- ٣- محتوى النيكوتين فى الدخان .
- ٤- محتوى «الكمفور» Champhor فى أوراق الريحان .
- ٥- محتوى حامض الأسكوربيك فى أوراق الكرنب وثمار الطماطم .

٦- محتوى المواد الكاروتينية فى الذرة الصفراء .

٧- محتوى الألياف فى القطن والجوت .

متعددة المجموعة الكروموسومية الخليطة أو الهجينية التضاعف

تنشأ الأفراد المتعددة المجموعة الكروموسومية الخليطة - أو الهجينية التضاعف - Allopolyploids حينما تجرى تلقينات معينة بين أفراد من مجموعتين مختلفتين من الوجهة التقسيمية . وتكون أفراد الجيل الأول الناتجة من هذا التهجين عقيمة - غالباً - لوجود الكروموسومات فى الفرد الهجين بحالة مفردة دون قرين ، إلا أنها قد تتقارن - جزئياً - إذا كانت الاختلافات بين الهياكل الكروموسومية للأبوين بسيطة ؛ وتعرف الهجن فى هذه الحالة باسم المتعددة المجموعة الكروموسومية الخليطة جزئياً Segmental Allopolyploids . وتعرف الكروموسومات المتماثلة جزئياً فى هذه الهجن باسم Homoeologous Chromosomes .

وقد يحتوى الفرد الهجين على جميع الكروموسومات التى توجد فى أبويه ؛ ويحدث ذلك فى إحدى الحالتين التاليتين :

- ١- حينما ينشأ الفرد المتعدد المجموعات الكروموسومية الخليطة من اتحاد جاميطات ثنائية (٢ن) ، تكونت إما بمحض الصدفة ، وإما نتيجة لمضاعفة كروموسومات الآباء صناعياً قبل إجراء التهجين .
- ٢- إذا حدث تضاعف لكروموسومات الفرد المتعدد المجموعات الكروموسومية الخليطة .

تعرف هذه الأفراد التى تحتوى خلاياها الجسمية على جميع الكروموسومات التى توجد فى كل من أبويها باسم المتعددة المجموعات الكروموسومية الشبيهة بالثنائية Amphidiploids . ولا يختلف السلوك الكروموسومى لهذه الأفراد فى الانقسام الميوزى عن الأفراد الثنائية المجموعة الكروموسومية العادية . وتكون هذه النباتات صادقة التربية لنوعها true breeding ، إلا إذا كانت نشأتها بالطريقة الأولى ، وكانت الآباء خليطة أصلاً .

وليس من الضروري أن تكون الأفراد المتعددة المجموعة الكروموسومية - الشبيهة بالثنائية - خصبة دائماً ، كما لارتبط قيمتها الزراعية بقيمة الأنواع النباتية الداخلة في إنتاجها ؛ فقد يؤدي تهجين أنواع عديمة القيمة معاً إلى الحصول على أنواع جديدة على درجة كبيرة من الأهمية . وقد حدث ذلك بالنسبة لكل من القمح والقطن ، والدخان ، وغيرها من المحاصيل الهامة التي نشأت - في الطبيعة - من تهجينات بين أنواع لاشأن لها .


ينتشر التضاعف الهجينى فى الطبيعة بدرجة كبيرة ، ويعتبر القمح المثال التقليدى على ذلك . كما يوجد أيضاً فى كل من القطن ، والشوفان ، وبنجر السكر ، والقصب ، والشليك ، والبرقوق الأوروبى . كذلك ينتشر التضاعف الهجينى فى العائلة الصليبية ، وقد اقترح U ، (وهو عالم يابانى) الطريقة المبينة فى شكل (١٤-٣) للكيفية التى نشأت بها الأنواع المتعددة المجموعة الكروموسومية الشبيهة بالثنائية فى الجنس *Brassica* والتى تعرف بمثلث U .

ومن أمثلة التضاعف الهجينى الصناعى الهجين *Raphanobrassica* الذى أنتجته Karpechenko بالتهجين بين الفجل (٢ن = ١٨) ، والكرونب (٢ن = ١٨) ، ثم مضاعفة كروموسومات الجيل الأول لتصبح بخلاياه الجسمية ٣٦ كروموسوماً ، تشتمل على المجموعة الكروموسومية الكاملة لكل من الفجل والكرونب . كما نشأ النوع *Primula kewensis* كطفرة متضاعفة للهجين النوعى : *P. floribunda* × *P. verticillata* ، الذى ظل عقيماً لعدة سنوات ، إلى أن ظهرت هذه الطفرة على صورة فرع يحمل أزهاراً كثيرة خصبة بأحد النباتات ، ثم اتضح أن خلايا هذا الفرع يوجد بها ٣٦ كروموسوماً ، وهو العدد الكلى لكروموسومات الأبوين .

السلوك السيتولوجى والوراثى للنباتات الذاتية التضاعف

السلوك السيتولوجى

يتكون فى أثناء الانقسام الاختزالى فى النباتات الذاتية التضاعف Autoploids وحدات كروموسومية متعددة الكروموسوم multivalents ، بدلاً من الوحدات الثنائية الكروموسوم bivalents ، التى تتكون فى النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية ؛ فنجد



شكل (١٤ - ٣) : مثلث U لبيان الكيفية التي يحتمل أن تكون قد نشأت بها أنواع الجنس *Brassica* المتعددة المجموعة الكروموسومية الشبيهة بالثنائية amphidiploids (وهي التي بها $n = ١٧$ ، أو ١٨ ، أو ١٩) من الأنواع الثنائية diploids (وهي التي بها $n = ٨$ ، أو ٩ ، أو ١٠) . تشير الأسهم إلى الأنواع المتضاعفة هجيناً التي نشأت من مختلف الأنواع الثنائية .

في النباتات الثلاثية المجموعة الكروموسومية أن معظم الكروموسومات تتقارن في وحدات ثلاثية الكروموسوم trivalents ، مع تكون بعض الوحدات الأحادية الكروموسوم univalents ، وبعض الوحدات الثنائية الكروموسوم . ونجد في النباتات الرباعية المجموعة الكروموسومية أن معظم الكروموسومات تظهر أثناء الانقسام الاختزالي على شكل وحدات رباعية الكروموسوم quadrivalents ، أو ثنائية الكروموسوم . مع تكون بعض الواحدات الأحادية والثلاثية الكروموسوم ... إلخ . ويكون التقارن بين الكروموسومات عشوائياً تماماً Randon Paring مادام التضاعف الكروموسومي من النوع الذاتي ، وكانت الكروموسومات متماثلة تماماً Homologus . هذا .. إلا أنه قد تظهر درجات


مختلفة من التقارن التفاضلى Preferential Paring ، أو الاختيارى Selective Pairing فى حالة الأفراد المتعددة المجموعة الكروموسومية الشبيهة بالثنائية amphidiploids التى تكون فيها كروموسومات الأبوين متشابهة جزئياً Homoelogus ، كما سيتضح عند بيان السلوك السيتولوجى للنباتات الهجينية التضاعف .

وبتلخص عملية الاقتران الكروموسومى فى الوحدات الرباعية الكروموسوم (فى الأفراد الرباعية المجموعة الكروموسومية) فيما يلى : تظهر الكروموسومات الأربعة المتماثلة فى الدور القلادى ، ثم تتصل فى أزواج فى الدور التزاوجى . يبدأ الاتصال عند عدة مواقع على امتداد الكروموسومات ؛ وبذلك .. يقترن كل كروموسوم من الكروموسومات الأربعة بكروموسوم آخر منها عند مواقع مختلفة . ومع نهاية الدور الضام .. يكون الكروموسوم الواحد قد اقترن مع كروموسومات مختلفة (شكل ١٤-٤) ، وانقسم كل كروموسوم منها إلى كروماتيدتين ، وتكون قد تكونت الكيازومات chiasmata ؛ نتيجة للعبور بين الكروموسومات المتقارنة . ويؤدى الاختلاف فى عدد ومواقع الكيازومات إلى ظهور عدة أشكال مميزة (مثل الوحدات الثنائية الكروموسوم ، والسلاسل ، والحلقات) فى الدور الانفراجى .


وبعد أن تتعلق الوحدات الرباعية الكروموسوم بخيوط المغزل فى دور الوضع المتوسط الأول .. فإن الانفصال قد يحدث بحيث تذهب الكروموسومات المتجاورة (فى أى من الأشكال المميزة السابقة) إلى نفس القطب ، أو إلى أقطاب مختلفة . ولكن قد تتكون وحدتان ثنائيتا الكروموسوم إن لم تتكون كيازمتان بين أزواج الكروماتيدات ؛ حينئذ .. يتحتم على كروموسومى كل وحدة ثنائية الكروموسوم أن يتوزعا على قطبين مختلفين فى الدور الانفصالى الأول .

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأنواع المعروفة الرباعية المجموعة الكروموسومية (مثل البطاطس والبرسيم الحجازى) تظهر بها أحياناً درجة من التقارن الاختيارى Selective Pairing . ويرجع ذلك إلى تراكم تغيرات طفيفة ، حدثت فى الكروموسومات منذ فترات زمنية بعيدة ، برغم أنها كانت فى الأصل تامة التماثل . وبعد التقارن الاختيارى فى مثل هذه النباتات الرباعية المجموعة الكروموسومية انحرافاً نحو العودة إلى الحالة الثنائية diploidization .


الدور التزاوجي




الدور الضام




الدور الانفراجي



الدور التشتي



الدور الاستوائي



وحدات ثنائية الكروموسوم

سلاسل

حلقات

شكل (١٤ - ٤) : أشكال الوحدات الرباعية الكروموسوم خلال الانقسام الميوزي الأول (يراجع المتن

التفاصيل) .

السلوك الوراثى

يختلف السلوك الوراثى للنباتات الذاتية التضاعف عن النباتات الثنائية ، بسبب احتمال وجود أكثر من أليلين لكل جين ، ولتكوين وحدات متعددة الكروموسوم . وحتى إذا وجد أليلان فقط للجين .. فإن عدد التراكيب الوراثية الممكنة فى نبات رباعى المجموعة الكروموسومية (وهى درجة منخفضة نسبياً من التضاعف) يصبح خمسة مقارنة بثلاثة فقط فى النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية . ويطلق على التراكيب الوراثية الخمسة الممكنة فى حالة وجود أليلين ، أحدهما سائد (A) ، والآخر مُتَنَح (a) الأسماء التالية :

التركيـب الوراثى	الاسم
AAAA (سائد أصيل)	quadriplex
AAAa	triplex
AAaa	duplex
Aaaa	simplex
aaaa (متنح أصيل)	nulliplex

يلاحظ أن نسبة الأليلات السائدة إلى المتنحية تختلف فى النباتات الـ triplex ، والـ duplex ، والـ simplex عن النسب المعهودة فى النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية ، إلا أن الشكل الظاهرى للفرد الخليط يتوقف على درجة السيادة بين الأليلات ؛ ففى حالة السيادة التامة .. لا يظهر سوى نوعين من الأشكال المظهرية ، بينما يظهر عدد أكبر من الأشكال المظهرية فى حالات السيادة غير التامة . ويصل عدد الأشكال المظهرية إلى خمسة عند غياب السيادة ، وفى حالات التأثير الإضافى للجين .

وتتوقف نسب التراكيب الوراثية التى يتوقع ظهورها فى النسل على كل من التركيب الوراثى لجيل الآباء ، وعلى مدى كون انعزال الجينات يحدث فى أثناء الانقسام الاختزالى على مستوى التوزيع الحر للكروموسومات ، أم للكروماتيدات . وسنفترض - للتبسيط - أن التركيب الوراثى للآباء simplex أى Aaaa ، ثم نستعرض النسب المتوقعة فى كل من حالتى التوزيع الحر .

١- التوزيع الحر للكروموسومات Random Chromosome Assortment :


يحدث التوزيع الحر للكروموسومات عندما تفشل الكروموسومات فى تكوين وحدة رباعية الكروموسوم ، أو عندما يكون الجين قريباً بدرجة كبيرة من موضع السنترومير ؛ فنجد أن كل كروموسوم يحمل فى أثناء الانقسام الاختزالى أليلين متشابهين على كروماتيديه ، ويذهب الأليلان - معاً - إلى أحد أقطاب الخلية فى أثناء الانقسام الاختزالى الأول ؛ لأنهما يكونان متصلين بنفس السنترومير ، ثم يتوزع الأليلان إلى أقطاب مختلفة فى الانقسام الاختزالى الثانى ؛ وعليه .. فلا يمكن أن يتواجد الأليلان - معاً - فى جاميطة واحدة بعد الانقسام (شكل ١٤-٥) . ولتوضيح ذلك .. نفترض أن الأليلات التى يحملها النبات الـ simplex (وهى أليل واحد سائد A ، وثلاثة متنحية a) تتضاعف عند تكوين الكروماتيدات (أثناء الانقسام الاختزالى) ؛ لتصبح (A₁ ، و A₂) ، و (a₃ ، و a₄) ، و (a₅ ، و a₆) ، و (a₇ ، و a₈) ، علماً بأن كل زوج منها (داخل قوسين) يمثل أليلين متماثلين على كروماتيدين متماثلتين لكروموسوم واحد .

ونظراً لأن كل زوج من الأليلات ينتهى به الأمر فى جاميطات مختلفة ؛ لذا .. فإن كلاً من A₁ ، و A₂ يكون له نفس الفرصة لأن ينعزل مع أى من a₃ ، أو a₄ ، أو a₅ ، أو a₆ ، أو a₇ ، أو a₈ ، ولكنهما - أى A₁ ، و A₂ - لا يمكن أن يتواجدا معاً فى جاميطة واحدة .. وهكذا الأمر بالنسبة لأزواج الأليلات الأخرى . وتكون نتيجة ذلك أن تتعزل الجينات فى الجاميطات - على أساس التوزيع الحر للكروموسومات - كما هو مبين فى شكل (١٤-٦) . ويتبين من الشكل أنه يتكون نوعان من الجاميطات ، هما : Aa ، و aa بنسبة ١:١ . ويمكن بتحليل مماثل إثبات أن النبات الـ duplex (AAAA) ينتج ثلاثة أنواع من الجاميطات هى AA ، و Aa ، و aa بنسبة ١:٤:١ ، وأن AAAa triplex ينتج نوعين من الجاميطات هما AA ، و Aa بنسبة ١:١ .

وتحسب نسب التراكيب الوراثية المتوقعة بعد ذلك كما يلى :

(١) فى حالة الـ simplex :

الجاميطات المذكرة			
		1Aa	1aa
الجاميطات المؤنثة	1Aa	1AAaa	1Aaaa
	1aa	1Aaaa	1aaaa



شكل (١٤ - ٥) : انعزال الجينات من وحدة رباعية الكروموسوم quadrivalent لنبات simplex (Aaaa) . يعتمد الانعزال على التوزيع الحر للكروموسومات ، لوجود الجين قريباً جداً من السنترومير وانعدام العبور في هذه المنطقة .

	A ₁	A ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆	a ₇	a ₈
A ₁			A ₁ a ₃	A ₁ a ₄	A ₁ a ₅	A ₁ a ₆	A ₁ a ₇	A ₁ a ₈
A ₂			A ₂ a ₃	A ₂ a ₄	A ₂ a ₅	A ₂ a ₆	A ₂ a ₇	A ₂ a ₈
a ₃					a ₃ a ₅	a ₃ a ₆	a ₃ a ₇	a ₃ a ₈
a ₄					a ₄ a ₅	a ₄ a ₆	a ₄ a ₇	a ₄ a ₈
a ₅							a ₅ a ₇	a ₅ a ₈
a ₆							a ₆ a ₇	a ₆ a ₈
a ₇								
a ₈								

شكل (١٤ - ٦) : تكوين الجاميطات في نبات simplex في حالة التوزيع الحر للكروموسومات .

أى يتوقع أن تكون التراكيب الوراثية ونسبها كما يلى : ١ : AAaa ٢ : Aaaa ١ :
 وتكون الأشكال المظهرية المتوقعة فى حالة السيادة التامة هى ٣ سائد : ١
 متنح

(ب) فى حالة ال duplex :

		الجاميطات المذكرة		
		1AA	4Aa	1aa
الجاميطات المؤنثة	1AA	1AAAA	4AAAAa	1AAaa
	4Aa	4AAAAa	16AAaa	4Aaaa
	1aa	1AAaa	4Aaaa	1aaaa

أى يتوقع أن تكون التراكيب الوراثية ونسبها كما يلى : ١ : AAAA ٨ : AAAa :
 ١٨ : AAaa ٨ : Aaaa ١ : aaaa . وتكون الأشكال المظهرية المتوقعة فى حالة السيادة
 التامة هى ٣٥ سائد : ١ متنح .

(ج) فى حالة triplex :

		الجاميطات المذكرة	
		1AA	1Aa
الجاميطات المؤنثة	1AA	1AAAA	1AAAAa
	1Aa	1AAAAa	1AAaa

أى يتوقع أن تكون التراكيب الوراثية ونسبها كما يلى : ١ : AAAA ٢ : AAAa :
 ١ : AAaa . وتكون جميع الأشكال المظهرية سائدة فى حالة السيادة التامة .

٢- التوزيع الحر للكروماتيدات Random Chromatid Assortment :

إذا تكونت وحدات رباعية الكروموسوم مع وجود الجينات بعيدة عن السنترومير بدرجة
 تسمح بحدوث عبور بين موقع الجين والسنترومير .. فإن ذلك يعطى فرصة متكافئة لأن
 يتواجد أى أليل مع أى أليل آخر ، بما فى ذلك أزواج الأليلات التى توجد على

الكروماتيدات الشقيقة (شكل ١٤-٧) . وتتكون الجاميطات على النحو المبين في شكل (١٤-٨) من كل نبات simplex (Aaaa) ، بفرض حدوث عبور بنسبة ٥٠٪ ، علماً بأن كل زوج من الأليلات (A₁ و A₂) ، و (a₃ و a₄) ، و (a₅ و a₆) ، و (a₇ و a₈) - داخل قوسين - يمثل أليلين متماثلين على كروماتيدتين متماثلتين لكروموسوم واحد . ويتبين من الشكل أنه يتكون ثلاثة أنواع من الجاميطات هي AA ، Aa و aa بنسبة ١ : ١٢ : ١٥ . ويمكن بتحليل معادل إثبات أن النبات duplex (AAaa) ينتج الجاميطات AA ، Aa ، و aa بنسبة ٣ : ٨ : ٣ ، وأن الـ triplex (AAAa) ينتج الجاميطات AA ، Aa ، و aa بنسبة ١ : ١٢ : ١٥ .

وتحسب نسبة التراكيب الوراثية المتوقعة بعد ذلك كما يلي :


(١) في حالة الـ simplex :

		الجاميطات المذكرة		
		1AA	12Aa	15aa
الجاميطات المؤنثة	1AA	1AAAA	12AAAa	15AAaa
	12Aa	12AAAA	144AAAa	180Aaaa
	15aa	15AAaa	180Aaaa	225aaaa

أى يتوقع أن تكون التراكيب الوراثية ونسبها كما يلي :

بنسبة ١	AAAA	qudrplex
بنسبة ٢٤	AAAa	triplex
بنسبة ١٧٤	AAaa	duplex
بنسبة ٣٦٠	Aaaa	simplex
بنسبة ٢٢٥	aaaa	nulliplex

وتكون الأشكال المظهرية المتوقعة في حالة السيادة التامة هي ٥٥٩ سائداً : ٢٢٥ متتحياً ، أو حوالى ٤٨ ، ٢ : ١ .



شكل (١٤ - ٧) : تكوين الجاميطات من وحدة رباعية الكروموسوم لنبات (Aaaa) Simplex يحدث فيه عبور بين الكروموسوم الحامل للآليل السائد وكروموسوم آخر . ينتج من هذا العبور كروموسومين Aa وآخرين aa ينعزل الكروموسومان Aa إلى نفس القطب في الانقسام الاختزالي الأول في ثلث الحالات (الانعزال العلوي) ، وإلى أقطاب مختلفة في ثلثي الحالات (الانعزال السفلي) . وعندما ينتهي بهم الأمر في القطب نفسه في كل من الانقسامين الاختزاليين الأول والثاني (الحالة ١) .. فإن ذلك يعني تكون جاميطات أصيلة . أما تكوين الجاميطات من الوحدات الرباعية الكروموسوم للنباتات الـ duplex فيكون أكثر تعقيداً ؛ بسبب كثرة التوافق الممكنة .

	A ₁	A ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆	a ₇	a ₈
A ₁		A ₁ A ₂	A ₁ a ₃	A ₁ a ₄	A ₁ a ₅	A ₁ a ₆	A ₁ a ₇	A ₁ a ₈
A ₂			A ₂ a ₃	A ₂ a ₄	A ₂ a ₅	A ₂ a ₆	A ₂ a ₇	A ₂ a ₈
a ₃				a ₃ a ₄	a ₃ a ₅	a ₃ a ₆	a ₃ a ₇	a ₃ a ₈
a ₄					a ₄ a ₅	a ₄ a ₆	a ₄ a ₇	a ₄ a ₈
a ₅						a ₅ a ₆	a ₅ a ₇	a ₅ a ₈
a ₆							a ₆ a ₇	a ₆ a ₈
a ₇								a ₇ a ₈
a ₈								

شكل (١٤ - ٨) : التركيب الوراثي للجاميطات التي يكونها نبات Simplex (Aaaa) على أساس التوزيع الحر الكروماتيدات (يراجع المتن للتفاصيل) .

(ب) في حالة ال duplex :

الجاميطات المذكورة				
	3AA	8Aa	3aa	
الجاميطات الموزعة	3AA	9AAAA	24AAAAa	9AAaa
	8Aa	24AAAAa	64AAaaa	24Aaaa
	3aa	9AAaa	24Aaaa	9aaaa

أى يتوقع أن تكون التراكيب الوراثية ونسبها كما يلي :

بنسبة ٩	AAAA	qudrplex
بنسبة ٤٨	AAAa	triplex
بنسبة ٨٢	AAaa	duplex
بنسبة ٤٨	Aaaa	simplex
بنسبة ٩	aaaa	nullplex

وتكون الأشكال المظهرية المتوقعة في حالة السيادة التامة هي ١٧٨ سائداً : ٩

متتجياً ، أو حوالى ٢١ : ١ .

(ج) فى حالة الـ triplex :

الجاميطات المؤنثة	الجاميطات المذكرة		
	15AA	12Aa	1aa
15AA	225AAAA	180AAaAa	15AAaa
12Aa	180AAaAa	144Aaaa	12Aaaa
1aa	15AAaa	12Aaaa	1aaaa

أى يتوقع أن تكون التراكيب الوراثية ونسبها كما يلى :

بنسبة ٢٢٥	AAAA	quadriplex
بنسبة ٣٦٠	AAAa	triplex
بنسبة ١٧٤	AAaa	duplex
بنسبة ٢٤	Aaaa	simplex
بنسبة ١	aaaa	nulliplex

وتكون الأشكال المظهرية المتوقعة فى حالة السيادة التامة هى ٧٨٣ : ١ .

وبين جدول (١٤-١) ملخصاً لانعزالات الأشكال المظهرية المتوقعة فى حالات التزاوجات المختلفة لنباتات رباعية المجموعة الكروموسومية مع افتراض السيادة التامة (عن Allard ١٩٦٠) . ويتبين من الجدول استحالة تمييز النبات الـ quadriplex عن النبات الـ triplex على أساس اختبار النسل ؛ لأن جميع نباتات النسل تحمل الصفة السائدة فى كل منهما ، ولا يفيد انعزال النباتات الـ triplex فى حالة التوزيع الحر للكروماتيدات إلى ٧٨٣ سائداً : ١ متنح ؛ لأن نسبة النباتات المتنحية تكون منخفضة جداً إلى درجة يصعب معها ظهور واكتشاف هذه النباتات فى النسل .

وتجدر الإشارة إلى أن الانعزالات المبينة فى جدول (١٤-١) هى لحالتى التوزيع الحر للكروموسومات (حينما لا تتكون وحدات رباعية الكروموسوم نهائياً ، أو حينما تكون الجينات قريبة جداً من السنترومير إلى درجة لا يحدث معها عبور بين موقع الجين

جدول (١٤-١) : ملخص لانعزالات الأشكال المظهرية المتوقعة فى حالات التزاوجات المختلفة لنبات رباعى المجموعة الكروموسومية ، مع افتراض السيادة التامة .

انعزال الأشكال المظهرية (سائد : متتح) على أساس		
التزاوج	التوزيع الحر للكروموسومات	التوزيع الحر للكروماتيدات
AAAA ذاتى	كلها سائدة	كلها سائدة
AAAa ذاتى	كلها سائدة	١ : ٧٨٣
AAaa ذاتى	١ : ٣٥	١ : ٢٠,٨
Aaaa ذاتى	١ : ٣	١ : ٢,٥
aaaa ذاتى	كلها متنحية	كلها متنحية
AAaa × AAAa	كلها سائدة	١ : ١٣٠
Aaaa × AAAa	كلها سائدة	١ : ٥١,٣
aaaa × AAAa	كلها سائدة	١ : ٢٧
Aaaa × AAaa	١ : ١١	١ : ٧,٧
aaaa × AAAa	١ : ٥	١ : ٣,٧
aaaa × Aaaa	١ : ١	١ : ٠,٨٧

والسنتروميير) ، والتوزيع الحر للكروماتيدات (حينما تكون الجينات بعيدة عن السنتروميير بقدر يسمح بحدوث عبور تام بين موقع الجين والسنتروميير) ، إلا أنه يتعين - حتماً - وجود حالات تتكون فيها وحدات رباعية الكروموسوم بنسب مختلفة ، أو لا يكون فيها ارتباط الجين بالسنتروميير كاملاً ، وهى حالات يكون فيها الانعزال -دائماً- وسطاً بين الحالات السابقة .

السلوك السيتولوجى والوراثى للنباتات متعددة المجموعات الكروموسومية الشبيهة بالثنائية

السلوك السيتولوجى

سبق أن أوضحنا أن الهجن النوعية -التي تختلف أباًؤها كثيراً عن بعضها- تكون على

درجة عالية من العقم ؛ لفشل كروموسومات الأبوين فى الاقتران مع بعضها فى أثناء الانقسام الاختزالى ؛ حيث تبقى على صورة وحدات أحادية الكروموسوم . أما إذا كانت كروموسومات الأبوين متماثلة جزئياً homeologous (كما فى حالات النباتات المتعددة المجموعة الكروموسومية الخليطة جزئياً (Segmental Allopolyploids) .. فإنها تتقارن فى المناطق المتماثلة ، وبذا .. تتكون وحدات ثنائية الكروموسوم فى أثناء الانقسام الاختزالى ، وتكون النباتات خصبة نسبياً .

وعلى خلاف ما سبق بيانه .. فإن الوضع يصبح معكوساً تماماً بالنسبة للنباتات المتعددة المجموعات الكروموسومية الشبيهة بالثنائية Amphidiploids ؛ ففي هذه الحالة .. يحتوى الهجين النوعى على جميع كروموسومات الأبوين ؛ فإن لم يوجد أى تشابه بين كروموسومات الأبوين كان الهجين النوعى خصباً ؛ لأن أزواج الكروموسومات المتماثلة تتقارن مع بعضها فى أثناء الانقسام الاختزالى ، وتكون وحدات ثنائية الكروموسوم .

ويعرف التقارن الكروموسومى هذا بالتقارن التفاضلى الكامل Complete Preferential Pairing ، ويترتب عليه انعدام العبور بين كروموسومات الأبوين واستمرار احتفاظ الهجين بصفاته المميزة . أما إذا كانت كروموسومات الأبوين متماثلة جزئياً .. فإنها تتقارن مع بعضها فى المناطق المتماثلة بطريقة غير منتظمة ؛ فتتكون وحدات رباعية الكروموسوم ، أو وحدات ثلاثية وأخرى أحادية الكروموسوم ، كما قد تتكون وحدات ثنائية الكروموسوم ، وهو ما يعرف بالتقارن الاختيارى Selective Pairing . ويترتب على ذلك عدم وصول أجزاء متساوية من الكروماتين إلى الجاميطات ، وهو ما يجعل الهجين على درجة عالية من العقم .

وتجدر الإشارة إلى أن درجة التماثل homology بين الكروموسومات مسألة نسبية ، وتتوقف على درجة القرابة بين النوعين المهجنين معاً . وحينما تكون الآباء من نوع نباتى واحد .. فإن التماثل الكروموسومى يكون تاماً ، ويكون التقارن عشوائياً تماماً فى الوحدات الرباعية الكروموسومية ؛ إلا أن مثل هذه الهجن (التي تحتوى على جميع كروموسومات الأبوين) لاتخرج عن كونها نباتات رباعية المجموعة الكروموسومية tetraploids ، ولاتعد من النباتات المتعددة المجموعة الكروموسومية الشبيهة بالثنائية Amphidiploids .

السلوك الوراثى

يكون جزء كبير من المادة الوراثية فى النباتات المتعددة المجموعات الكروموسومية الشبيهة بالثنائية مكرراً ، سواء أكانت كروموسومات الآباء مختلفة تماماً (حالات الـ Allopolyploidy) ، أم مختلفة جزئياً (حالات الـ Segmental Allopolyploidy) ، وتلك من الأمور التى يجب الانتباه إليها عند دراسة وراثة الصفات فى النباتات الهجينية التضاعف. أما عن الشكل المظهرى لهذه النباتات .. فإنه غالباً مايكون وسطاً بين الآباء ، وإن كان من غير الممكن التنبؤ بذلك مقدماً .

تعدد المجموعات الكروموسومية الخلطى كطريقة لنشأ الأنواع

نشأ أنواع القمح

يعد القمح مثلاً كلاسيكياً لنشأة الأنواع بطريقة تعدد المجموعات الكروموسومية الخلطى . وتقسم الأنواع التابعة لجنس القمح *Triticum* - عادة - إلى ثلاث مجاميع ، تبعاً لعدد كروموسومات الهيئة الكروموسومية ، الذى يكون دائماً إما سبعة وإما مضاعفات لهذا العدد كما يلى :

١- مجموعة إينكورن Einkorn :

تعد الأنواع التى تنتمى إلى هذه المجموعة ثنائية المجموعة الكروموسومية ، وفيها $n = 7$ ، ومن أمثلتها النوعان : *T. aegilopoides* ، و *T. monococcum* .

٢- مجموعة إيمر Emmer :

تعد الأنواع التى تنتمى إلى هذه المجموعة رباعية المجموعات الكروموسومية ، وفيها $n = 14$ ، ومن أمثلتها الأنواع *T. dicoccoides* ، و *T. dicoccum* ، و *T. durum* .

٣- مجموعة فولجير Vulgare أو سبلتا Spelta :


تعد الأنواع التى تنتمى إلى هذه المجموعة سداسية المجموعات الكروموسومية ، وفيها $n = 21$ ، ومن أمثلتها الأنواع *T. spelta* ، و *T. vulgare* ، و *T. compactum* .

وقد تبين من الدراسات السيتولوجية أن الانقسام الميوزى فى هذه المجموعات منتظم للغاية ، وأن الكروموسومات تقترن دائماً على شكل وحدات ثنائية الكروموسوم ، وهو ما يدل على عدم وجود أى تشابه -ولجزئى- بين الكروموسومات فى أى من هذه الأنواع ، باستثناء ما يكون بين كروموسومى كل زوج منها . كما تبين أن الأقماح الرباعية تحتوى على هيتتين كروموسوميتين كاملتين متضاعفتين (أعطيتا الرمزين A ، و B) ، وأن كلاهما تتكون من سبعة كروموسومات غير متماثلة ؛ لذا ... فإن الأقماح الرباعية -وهى هجن متعددة المجموعات الكروموسومية شبيهة بالثنائية- تحتوى على ١٤ زوجاً من الكروموسومات ، ويتكون بها فى أثناء الانقسام الاختزالى ١٤ وحدة ثنائية الكروموسوم . أما الأقماح السداسية .. فقد تبين أنها تحتوى على الهيتتين الكروموسوميتين السابقتين A ، و B وهيئة كروموسومية ثالثة أعطيت الرمز D . وتتكون الهيئة D كذلك من سبعة كروموسومات ، تختلف عن أى من كروموسومات الهيتتين A ، و B . لذا .. فإن الأقماح السداسية - وهى هجن متعددة المجموعات الكروموسومية شبيهة بالثنائية - تحتوى على ٢١ زوجاً من الكروموسومات ، ويتكون بها أثناء الانقسام الاختزالى ٢١ وحدة ثنائية الكروموسوم .

وقد تبين من دراسات كل من Kihara ، و Sears ، و McFadden أنه توجد هيئة كروموسومية مشتركة بين جميع مجاميع القمح ، وهى التى أخذت الرمز A . ويعنى ذلك أن أنواع مجموعة الـ Einkorn تحتوى على الهيئة الكروموسومية A . أما الهيئة الكروموسومية الثانية التى أخذت الرمز B .. فيعتقد أنها أتت من حشيشة الأجروبيرون *Agropyron* ، وإن لم يكن ذلك متفقاً عليه ، بينما يوجد اتفاق بين العلماء على أن الأقماح السداسية قد حصلت على الهيئة الكروموسومية الثالثة (التى أخذت الرمز D) من النوع *Aegilops squarrosa* (ن = ٧) كما هو مبين فى شكل (١٤-٩) .

نشأ محاصيل زراعية أخرى

نشأ عديد من المحاصيل الزراعية الأخرى عن طريق الهجن النوعية أو الجنسية التى ضوعفت كروموسوماتها ؛ لتصبح نباتات متعددة المجموعة الكروموسومية شبيهة بالثنائية *Amphidiploids* . وقد سبقت الإشارة إلى نشأة بعض أنواع الجنس *Brassicae* بهذه الكيفية . كما نشأ عديد من الأنواع المحصولية الأخرى بهذه الطريقة ، وكانت نشأة



شكل (٩ - ١٤) : تخطيط يبين نشأة الأنواع الرباعية (Immer) والسداسية (Vulgare) من القمح ، وأوجه القرابة بينها وبين الأنواع الثنائية (Einkorn) .

بعضها بصورة طبيعية ، بينما نشأ بعضها الآخر لدى تدخل الإنسان ، وإجراء التلقيحات ومضاعفة كروموسومات الجيل الأول الهجين بنفسه . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع الفصل الخامس عشر .

التربية بالتضاعف الذاتي

أهمية التربية بالتضاعف

أدى اكتشاف الكولشيسين Colchicine (مركب كيميائي يستخرج من أحد النباتات ، ويستعمل في مضاعفة أعداد الكروموسومات في النباتات) وسهولة استخدامه في مضاعفة

كروموسومات عديد من النباتات فى عام ١٩٢٧ إلى اتجاه العلماء نحو مضاعفة كروموسومات عدد كبير من الأنواع النباتية ؛ ظلنا منهم أن ذلك كفيل بإحداث تقدم سريع فى تحسين المحاصيل الزراعية ، خاصة أن بعضاً من أهم النباتات الاقتصادية - مثل القمح ، والقطن ، والبطاطس - هى نباتات متضاعفة . كما ساعد على تقوية هذا الاتجاه على أن إحداث التضاعف صناعياً كان مصاحباً - غالباً - بزيادة فى حجم الأعضاء النباتية ، وهو ما يتوقع معه الحصول على نباتات كبيرة الحجم غزيرة المحصول ، إلا أن فريقاً آخر من العلماء كان أقل تفاؤلاً ؛ استناداً إلى أن الإنسان لا يمكنه أن ينجز فى أعوام قليلة ما لم يتحقق فى الطبيعة خلال آلاف السنين ، خاصة أن فرصة حدوث التضاعف -طبيعياً- متوفرة دائماً بالنسبة لجميع الأنواع النباتية . وقد تبين أن هذا الفريق كان أكثر واقعية ؛ لأن معظم النباتات التى ضوغت صناعياً كانت ضعيفة النمو، وصغيرة الحجم ، وغير ثابتة وراثياً ، وعقيمة بدرجة عالية .

هذا .. ولا يمكن التنبؤ بمظهر النباتات المتضاعفة من مظهرها فى الحالة الثنائية ، ويتعين -دائماً- استمرار التجربة والخطأ ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن مضاعفة النباتات الثنائية تعطى نتائج أفضل من مضاعفة النباتات المتضاعفة بالفعل . وعلى سبيل المثال .. وجد أن مضاعفة كروموسومات القمح والبطاطس - وهما من الأنواع المتضاعفة بطبيعتها - تحدث نقصاً فى قوة النمو وعمقا فى كلا المحصولين . ويبدو أنه يوجد حد لدرجة التضاعف المثلى لكل نوع نباتى ، وقد بلغت معظم الأنواع هذه الحالة المثلى فى الطبيعة . هذا .. ولا يمكن معرفة القيمة الحقيقية للنباتات المتضاعفة باختبارها تحت نفس الظروف البيئية التى تقيم فيها النباتات الثنائية ، بل تلزم دراستها فى ظروف بيئية متباينة .

ويمكن القول .. إن التضاعف لا يستخدم فى إنتاج سلالات جديدة بغرض استعمالها كأصناف جديدة مباشرة ، وإنما لاستعمالها كسلالات تربية ، يمكن الاستفادة منها فى برامج التربية . فالتضاعف لا يكون هو نهاية المطاف ، وإنما يكون غالباً بداية لبرنامج التربية ؛ فمثلاً .. يؤدى التهجين بين النباتات المتضاعفة ، ثم الانتخاب فى النسل إلى زيادة الخصوبة والجودة . كما تؤدى التربية الداخلية فى النباتات المتضاعفة إلى إنتاج نباتات أصيلة فى صفات مرغوبة . وتجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى أن حالة عدم

التماثل الوراثي heterozygosity ، تقل بمقدار النصف كل ٣,٨ جيلاً من التربية الداخلية فى النباتات الرباعية المجموعة الكروموسومية ، مقارنة بكل جيل فى النباتات الثنائية .

تأثير التضاعف فى النباتات

يختلف تأثير التضاعف باختلاف الأنواع النباتية ، وباختلاف الأصناف داخل النوع الواحد . وفيما يلى أهم تأثيرات التضاعف على النباتات .

١- زيادة حجم الخلايا ، وقد لوحظ ذلك خاصة فى الأنسجة الإنشائية ، والخلايا الحارسة للثغور، وحبوب اللقاح . إلا أن الزيادة فى حجم الخلايا لا يصاحبها - بالضرورة - زيادة فى حجم النبات .

٢- تتأثر نسب مكونات الخلية : فتتغير نسبة الماء ، والبروتين ، والكلوروفيل ، والسيليلوز ، والأوكسينات ، والفيتامينات ... إلخ ؛ فمثلاً .. يزيد نشاط فيتامين «أ» فى الذرة الرباعية بمقدار ٤٠٪ عما فى الذرة الثنائية ، ويزيد محتوى كثير من الخضر والفواكه الرباعية من حامض الأسكوربيك (فيتامين ج) عما فى نظائرها الثنائية ، ويزيد محتوى النيكوتين فى الدخان الرباعى بمقدار ١٨-٣٣٪ عما فى الثانى .

٣- تصبح الأوراق أقصر ، وأعرض ، وأسمك ، ويصبح النبات أقوى نمواً ، ولكن توجد حالات كثيرة يكون فيها النبات المتضاعف أضعف وأقل نمواً .

٤- يزيد حجم بعض الأعضاء النباتية مثل السبلات ، والبتلات ، والبذور ، والثمار ، ويطلق على تغيرات كهذه اسم عملاقة gigantism .

٥- ببطء النمو ، وتأخر الإزهار مع استمراره فترة أطول .

٦- تكون النباتات المتضاعفة على درجة من العقم تتراوح من نسبة ضئيلة إلى عقم تام . وقد عزى ذلك فى كثير من الأحيان إلى حدوث اضطرابات كروموسومية خلال الانقسام الاختزالى ، إلا أن أغلب حالات العقم ترجع - فى النباتات المتضاعفة - إلى حالة عدم التوازن الجينى genic imbalance التى تحدث بعد مضاعفة عدد الكروموسومات .

٧- قد تختلف الاحتياجات البيئية للنباتات الرباعية عن الثنائية ؛ فمثلاً .. تحد حالة التضاعف من احتياجات الفترة الضوئية فى الشيلم ، وتحتاج بنور البطيخ الثلاثى إلى

درجات حرارة أعلى للإنبات .

٨- يؤدي التضاعف إلى إضعاف حالة عدم التوافق الجاميطى .

مجالات استخدام التضاعف الذاتى الصناعى فى تربية النباتات

كان من أهم المجالات التى استخدم فيها التضاعف الذاتى لتحسين النباتات ما يلى :

١- تحسين النباتات التى تزرع لأجل أجزائها الخضرية :

تعد النباتات التى تزرع لأجل أجزائها الخضرية أكثر النباتات استجابة للتربية بالتضاعف ؛ فمثلا .. وجد فى بنجر السكر أن جذور النباتات الثلاثية المجموعة الكروموسومية أكبر حجما من جذور النباتات الثنائية ، مع تساوى نسبة السكر فى كليهما؛ ويترتب على ذلك زيادة كمية السكر التى يمكن إنتاجها من وحدة المساحة .

وتعد العقبة الرئيسية أمام الاستفادة من هذه الحقيقة فى الإنتاج التجارى هى كيفية إنتاج البذور الثلاثية ؛ إذ تطلب ذلك زراعة سلالات ثنائية وأخرى رباعية فى خطوط متبادلة ؛ لكى تلقح فيما بينها . ولكن السلالات الثنائية -وهى التى تعطى محصولاً عالياً من البذور - لا تنتج سوى نسبة منخفضة من البذور الثلاثية ، بينما السلالات الرباعية - وهى التى تعطى نسبة عالية من البذور الثلاثية- يكون إنتاجها من البذور منخفضاً للغاية .

هذا .. ويتوقع - كذلك - استجابة محاصيل المراعى ، والزهور ، ونباتات الزينة للتضاعف الذاتى ؛ لأنها لا تزرع لأجل ثمارها أو بنورها ، كما أن الزهور العقيمة تحتفظ بنضارتها فترة أطول ، وقد يعد أى تغير فى الشكل المظهرى لنباتات الزينة عند مضاعفتها أمراً مرغوباً فى حد ذاته .

٢- تحسين النباتات التى تزرع لأجل بنورها :

لم يكن للتربية بالتضاعف دور مهم فى تحسين النباتات التى تزرع لأجل بنورها ؛ بسبب العقم الذى يصاحب التضاعف ، ويستثنى من ذلك محصول الشيلم ؛ فقد وجد أن الشيلم الرباعى ($2n = 4s = 28$) يتميز بكبر الحبة ، وارتفاع نسبة البروتين بها ، وقدرته على النمو فى ظروف بيئية متباينة ، بينما يتساوى فى المحصول مع الشيلم

الثانى . هذا .. إلا أنه يعيبه قلة عدد الخلفات ، وارتفاع طول النبات ، كما اعترضت المطاحن على حبوبه الكبيرة الحجم .

٣- تحسين المحاصيل التى تزرع لأجل ثمارها :

أفاد التضاعف الذاتى فى تحسين المحاصيل التى تزرع لأجل ثمارها ؛ لسببين هما :

- (أ) وجد أن ثمار بعض الفواكه الرباعية المجموعة الكروموسومية كبيرة الحجم مقارنة بالطرز الثنائية ، كما فى العنب الذى تتميز أصنافه الرباعية بأن حباتها أكبر حجماً ، وينورها أقل عدداً ، ولكن يعيبها عدم امتلاء العناقيد ، وقلة المحصول .
- (ب) تميزت الطرز، الثلاثية المجموعة الكروموسومية بخاصية العقد البكرى ؛ أى بقدرتها على إنتاج ثمار خالية من البذور . ويعد البطيخ اللابذرى من أهم الأمثلة على ذلك وهو الذى تنتج بذوره الثلاثية (التي تعطى ثماراً خالية من البذور) ؛ بتهجين سلالات رباعية التضاعف - تستخدم كأمهات - مع سلالات ثنائية التضاعف - تستخدم كآباء - علماً بأن التلقيح العكسى لاينجح .

وتكون ثمار البطيخ الثلاثى خالية من البذور ؛ لأن الغالبية العظمى من الجاميطات التى تنتجها هذه النباتات ($2n = 2x = 22$) تكون عقيمة ، ولا يكون حصباً منها إلا ما تحتوى على ١١ ، أو ٢٢ كروموسوماً ، وهى تتكون (أى البويضات الخصبة) بنسبة $(\frac{1}{4}) \times 2 \times 11 \times 100$ أى $(\frac{1}{4}) \times 100 \times 1$ أى أقل من ٠.٠٥% ، بينما تزيد نسبة الجاميطات العقيمة (وهى التى تحتوى على ١٢-٢١ كروموسوماً) عن ٩٩.٩٥% ؛ لذا .. فإن الثمار العاقدة تكون خالية -تقريباً- من البذور . هذا .. إلا أنه تظهر بثمار البطيخ الثلاثى تكوينات صغيرة بيضاء تشبه بنور الخيار ، كما تبدو بها - أحياناً - بذور خالية من الأجنة تكون قشرتها صلبة وحجمها طبيعياً ؛ ويعد ذلك من أكبر عيوب البطيخ الثلاثى .

يحتاج عقد ثمار البطيخ الثلاثى إلى توفر حبوب اللقاح من سلالة ثنائية ؛ لذا .. تجب زراعة خط من سلالة ثنائية بين كل خمسة خطوط من السلالة الثلاثية . تعمل حبوب لقاح السلالة الثنائية كمنبهات فقط لنمو مبايض أزهار السلالة الثلاثية التى تكون ببضاتها عقيمة بنسبة تزيد على ٩٩.٩٥% .

وينتج فى اليابان عدد كبير من أصناف البطيخ الثلاثية ؛ ومن أهم عيوبها ارتفاع ثمن

التقاوى ؛ لكثرة اليد العاملة اللازمة لإنتاج الهجن ، وصعوبة إكثار السلالات الرباعية التضاعف ، وظهور أشكال غير طبيعية من الثمار الثلاثية ، مع ميلها إلى التفريغ ، وظهور بنور صلبة فارغة بها .

٤- يستفاد من التضاعف فى إنتاج سلالات أصيلة ثنائية (٢ن) من النباتات الأحادية.

٥- كما يلجأ المربي إلى مضاعفة عدد الكروموسومات فى كثير من الهجن النوعية للتغلب على مشاكل العقم .

طرق إحداث التضاعف الذاتى فى النباتات

أمكن إنتاج نباتات متضاعفة من الذرة ؛ بتعرضها لدرجات حرارة مرتفعة ، كما عرف فى الذرة - أيضاً - جين يجعل النبات قادراً على إنتاج جاميطات متضاعفة ، وهو الجين as (asynaptic) الذى يمنع التقارن الكروموسومى فى أثناء الانقسام الاختزالى . هذا .. إلا أن مضاعفة الكروموسومات تجرى - عادة - بإحدى طريقتين ، هما :

١- إنتاج نباتات متضاعفة من نسيج الكالوس Callus Tissue :

يلزم لإنتاج نباتات متضاعفة بهذه الطريقة قطع فرع نباتى ، ثم معاملة السطح المقطوع بمنظم النمو إنبول حامض الخليك (IAA) فى اللانولين . وتؤدى هذه المعاملة فى بعض النباتات إلى تكون كتلة من نسيج الكالوس على السطح المقطوع ، قد تنمو منها أفرع جديدة . تكون بعض هذه الأفرع رباعية التضاعف ، وتنتج - لدى إكثارها خضرياً - نباتات كاملة رباعية . وقد اتبعت هذه الطريقة بنجاح فى الطماطم والدخان .

٢- إنتاج نباتات متضاعفة بالمعاملة بالمركبات الكيميائية :

استخدم عديد من المركبات الكيميائية فى مضاعفة كروموسومات الأنواع النباتية ، وكان من أمثلتها الإيثر ، والكلوروفورم ، وأكسيد النتروز nitrous oxide ، وكلورال هيدريت Chloral hydrate ، واسينافثين acenaphthene ، وإيثيل كلوريد الزئبق ethyl - mercury - chloride . إلا أن أكثر المركبات استعمالاً وأهمها فى مضاعفة الكروموسومات كان الكولشيسين colchicine ، وهو ما سنتناوله بشئ من التفصيل . وقد أعقب اكتشافه - وهو مركب طبيعى - تخليق طرز أخرى صناعية منه ؛ مثل الكولشيم

الكولشيسين واستعمالاته فى مضاعفة الكروموسومات

كان الكولشيسين هو المركب الرئيسى المستخدم فى إحداث التضاعف الكروموسومى فى النباتات منذ أكثر من أربعين عاماً ولا يزال كذلك ، وهو يستخرج من نبات *Cecchium autumnale* الذى يحتوى على المركب بنسبة ٠,٤ ٪ من وزنه الجاف . وتتناول - فيما يلى - دراسة الكولشيسين من الجوانب التالية :

١- كيفية إحداث الكولشيسين للتضاعف :

يحدث الكولشيسين تأثيره بمنع تكوين خيوط المغزل فى أثناء انقسام الخلية ، وهو ما يمنع هجرة الكروموسومات إلى قطبى الخلية . ويؤدى ذلك إلى تكوين نواة جديدة تحتوى على ضعف العدد الأصىلى من الكروموسومات . ونظراً لأن عدد الكروموسومات يستمر فى التضاعف مع كل انقسام جديد مادام تأثير الكولشيسين باقياً ؛ لذا .. فإن المعاملة بالمركب يجب أن تتوقف بعد انقضاء الفترة اللازمة لإحداث التضاعف المطلوب . هذا .. علماً بأن الخلايا الرباعية التضاعف -وأحياناً الثمانية التضاعف- هى التى يمكن أن تستمر فى الانقسام والنمو .

٢- طرق إضافة الكولشيسين للأنسجة النباتية :

يضاف الكولشيسين للأنسجة النباتية فى إحدى الصور التالية :

(أ) محلول مائى : يتراوح تركيز المحلول المائى عادة من ٠,٠٥ ٪ - ٠,٤ ٪ .
(ب) محمّل فى الجلسرين : يستعمل لذلك ٧,٥ مل جلسريناً ، و ٢,٥ مل ماءً ، و ٦-٨ نقاط من المادة المبللة سانتوميرز santomerse ، ثم يضاف الكولشيسين بالتركيز المطلوب .

(ج) محمل فى الآجار : يضاف الكولشيسين إلى الآجار الساخن قبل تصلبه .
(د) محمل فى مستحلب اللانولين : يحضر مستحلب اللانولين بإضافة ٢٠ مل ماء إلى ١,٥ جم حامض استياريك stearic acid ، ٠,٥٣ مل مورفولين morpholine مع التسخين إلى أن يتم ذوبان حامض الاستياريك ، على ألا ترتفع درجة حرارة المخلوط عن

١٠٠ م . يحرك المخلوط بساق زجاجية ، إلى أن يأخذ مظهر الصابون فى اللون والقيوم ، ثم يضاف إليه ٨ جم لانولين lanolin مع استمرار التسخين والتقليب ، إلى أن ينوب اللانولين ؛ وحتى يصبح قوام المستحلب سميكاً نسبياً ، ثم يترك ليبرد ، ويضاف إليه الكولشيسين بالتركيز المطلوب .

٢- طرق المعاملة بالكولشيسين :

تجرى المعاملة بالكولشيسين بإحدى الطرق التالية :

أ- معاملة البذور :

تنقع البذور التى يُراد معاملتها فى محلول مائى من الكولشيسين بتركيز ٠,٠٥ ٪ - ١,٥ ٪ لمدة ١-٦ أيام ، علماً بأن البذور البطيئة الإنبات تحتاج إلى مدة أطول . ويجب أن تنتهى المعاملة قبل أن تباشر البذور بالإنبات . وتغسل البذور جيداً بعد المعاملة .

ب- معاملة البادرات :

تعامل القمم النامية للبادرات الصغيرة بنجاح أكبر من معاملة البذور ، وتستمر المعاملة لمدة ٣-٢٤ ساعة . يراعى عدم وصول الكولشيسين إلى جذور البادرات نظراً لحساسيتها الشديدة له . وتجرى المعاملة بإحدى طريقتين كما يلى :

(١) إذا استنبتت البذور على ورق ترشيح فى أطباق بترى ، وكانت جذور البادرات تتخلل ورق الترشيح بشكل جيد .. فإن المعاملة تجرى بقلب أطباق بترى بما عليها من بادرات ، حتى تنغمس القمم النامية للنباتات فى محلول مائى من الكولشيسين .

(٢) بلف جذور مجموعة من البادرات بقطن مبلل بالماء ، ثم قلبها فى كأس به محلول مائى من الكولشيسين بنفس الطريقة السابقة ، وتفضل هذه الطريقة : لأن الجذور تبقى رطبة ولا تتعرض للجفاف . هذا .. وتغسل البادرات بالماء بعد انتهاء المعاملة .

ج - معاملة النباتات الكبيرة :

تعامل الفروع الصغيرة ، والبراعم الإبطية ، والقمم النامية للسيقان الكبيرة بإحدى

- (١) غمر القمة النامية فى محلول مائى من الكولشيسين .
- (٢) وضع قطعة قطن مبللة بمحلول الكولشيسين بين أوراق البرعم التامى ، مع تكرار المعاملة يومياً لمدة ٢-٦ أيام .
- (٣) رش البراعم بمحلول الكولشيسين عدة مرات يومياً . أو قد يضاف إلى البرعم الإبطى نقطة واحدة من محلول مائى من الكولشيسين بتركيز ٠.٥ / ، يضاف إليه زيت معدنى بنسبة ٨ / .
- (٤) إضافة الكولشيسين محملاً فى الجلسرين بواسطة فرشاة .
- (٥) دهان القمة النامية بالكولشيسين فى مستحلب من اللانولين .
- (٦) معاملة القمة النامية بالكولشيسين المحمل فى الأجار ، مع إضافته إما بفرشاة ، وإما فى نصف كبسولة توضع منكسة على البرعم .

هذا .. ويراعى عند استعمال الكولشيسين أنه مركب شديد السمية ؛ فلا يجب أن يلامس الجلد فترة طويلة ؛ كما أنه مرتفع الثمن ، ويتلف من التخزين الطويل ؛ لذا .. يجب ألا تحضر منه إلا الكمية اللازمة فقط حسب الحاجة . وتذاب الكمية المطلوبة من الكولشيسين فى قطرات من الكحول ، ثم يضاف الماء ببطء لأن سرعة إضافته تجعل الكولشيسين يترسب من المحلول ثانية . ويمكن تخزين محلول الكولشيسين فى الثلاجة لأسابيع قليلة ، ولكنه لا يخزن مجمداً (Avery وآخرون ١٩٤٧ ، Egisti & Dustin ، ١٩٥٥ ، Hayes وآخرون ١٩٥٥ ، North ١٩٧٩) . ولزيد من التفاصيل عن الكولشيسين واستعمالاته .. يراجع Egisti & Dustin (١٩٥٥) .

أعداد الكروموسومات فى النباتات

تظهر فى جدول (١٤-٢) قائمة بأعداد الكروموسومات فى الخلايا الجسمية (٢ن) ، وفى الهية الكروموسومية الواحدة (x) لبعض المحاصيل الاقتصادية . أما أعداد الكروموسومات فى بقية النباتات .. فيمكن الرجوع إليها فى كل من Hayes وآخرين (١٩٥٥) ، و Purseglove (١٩٧٢ ، و ١٩٧٤) ، و Simmonds (١٩٧٩) .

جدول (١٤-٢) : أعداد الكروموسومات فى بعض المحاصيل الاقتصادية (عن Elliott ١٩٥٥ ، و Darrow ١٩٦٦ و Edmond وآخرين ١٩٧٥ ، و Welsh ١٩٨١ ، و Hawkes ١٩٨٣) .

المحصول	العدد الأساسى (س)	العدد فى الخلايا الجسمية (٢ن)
<u>المحاصيل الحقلية :</u>		
١٠	٢٠	
٨	٣٢	الذرة
١٠	٤٠	البرسيم الحجازى
١٢	٤٨	الفول السودانى
١٣	٢٦	الدخان المزروع
١٣	٥٢	القطن الآسيوى
٧	٤٢	القطن upland
	٨٠	الشوفان المزروع
٧	١٤	القصب
٧	٤٢	الشعير
٧	٢٨	قمح الخبز (السداسى)
		القمح durum (الرباعى)
<u>الفاكهة :</u>		
١٧	٥١ ، ٣٤	التفاح
٨	٤٨ ، ٣٢ ، ٢٤ ، ١٦	جنس نوات النواة الحجرية <i>Prunus</i>
٩	٣٦ ، ٢٧ ، ١٨	الموالح
١٩	٧٦ ، ٤٠ ، ٣٨	العنب
١١	٤٤ ، ٣٣ ، ٢٢ للنوع المزروع ، ٤٤	الموز
٨	١٦	اللسوز
٨	٣٢	الكريز الحامضى
٨	١٦	الكريز الحلو
١٧	٥١ ، ٣٤	الكمثرى

المحصل	العدد الاساسى (س)	العدد فى الخلايا الجسمية (٢٢)
الخضر :		
جنس الشليك <i>Fragaria</i>	٧	١٤ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٤٢ ، ٤٩ ، ٥٦ للنوع المزروع ، ٦٣ ، ٧٠ حتى ٢٢ = ١٦ س
جنس البطاطس <i>Solanum</i>	١٢	٢٤ ، ٣٦ ، ٤٨ للنوع المزروع ، ٦٠ ، ٩٦ ، ٧٢
البطاطا	١٥	٩٠
جنس الطماطم <i>Lycopersicon</i>	١٢	٢٤
جنس الكرنبات <i>Brassica</i>	١٠ ، ٩	١٨ ، ٢٦ ، ٢٠ ، ٥٦
الكاسافا (٤س)		
القلقاس (٢س ، ٣س)		
الزهور ونباتات الزينة :		
الورد	٧	١٤ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٤٢ ، ٥٦
الأقحوان	٩	١٨ ، ٣٦ ، ٥٤ ، ٧٢ ، ٩٠
الزنبق	١٢	٢٤ ، ٣٦ ، ٤٨
الداليا	٨	٢٢ ، ٦٤
بسلة الزهور	٧	١٤
نباتات المشروبات :		
القهوة (٢س ، ٤س)		
الشاي (٢س)		
الكاكاو (٢س)		

الفصل الخامس عشر

الهجن النوعية

يلجأ المربي إلى التهجين بين أنواع نباتية مختلفة Innerspecific Hybridization ، عندما يتعذر عليه العثور على الصفات المرغوب فيها داخل النوع الذى ينتمى إليه المحصول الذى يقوم بتحسينه . وقد يكون التهجين مع نوع نباتى آخر من نفس الجنس ، أو من جنس آخر من نفس العائلة . ويستعان بمثل هذه الهجن النوعية لنقل جين واحد ، أو مجموعة من الجينات المرغوب فيها من نوع إلى آخر ، أو للتوصل إلى صفات جديدة ليست موجودة فى أى من النوعين منفرداً . كما تجرى الهجن النوعية فى كثير من الأحيان ، لمجرد تجربة مايمكن أن تسفر عنه هذه الهجن .

وبرغم وجود أمثلة عديدة لهجن نوعية ناجحة .. إلا أنه توجد حالات يستحيل فيها إجراء الهجن النوعية ، وقد يمكن إنتاج الهجين النوعى (الجيل الأول) ولكنه يكون عقيماً ، أو قد يبدأ التدهور والعقم فى الجيل الثانى . وقد توصل مربو النبات إلى طرق فعالة ؛ للتغلب على كثير من مشاكل إنتاج الهجن النوعية فى حالات خاصة .

وغنى عن البيان أنه لايمكن دراسة الهجن النوعية Interspecific Hybrids بمعزل عن التضاعف الهجينى Allopoloidy الذى سبقت دراسته فى الفصل الرابع عشر ؛ وذلك لأن التضاعف الهجينى يستلزم حدوث هجن نوعية ابتداء . كما أن كثيراً من أمثلة الهجن

النوعية الناجحة التى يأتى بيانها فى هذا الفصل هى لأنواع (هجن نوعية) متعددة المجموعة الكروموسومية شبيهة بالثنائية Amphidiploids .

إن معظم الهجن النوعية التى يجربها مربى النبات تكون بين المحاصيل الزراعية وأنواع أخرى برية قريبة منها ؛ بفرض الحصول على جينات مرغوب فيها من الأخيرة . ومن الطبيعى أن يتلقى الجيل الأول الهجين نصف جيناته من الأب البرى ؛ لذا .. فإنه لا يصلح للزراعة التجارية . ويتطلب الأمر إجراء عديد من التلقيحات الرجعية إلى النوع المحصولى ، مع محاولات لكسر الارتباطات غير المرغوب فيها - إن وجدت - ليتمكن إنتاج سلالة تربية من النوع المحصولى تحتوى على الجين المرغوب فيه من النوع البرى لاستخدامها - بعد ذلك - فى برامج التربية لتحسين المحصول بالطرق الأخرى . ويعرف برنامج التربية الذى يتمخض عنه سلالات كهذه باسم التربية السابقة pre - breeding ، أو تربية سلالات الأباء parent - line breeding .

هذا .. إلا أن الانواع المحصولية والأنواع البرية ربما لا تختلف كثيراً - وراثياً - عن بعضها ، بسبب ما يكون قد حدث بينها من تبادل جينى فى الطبيعة فى أزمنة سابقة . ورغم أن الهجن النوعية لا تكون صعبة فى حالات كهذه ، إلا أنها لا تكون ضرورية أيضاً ؛ نظراً لأن الجينات المرغوب فيها غالباً ما تكون قد انتقلت - بالفعل - من النوع البرى إلى النوع المحصولى فيما يعرف باسم Introgression .

الصعوبات التى تعوق زجاج الهجن النوعية

يقسم Hawkes (١٩٨٣) الصعوبات التى تواجه المربى عند إجراء الهجن النوعية إلى خمسة مستويات تتدرج بالزيادة فى صعوبتها كما يلى :

المستوى الأول : أقلها صعوبة ؛ وفيه يكون النوع المحصولى والنوع البرى متقاربين من بعضيهما وراثياً ؛ أى يكونان من مجمع جينى gene pool واحد ، ؛ بسبب ما يكون قد حدث بينهما من تبادل جينى فى الطبيعة فى أزمنة سابقة ، ومن أمثلة ذلك الهجين النوعى :

L . esculentum × *L . pimpinellifolium*

المستوى الثانى : وفيه ينتمى النوع المحصولى والنوع البرى إلى مجموعات جينية مختلفة ، إلا أن التهجين يكون ممكناً ، ويكون الجيل الأول الهجين خصباً بدرجة عالية ؛ حيث يحدث التقارن الكروموسومى بين كروموسومات النوعين فى أثناء الانقسام الاختزالى . ومن أمثلة ذلك الهجن النوعية التالية :

Oryza sativa × *O. nivara*

Lyscoersicon esculentum × *L. cheesmanii*

المستوى الثالث : أكثر صعوبة ، وفيه يختلف النوع المحصولى عن النوع البرى فى عدد الكروموسومات إلا أن الجيل الأول الهجين يمكن جعله خصباً : بمضاعفة كروموسومات هذا الجيل (amphidiploidy) . ومن أمثلة ذلك الهجين النوعى

Brassica Oleracea × *B. rapa*

الذى يعطى النوع *B. napus*

المستوى الرابع : يتطلب نجاح التلقيح إجراء معاملات خاصة مثل زراعة الأجنة فى بيئات خاصة وهى ما زالت فى بدايات تكوينها ، ومن أمثلة ذلك الهجن النوعية التالية :

Solanum acaule × *S. bulbocastanum*

Lycopersicon esculentum × *L. peruvianum*

المستوى الخامس : تلقحيات بعيدة جداً وصعبة ، وهى التى تكون بين أنواع تنتمى إلى أجناس مختلفة ؛ كالتلقيح بين الطماطم *Lycopersicon esculentum* ، والبطاطس *Solanum tuberosum* . وقد أمكن التغلب على مصاعب التهجين ، فى حالات كثيرة كهذه بطريقة اندماج البروتوبلازم protoplasm fusion فى مزارع البروتوبلازم ، إلا أنه نادراً ما أمكن دفع هذه الهجن للنمو إلى مرحلة النضج . وبعد محصول التريتيكيل *Triticale* - وهو هجين بين القمح *Triticum* ، والشيلم *Secale* حالة شاذة ؛ نظراً لأن التهجين يجرى بسهولة تامة ، وقد وجد عدة مرات فى الطبيعة .

ويمكن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بمزارع الأجنة ومزارع البروتوبلازم فى

ومن أهم أسباب فشل الهجن النوعية ما يلي (عن Allard ١٩٦٤) :

١- وجود عوائق أمام نمو حبة اللقاح :

فمثلاً .. قد يكون قلم الزهرة في النوع المستخدم كأطول من قلم الزهرة في النوع المستخدم كأب ، وهو ما يعنى أن على حبوب اللقاح أن تنمو - فى مثل هذه الحالات - لمسافة أطول مما تكون عليه الحال فى الظروف الطبيعية . وقد يلجأ المربي إلى مضاعفة كروموسومات أحد الأبوين ؛ لزيادة فرصة نجاح التهجين ، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية ، إذا كان النوع المتضاعف هو المستخدم كأب ، لأن حبوب اللقاح تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية وسميكة ، وقد يصعب عليها الإنبات فى قلم زهرة النوع الثنائي المستخدم كأب .

٢ - وجود عوائق أمام نمو الجنين :

قد يتم التلقيح والإخصاب بصورة طبيعية ، وتنقسم اللاحة ، ويبدأ تكوين الجنين ، إلا أنه لا يكمل نموه ، وقد يتكون الجنين بصورة طبيعية ، إلا أنه يتدهور فى أولى مراحل نموه الخضرى بعد زراعة البذور ويطلق على هذه الحالات مجتمعة اسم Hybrid Inviability ؛ وهي ترجع إما إلى عدم التوافق بين التراكيب الوراثية لنوعى الأبوين ، وإما إلى عدم التوافق بين الجنين النامى والإندوسيرم . وتعرف الحالة الثانية فقط - أى حالة عدم التوافق بين الجنين النامى والإندوسيرم - باسم Somatoplastic sterility ، وهي تحدث فى بعض الهجن النوعية البعيدة ، التى لايتكون فيها الاندوسيرم بصورة طبيعية ؛ ويؤدى ذلك إلى عدم استطاعة الجنين إكمال نموه ، لأنه يعتمد فى غذائه على الإندوسيرم . ويترتب على ذلك توقف نمو الجنين واندثاره بعد فترة وجيزة من بداية تكوينه . ويتم التغلب على هذه المشكلة - عادة - بزراعة الأجنة ، وهي فى المراحل الأولى لتكوينها - فى بيئات خاصة .

طرق التغلب على مشاكل إنتاج الهجن النوعية

توصل مربو النبات إلى طرق فعالة للتغلب على كثير من مشاكل إنتاج الهجن النوعية

فى حالات خاصة إلا أن هذه الطرق لاتكون - دائماً - مجدية فى كل الحالات ؛ ولذا .. فإنه يلزم استمرار التجربة والخطأ ومحاولة استنباط وسائل جديدة تناسب كل حالة . ومن الطرق التى أمكن التوصل إليها ما يلى :

١- مضاعفة كروموسومات أحد - أو كلا - الأبوين الداخلين فى التهجين (يراجع لذلك موضوع التضاعف فى الفصل الرابع عشر) .

٢- زراعة جنين أحد النوعين غير المتوافقين فى إندوسبرم النوع الآخر . وتعطى هذه الأجنة نباتات أكثر توافقاً مع النوع الذى استخدم أندوسبرمه عن النباتات العادية ؛ فمثلاً .. وجد أن زراعة أجنة القمح فى أندوسبرم الشيلم يعطى نباتات قمح أكثر توافقاً فى التلقيح مع الشليم عن نباتات القمح العادية (عن Elliott ١٩٥٨) . كما أمكن إنتاج هجن القمح مع الشعير بزراعة الأجنة - وهى فى بداية تكوينها فى إندوسبرم الشعير ، وقد كانت هذه الهجن عقيمة ذكرياً ، ولكنها انتجت بنوراً عندما لقحت بالقمح ، واحتوت النباتات الناتجة على كل كروموسومات القمح ونصف كروموسومات الشعير (Jan وآخرون ١٩٨٢) .

٣- فصل الأجنة النامية وزراعتها فى بيئات خاصة فى الحالات التى لا يوجد فيها توافق بين الجنين النامى والأنوسبرم ، ويكون الهدف الأساسى من ذلك هو مد الجنين النامى بكل احتياجاته الغذائية ؛ لمساعدته على النمو قبل أن يبدأ فى تكوين الأوراق والاعتماد على نفسه .

٤- محاولة إجراء التهجين بين أصناف مختلفة من كلا النوعين ؛ نظراً لأن بعض الأصناف تكون متوافقة أكثر من غيرها . ويفيد فى هذه الشأن استعمال مخلوط من حبوب لقاح عدة أصناف فى تلقيح كل واحد من هذه الأصناف ، ولكن يعاب على هذه الطريقة عدم معرفة هوية الأب الذى يكون متوافقاً مع الصنف المستخدم كأم .

٥- استعمال مخلوط من حبوب لقاح كلا النوعين عند إجراء التهجين ؛ فيضاف -أولاً- إلى ميسم الأم كمية قليلة من لقاحها ، ثم تضاف - بعد ذلك بفترة وحيزة - كمية أكبر من حبوب لقاح النوع المستخدم كأم ، وتفيد حبوب لقاح الأم فى إخصاب بعض البويضات ؛ فلا تسقط الزهرة مبكرة ؛ وبذا تتوفر فرصة أكبر أمام حبوب لقاح نوع الأب لإخصاب بقية البويضات .

٦- إجراء التهجين فى كلا الاتجاهين ، أى استعمال كل من النوعين كآباء وكأمهات

فى تلقىحات مختلفة ؛ لأن التهجين قد يكون غير ناجح فى أحد الاتجاهين ، ولكنه ناجح فى الاتجاه الآخر ، ويفضل أن يكون التهجين فى اتجاه معين فى الحالات الخاصة التالية :

أ- عند اختلاف عدد كروموسومات الأبوين .. يفضل استخدام النوع الأكثر فى عدد الكروموسومات كأم .

ب- ويفضل فى حالة مضاعفة كروموسومات أحد النوعين أن يستخدم النوع المضاعف كأم .

ج- فى حالة وجود ظاهرة عدم التوافق الذاتى فى أحد النوعين .. يفضل استعماله كأم .

٧- محاولة إجراء التلقيح فى مراحل مختلفة من النمو البرعمى والزهرى ، وغالباً ماتكون التلقىحات البرعمية أكثر نجاحاً من تلك التى تجرى فى الوقت الطبيعى .

٨- إزالة الميسم بجزء من القلم ؛ لأن ذلك يقلل المسافة التى يجب أن تقطعها الأنبوبة اللقاحية ، التى غالباً ما تقطعها ببطء وصعوبة . وفى هذا الشأن .. أفادت إضافة كمية صغيرة من الآجار مع السكر مكان الميسم المقطوع قبل التهجينات النوعية فى الجنس *Solanum*.

٩- معاملة متاع الأم ببعض منظمات النمو ؛ مثل بتيا نفثوكس حامض الخليك BNAA لمنع سقوط الأزهار مبكراً .

١٠- تطعيم النوع المستخدم كأم على أصل من النوع المستخدم كأم . وتقيد هذه المعاملة فى تهيئة الطعم (الأم) فسيولوجياً لاستقبال حبوب لقاح النوع الآخر .

١١- إذا كان من الصعب تهجين نوعين (أ) ، و(ب) مباشرة .. فيفضل تهجين أحدهما - وليكن (أ) - مع نوع ثالث (ج) ، ثم تلقيح الهجين (أج) مع النوع الثانى (ب) . ويسمى النوع (ج-) فى هذه الحالة باسم النوع القنطرى (Briggs & Knowles ١٩٦٧) .

١٢- معاملة الأزهار عند إجراء التهجينات بمركب أمينو إيثوكسى فينيل جليسين aminoethoxyvinylglycine . أدت المعاملة إلى تأخير سقوط الأزهار ، إلى أن وصلت الأنابيب اللقاحية إلى البويضات . ويحدث المركب تأثيره بمنع تمثيل الإثيلين ، وهو

الهرمون الذى يعرف بدوره فى التعجيل بالشيخوخة ، وتساقط الأزهار والثمار (Custers & Den Nijs ١٩٨٦) .

١٣- استخدام مزارع المبايض والبويضات (يراجع لذلك الفصلان السابع عشر والثامن عشر) .

١٤- إدخال حبوب اللقاح فى المبيض مباشرة Intraovarian Pollination . يتم فى هذه الطريقة حقن معلق لحبوب اللقاح مباشرة داخل المبيض من خلال ثقب جانبي فى المبيض ، مع عمل ثقب فى الجانب الآخر ؛ للسماح بخروج الهواء ، يستمر حقن المعلق إلى أن يمتلئ كل فراغ المبيض ويظهر ذلك بخروج السائل من الثقب المقابل . ويلي ذلك .. سد الثقوب بجلي بترولى ، اتبعت هذه الطريقة بنجاح فى بعض الهجن النوعية مثل *Argemone mexicana* x *A. ochroleuca* (عن Ohojwani & Razdan ١٩٨٣) .

عقم الجيل الأول للهجن النوعية

يمكن فى بعض الأحيان الحصول على بنور من الهجن النوعية الصعبة . وتعطى هذه البنور عند زراعتها نباتات تامة النمو وخصبة أحياناً ، إلا أنها قد تكون عقيمة - تماماً - فى حالات أخرى ، ويقسم عقم الجيل الأول للهجين إلى نوعين كما يلى :

١- عقم عاملى Genic Sterility :

يرجع العقم العاملى إلى وجود اختلافات كبيرة بين العوامل الوراثية للأبوين ، ومن مظاهره .. عدم قدرة النبات على إنتاج أزهار ، أو عدم قدرته على إتمام عملية الإنقسام الاختزالى .

٢- عقم كروموسومى Chromosomal Sterility :

يرجع العقم الكروموسومى إلى وجود اختلافات عديدة أو تركيبية كبيرة بين كروموسومات الأبوين ، ومن مظاهره عدم تقارن كروموسومات الأبوين بشكل تام فى أثناء الانقسام الاختزالى ، وحدث تقارن بين أكثر من كروموسومين فى وحدة واحدة ، وظهور تكوينات غير طبيعية للتقارن الكروموسومى فى أثناء الانقسام الاختزالى .

ومن أمثلة الهجن النوعية العقيمة الهجين بين المشمش *Prunus armenica* ، واللوز

Prunus amygdalus ، وهما نوعان قريبان نباتياً ، وفيهما ٢ ن = ١٦ . أجرى التهجين ، بغرض نقل بعض الصفات الهامة من المشمش إلى اللوز ، وهى المقاومة للعناكب ، وبكتيريا التثاقل التاجى ، ونيماتودا تعقد الجذور ، وتحمل الرطوبة الأرضية الزائدة ، والنضج المبكر . وقد أمكن - من عدد كبير من التلقيحات - الحصول على عدد قليل من النباتات الهجين التى كانت وسطاً فى صفاتها الخضرية ، وأنتجت قليلاً من حبوب اللقاح الخصبة ، إلا أنها كانت عقيمة أنثوياً تماماً (Jones ١٩٦٨) .

هذا .. ولا يكون لعقم الجيل الأول الهجين أية أهمية فى المحاصيل التى يمكن إكثارها خضرياً ، وتزرع لأجل أجزائها الخضرية كما فى عديد من نباتات الزينة . ومن أهم وسائل التغلب على حالة العقم فى الجيل الأول الهجين ما يلى :

- ١- تلقيح الجيل الأول - رجعياً - إلى أحد الأبوين ، أو إلى كليهما ؛ فقد تكون النباتات الناتجة من التلقيح الرجعى الأول لأحد الأبوين خصبة .
- ٢- مضاعفة كروموسومات الهجين النوعى ؛ للتغلب على حالة العقم الكروموسومى .
- ٣- تطعيم الهجين النوعى على أصل من أى من نوعى الآباء ، أو من نوع أو جنس آخر ، ويؤدى ذلك أحياناً إلى تهينة الهجين النوعى - فسيولوجياً - بطريقة تسمح بالتغلب على حالة العقم الجينى .

تدهور الهجن النوعية فى الجيل الثانى

يمكن - فى بعض الحالات - إنتاج نباتات خصبة من الهجن النوعية ، إلا أنها تتدهور degenerates فى الجيل الثانى ، وتصبح عقيمة . وقد فُسر ذلك على أساس أن النبات يكون خصباً عندما يحتوى على عوامل وراثية مكملة لبعضها البعض . فمثلاً .. قد يكون العامل A مكماً للعامل B ، والعامل a مكماً للعامل b ، إلا أن العامل A لا يكون مكماً للعامل b ؛ ولا العامل a مكماً للعامل B ، وتحتوى الأنواع المهجنة على هذه العوامل فى صورة مكملة لبعضها ، وتكون خصبة ؛ كأن تكون aa bb ، و AA BB ، ويكون الجيل الأول الهجين بينها ذا تركيب وراثى Aa Bb وخصباً أيضاً . أما الجيل الثانى .. فتظهر فيه انعزالات كثيرة ، يكون بعضها خصباً ؛ مثل aa bb ، و - B - A ، ويكون بعضها عقيماً ؛ مثل - B - aa ، و - bb - A .

نقل كروموسومات أو أجزاء كروموسومية من نوع إلى آخر

يعرف نقل كروموسومات أو أجزاء كروموسومية من نوع إلى آخر باسم In-trogression ، وهي ظاهرة تحدث طبيعياً ، وكان لها فضل كبير في تطور النباتات المزروعة ، كما أنها تتحقق من خلال برامج التربية بإجراء التهجين النوعي المرغوب فيه ، ثم إجراء تهجينات رجعية متتابعة لأحد الآباء ؛ بغرض تحسين الخصوبة والقدرة التناسلية واستعادة صفات النوع الرجعي ، مع إضافة بعض الجينات من النوع الآخر . ويفيد التلقيح الرجعي - كثيراً - في التغلب على حالة العقم التي تنشأ بعد تهجين نوعين بعيدين عن بعضيهما من الناحية الوراثية ؛ لأن الهجين لا يكون متوازناً سيتولوجياً ، ولا تتقارن الكروموسومات الآتية من نوعي الآباء مع بعضها بشكل جيد ، ويسرع التلقيح الرجعي إلى أحد الآباء في التغلب على حالة عدم التوازن السيتولوجي هذه ، وربما تكون المحصلة النهائية لعملية التلقيح الرجعي هي إضافة زوج كامل من الكروموسومات إلى النوع المراد تحسينه ليصبح $2n + 2$ ؛ وبذا .. تتكون سلالة إضافة كروموسومية chromosome addition line ؛ أو أن يحل زوج كامل من الكروموسومات محل زوج من كروموسومات النوع المراد تحسينه ؛ ليصبح $2n - 2 + 2$ ؛ وبذا تتكون سلالة إحلال كروموسومي Chromosome substitution line . وقد تنقل أجزاء صغيرة من الكروموسومات إلى النوع المراد تحسينه من خلال الانتقالات الكروموسومية ، ويتراوح طول الأجزاء المنتقلة من جين واحد إلى أجزاء كبيرة من الكروموسومات .

ومن أشهر الأمثلة على النقل الكروموسومي من نوع إلى آخر .. حالات نقل صفات المقاومة للأمراض من الأجناس *Agropyron* ، و *Aegilops* ، و *Secale* إلى القمح . وتكفي عدة تهجينات رجعية إلى النوع المزروع لإكمال النقل الكروموسومي في الحالات التي لا تختلف فيها الأنواع المهجنة كثيراً عن بعضها ، أما إن كانت الأنواع المهجنة بعيدة عن بعضها .. فإن نقل الأجزاء الكروموسومية المرغوب فيها يتم بتعريض نباتات الجيل الأول للإشعاع لإعطاء الفرصة لحدوث الكسور والالتحامات الكروموسومية المرغوب فيها ، وطبيعي أن يكون ذلك متبوعاً بعدة تلقحيات رجعية إلى النوع المراد تحسينه .

أمثلة على الهجن النوعية وطرق التغلب على مشاكل العقم فيها

الهجن النوعية الطبيعية

يعتقد أن أنواعاً كثيرة قد نشأت - طبيعياً - من هجن نوعية بعيدة ، وأن بعض هذه الهجن كان بين أجناس نباتية مختلفة . ومن بين النباتات التي يعتقد نشأتها بهذا الشكل السوسن ، والأوركيد ، والقنأ ، والداليا ، والجلاديولس ، والورد ، والبنفسج ، والحرور .

كما حدثت هجن نوعية كثيرة ، صاحبت نشأة عدد من الفواكه المهمة ؛ مثل التفاح ، والبرقوق ، والكريز ، والبنق ، والعنب ، وعديد من الفواكه الأخرى ذات الثمار الصغيرة تتبع الجنس *Rubus* ، الذي يشتمل على أنواع كثيرة جداً توجد فيها الكروموسومات في مضاعفات للعدد الأساسي ٧ حتى ١٢ ضعفاً ، وهو يتضمن الراسبيري *rasberry* (ثنائي غالباً) ، والبلاكبيري *blackberry* والدوبيري *dewberry* (معظمها ثنائية وبعضها به ٦ مضاعفات أو أكثر للعدد الأساسي) والنسبيري *nessberry* ، واللونجانبيري *longanberry* ، وبويرزنبري *boysenberry* . وقد نشأ النسبيري (٤ س) من التهجين بين *Rubus trivialis* (٢ س) ، و *R. strigosus* (٢ س) ؛ حيث إن الأول هو الدوبيري الجنوبي ، والثاني هو الراسبيري الأمريكي ، ونشأ اللونجانبيري *R. longanbaccus* (٦ س) من التهجين بين الدوبيري الأمريكي *R. ursinus* (٨ س) ، والراسبيري الأوروبي *R. idaeus* (٢ س) ؛ حيث اتحدت جاميطات (٢ ن) من الثاني مع جاميطات (١ ن) من الأول . وقد تهجن اللونجانبيري بدوره مع الدوبيري الشرقي ، ونتج من ذلك الينجبيري *youngberry* الذي يحتوي على نفس عدد الكروموسومات مثل اللونجانبيري ، ولكنه لا يلقح معه .

وقد نشأت بعض المحاصيل الاقتصادية المهمة مثل القمح ، والشوفان ، والقطن ، والدخان ، وقصب السكر (وهي التي تعد نباتات متضاعفة هجينياً ، شبيهة بالثنائية amphidiploids) من هجن نوعية بعيدة . وفيما عدا ذلك .. فلم يكن للهجن النوعية الطبيعية دور كبير في نشأة محاصيل الحبوب ، والألياف ، والزيوت ، والعلف . كما لم تتأثر محاصيل الخضر - كثيراً - بالهجن النوعية الطبيعية باستثناء البطاطس ، والبطاطا .

الهجين بين القمح والشيلم (التريتكيل)

يعد التريتكيل *Triticale* (*Triticosecale* sp.) أحد محاصيل العائلة النجيلية ، وهو من الحبوب الصغيرة ، ويمثل أول محاولة ناجحة ، لتخليق محصول جديد بالتهجين بين جنسين مختلفين ، هما قمح الخبز السداسى *Triticum vulgare* ، والشيلم *Secale cereale* . وكان التلقيح قد أجرى - أصلاً - بهدف جمع صفة المقاومة للبرودة ، التى توجد فى الشيلم مع الصفات المرغوب فيها للقمح .

ويتشابه التريتكيل - مورفولوجياً - مع القمح فى شكل النبات وصفات الحبة ، إلا أنه يمتاز عنه بزيادة فى كل من قوة النمو وحجم الحبة ، كما أن السفا فية أطول ، ويتحدد إن كان التريتكيل من النوع الربيعى ، أو الشتوى بنوع وصنف القمح المستخدم فى التلقيح مع الشيلم .

وقد عرفت من التريتكيل أنواع سداسية (٢ ن = ٦ س = ٤٢ كروموسوماً) ، وأخرى ثمانية (٢ ن = ٨ س = ٥٦ كروموسوماً) منذ أكثر من مئة عام . تكونت الأولى (السداسية) عندما هجن القمح الرباعى (٢ ن = ٤ س = ٢٨ كروموسوماً) مع الشيلم ، (٢ ن = ٢ س = ١٤ كروموسوماً) ، ثم ضوعفت كروموسومات الجيل الأول الهجين . أما الأنواع الثمانية فقد أنتجت بتهجين القمح السداسى (٢ ن = ٦ س = ٤٢ كروموسوماً) مع الشيلم ، ثم مضاعفة كروموسومات الجيل الأول الهجين ، ونظراً لأن إنتاج الطرز الثمانية كان أسهل من الطرق السداسية التى كانت أكثر خصوصية ؛ لذا فإنها حظيت باهتمام أكبر فى بادئ الأمر ، إلى أن تبينت أفضلية الطرز السداسية التى كانت أكثر خصوصية ، كذلك .. أنتجت طرز رباعية (٢ ن = ٤ س = ٢٨ كروموسوماً) من التريتكيل على نطاق تجريبى فقط ، ووجد أنها أقل فى صفاتها الحقلية والتجارية من الطرز الأخرى .

وقد أنتج الصنف روزنر Rosner فى كندا كأول صنف تجارى من التريتكيل . وقد كان واضحاً تفوق هذا الصنف على الطرز التى سبقته من التريتكيل فى قوة الساق (لتجنب الرقاد) والخصوبة والتبكير فى النضج ، إلا أنه كان حساساً للفترة الضوئية ، وقليل المحصول . وقد أعقب ذلك إنتاج سلالات الأرماديللو Armadillo فى المكسيك . وقد تميزت هذه السلالات بعدم حساسيتها للفترة الضوئية ، وارتفاع محصولها ، وقد كانت

٦٠٪ منها أعلى محصولاً من الصنف روزنر ، كما كانت ٢٪ منها أعلى محصولاً من أكثر أصناف القمح الكندية إنتاجية . وقد وصل محصول بعض هذه السلالات إلى ٦٧٠٠ كجم / هكتار في كاليفورنيا ، وهو يقارب ما تنتجه أعلى أصناف القمح محصولاً . هذا .. ويفوق الترتكيل القمح في محتواه من البروتين والأحماض الأمينية الضرورية . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Larter (١٩٧٦) .

التهجين بين القمح والجنس *Aegilops*


تحتوى الحشيشة البرية *Aegilops umbellulata* على صفة المقاومة لمرض صدأ الأوراق التى يتحكم فيها جين واحد سائد ، بينما لا توجد هذه المقاومة فى القمح السداسى *Triticum aestivum* . ونجد فى القمح أن ٢ ن = ٦ س = ٤٢ كروموسوماً بواقع ٧ أزواج من الكروموسومات من كل من الهيئات الكروموسومية A ، و B ، و D ؛ بينما نجد أن الوضع الكروموسومى فى النوع *A. umbellulata* هو ٢ ن = ٢ س = ١٤ كروموسوماً ؛ بواقع ٧ أزواج من كروموسومات الهيئة الكروموسومية C . وبينما يتلقح كل من القمح والنوع *A. umbellulata* مع أنواع أخرى كثيرة .. فإن التلقيح بينهما لاينجح . وللتغلب على هذه المشكلة - لنقل صفة المقاومة لصدأ الأوراق من *Aegilops* إلى القمح - هجّن Sears E . R . القمح emmer الرباعى *T. dicoccoides* (٢ ن = ٤ س = ٢٨ كروموسوماً بواقع ٧ أزواج من كل من الهيئتين الكروموسوميتين A ، و B) مع النوع *Aegilops* ، وقد كان الهجين بينهما ثلاثياً وعقيماً (٢ ن = ٣ س = ٢١ كروموسوماً بواقع ٧ كروموسومات من كل من الهيئات الكروموسومية A ، و B ، و C) ، وأدت مضاعفته إلى إنتاج هجين متضاعف شبيه بالثنائى amphidipoid به ٢ ن = ٦ س = ٤٢ كروموسوماً ؛ بواقع ٧ أزواج من الكروموسومات من كل من الهيئات الكروموسومية A ، و B ، و C . وكان هذا الهجين المتضاعف خصباً جرنياً فى تلقيحاته مع قمح الخبز السداسى ، ونتج من محاولات تلقيحه مع القمح هجين ، كان به ٢ ن = ٦ س = ٤٢ كروموسوماً بواقع ٧ أزواج من الكروموسومات من كل من الهيئتين الكروموسوميتين A ، و B ؛ و ٧ كروموسومات من كل من الهيئتين الكروموسوميتين C ، و D (أى كان الهجين : AA BB CD) . وقد ظهر بالهجين فى أثناء الانقسام الاختزالى ١٤ وحدة ثنائية الكروموسوم (وهى الخاصة بالهيئتين A ، و B) ، و ١٤ وحدة أحادية الكروموسوم (وهى

الخاصة بالهيتتين C : D) ، وكان الهجين مقاوماً للصدأ وأقرب في شكله المظهرى من الحشيشة *Aegilops* ، وكانت حبوب لقاحه عقيمة إلى حد كبير ، إلا أنه أنتج بعض البنور لدى تلقيحه ذاتياً . وقد قام Sears بتلقيح هذه النباتات رجعياً ، إلى قمح الخبز عدة مرات مع انتخاب النباتات المقاومة للصدأ بعد كل تلقيح . وقد تبين بعد إجراء عدة تلقيحات رجعية أن النباتات المتنحية كانت ثلاثية الكروموسوم trisomics (أى تحتوى على كروموسوم زائد ، وفيها ٢ ن = ٤٣) ، وتبين أن الكروموسوم الزائد كان من الهيئة الكروموسومية C . وكانت هذه النباتات قليلة الخصوبة ، وأسهم فيها الكروموسوم الزائد بعدد من الجينات غير المرغوب فيها ؛ مثل التبيكر في الإزهار ، وضعف المحصول .

وقد أكمل Sears الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج بمعاملة النباتات التى تحتوى على ٤٣ كروموسوماً بالإشعاع قبل الانقسام الاختزالى ، ثم استخدم حبوب اللقاح التى أنتجتها فى تلقيح أزهار نباتات أخرى من نفس الهجين لم تعرض للإشعاع ، وأعطت هذه التقليلات ٦٠٩١ نباتاً ، كان من بينها ١٣٢ نباتاً مقاوماً للصدأ ، ومن بين الفئة المقاومة للصدأ تبين وجود تبادل لأجزاء كروموسومية reciprocal chromosomal interchange فى ١٢ نباتاً منها ؛ أى إن كل نبات من الاثنى عشر نباتاً كان به انتقال لقطعة من كروموسوم النوع *Aegilops* - تحتوى على الجين المسئول عن المقاومة للصدأ - إلى أحد كروموسومات القمح . وكانت معظم الانتقالات الخليطة هذه عقيمة - جزئياً - واحتوت على صفات أخرى للنوع *Aegilops* ؛ مما يدل على أن الجزء الكروموسومى المنقول فى كل منها كان كبيراً نسبياً ؛ إلا أن أحد النباتات كان مقاوماً للصدأ ، بينما كانت صفاته مقبولة كما كان كامل الخصوبة . وقد أظهرت الدراسات السيتولوجية التى أجريت على هذا النبات أن الانتقال الكروموسومى شمل جزءاً صغيراً جداً من كروموسوم النوع *Aegilops* لم يحمل سوى الجين المسئول عن المقاومة لمرض صدأ الأوراق (عن Brewbaker ١٩٦٤) . وببين شكل (١٥ - ١) تخطيطاً لبرنامج التربية الذى سبق شرحه (عن Poehlman ١٩٧٩) .

التهجين بين جنس القمح *Triticum* والجنس *Agropyron*

نال الهجين بين جنس القمح *Triticum* ، والجنس *Agropyron* اهتمام الكثيرين ، وكان الهدف الأسمى هو إنتاج قمح معمر . وبرغم أنه أمكن تحقيق بعض التقدم نحو هذا



قمح صيني ربيعي به جين لمقاومة صدأ الورقة أضيف إليه من

Triticum umbellulatum

شكل (١٥ - ١) : تخطيط يبين الطريقة التي أمكن بواسطتها نقل صفة المقاومة لمرض صدأ الأوراق من الحشيشة البرية *Aegilops umbellulata* إلى قمح الخبز السداسي *Triticum aestivum*.

الهدف .. إلا أن أهم ما تمخضت عنه هذه الدراسات كان انتخاب طرز شبيهة بالقمح ، ذات مقاومة جيدة للصدأ والأمراض الأخرى التي يقاومها النوع *Agropyron* . ويعد عدم الثبات السيتولوجى الوراثى من أهم مشاكل النباتات المتضاعفة الشبيهة بالثنائية *Amphidiploids* لهذا الهجين النوعى .

الهجين النوعية فى الجنس *Lycopersicon*

تتلقح الطماطم *Lycopersicon esculentum* بسهولة تامة مع النوع *L. pimpinellifolium* ، وقد أمكن عن طريق هذا التلقيح نقل كثير من الصفات المهمة إلى الطماطم ؛ مثل صفات المقاومة للفطريات *Fusarium oxysporum* ، و *Stemphylium solani* ، و *Cladosporium fulvum* ، وغيرها . كما تتلقح الطماطم بسهولة مع النوع *L. cheesmanii* الذى يتميز بقدرته على تحمل الملوحة العالية ، والنوع *L. pennellii* الذى يتميز بقدرته على تحمل ظروف الجفاف . كذلك .. أمكن تلقيح الطماطم مع كل من النوعين *L. hirsutum* ، و *L. chilense* بشرط استعمال الطماطم كأمهات ، وأمكن عن طريق هذه الهجن النوعية نقل عديد من الصفات المهمة ؛ مثل المقاومة للفطر *Septoria lycopersici* من النوع *L. hirsutum* . أما النوع *L. peruvianum* .. فإنه لا يهجن مع الطماطم إلا إذا استخدم الأخير كأم مع زراعة الأجنة الهجين فى بيئة صناعية ، وهى فى المراحل المبكرة لتكوينها ، وإلا تدهور الجنين ، واختفى داخل الثمرة التى تكمل نموها وهى خالية من البذور .

وقد أمكن عن طريق هذا التلقيح نقل عدد من الصفات الهامة إلى الطماطم ؛ مثل المقاومة لنيماتودا تعقد الجنور ، والمحتوى المرتفع من فيتامين ج ، كما تجرى محاولات لنقل صفة المقاومة لفيرس التفاف واصفرار أوراق الطماطم التى توجد على مستوى عال فى بعض سلالات النوع *L. peruvianum* . وقد نوه C. M. Rick فى عام ١٩٨٣ عن وجود سلالتين من *L. peruvianum* يلقحان بسهولة تامة مع الطماطم ، وهما LA 1708 ، و LA 2172 . ووجد أن هاتين السلالتين لاثققتان مع أية سلالة أخرى من نوعهما ، كما لم يكن الهجين النوعى بينهما وبين الطماطم صالحاً كقنطرة للتهجين مع سلالات أخرى من النوع *L. peruvianum* ؛ رغم أنه كان خصباً جزئياً ومتوافقاً فى الهجن الرجعية إلى الطماطم (Lindhout & Purimahua ١٩٨٨) . هذا .. بينما تمكن

LA 2394 من *marulanda* & (١٩٨٩) من التهجين بين السلالة من *L . peruvianum* من LA 1708 كأم والسلالة *L . esculentum* var . *cerasiforme* كأب ، وكان الهجين النوعى بينهما خصباً فى تلقيحاته مع سلالات أخرى من *L . peruvianum* ، وأعطت هذه التلقيحات بنوراً كثيرة؛ وهو ما يعنى إمكان استعماله كقنطرة وراثية بين النوعين *L . esculentum* و *L . peruvianum* . ولزید من التفاصيل عن الهجن النوعية فى النوع *Lycopersicon* وأوجه الاستفادة بها .. يراجع Rick (١٩٧٩ ، ١٩٨٠) .

الهجن النوعية فى الجنس *Fragaria*

يُعد الشليك *Fragaria × ananassa* من الأمثلة الناجحة للهجن النوعية (يشير حرف X فى الاسم العلمى إلى أنه ناتج من هجين نوعى) ؛ فقد جرت محاولات كثيرة فى أوروبا لعزل تراكيب وراثية جيدة من الأنواع البرية التى كانت شائعة ، وهى *F . moschata* ، و *F . vesca* ، و *F . viridis* ، ومن النوعين *F . chiloensis* و *F . virginiana* - اللذين نقلا إلى أوروبا من الأمريكتين - إلا أن هذه المحاولات لم تثمر النتائج التى كانت مرجوة منها ، وعندما هُجن المزارعون النوعين الأخيرين فى القرن الثامن عشر ، ظهرت انعزالات كثيرة فى النسل ، وانتخب الطرز الجيدة لتُطوّر فيما بعد إلى الشليك المزروع .

ولزید من الأمثلة عن الهجن النوعية يراجع Knott & Dovrak (١٩٧٦) بشأن الاستفادة بها فى نقل صفات المقاومة للأمراض من الأنواع البرية إلى الأنواع المزروعة ؛ مثل الطماطم ، والبنجر ، والبطاطس ، والدخان ، وغيرها ، ويراجع Uhlinger (١٩٨٢) بشأن الهجن البعيدة بين الأنواع العشبية المعمرة ، و Layne (١٩٨٣) بشأن الهجن النوعية فى الفاكهة ، والجمعية الأمريكية لعلوم البساتين (Amer . Soc Hort . Sci) ، بشأن التغلب على مشاكل العقم فى الهجن النوعية للأجناس *Prunus* ، و *Malus* ، و *Pyrus* ، و *Rubus* ، و *Vaccinium* ؛ ويراجع Dicksom & Wallace (١٩٨٦) بشأن الهجن النوعية فى الجنس *Brassica* ، و Whitaker & Robinson (١٩٨٦) بشأن الهجن النوعية فى الجنس *Cucurbita* .

الفصل السادس عشر

القواعد المتعلقة بتربية النباتات الخضرية التكاثر

إن أهم ما يميز النباتات الخضرية التكاثر هو أنه بمجرد تعرفُ نبات ذى تركيب وراثى مرغوب فيه .. فإن هذا النبات يمكن إكثاره فى الحال ، ليصبح صنفاً جديداً ، ويكون العثور على هذا النبات هو المحور الرئيسى لبرنامج التربية .

مصادر الاختلافات الوراثية

يمكن العثور على التراكيب الوراثية المرغوب فيها ، إما بالانتخاب فى العشائر المتوفرة المكثرة خصرياً ، وإما بالمعاملة بالعوامل المطفرة ، وإما بعد اللجوء إلى التكاثر الجيسى إن كان ذلك ممكناً .

الانتخاب فى العشائر المتوفرة المكثرة خضرياً

سبقت الإشارة إلى أنه لاجدوى من الانتخاب فى السلالة الخضرية : لأن نباتاتها تكون متجانسة تماماً ، وإذا ظهرت أية اختلافات بينها .. فإنها تكون غالباً بيئية . أما العشائر التى يجدى فيها الانتخاب .. فهى التى يحتمل أن تكون قد تراكمت فيها الطفرات خلال فترة طويلة من الزمن ' مثل الأصناف البلدية ، والأصناف المحسنة القديمة . ويفضل فى هذه الحالة .. الانتخاب للصفات التى يكون من السهل تعرفُها : مثل كل الصفات النوعية ،

ويعرف الانتخاب حينئذ باسم انتخاب السلالة الخضرية Clonal Selection . ويعاب على هذه الطريقة فى التربية أنها تعتمد كلية على الاختلافات الوراثية التى توجد بصورة طبيعية ؛ فلاتعطى بذلك الفرصة لإحداث تقدم سريع وجوهري فى صفات المحصول .

اللجوء إلى التكاثر الجنسي

ترجع أهمية اللجوء إلى التكاثر الجنسي (إن كان ذلك ممكناً) إلى الحقائق التالية :

- ١- يُعد التكاثر الجنسي الوسيلة الوحيدة لجمع صفات من سلالات ، أو أصناف مختلفة فى صنف جديد .
- ٢- يعطى التهجين بين الأصناف الفرصة لظهور انعزالات جديدة كثيرة للغاية (يبلغ عددها ٣ حيث ن هى عدد العوامل الواثية ، التى يختلف فيها الصنفان الملقحان) .
- ٣- تتميز النباتات الخضرية التكاثر بأنها تكون على درجة كبيرة من عدم التماثل الوراثى (يراجع لذلك الفصل الثالث) ؛ لذا .. فإن مجرد تلقيحها - ذاتياً - ينشأ عنه انعزالات وراثية كثيرة .

ويستفاد مما تقدم بيانه فى تحسين المحاصيل الخضرية التكاثر كما يلى :

- ١- الاستفادة من الانعزالات التى تحدث عند التلقيح الذاتى ، وقد انتخبت بهذه الطريقة معظم الأصناف القديمة من الفاكهة .
- ٢- الاستفادة من الانعزالات التى تحدث عند التلقيح الخلطى الطبيعى بين نباتات الصنف الواحد أو الأصناف المختلفة ، وقد انتجت بهذه الطريقة أصناف كثيرة من نخيل البلح . وتتميز النباتات المنتخبة بهذه الطريقة بأنها لاتتعرض لاحتمالات التدهور مع التربية الداخلية الذى قد يحدث فى حالة التلقيح الذاتى .
- ٣- الاستفادة من الانعزالات التى تحدث عند إجراء تلقيحات مُتَحَكِّمٍ فيها بين أصناف مختارة تحمل الصفات المرغوب فيها ، وتلك هى الطريقة المفضلة ، التى تتبع - حالياً - فى معظم برامج التربية .
- ٤- الاستفادة من ظاهرة قوة الهجين التى تظهر عند تهجين السلالات المرباة تربية داخلية بشكل جزئى ؛ حيث تمارس التربية الداخلية لأجيال قليلة مع انتخاب النباتات المتميزة بعد كل جيل ، ثم تلقح السلالات المنتخبة معاً ، وتقيم الهجن الناتجة ، وتنتخب

أفضل النباتات الهجين : لإكثارها كأصناف جديدة .

هذا .. ولا يمكن - دائماً - اللجوء إلى التكاثر الجنسي ؛ نظراً لأن بعض الأنواع النباتية الخضرية التكاثر لاتنتج بنوراً بالمرة ، أو قد تنتج بنوراً بها أجنة لا إخصابية فقط (أى تكون إجبارية التكاثر اللاإخصابى) . وقد أمكن التغلب على المشكلة الأخيرة فى بعض الحالات (شكل ١٦-١) ؛ نظراً لأن التكاثر اللاإخصابى هو فى الأساس ظاهرة وراثية .

وتجدر الإشارة إلى استحالة تطبيق طريقة التربية بالتهجين الرجعى على النباتات التى تكثر - تجارياً - بطريقة خضرية ، ولكن يمكن أن يتبع معها طريقة التهجين الرجعى المحورة ، التى سبقت الإشارة إليها فى الفصل الثانى عشر .

المعاملة بالعواهل المطفرة


سبقت الإشارة فى الفصل الثالث عشر إلى أهمية تربية النباتات الخضرية التكاثر بالطفرات . ويفيد هنا إعادة التأكيد أن تربية النباتات الخضرية التكاثر بالطفرات ، تعادل فى تأثيرها النهائى التربية بالتهجين الرجعى فى النباتات الجنسية التكاثر .

هذا .. وأياً كانت طريقة التربية المتبعة .. فإن التقييم إما أن يكون على أساس النباتات الفردية فى حالة الانتخاب للصفات النوعية ذات درجات التوريث المرتفعة ، وإما أن يكون على أساس السلالات الخضرية بون مكررات فى حالة الصفات الكمية ذات درجات التوريث المتوسطة ، وإما بمكررات بالنسبة للصفات الكمية ذات درجات التوريث المنخفضة .

مشاكل تربية النباتات الخضرية التكاثر

توجد مشاكل عامة تتعلق بتربية النباتات الخضرية التكاثر بوجه عام ، منها ما يلى :

- ١- لاتنتج بعضها بنوراً ؛ مثل الموز ، والقلقاس ، والثوم .
- ٢- تكثر بها مشاكل العقم وعدم التوافق .
- ٣- توجد فى بعضها ظاهرة تعدد الأجنة ، كما فى أنواع الموالح المختلفة (ما عدا الشانوك والكازمارو) ، وبعض أصناف المانجو ؛ مثل : هندى بسنارة ، وتيمور ، وقلب الثور ، ولونج ، ومسك ، ومستكاوى . وتعد هذه الظاهرة عائقاً أمام المربى الذى يتعين عليه زراعة ورعاية عدة نباتات من كل تلقيح، إلى أن يتمكن من معرفة النبات الناتج من الجنين الجنسي .



شكل (١٦ - ١) : طريقة إنتاج أصناف جديدة من حشيشة بفل buffelgrass وهي ذات تكاثر لاإخصائي إجباري ، تكون السلالة الجنسية التكاثر خليطة في الجينات التي تتحكم في القدرة على التكاثر الجنسي ، وتعطى نسلًا ذا تكاثر جنسي (S) ، ولاإخصائي (A) عند تلقيحها ذاتيًا أو مع سلالة ذات تكاثر لاإخصائي (Fehr ١٩٨٧) .

٤- تكثر بها الإصابات الفيرسية التي تنتقل بالتكاثر الخضري .

٥- تكون معظم الأصناف خليطة وراثيًا .

كما توجد مشاكل خاصة بالمحاصيل الخشبية المعمرة الخضرية التكاثر كالفاكهة ؛ منها مايلي :

١- احتياجها إلى عدة سنوات حتى تزهر وتثمر .

- ٢- احتياجها إلى مساحات كبيرة لإجراء التقييم اللازم على النباتات المنعزلة .
- ٣- صعوبة التنبؤ باحتياجات المستهلك فترة طويلة مقدماً ، وهى الفترة التى يستغرقها برنامج التربية .
- ٤- استحالة تغيير الصنف بسرعة .
- ٥- تكثر بها مشاكل عدم توافق الأصل مع الطعم .

طرق التغلب على مشاكل تربية الأشجار المعمرة

تعد فترة الحداثة الطويلة التى تبقى فيها أشجار الفاكهة المعمرة غير مثمرة من أكبر مشاكل تربية الفاكهة . وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة - جزئياً - باتباع ما يلى :

١- تطعيم البادرات الناتجة من الهجن على أشجار معمرة :

يمكن عند اتباع هذه الطريقة تطعيم براعم ، أو أفرع خضرية من البادرات الصغيرة على أشجار بعمر ٥-٦ سنوات ليسهل إجراء التطعيم عليها ، وليسهل إجراء التقييم للثمار بعد ذلك ، حينما تكون الأشجار لاتزال صغيرة . ويمكن الحصول على عقل للتطعيم -عادة- فى نهاية موسم النمو الأول ، ويفضل - دائماً - تطعيم النباتات الناتجة من تهجين واحد - مجتمعة - على شجرة واحدة . وتثمر هذا الطعوم -عادة- بعد ٣-٤ سنوات ؛ وبذا .. يمكن تقييمها فى خلال خمس سنوات من إجراء التهجين ، مقارنة بنحو ٨-١٠ سنوات عند تربية النباتات إلى مرحلة الإثمار . ويعاب على هذه الطريقة أنها لاتسمح بتقييم الأشجار من حيث قوة النمو ، والشكل العام (Magness ١٩٣٧) .

١- تشجيع النمو القوى فى السنوات الأولى بعد الزراعة بزيادة مسافة الزراعة .

٢- تقليم الجذور .

٤- تحليق جنود الأشجار التى بلغت من العمر أربع سنوات .

٥- التطعيم على أصول مقزمة ؛ مثل أصل التفاح East Malling (Way ١٩٧١) .

٦- الاستفادة من الارتباط بين صفات الثمار ، وصفات النمو الخضرى .

ففى التفاح - مثلاً - وجد ارتباط عالٍ بين pH أوراق الأشجار وهى فى عمر سنتين ، وبين pH الثمار عندما أثمرت تلك الأشجار وهى فى عمر ٦-٧ سنوات ، وأمكن اتخاذ تلك العلاقة كأساس للانتخاب لصفة pH الثمار ؛ فوجد أن استبعاد البادرات ذات الـ pH

الأعلى من المتوسط (٤٠٪ من مجموع البادرات) أدى إلى استبعاد ٧٤٪ من النباتات التي أنتجت ثماراً قليلة الحموضة بدرجة غير مرغوب فيها ($pH \leq 3,8$). إلا أن هذه الطريقة لم تكن فعالة في خفض نسبة الأشجار التي تحمل ثماراً حامضية بدرجة غير مقبولة ($pH \geq 2,9$) (Visser & Verhaegh ١٩٧٨).

وتستخدم منظمات النمو في التغلب على بعض مشاكل تربية الأشجار المعمرة مثل الفاكهة ، كما يلي :

١- تقصير فترة الانتقال Transition Phase :

تمر الأشجار المعمرة -مثل الفاكهة- بفترة حداثّة Juvenile Phase تتراوح من ٤-١٢ سنة قبل أن تبدأ في الإزهار ، ولا يمكن دفع النباتات خلالها للإزهار بأية وسيلة . ولاتتفق - أحياناً - نهاية فترة الحداثّة مع بداية الإزهار . ويطلق على المدة التي تمر بين المرحلتين اسم فترة الانتقال ، وهي مرحلة تتأثر خلالها النباتات - بسهولة - بالمعاملة بمنظمات النمو ، ويمكن تقصيرها بمعاملة النباتات بال SADH ، و TIBA ، و CEPA ، وغيرها .

٢- التغلب على سكون البذور :

يحل حامض الجبريلليك محل معاملة الكمر البارد Stratification في معظم الفواكه التي تتطلب بنورها تلك المعاملة ، كما استعملت الثيورورا كذلك . ووجد أن تعريض البذور لفترة قصيرة من الكمر البارد بعد المعاملة بأي من منظمي النمو يزيد من كفاءة منظم النمو في التخلص من سكون البذور .

٣- إحداث العقم الذكري :

أمكن إحداث العقم الذكري في بعض الفاكهة -مثل العنب- بالمعاملة ببعض منظمات النمو ؛ مثل المالك هيدارزيد ، والترأى أيودوبنزوك أسد TIBA ، و FW 50 .

٤- المساعدة على إجراء التلقيحات البعيدة :

أمكن - مثلاً - إجراء تهجينات ناجحة بين الكمثرى ، والتفاح بمعاملة مبايض الأزهار الملقحة بمنظم النمو بيتا نفتوكسي حامص الخليك NAA - B قبل التلقيح مباشرة ، وبعد التلقيح بـ ٢٤ ساعة .

٥- كسر سكون البراعم :

يستخدم لكسر سكون البراعم حامض الجبريلليك ، والثيوريا .

٦- منع تساقط الثمار :

يُعَدُّ تساقط بعض الثمار أمراً طبيعياً في كثير من الفاكهة ؛ مثل الموالح والمانجو . وإذا سقطت الثمار الناتجة من التلقيحات .. تأخر برنامج التربية ، وضاعت جهود المربي . وقد وجد أن تساقط الثمار تقل معدلاته كثيراً بالرش بمنظّم النمو ٢ ، ٤ - D 2,4 بتركيز ٢٥ جزءاً في المليون (عن Dhatt ١٩٧٧) .

وقد أمكن لسنوات عديدة التغلب على مشكلة صعوبة تمييز بادرة الجنين الجنسي عن بادرات الأجنة اللاإخصابية في الحمضيات ، بالاستفادة من سيادة صفة الورقة الثلاثية التي توجد في النوع *Poncirus trifoliata* عند تلقيحه مع أنواع الجنس *Citrus* ؛ حيث تكون البادرات الناتجة من الجنين الجنسي لهذا التلقيح النوعي ثلاثية الأوراق .. إلا أن هذه الصفة لا توجد إلا في الجنس *Poncirus* ؛ وعليه .. فإنها لا تفيد عند تلقيح أنواع الجنس *Citrus* مع بعضها (عن Esen وآخرين ١٩٧٥) .

القسم الثالث

**زراعة الأنسجة وأوجه الاستفادة منها
في تربية النبات**

يستعمل مصطلح مزارع الأنسجة Tissue Culture فى هذا القسم ليعنى به مزارع الخلايا والأنسجة والأعضاء النباتية تحت ظروف معقمة . وغنى عن البيان أن مزارع الأنسجة هى علم قائم بذاته ، إلا أننا نتناولها فى هذا القسم كأداة جديدة هامة ، أصبح يعتمد عليها مربى النبات اعتماداً متزايداً فى تحقيق أهداف برامج التربية . ونقدم فى الفصل التالى (الفصل السابع عشر) عرضاً سريعاً للأسس العامة لمختلف أنواع مزارع الأنسجة ، مع الإشارة إلى المراجع المتخصصة التى نتناولها بتوسع ؛ ثم نستعرض - فى الفصل الثامن عشر - أوجه الاستفادة من مختلف أنواع مزارع الأنسجة فى مجال تربية النبات .

أما الهندسة الوراثية - وهى أحدث العلوم البيولوجية - فهى أيضاً علم قائم بذاته . وبينما تعد مزارع الأنسجة أداة مهمة ويعتمد عليها علم الهندسة الوراثية .. فإن الهندسة الوراثية تعد - بدورها - أداة مهمة فى يد مربى النبات ، يمكن استخدامها فى تحسين المحاصيل الزراعية ؛ ومن هذا المنطلق .. فإننا نتعرض - باختصار - فى نهاية الفصل الثامن عشر - للهندسة الوراثية ؛ كوسيلة لتحسين النباتات فى صفات معينة ، ضمن برامج التربية العادية ، مع الإشارة إلى المراجع المتخصصة فى هذا المجال .

وما العرض السريع للأسس العامة لمزارع الأنسجة والهندسة الوراثية فى الفصل السابع عشر إلا لتعريف القارئ بمختلف أنواع مزارع الأنسجة ، وطبيعة التقنيات التى تتطلبها هذه النوعية من الدراسات ؛ لكى يمكن استيعاب أوجه الاستفادة منها فى مجالات تربية النباتات فى الفصل الثامن عشر . أما التوسع فى دراسة مزارع الأنسجة والهندسة الوراثية ، وتعرف دقائق تقنياتها .. فليست من أهداف هذا الكتاب - ولا يصح أن تكون - ويمكن الرجوع إلى تلك التفاصيل فى المراجع المتخصصة التى سبق ذكرها . هذا .. ولقد

لخصت معظم المعلومات الواردة فى هذا القسم عن Ohojwani & Razdan (١٩٨٣) ،
مع إضافات أخرى من المصادر التى جاء بيانها .

الفصل السابع عشر

زراعة الأنسجة

أمور عامة

مختبر زراعة الأنسجة

تجرى زراعة الأنسجة تحت ظروف معقمة في مختبرات خاصة ، يجب أن تتوفر فيها شروط معينة ، وأن تجهز تجهيزاً خاصاً ؛ فيجب أن يحتوى المختبر على غرفة خاصة لتحضير البيئات ، وأخرى لزراعة الأنسجة وثالثة لحضانة المزارع وحفظها . ويجب أن يزود المختبر بقائمة طويلة من مختلف أنواع الزجاجيات ، والمركبات الكيميائية ، والحضانات ، والأدوات ، والأجهزة المختبرية العادية (التي تتوفر - عادة - في مختبرات أمراض النبات) ، بالإضافة إلى حيز مبرد مناسب في الثلاجات لتخزين المزارع والبيئات . ويتعين أن يكون المختبر منيعاً ضد الأتربة ، التي يمكن أن تلوث المزارع والبيئات في حالة انتشارها في هواء المختبر . كما يجب أن تتوفر في المختبر الأفران التي تستخدم في تعقيم الزجاجيات ، وأوتوكليف لتعقيم البيئات ، ومختلف أنواع المطهرات السطحية (مثل هيبوكلوريد الصوديوم أو الكالسيوم ، وفوق أكسيد الأيدروجين ، وبنترات الفضة ، وكلوريد الزئبق ، والمضادات الحيوية) ؛ لتطهير العينات النباتية سطحياً .

وفيما يلي قائمة بأهم المعدات التي يجب أن تتوفر في مختبر زراعة الأنسجة :

- ١- بوارق مخروطية بأحجام : ١٠٠ ، و ٢٥٠ أو ٥٠٠ مل ، و ١ ، و ٥ لترات .
- ٢- بوارق معيارية بأحجام : ٥٠٠ مل ، و ١ ، و ٢ ، و ٣ لترات .
- ٣- مخابير مدرجة بأحجام : ٢٥ ، و ٥٠ ، و ١٠٠ ، و ٥٠٠ مل ، ولتر واحد .
- ٤- ماصات مدرجة بأحجام : ١ ، و ٢ ، و ٥ ، و ١٠ مل .
- ٥- ماصات باستير .
- ٦- أوعية مزارع (أنابيب المزارع ، وزجاجات بأحجام مختلفة لها أغطية «بقلووظ» ، وأطباق بتري) .
- ٧- «دلاء» بلاستيكية لنقع الزجاجيات قبل غسلها .
- ٨- حجرة أو حيز خاص صغير مزود بالهواء الساخن ؛ لتجفيف الأوعية ، والزجاجات بعد غسلها .
- ٩- فرن لتجفيف الأوعية والزجاجيات ، وتعقيم الزجاجات .
- ١٠- سلال سلكية ، توضع بها أوعية البينات الصغيرة في أثناء تعقيمها ، والزجاجيات الصغيرة في أثناء تجفيفها .
- ١١- جهاز لتقطير الماء .
- ١٢- أوعية بلاستيكية (بحجم : ١٠ ، و ٢٠ لترًا) ؛ لتخزين الماء المقطر .
- ١٣- ميزانان ؛ أحدهما لوزن الكميات الصغيرة ، والثاني لوزن الكميات الكبيرة نسبياً .
- ١٤- قرص ساخن hot plate مع قلاب مغناطيسي magnetic stirrer ؛ لإذابة المركبات الكيميائية .
- ١٥- مضخة تفريغ exhaust pump لتسهيل عملية التعقيم بالترشيح .
- ١٦- قنينات بلاستيكية بأحجام مختلفة لتخزين المحاليل سائلة أو مجمدة .
- ١٧- ثلاجة لتخزين المركبات الكيميائية ، والمحاليل القياسية التي تحضر منها البينات ، والعينات النباتية .
- ١٨- مجمدة لتخزين المحاليل القياسية لفترات أطول ، وبعض الإنزيمات ، ولبن جوز الهند ... إلخ .
- ١٩- جهاز توليد بخار steamer ؛ لإذابة الآجار والبيئات .

- ٢٠- جهاز قياس الـ pH لضبط pH البيئات والمحاليل .
- ٢١- أوتوكليف (جهاز تعقيم البخار تحت ضغط) ، أو قنور طهى تحت ضغط ؛ لتعقيم البيئات .
- ٢٢- قرص ساخن مُنظَّم بالحرارة heat - regulated hot plate ؛ للتعقيم البخار فى قنور الطهى تحت ضغط .
- ٢٣- أغشية مرشحات تعقيم ومواسكها ؛ لتعقيم المحاليل بالترشيح .
- ٢٤- حقن بلاستيكية معقمة ؛ لغرض الاستعمال مع المحاليل المعقمة بالترشيح .
- ٢٥- عربة صغيرة مزودة بصوانٍ مناسبة ؛ لنقل البيئات والأنوات .
- ٢٦- حجرة محكمة الغلق Inoculation chamber يتجدد فيها الهواء بعد ترشيحه ؛ لاستخدامها فى كل العمليات التى تجرى فى ظروف معقمة .
- ٢٧- لمبة (شعلة) كحول spirit Lamp أو مصباح بنزن bunsen burner ؛ لتعقيم الأنوات باللهب .
- ٢٨- رشاشة صغيرة atomizer ؛ لرش الكحول داخل حجرة العزل والتلقيح .
- ٢٩- زجاجات ذات أغشية «بقلاووظ» ؛ لتعقيم العينات النباتية .
- ٣٠- حامل للأنوات المعقمة .
- ٣١- ملاقط كبيرة ذات أطراف غير حادة للزراعة والتلقيح .
- ٣٢- ملاقط ذات أطراف حادة ؛ لنزع بشرة الأوراق .
- ٣٣- إبر دقيقة للتشريح .
- ٣٤- مشارط لتقطيع الأنسجة النباتية .
- ٣٥- ملاوق لزراعة الأنسجة .
- ٣٦- مثقاب فلين لأخذ عينات أسطوانية من الأنسجة بحجم ثابت .
- ٣٧- مجهر ثنائى العينين binocular ؛ لتجزئ النباتات المجهرية الحجم .
- ٣٨- مكيفات هواء للمحافظة على درجة حرارة ثابتة لحجرة المزارع .
- ٣٩- هزاز للمزارع السائلة .
- ٤٠- مناخل من الصلب الذى لا يصدأ ، ذات ثقوب بأقطار مختلفة ؛ لفصل تجمعات الخلايا التى تكون بأحجام مختلفة .
- ٤١- جهاز طرد مركزى صغير ، لترسيب الخلايا ؛ بغرض تحديد حجم النمو الخلوى ،

ولتنظيف البروتوبلازم .

٤٢- هيموسيتوميتر Haemocytometer لعدّ الخلايا .

٤٣- شرائح زجاجية ذات تجويف ؛ لتعليق المزارع السائلة فى أثناء فحصها .

٤٤- شرائح زجاجية عادية وأغطية شرائح ؛ لعمل تحضيرات مجهرية من الخلايا والأنسجة .

٤٥- مجهر لفحص الخلايا والأنسجة .

بيئات الزراعة

يجب أن تتوفر فى بيئات الزراعة Culture Media كافة الاحتياجات الغذائية والهرمونية التى تلزم الأنسجة وتميزها . وتختلف هذه الاحتياجات -كثيراً- ليس فقط من نوع نباتى إلى آخر ، وإنما أيضاً من جزء إلى آخر فى النبات الواحد ؛ وعليه .. فإنه يلزم عند العمل على نبات جديد أن يبدأ الباحث بتحديد البيئة المناسبة لهذا النبات . وقد أمكن التوصل إلى عدد من البيئات القياسية (جدول ١٧-١) ، التى قد يمكن استخدام أى منها مباشرة ، أو بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها ؛ لتصبح أكثر ملاءمة للنوع النباتى الذى يعمل عليه المربى . ويبين جدول (١٧-٢) تركيز مختلف العناصر فى كل من البيئات التى جاء ذكرها فى جدول (١٧-١) .

ويفضل دائماً تجريب ثلاثة مستويات - منخفض ، ومتوسط ، ومرتفع - من الأنواع الأربعة من المركبات التى تدخل فى تركيب بيئات الزراعة (وهى المركبات المعدنية ، والأوكسينات ، والسيتوكينينات ، والمغذيات العضوية) ؛ وبذا .. فإن التجربة الأولى لتحديد أفضل بيئة للزراعة .. يمكن أن تتضمن ٨١ معاملة (جدول ١٧-٣) . ويلي ذلك إجراء تجارب أخرى أصغر ؛ للتوصل إلى التركيز الأمثل من كل مركب ، مع استعمال أنواع مختلفة من الأوكسينات والسيتوكينينات . وإذا استخدم الآجار فى تحضير بيئات الزراعة (يكون استخدامه غالباً بنسبة ٨ ٪ - ١٠ ٪) .. تجب مراعاة ما يحتويه الآجار من عناصر (خاصة الكالسيوم والمغنيسيوم والعناصر الدقيقة) على صورة شوائب (جدول ١٧-٤) . هذا .. ويستخدم فى تحضير بيئات الزراعة محاليل قياسية ، يحتوى كل منها على تركيزات عالية نسبياً لعدد من المركبات الكيميائية ، كما هو مبين فى جدول (١٧-٥) بالنسبة لبيئة Murashige & Skoog .

جدول (١٧ - ١) : البيانات القياسية المستخدمة في مزارع الانسجة (١)

المكونات	(ب) البيانات (الكيمياء بالجزء في المليون)						
	White's (ح)	Heller's (د)	MS (هـ)	ER (و)	B (ز)	Mitsch's (ح)	NT (ط)
غير العضوية							
NH ₄ NO ₃	—	—	1650	1200	—	720	825
KNO ₃	80	—	1900	1900	2527.5	950	950
CaCl ₂ · 2 H ₂ O	—	75	440	440	150	—	220
CaCl ₂	—	—	—	—	—	166	—
MgSO ₄ · 7 H ₂ O	750	250	370	370	246.5	185	1233
KH ₂ PO ₄	—	—	170	340	—	68	680
(NH ₄) ₂ SO ₄	—	—	—	—	134	—	—
Ca(NO ₃) ₂ · 4 H ₂ O	300	—	—	—	—	—	—
NaNO ₃	—	600	—	—	—	—	—
Na ₂ SO ₄	200	—	—	—	—	—	—
NaH ₂ PO ₄ · H ₂ O	19	125	—	—	150	—	—
KCl	65	750	—	—	—	—	—
KI	0.75	0.01	0.83	—	0.75	—	0.83
H ₃ BO ₃	1.5	1	6.2	0.63	3	10	6.2
MnSO ₄ · 4 H ₂ O	5	0.1	22.3	2.23	—	25	22.3
MnSO ₄ · H ₂ O	—	—	—	—	10	—	—
ZnSO ₄ · 7 H ₂ O	3	1	8.6	—	2	10	—
ZnSO ₄ · 4 H ₂ O	—	—	—	—	—	—	8.6
Zn · Na ₂ · EDTA	—	—	—	15	—	—	—
Na ₂ MoO ₄ · 2 H ₂ O	—	—	0.25	0.025	0.25	0.25	0.25
MoO ₃	0.001	—	—	—	—	—	—
CuSO ₄ · 5 H ₂ O	0.01	0.03	0.025	0.0025	0.025	0.025	0.025
CoCl ₂ · 6 H ₂ O	—	—	0.025	0.0025	0.025	—	—
CoSO ₄ · 7 H ₂ O	—	—	—	—	—	—	0.03
AlCl ₃	—	0.03	—	—	—	—	—
NiCl ₂ · 6 H ₂ O	—	0.03	—	—	—	—	—
FeCl ₃ · 6 H ₂ O	—	1	—	—	—	—	—
Fe ₂ (SO ₄) ₃	2.5	—	—	—	—	—	—
FeSO ₄ · 7 H ₂ O	—	—	27.8	27.8	—	27.8	27.8
Na ₂ · EDTA · 2 H ₂ O	—	—	37.3	37.3	—	37.3	37.3
Sequestrene 330Fe	—	—	—	—	28	—	—
العضوية							
Inositol	—	—	100	—	100	100	100
Nicotinic acid	0.05	—	0.5	0.5	1	5	—
Pyridoxine HCl	0.01	—	0.5	0.5	1	0.5	—
Thiamine HCl	0.01	—	0.1	0.5	10	0.5	1
Glycine	3	—	2	2	—	2	—
Folic acid	—	—	—	—	—	0.5	—
Biotin	—	—	—	—	—	0.05	—
Sucrose	2%	—	3%	4%	2%	2%	1%
D-Mannitol	—	—	—	—	—	—	12.7%

(أ) لم تعط بيانات منظمات النمو وبيئات الزراعة الخاصة لحالات معينة .

(ب) أعطيت تركيزات المانيتول والسكروز كنسب مئوية .

(ج) بيئة هوايت White .

(د) بيئة هالر Heller .

(هـ) بيئة مراشج وسكوج Murashige & Skoog .

(و) بيئة إيركسون Eriksson .

(ز) بيئة جامبورج Gamborg وآخرون .

(ح) بيئة نتشه Nitsch .

(ط) بيئة ناجاتا وتاكيبا Nagata & Takeba .

جدول (١٧ - ٢) : تركيز الأيونات في البساتين المائية في جدول (١٧ - ١).

البساتين

الأيونات	الوحدات	White's	Heller's	MS	ER	B _j	Nilsch's	NT
NO ₃ , NH ₄ , Total N		3.33	7.05	39.41	33.79	25.00	18.40	19.69
		—	—	20.62	15.00	2.00	9.00	10.30
P	mmol l ⁻¹	3.33	7.05	60.03	48.79	27.03	27.40	29.99
K		0.138	0.90	1.25	2.50	1.08	0.50	5.00
Ca		1.66	10.05	20.05	21.29	25.00	9.90	14.39
Mg		1.27	0.51	2.99	2.99	1.02	1.49	1.50
Cl		3.04	1.01	1.50	1.50	1.00	0.75	5.00
Fe		0.87	11.08	5.98	5.98	2.04	2.99	3.00
S		12.50	3.70	100.00	100.00	50.10	100.00	100.00
Nu		4502.00	1013.50	1730.00	1610.00	2079.90	996.80	5236.50
B		2958.00	7966.00	202.00	237.20	1089.00	202.00	202.00
Mn		24.20	16.00	100.00	10.00	48.50	161.80	100.00
Zn	μmol l ⁻¹	22.40	0.40	100.00	10.00	69.20	112.00	100.00
Cu		10.40	3.40	30.00	37.30	7.00	34.70	36.83
Ni		0.04	0.10	0.10	0.01	0.10	0.10	0.10
Co		0.007	—	1.00	0.1	1.00	1.00	1.00
I		—	—	0.10	0.01	0.10	—	0.10
Al		4.50	0.06	5.00	—	4.50	—	5.00
Ni		—	0.20	—	—	—	—	—
		—	0.10	—	—	—	—	—

جدول (١٧ - ٣) : المستويات المنخفضة ، والمتوسطة ، والمرتفعة لمختلف مكونات البيئات اللازمة لتحديد البيئة المثلى .

المكونات	مدي التركيزات (ملي مول / لتر)		
	منخفض	متوسط	مرتفع
مركبات معدنية			
NH ₄ NO ₃	5	10	20
KNO ₃	—	10	20
KH ₂ PO ₄	0.1	—	—
NaH ₂ PO ₄	—	1	2
KCl	1.9	—	—
CaCl ₂	1	2	3
MgSO ₄	0.5	1.5	3
H ₃ BO ₃	0.01	0.05	0.15
MnSO ₄	0.01	0.05	0.1
ZnSO ₄	0.001	0.02	0.04
CuSO ₄	0.00001	0.0001	0.0015
Na ₂ MoO ₄	0.00001	0.0001	0.001
CoCl ₂	0.0001	0.0005	0.001
KI	0.0005	0.0025	0.005
FeSO ₄	0.01	0.05	0.1
Na ₂ ·EDTA	0.01	0.05	0.1
أوكسين	0.0001	0.001	0.01
فيتوكاينين	0.0001	0.001	0.01
مركبات عضوية			
Inositol	0.1	0.3	0.6
Nicotinic acid	0.004	0.02	0.04
Pyridoxine HCl	0.0006	0.003	0.006
Thiamine HCl	0.0001	0.002	0.04
Biotin	0.00004	0.0002	0.001
Folic acid	0.0005	0.001	0.002
D-Ca Pantothenate	0.0002	0.001	0.005
Riboflavin	0.0001	0.001	0.01
Ascorbic acid	0.0001	0.001	0.01
Choline chloride	0.0001	0.001	0.01
L-Cysteine HCl	0.01	0.06	0.12
Glycine	0.0005	0.005	0.05
Sucrose	6	60	120

جدول (١٧ - ٤) : المحتوي الكيميائي لأنواع أجار Difco المستخدمة في مزارع الأنسجة .

المكونات	Bacto-agar	Noble-agar	Purified-agar
Ash	4.5%	2.6%	1.75%
Calcium	0.13%	0.23%	0.27%
Barium	0.01%	0.01%	0.01%
Silica	0.19%	0.26%	0.09%
Chloride	0.43%	0.18%	0.13%
Sulphate	2.54%	1.90%	1.32%
Nitrogen	0.17%	0.10%	0.14%
Iron	11.00 mg l ⁻¹	11.00 mg l ⁻¹	11.00 mg l ⁻¹
Magnesium	285.00 mg l ⁻¹	260.00 mg l ⁻¹	695.00 mg l ⁻¹
Copper	5.00 mg l ⁻¹	7.50 mg l ⁻¹	20.00 mg l ⁻¹

جدول (١٧ - ٥) : المحاليل القياسية المستخدمة في تحضير بيئة

مراشيج وسكوج Murashige & Skoog (١)

المكونات	الكمية (مجم / لتر)
المحلول القياسي الأول	
NH ₄ NO ₃	33 000
KNO ₃	38 000
CaCl ₂ . 2 H ₂ O	8800
MgSO ₄ . 7 H ₂ O	7400
KH ₂ PO ₄	3100
المحلول القياسي الثاني	
KI	166
H ₃ BO ₃	1240
MnSO ₄ . 4 H ₂ O	4460
ZnSO ₄ . 7 H ₂ O	1720
Na ₂ MoO ₄ . 2 H ₂ O	50
CuSO ₄ . 5 H ₂ O	5
CoCl ₂ . 6 H ₂ O	5
(ب) المحلول القياسي الثالث	
FeSO ₄ . 7 H ₂ O	5560
Na ₂ EDTA . 2 H ₂ O	7460
المحلول القياسي الرابع	
Inositol	20 000
Nicotinic acid	100
Pyridoxine HCl	100
Thiamine HCl	100
Glycine	400

(أ) لتحضير لتر من البيئة .. يستخدم ٥٠ مل من المحلول القياسي الأول ، و٥ مل من كل من

المحاليل القياسية الثاني ، والثالث ، والرابع .

(ب) أذب كلاً من المركبين - علي انفراد - في ٤٥٠ مل ماء مقطراً مع التسخين والتقليب ، ثم اخلط

المحلولين ، وعدل الـ pH إلي ٥.٥ ثم أضف ماء مقطراً ، إلي أن يصل الحجم النهائي إلي لتر .

ويبين جدول (١٧-٦) التركيب الكيميائي ، والوزن الجزيئي لمختلف المركبات التي تدخل في تركيب البيئات المغذية ؛ كما يبين جدول (١٧-٧) الوزن الذري لمختلف العناصر التي تدخل في تكوين هذه المركبات . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Dixon (١٩٨٥) ، و Ohojwani & Razdan (١٩٨٣) .

مزارع الخلايا

يُعد عزل خلايا مفردة أولى الخطوات في عمل مزارع الخلايا Cell Cultures . وتجري هذه الخطوة إما بالوسائل الميكانيكية ، وإما إنزيمياً من الأعضاء النباتية الكاملة ، وإما تؤخذ الخلايا من نسيج كالوس callus tissue نامٍ من أسطح معقمة لأجزاء نباتية مزروعة ويلى ذلك .. زراعة الخلايا من المعلق . وتعد طريقة برجمان Bergmann (شكل ١٧-١) أكثر الطرق شيوعاً لزراعة الخلايا المفردة . ويراعى فيها أن يكون تركيز الخلايا المفردة في البيئة السائلة ضعف التركيز النهائي المطلوب عند الزراعة . ويبين شكل (١٧-٢) خطوات إنتاج نبات دخان من خلية مفردة ، بينما يعطى جدول (١٧-٨) تركيب بيئتين مناسبتين لزراعة خلايا مفردة من النسيج الوسطى (الميزوفيل) للورقة .

وتتوقف طبيعة النمو في مزارع الخلايا على تركيز الهرمونات في بيئة النمو ؛ حيث قد يكون النمو متميزاً Differentiated ، أو غير متميز Undifferentiated . ويعنى بالنمو المتميز تكوين نموات خضرية ، أو جنور ، أو كليهما ، بينما يعنى بالنمو غير المتميز تكوين كتلة من الخلايا تسمى كالس Callus .


ينتج الكالس - عادة - من أى نسيج نباتى متميز (مثل الأوراق ، والسيقان والحذير) ؛ بوضع الجزء النباتى الذى تؤخذ منه الخلايا (explant) فى بيئة تحتوى على تركيز مرتفع نسبياً من الأوكسين ، وتركيز منخفض نسبياً من السيتوكينين ، حيث يتكون الكالس حينئذ ، ويمكن أن يستمر في النمو بعد ذلك ، إما على صورة كتل متعددة الخلايا multicellular masses فى البيئات الصلبة ، وإما على شكل تجمعات صغيرة من الخلايا small cell aggregates فى البيئات السائلة الدوارة (أى التى توضع على أجهزة تتحرك بأوعية المزارع حركة دورانية) . ومع استعمال تركيزات مرتفعة من السيتوكينينات وتركيزات منخفضة من الأوكسينات فى بيئة النمو .. فإنه يمكن - أحياناً - تحفيز تكوين

جدول (١٧ - ٦) : الوزن الجزيئي للمركبات الشائعة الاستخدام في بيئات مزارع الأنسجة .


المركب	التركيب الكيميائي	الوزن الجزيئي
العناصر الكبرى		
Ammonium nitrate	NH_4NO_3	80.04
Ammonium sulphate	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	132.15
Calcium chloride	$\text{CaCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$	147.02
Calcium nitrate	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$	236.16
Magnesium sulphate	$\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	246.47
Potassium chloride	KCl	74.55
Potassium nitrate	KNO_3	101.11
Potassium dihydrogen ortho-phosphate	KH_2PO_4	136.09
Sodium dihydrogen ortho-phosphate	$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$	156.01
العناصر الصغرى		
Boric acid	H_3BO_3	61.83
Cobalt chloride	$\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$	237.93
Cupric sulphate	$\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$	249.68
Manganous sulphate	$\text{MnSO}_4 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$	223.01
Potassium iodide	KI	166.01
Sodium molybdate	$\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$	241.95
Zinc sulphate	$\text{ZnSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	287.54

جدول (١٧ - ٧) : الأوزان الذرية التي تدخل في تكوين بيئات مزارع الأنسجة .

العنصر	الرمز	الوزن الذري
Aluminium	Al	26.98
Boron	B	10.82
Calcium	Ca	40.08
Carbon	C	12.011
Chlorine	Cl	35.457
Cobalt	Co	58.94
Copper	Cu	63.54
Hydrogen	H	1.008
Iodine	I	126.91
Iron	Fe	55.85
Magnesium	Mg	24.32
Manganese	Mn	54.94
Molybdenum	Mo	95.95
Nickel	Ni	58.71
Nitrogen	N	14.008
Oxygen	O	16.00
Phosphorus	P	30.975
Potassium	K	39.10
Sodium	Na	22.991
Sulphur	S	32.066
Zinc	Z	65.38



شكل (١٧ - ١) : طريقة Bergmann لزراعة الخلايا المفردة .




شكل (١٧ - ٢) : تكوين نبات دخان من خلية مفردة : (أ) كالكس نام من قطعة صغيرة من النبات أخذت من النخاع ، (ب) عملية نقل قطعة صغيرة من الكالكس إلى بيئة سائلة في دوايق زجاجية ووضعها على هزاز ، (ج) تفكك الكالكس إلى خلايا مفردة ، (د) نقل الخلية المفردة جـ من الدوايق ووضعها في نقطة من بيئة الزراعة في حيز صغير خاص microchamber ، (هـ) نسيج صغير تكون من الخلية المفردة من خلال عدة انقسامات متتالية ، (و) عملية نقل النسيج هـ إلى بيئة شبه صلبة حيث ينمو إلى كالكس كبير ، (ز ، ح) تتميز النباتات ، (ط ، ي) تنمو النباتات إلى مرحلة النضج عند نقلها إلى أحصص .

جدول (١٧ - ٨) : تركيب بيئتين مناسبتين لزراعة خلايا مفردة من ميزوفيل الأوراق .

المكونات	البيئة والكميات (مجم / لتر)	
	Rossini	Joshi and Ball
KNO ₃	950	—
KCl	—	750
NH ₄ NO ₃	725	—
NaNO ₃	—	600
MgSO ₄ · 7 H ₂ O	187	250
CaCl ₂	169	—
CaCl ₂ · 6 H ₂ O	—	112
KH ₂ PO ₄	69	—
NaH ₂ PO ₄ · 2 H ₂ O	—	141
NH ₄ Cl	—	5.35
MnSO ₄ · 4 H ₂ O	12.5	—
MnCl ₂ · 4 H ₂ O	—	0.036
H ₃ BO ₃	5	0.056
ZnSO ₄ · 4 H ₂ O	5	—
ZnCl ₂	—	0.15
NaMoO ₄ · 2 H ₂ O	0.125	0.025
CuSO ₄ · 6 H ₂ O	0.0125	—
CuCl ₂ · 2 H ₂ O	—	0.054
CoCl ₂	—	0.02
FeSO ₄ · 7 H ₂ O	13.9	—
FeCl ₃ · 6 H ₂ O	—	0.5
Na · EDTA	18.6	—
Disodium salt of ethylene dinitrilotetraacetic acid	—	0.8
Glycine	2	—
Nicotinic acid	5	—
Pyridoxine HCl	0.5	—
Thiamine HCl	0.5	—
Biotin	0.05	—
Folic acid	0.5	—
Casein hydrolysate (acid hydrolysate, acid and vitamin free)	—	400
m-Inositol	100	—
BAP	0.1	—
Kinetin	—	0.1
2,4-D	1	1
Sucrose	10 000	20 000
pH	5.0	?

نموات متميزة إلى سيقان وأوراق وجذور شكل (١٧-٣) ، أو تكوين أجنة عرضية تنمو بنورها إلى نباتات كاملة بعد ذلك . ولزيد من التفاصيل عن مزارع الخلايا والتميز منها .. يراجع Helgeson (١٩٨٠) ، و Evans وآخرون (١٩٨١) .



شكل (١٧ - ٢) : تأثير تركيز الأوكسينات والسيبتوكينينات - في بيئة النمو - على تكوين الكالس ، وتميز النموات الجذرية والخضرية .


تكوين الأجنة الجسمية

تتكون الأجنة الجسمية Somatic Embryos ، أو Embryoides في مزارع الخلايا عندما تتوفر لها شروط معينة ، تتعلق بمنظمات النمو (خاصة الأوكسينات والسيبتوكينينات) ، مع توفر مصدر النيتروجين ، وبعض العوامل الأخرى ؛ ففي مزارع خلايا الجزر (شكل ١٧-٤) يتكون الكالس عندما تكون البيئة غنية بالأوكسين (يستعمل عادة الأوكسين ٢ ، ٤ - بتركيز ٠.٥ - ١.٠ جزءاً في المليون) ؛ وإذا نقلت تجمعات من هذه الخلايا الميرستيمية إلى بيئة ذات محتوى شديد الانخفاض من الأوكسين (حوالي ٠.١ - ٠.١ جزءاً في المليون) ، أو خالية تماماً منه .. فإنه تتميز فيها أجنة كاملة .

ويبدو أن وجود الأوكسين في البيئة الأولى ضروري لتكوين الأجنة في البيئة الثانية ؛ لأن الأنسجة التي تبقى دائماً في بيئة خالية من الأوكسين لا تتكون بها أجنة . أما مصدر النيتروجين في البيئة .. فيفضل أن يكون على صورة مختزلة ؛ مثل كلوريد الأمونيوم

NH_4Cl منفردة ، أو مع نترات البوتاسيوم KNO_3 . ومرد ذلك أن تكوين الأجنة يتطلب حداً أدنى من أيون الأمونيا NH_4^+ داخل الخلايا ؛ وهو ما لا يتحقق إلا إذا توفر أيون الأمونيا بتركيز منخفض (٢٠،٥ مللى مول/لتر) ، أو أيون النترات NO_3^- بتركيز مرتفع (٦٠ مللى مول/لتر) فى البيئة . ومن الشروط الأخرى الضرورية لتمييز الأجنة توفر تركيز عالٍ من البوتاسيوم (٢٠ مللى مول/لتر) فى البيئة . وألا يزيد تركيز الأكسجين الذائب عن ١،٥ مجم/ لتر : لأن التركيز الأعلى من ذلك يشجع على تكوين الجنور .

وتجدر الإشارة إلى أن الأجنة المتكونة فى مزارع الخلايا تبقى على اتصال سيتوبلازمى مع الخلايا المجاورة لها فى البيئة خلال المراحل الأولى لتكوين الأجنة ، ولا تنفصل عنها إلا فى مراحل متأخرة حينما يصبح الجنين مكوناً من عدة خلايا . وتكمل



شكل (١٧ - ٤) : تخطيط يبين مراحل تكوين الأجنة الجسمية فى مزارع الخلايا المعلقة للجزر .

الأجنة نموها وتثبت مباشرة فى نفس البيئة ، إلا أن الأنواع -التي تحتاج بنورها إلى المعاملة بالبرودة لكي تثبت- تتطلب نفس المعاملة ؛ حتى تثبت أجنيتها الجسمية المتكونة فى البيئات . هذا .. ويطلق على القدرة الموروثة فى الخلايا النباتية لإنتاج نباتات كاملة - حتى بعد أن تكون هذه الخلايا قد تميزت نهائياً فى جسم النبات الذى أخذت منه - اسم Totipotency .


هذا .. وقد أمكن إنتاج أجنة جسمية فى أنواع أخرى من المزارع لعدة أنواع محصولية ، ومن أمثلتها ما يلى :

المحصول	العضو أو النسيج	النباتى المستخدم كمصدر للجنين الجسمى
الشفيف	<i>Allium schoenoprasum</i>	النواتان المساعدتان فى الكيس الجنينى
الرجلة	<i>Portulaca oleracea</i>	الإندوسبرم
الشليك البرى	<i>Fragaria vesca</i>	النواتان المساعدتان
الفلفل من النوع	<i>Capsicum frutescens</i>	الجنين
الفلفل	<i>C. annum</i>	المتوك
الهندباء	<i>Cichorium endivia</i>	الجنين
الكوسة	<i>Cucurbita pepo</i>	السويقة الجنينية العليا - الفلقات
الهليون	<i>Asparagus officinalis</i>	السويقة الجنينية العليا - الأوراق - المتوك
		-الساق - الجنين - البروتوبلازم - الخلية
		الوالدة للجرثومة الصغيرة
الطماطم	<i>Lycopersicon esculentum</i>	الخلية الوالدة للجرثومة الصغيرة
الطماطم البرية	<i>L. pimpinellifolium</i>	الخلية الوالدة للجرثومة الصغيرة
الجزر	<i>Daucus carota</i>	الجنين - نسيج الكالس - السويقة الجنينية
		العليا - الأوراق - أعناق الأوراق - اللحاء
		- البروتوبلازم - الجنور - السيقان
الفينوكيا	<i>Foeniculum vulgare</i>	الساق - الجنين

ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Tisserat وآخرون (١٩٧٩) .

مزارع المتوك

تفيد مزارع المتوك Anther Culture (أو anther androgenesis) فى إنتاج نباتات أحادية من حبوب اللقاح .. إما من خلال تكوين الأجنة Pollen Embryogenesis ، وإما من خلال الكالس Pollen Callusing (شكل ١٧-٥) . ويجب أن تؤخذ المتوك من نباتات حديثة الإزهار ، ويكون ذلك فى مرحلة معينة من تكوين حبوب اللقاح قبل تفتح الزهرة ؛ لذا .. فإنه تفضل دائماً زراعة النباتات التى تؤخذ منها المتوك فى ظروف بيئية متحكم



شكل (١٧ - ٥) : تخطيط يبين نشأة النباتات الأحادية من حبوب اللقاح في مزارع المتوك . يمكن أن تسلك الخلية الوالدة للجراثومة الصغيرة ، أيا من الطرق الأربعة المبينة في الشكل لتكوين حبلة لقاح متعددة الخلايا ، وهي التي يمكن أن تنتج بدورها جنيناً مباشرة ، أو تنتج الطور الاسبوروفيتي من خلال النمو الكالوسي .

فيها ، ليتمكن الربط - إلى حد ما - بين المظهر الخارجي للبرعم الزهري ، والمرحلة المناسبة لتكوين حبوب اللقاح . وتُطهَّر البراعم الزهرية المنتخبة سطحياً بأحد المطهرات المناسبة ، ثم تفصل منها الأسدية كاملة (المتوك مع خيوطها) ، وتوضع في طبق بترى معقم . يسحق أحد المتوك في صبغة أسيتوكارمن لاختبار مرحلة تكوينه ، فإذا كان في المرحلة المناسبة .. فإن بقية المتوك تفصل من خيوطها ، وتوضع أفقياً على بيئة الزراعة .

ويجب توخي الحرص حتى لا تحدث أية أضرار للمتوك في أثناء تداولها ؛ لأن تجريحها يحفز - غالباً - تكوين كالوس من خلايا جدر المتوك .. وهي خلايا ثنائية . تحضَّن مزارع المتوك غالباً في الضوء (٥٠٠٠ - ١٠٠٠٠ لكس /lux م/٢) لمدة ١٢ - ١٨ ساعة على درجة حرارة ٢٨م بالتبادل مع فترة إظلام ، مدتها ٦ - ١٢ ساعة على حرارة ٢٢م . تتحول جدر المتوك - تدريجياً - إلى اللون البنى ، ثم تتفتح في خلال ٢ - ٨ أسابيع ؛ بسبب الضغط الداخلي للكالس المتكون من حبوب اللقاح ، أو بسبب النباتات الصغيرة Plantlets التي تنمو منها . تفصل النباتات المفردة أو النموات الخضرية المتكونة عن الكالس ، بعد أن يصل طولها إلى نحو ٣-٥ سم ، وتنقل إلى بيئة مناسبة للنمو الجذرى . ويلي ذلك .. نقل النباتات التي تكونت جذورها إلى أصص صغيرة معقمة .

هذا .. ولا توجد بيئة واحدة تناسب زراعة متوك جميع الأنواع النباتية . ويبين جدول (١٧-٩) تركيب ثلاث من البيئات التي تستخدم في مزارع المتوك في النجيليات ، علماً بأن بيئة البطاطس - ١ - تحتوي على ٢٠٪ مستخلصاً مائياً لدرنات البطاطس ، بينما تحتوي بيئة البطاطس - ٢ - على ١٠٪ من هذا المستخلص . وتعد البيئة الثالثة (N6) أفضل من البيئتين الأخريين . ولمزيد من التفاصيل عن مزارع المتوك وحبوب اللقاح .. يراجع Nitsch (١٩٧٥) ، و Sink & Padmanabhan (١٩٧٧) ، و Sunderland (١٩٨٠) ، و Chu (١٩٨٢) ، و Dunwell (١٩٨٥) .

مزارع الإندوسبرم

يعد الإندوسبرم نسيجاً ثلاثياً (٣ن) ، يتكون من تزاوج إحدى النواتين التناسليتين الأحاديتين في حبة اللقاح مع النواتين القطبيتين الأحاديتين في الكيس الجنيني لتكوين نواة الإندوسبرم الابتدائية ؛ لذا .. فإن مزارع الإندوسبرم Endosperm Culture تفيد في إنتاج نباتات ثلاثية المجموعة الكروموسومية ، ويتم ذلك إما بتكوين براعم من

جدول (١٧ - ٩) : تركيب ثلاث بيئات لزراعة متوك النجيليات .

المكونات	البيئات (مجم / لتر)		
	N6	البطاطس - ١	البطاطس - ٢
KNO ₃	2830	—	1000
(NH ₄) ₂ SO ₄	463	—	100
KH ₂ PO ₄	400	—	200
KCl	—	—	35
MgSO ₄ · 7 H ₂ O	185	—	125
CaCl ₂ · 2 H ₂ O	166	—	—
Ca(NO ₃) ₂ · 4 H ₂ O	—	—	100
FeSO ₄ · 7 H ₂ O	27.2	—	—
Na · EDTA	37.2	—	—
Fe · EDTA	—	10 ⁻⁴ mol l ⁻¹	10 ⁻⁴ mol l ⁻¹
H ₃ BO ₃	1.6	—	—
MnSO ₄ · 4 H ₂ O	4.4	—	—
ZnSO ₄ · 7 H ₂ O	1.5	—	—
KI	0.8	—	—
Thiamine HCl	1.0	1.0	1.0
Pyridoxine HCl	0.5	—	—
Niacin	0.5	—	—
Glycine	2.0	—	—
2,4-D	2.0	1.0	1.5
Kinetin	—	0.5	0.5
Potato extract	—	20%	10%
Sucrose	50 g	90 g	90 g
Agar	10 g	6 g	6 g

الإندوسبرم مباشرة ، وإما بعد تكوين نسيج كالس ؛ أما تكوين الأجنة .. فلم يتأكد بعد في مزارع الإندوسبرم .

ويتعين عزل الإندوسبرم الذى يُراد زراعته بعد مدة معينة من التلقيح ، تختلف من نوع إلى آخر ؛ فهى - مثلاً - ٨ - ١١ يوماً فى الذرة ، و ٤ - ٧ أيام فى الأرز ؛ بينما لا يصلح الإندوسبرم المكتمل النمو للزراعة . وقد نجح إنتاج النباتات الثلاثية من مزارع الإندوسبرم فى عدد محدود نسبياً من النباتات ، منها - على سبيل المثال - الأرز ، والكمثرى ، والبقدونس ، وبعض أنواع الجنس *Citrus* . ولمزيد من التفاصيل عن مزارع الإندوسبرم .. يراجع Johri وآخرون (١٩٨٠) .

التلقيح فى مزارع البويضات و مزارع المبايض

يستخدم المصطلح *In vitro Pollination* لوصف جميع الحالات التى توضع فيها حبوب اللقاح - مباشرة - على البويضات المفصولة فى بيئة صناعية (*In vitro Ovular Pollination* .. أو ما أطلق عليه اسم التلقيح فى أنبوبة الاختبار - Test - Fertilization) ، أو على البويضات المفصولة مع مشيمتها فى بيئة صناعية (*In Vitro Placental Pollination*) أو على مياسم الأزهار ، التى فصلت أمتعتها ، ووضعت فى بيئة صناعية (*In vitro Stigmatic Pollination*) . وتسمى المزارع فى الحالتين الأولى والثانية باسم مزارع البويضات *Ovule Culture* ، بينما يطلق على النوع الثالث اسم مزارع المبايض *Ovary Culture* . وتفيد هذه المزارع فى التغلب على المشاكل السابقة للإخصاب فى التلقيحات البعيدة .

تخصى الأمهات قبل تفتح الأزهار بيومين ، وتكيس ، ثم تنقل الأزهار المخصية إلى المختبر بعد موعد تفتحها الطبيعى بيوم أو يومين ؛ حيث يزال الكأس والتويج ، ويغمس المتاع وعنق الزهرة - إن وجد - سريعاً فى ٧٠٪ كحولاً ، ثم يطهران سطحياً بأحد المطهرات المناسبة ، ويغسلان جيداً بماء مقطر معقم . يُزال بعد ذلك كل من الميسم والقلم وجدار المبيض .

تستخدم المشيمة الكاملة التى تحمل البويضات فى حالات التلقيح المشيمي *Placental Pollination* . وقد تقطع المشيمة إلى أجزاء ، يحمل كل منها عدداً من البويضات ، كما قد تزال المشيمة كلية فى حالات تلقيح البويضات *Ovular Pollination* . أما فى حالات التلقيح الميسمي *Stigmatic Pollination* .. فإن متاع الزهرة يبقى بأكمله ، ويعقم سطحه الخارجى جيداً ، على ألا يلامس المطهر سطح الميسم . وربما لا يحتاج متاع الزهرة إلى التعقيم إن كان مغلفاً بصورة جيدة ، كما فى الذرة .

وتجمع متوك غير متفتحة من الآباء ، وتحفظ فى طبق بترى معقم إلى أن تتفتح ؛ حيث تنتقل حبوب اللقاح بحرص ، وتوضع على البويضات المزروعة ، أو على مشيمتها ، أو على مياسم المبايض المزروعة حسب الحالة .

هذا .. ويكون الهدف النهائى من هذه المزارع هو الحصول على بنور مكتملة التكوين

من مزارع البويضات ، سواء أكانت البويضات بمشيمة ، أم كانت دون مشيمة ، والحصول على ثمار -كاملة ناضجة تحتوي على بذور مكتملة التكوين من مزارع المبيض . وقد أمكن إنتاج بذور عدد من الهجن النوعية بواسطة مزارع البويضات بنوعيتها ، كما أمكن الحصول على ثمار ناضجة في البيئات الصناعية من مزارع المبيض لعدد من المحاصيل الزراعية ، منها : الشليك ، والطماطم ، والدخان ، والفاصوليا ، والجرجن ، إلا أن الثمار كانت أصغر من نظيرتها التي تتكون طبيعياً على النبات .

تعد البيئة المناسبة للزراعة أهم العوامل التي تتحكم في نجاح مزارع البويضات والمبيض .. علماً بأن البيئة يجب أن تناسب إنبات حبوب اللقاح ، إلى أن يتم الإخصاب ، ثم تطور البويضات المخصبة إلى بذور كاملة تحتوي على أجنة مكتملة التكوين . هذا .. ولايعد إنبات حبوب اللقاح في البيئات الصناعية مشكلة ؛ لأنها تثبت بسهولة ، كما يكون إنبات حبوب اللقاح طبيعياً على الميسم وداخل القلم - بعيداً عن بيئة الزراعة - في مزارع المبيض . أما نمو البذور .. فإن له متطلبات خاصة ؛ ويبين جدول (١٧-١) تركيب واحدة من أكثر البيئات استعمالاً في مزارع البويضات الملقحة وهي بيئة تنشئ المحورة . ولزيد من التفاصيل عن مزارع البويضات والمبيض .. يراجع (١٩٨٠) Zenkteler .

جدول (١٧ - ١٠) : تركيب واحدة من أكثر البيئات استعمالاً في مزارع البويضات الملقحة .

المكونات	الكميات (مجم / لتر)
CaNO ₃ · 4 H ₂ O	500
KNO ₃	125
KH ₂ PO ₄	125
MgSO ₄ · 7 H ₂ O	125
CuSO ₄ · 5 H ₂ O	0.025
Na ₂ MoO ₄	0.025
ZnSO ₄ · 7 H ₂ O	0.5
MnSO ₄ · 4 H ₂ O	3.0
H ₃ BO ₃	0.5
FeC ₆ O ₅ H ₇ · 5 H ₂ O	10.00
Glycine	7.5
Ca-Pantothenate	0.25
Pyridoxine-HCl	0.25
Thiamine-HCl	0.25
Niacin	1.25
Sucrose	50 000
Agar	7000

مزارع الأجنة

استخدمت مزارع الأجنة Embryo Cultures من قبل مربى النباتات منذ أكثر من نصف قرن . وتقيد هذه المزارع في التغلب على المشاكل اللاحقة للإخصاب في التلقيحات البعيدة . وتعد عملية فصل الأجنة الصغيرة ، وتحديد بيئة الزراعة المناسبة أهم عاملين يتحكمان في نجاح مزارع الأجنة . كما يجب فصل الأجنة قبل أن تبدأ في التدهور degeneration والاختفاء في حالات الهجن النوعية البعيدة التي يحدث فيها عدم توافق بين الجنين النامي والإندوسبرم . وتتحدد المراحل المناسبة لفصل الأجنة بعدد الأيام من التلقيح . أما البيئة المناسبة .. فهي تختلف من نوع إلى آخر . ويبين جدول (١٧-١١) أربع بيئات ، استخدمت في زراعة أجنة الشعير ، وهي تحتوى - بالإضافة إلى ما هو مبين في الجدول - على المكونات التالية :

- ١- البيئة II - B : تحتوى على ١ جم حامض ماليك مذاب في ٥٠ مل ماء ، مع تعديل الـ pH إلى ٥,٠ باستعمال أيروكسيد الأمونيوم .
- ٢- البيئة 17 - C : تحتوى على ٥٠٠ مجم حامض ستريك مذاب في ٥٠ مل ماء مع تعديل الـ pH إلى ٥,٣ باستعمال أيروكسيد الأمونيوم ؛ و ٣٠٠ مجم من سترات ثلاثي البوتاسيوم تضاف إلى البيئة مباشرة ، مع تعديل pH البيئة إلى ٥,٥ ؛ باستعمال أيروكسيد البوتاسيوم المعقم بالترشيح .
- ٣- البيئة 21 - C : تحتوى على ٥٠ مجم حامض ستريك مذابة في ٥٠ مل ماء ، مع تعديل الـ pH إلى ٥ باستعمال أيروكسيد الأمونيوم ، وإضافتها إلى البيئة النهائية ، مع تعديل الـ pH فيها إلى ٥,٥ ؛ باستعمال أيروكسيد البوتاسيوم المعقم بالترشيح ؛ و ٢٥٠ مجم سترات ثلاثي البوتاسيوم ، تضاف إلى البيئة النهائية مع تعديل الـ pH إلى ٥,٥ .
- ٤- البيئة 45 - C : تحتوى على ٣٠٠ مجم حامض ماليك مذابة في ٥٠ مل ماء يحتوى على ٣٠٠ مجم حامض ستريك مع تعديل الـ pH إلى ٥,٠ باستعمال أيروكسيد الأمونيوم .

ونظراً لأن الأجنة تكون محاطة بأنسجة المبيض ؛ لذا .. فإنها لا تكون معرضة للتلوث ، ولا تحتاج إلى تعقيم ويكتفى بتطهيرها سطحياً . ويحتاج فصل الأجنة الصغيرة إلى

جدول (١٧ - ١١) : تركيب بعض البيئات المستخدمة في مزارع أجنة الشعير .

المكونات	البيئات (مجم / لتر)			
	B-II	C-17	C-21	C-45
عناصر كبرى				
KNO ₃	—	300	300	900
CaCl ₂ · 2 H ₂ O	740	250	—	400
MgSO ₄ · 7 H ₂ O	740	325	300	300
(NH ₄) ₂ SO ₄	—	—	—	60
NaH ₂ PO ₄ · H ₂ O	—	100	—	75
KCl	750	150	300	—
KH ₂ PO ₄	910	150	500	170
Ca(NO ₃) ₂	—	—	500	300
NH ₄ NO ₃	—	200	—	500
عناصر صفري				
KI	—	0.10	—	—
H ₃ BO ₃	0.5	0.5	15.0	1.0
MnSO ₄ · 4 H ₂ O	3.0	0.5	—	5.0
ZnSO ₄ · 7 H ₂ O	0.5	0.25	—	5.0
Na ₂ MoO ₄ · 2 H ₂ O	0.025	0.012	—	0.25
CuSO ₄ · 5 H ₂ O	0.025	0.012	—	0.012
CoCl ₂ · 6 H ₂ O	0.025	0.012	—	0.012
Ferric citrate	10	3	20	20
Fe-EDTA	—	17.5	10	28
فيتامينات				
Nicotinamide	—	—	—	1.0
Thiamine HCl	0.25	0.25	10	10
Pyridoxine HCl	0.25	0.25	—	1.0
Inositol	50	50	150	100
Ca-pantothenate	0.25	0.25	—	—
Glycine	—	0.75	—	—
Ascorbic acid	—	0.5	—	1.0
أحماض أمينية				
Glutamine	400	—	—	600
Glutamic acid	—	150	300	—
Alanine	50	30	—	100
Cysteine	20	—	—	—
Arginine	10	20	50	—
Leucine	10	10	—	—
Phenylalanine	10	20	—	—
Tyrosine	10	—	—	—
Aspartic acid	—	30	100	100
Proline	—	50	50	—
Valine	—	10	—	—
Serine	—	25	25	50
Threonine	—	10	—	100
Lysine	—	10	—	—
Sucrose	34 000	60 000	45 000	45 000
Agar (Difco)	6000	—	—	—
pH	5	5.5	5.5	5.8

الاستعانة بالمجهر . ويكتمل نمو الأجنة بعد زراعتها ، ثم تنمو معطية نباتات صغيرة ، يتم نقلها بعناية إلى أصص معقمة . وجدير بالذكر أن الأجنة الصغيرة لاتكمل تكوينها ، وإنما تنمو إلى كالس فى بعض الحالات ، ثم تتميز فيه بعد ذلك نباتات صغيرة . يحدث ذلك - على سبيل المثال - فى الذرة إذا زرعت الأجنة بعد حوالى ١٨ يوما من التلقيح .

وقد تمكن Harberd (١٩٦٩) من زراعة أجنة بعض الهجن النوعية فى الجنس *Brassica* بطريقة سهلة ، إذ قام بحصاد مبايض الأزهار الملقحة فى الوقت المناسب ، وعقمها سطحياً ، وقطعها طويلاً ، ثم نقلها إلى بيئة مغذية على جهاز هزاز . أدت الحركة الدائمة للبيئة المغذية إلى خروج عدد من الأجنة من المبايض ؛ حيث نمت فى البيئة المغذية بدرجة مماثلة لما يحدث عند اتباع الطرق الأخرى الأكثر صعوبة .

وأمكن كذلك زراعة أجنة الهجين النوعى *Lycopersicon esculentum* × *L. peruvianum* قبل اكتمال تكوينها بزراعة البنور غير المكتملة التكوين المحتوية على هذه الأجنة فى بيئة خاصة . أنتجت البنور نسيج كالس ، تميزت فيه نباتات كانت ثنائية أو رباعية المجموعة الكروموسومية ؛ مما يدل على أنها لم تنشأ من نسيج الإندوسبرم الثلاثى . كما استدل على أن هذه النباتات كانت هجنا نوعية من صفات النوع *L. peruvianum* الذى استخدم كمصدر لحبوب اللقاح ، التى ظهرت فى الهجن ؛ مثل : وجود صبغة الأنثوسيانين (حيث استخدمت سلالة من الطماطم خالية من الأنثوسيانين كأم فى التهجين) ، وشكل الأوراق ، والأزهار ، والثمار ، بالإضافة إلى عقم النباتات الهجين (Thomas & Pratt ١٩٨٢) . ولمزيد من التفاصيل عن مزارع الأجنة .. يراجع Raghavan (١٩٨٠) .

مزارع البروتوبلازم

تعد مزارع البروتوبلازم Protoplast Culture (مزارع الخلايا بدون جدرانها السيلولوزية) ضرورية لكل من عملية دمج البروتوبلازم Protoplasm fusion - عند الرغبة فى إجراء تهجينات نوعية بعيدة - وعملية إدخال أجزاء غريبة من الحامض النووى دى إن أى DNA ، أو عضيات خلوية Cell Organells أو بكتيريا ، أو فيروسات معينة فى حالات

الهندسة الوراثية . ومن الضروري - لتحقيق ذلك - عزل البروتوبلازم عن الجدار الخلوى ، وزراعته فى بيئة تسمح بتكاثره ، ثم بتميز نباتات كاملة منه .

يفصل الجدار الخلوى السيليلوزى عن البروتوبلازم بسهولة ؛ بواسطة إنزيم السيلوليز Cellulase الذى يحضر من مزارع الفطر *Myrothecium verrucaria* . وقد ظهرت منذ عام ١٩٦٨ تحضيرات تجارية من إنزيمى ماسيروزيم *macerozyme* ، وسيلوليز ، واستخدمت بتعريض قطع من النسيج النباتى للإنزيم الأول - ماسيروزيم - لفصل الخلايا عن بعضها ، ثم إضافة الإنزيم الثانى - سيلوليز - لهضم الجدر الخلوية ، ولكن تفضل إضافتهما معاً فى أن واحد .

وقد ظهرت بعد ذلك عدة تحضيرات تجارية أخرى من الإنزيمات التى تستخدم فى مزارع البروتوبلازم (جدول ١٧-١٢) . وأمكن بواسطة هذه الإنزيمات فصل البروتوبلازم عن الجدار الخلوى فى أية خلية نباتية لم تتلجن جدرها ، أياً كان النسيج الذى أخذت منه . ويعد إنزيم بكتيناز *Pectinase* ضرورياً لتحليل الصفيحة الوسطى وفصل الخلايا عن بعضها .

تعد الأوراق حديثة التكوين أفضل مصادر الخلايا لمزارع البروتوبلازم . يُطهر النسيج النباتى المستعمل سطحياً ، ثم تسلخ بشرة الورقة ، أو يقطع الجزء النباتى المستخدم إلى أجزاء صغيرة ، قبل وضعه فى محلول الإنزيمات الهاضمة للجدر الخلوية . وتفضل أن تكون المعاملة بالإنزيمات الهاضمة تحت تفريغ ، لإسراع عملية تخلل محلول الإنزيمات بين الخلايا . كما يفيد -أيضاً- تحريك الأنسجة المعاملة بوضعها فى جهاز هزاز فى أثناء المعاملة . وتتراوح فترة المعاملة بالإنزيمات من نصف ساعة إلى ٢٠ ساعة .

تتشابه بيئات مزارع البروتوبلازم مع بيئات مزارع الخلايا إلى حد كبير ، وتفضل البيئات السائلة ، مع مراعاة الدقة فى ضبط الضغط الأسموزى للبيئة . يبدأ تمثيل الجدر الخلوية حول البروتوبلازم بمجرد فصل الإنزيمات عنه . ويظهر أول الدلائل على تكوين الجدر السيليلوزية بعد نحو ٢ - ٤ أيام من زراعة البروتوبلازم ، بينما تبدأ معظم الانقسامات الخلوية بعد ٧ - ١٤ يوماً من الزراعة ، ويؤدى ذلك إلى تكوين نسيج كالس . ويبين جدول (١٧-١٢) تركيب إحدى البيئات المستخدمة فى مزارع البروتوبلازم .

جدول (١٧ - ١٢) : بعض الإنزيمات المتوفرة تجارياً ، والتي تستخدم في عزل البروتوبلازم .

الإنزيم	الكائن المنتج للإنزيم	الشركة المنتجة
Cellulase R-10	<i>Trichoderma viride</i>	Kinki Yokult Mfg. Co. Ltd., 8-12, Shingikancho, Nishinomiya, Japan
Meicelase-P	<i>Trichoderma viride</i>	Meiji Seiki Kaisha Ltd., No. 8, 2-Chome, Kyobashi, Chuo-Ku, Japan
Hemicellulase H-2125	<i>Rhizopus sp.</i>	Sigma, München
Macerozyme R-10	<i>Rhizopus sp.</i>	Kinki Yokult Mfg. Co. Ltd.
Pectinase (purified)	<i>Aspergillus niger</i>	Sigma Chem. Co., P.O. Box 14508, St. Louis, MO 63178, U.S.A.
Pectolyase Y23	<i>Aspergillus japonicus</i>	Seishin Pharm. Co. Ltd. 9-500-1, Nagareyama, Nagareyama-shi, Chiba-ken, Japan
Pectinol	<i>Aspergillus sp.</i>	Rohm and Haas Co. Independence Hall West, Philadelphia, PA 19105, U.S.A.
Zymolyase	<i>Arthrobacter luteus</i>	Sigma Chem. Co.
Driselase	<i>Irpex lactes</i>	Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd., Tokyo, Japan

وعلى الرغم من كثرة وتنوع الأنواع النباتية التي أعطت نمو كالس في مزارع البروتوبلازم .. إلا أن معظم الأنواع التي حدث فيها تميز (أي نمت فيها النباتات من مزارع البروتوبلازم) كانت من العائلة الباذنجانية . وتشمل القائمة التي تميزت فيها نباتات من مزارع البروتوبلازم : الفلفل ، والبطاطس ، والباذنجان ، والدخان ، والبيتونيا ، وأنواع أخرى قليلة من العائلات المركبة ، والصليبية ، والنجيلية ، والزنبقية ، والبقولية وغيرها .

ولزيد من التفاصيل عن مزارع البروتوبلازم .. يراجع Vasil (١٩٧٦) ، و Hanke (١٩٨٠) ، و Vasil & Vasil (١٩٨٠) و Power & Chapman (١٩٨٥) .

جنول (١٧ - ١٢) : بيئة لزراعة البروتوبلازم .

المكونات	الكمية (مجم / لتر)	المكونات	الكمية (مجم / لتر)
Mineral salt			
NH ₄ NO ₃	600	KI	0.75
KNO ₃	1900	H ₃ BO ₃	3.00
CaCl ₂ · 2 H ₂ O	600	MnSO ₄ · H ₂ O	10.00
MgSO ₄ · 7 H ₂ O	300	ZnSO ₄ · 7 H ₂ O	2.00
KH ₂ PO ₄	170	Na ₂ MoO ₄ · 2 H ₂ O	0.25
KCl	300	CuSO ₄ · 5 H ₂ O	0.025
Sequestrene 330 Fe ^c	25	CoCl ₂ · 6 H ₂ O	0.025
Sugars			
Glucose	68 400	Mannose	125
Sucrose	125	Rhamnose	125
Fructose	125	Cellobiose	125
Ribose	125	Sorbitol	125
Xylose	125	Mannitol	125
Organic acids (adjusted to pH 5.5 with NH ₄ OH)			
Sodium pyruvate	5	Malic acid	10
Citric acid	10	Fumaric acid	10
Vitamins			
Inositol	100	Biotin	0.005
Nicotinamide	1	Choline chloride	0.5
Pyridoxine-HCl	1	Riboflavin	0.1
Thiamine-HCl	10	Ascorbic acid	1
D-Calcium pantothenate	0.5	Vitamin A	0.005
Folic acid	0.2	Vitamin D ₃	0.005
p-Aminobenzoic acid	0.01	Vitamin B ₁₂	0.01
Hormones	Soybean × barley	Soybean × pea or <i>N. glauca</i>	
2,4-D	1		0.2
Zeatin	0.1		0.5
NAA	—		1
Vitamin-free casamino acid ^d	125 mg l ⁻¹		
Coconut water	10 ml l ⁻¹		
(from mature fruits; heated to 60°C for 30 min and filtered)			

مزارع القمة الخضرية الميرستيمية

يستفاد من مزارع القمة الخضرية الميرستيمية Meristem Shoot Tip Culture فى إنتاج نباتات خالية من الإصابات الفيروسية ، ويعد ذلك أمراً بالغ الأهمية فى المحاصيل التى تتكاثر خضرياً ، والتى تنتقل فيها الفيروسات تلقائياً مع الأجزاء الخضرية المستخدمة فى التكاثر .

وبرغم أن النباتات قد تكون مصابة جهازياً بالفيروسات .. إلا أن القمة النامية تكون غالباً خالية تماماً من الفيروسات ، أو لاتحتوى إلا على قليل جداً منها ؛ ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتية :

١- خلو القمة الميرستيمية من الأنسجة الوعائية التى يكون انتقال الفيروسات فيها سريعاً ، بينما يكون انتقالها خلال الروابط البروتوبلازمية أبطأ من سرعة نمو القمة النامية .


٢- يكون النشاط الأيضى فى الخلايا الميرستيمية عالياً بدرجة يقل معها تكاثر الفيروس فيها .

٣- تكون نظم المقاومة لتكاثر الفيروسات أعلى فى الأنسجة الميرستيمية مما فى أى نسيج آخر .

٤- قد يثبط التركيز العالى للأوكسين الطبيعى فى القمة النامية نشاط الفيروسات فيها .

ولهذه الأسباب كلها .. فإن فصل القمة الميرستيمية وزراعتها فى بيئة صناعية يؤدى إلى إنتاج نباتات خالية من الإصابات الفيروسية . وقد استخدمت هذه التقنية تجارياً ، لإنتاج نباتات خالية من الفيروس من عديد من الأنواع النباتية ؛ مثل : الشليك ، البطاطس ، البطاطا ، والروبارب ، والكاسافا ، والكرسون المائى ، واليام ، وقصب السكر ، والتفاح ، والموز ، وعديد من نباتات الزينة التى تتكاثر خضرياً .

ويفضل استعمال مصطلح مزارع القمة الميرستيمية Meristem - Tip Culture فى حالة استعمال القمة الميرستيمية فى الزراعة (شكل ١٧-٦) ، وهى التى يكون عرضها - عادة - حوالى ١٠٠ ميكرون ، وطولها حوالى ٢٥٠ ميكرون . وبرغم أن هذا الجزء ينتج



شكل (١٧ - ٦) : القمة الميرستيمية كما تبدو بعد ١٢ ساعة من زراعتها .

- غالباً - نباتات خالية من الفيرس .. إلا أنه قد يصعب فصله ؛ لذا .. تستعمل - أحياناً -
القمة النامية كلها ، وهى التى يكون عرضها - عادة ١٠٠ ميكرون ، وطولها ٥٠٠ ميكرون .
ويطلق على المزارع فى هذه الحالة اسم Shoot - Tip Culture ، وهى تنتج كذلك نباتات
خالية من الفيرس فى أغلب الأحيان (شكل ١٧-٧) . تفصل القمم النامية تحت المجهر .
ويعتبر فصل القمة النامية سريعاً - دون إحداث أضرار بها - من أهم مقومات نجاح
مزارع القمة الميرستيمية . هذا .. بالإضافة إلى أهمية بيئة الزراعة التى يجب أن تكون
محفزة لتكوين الجذور والأوراق من القمم الميرستيمية المزروعة . ويبين جدول (١٧-١٤)
تركيب عدد من البيئات التى استخدمت فى مزارع القمة الميرستيمية . وبرغم سهولة
الزراعة فى بيئة شبه صلبة تحتوى على الأجار .. إلا أنها تحفز تكوين الكالس فقط ، وهو
أمر غير مرغوب فيه فى هذه المزارع .


وتزداد فرصة تميز النباتات فى المزرعة كلما ازداد حجم القمة الميرستيمية المزروعة ؛ ذلك لأن القمم الصغيرة تنتهى غالباً بتكوين جنور وكالس ، وربما لاتعطى جنوراً ألبتة إن كانت صغيرة جداً ، فى حين أن القمم الخضرية الكبيرة ربما تكون خالية من الفيرس ؛ لذا .. فإن القاعدة هى أن تكون القمم الميرستيمية المزروعة صغيرة بالقدر الذى يضمن خلوها من الفيرس ، وكبيرة بالقدر الذى يسمح بتمييزها إلى نباتات مكتملة النمو .

وقد وجد أن النباتات المصابة جهازياً بالفيروسات تعطى عند زراعة أى من أنسجتها المصابة خلايا كالس ، تختلف فى محتواها من الفيرس ، وأمكن الحصول على نباتات خالية من الفيرس من خلايا الكالس السليمة فى هذه المزارع . كذلك .. وجد أن نسبة النباتات الخالية من الفيرس كانت أعلى بكثير من النباتات التى تميزت من الكالس فى مزارع القمة الميرستيمية عما فى النباتات التى تميزت من القمة الميرستيمية مباشرة . وربما يرجع السبب فى ذلك إلى أن سرعة تكاثر الفيرس تكون أقل من سرعة تكاثر الخلايا فى نسيج الكالس . هذا .. إلا أن كثيراً من الأنواع النباتية الهامة لم تتميز فيها نباتات من نسيج الكالس ، كما أن هذا النسيج لا يكون ثابتاً وراثياً .

ولمزيد من التفاصيل عن مزارع القمة الميرستيمية .. يراجع Langhans وآخرون (١٩٧٧) ، و Ingram (١٩٨٠) .

مزارع الإكثار الدقيق

يستفاد من مزارع الإكثار فى إنتاج سلالات خضرية تحتوى على عشرات الآلاف من النباتات الصغيرة خلال فترة وجيزة . ويفضل دائماً استخدام القمة الميرستيمية ؛ لكى تكون النباتات المنتخبة خالية من الفيروسات . أما إن لم يكن ذلك ضرورياً .. فإنه يمكن استعمال أجزاء صغيرة من ساق النبات ، تحتوى كل منها على عقدة وبرعم جانبي (nodal segments) ؛ ذلك لأن البراعم الجانبية المفصولة بمفردها من الأشجار البالغة لاتنمو فى معظم الحالات ، بينما يساعد النسيج الأمى الموجود مع البرعم الإبطى فى هذه العقل (nodal cuttings) على نمو البرعم . وتحمل البراعم الجانبية عمليات التعقيم أفضل من البراعم الطرفية . ويمكن استعمال أى جزء نباتى آخر فى التكاثر الدقيق إذا أمكن دفعه لتكوين بواعم عرضية ، سواء تكونت من خلال نسيج الكالس ، أم بدونه .



شكل (١٧ - ٧) : زراعة القمة النامية Shoot Tip Culture في القرنفل .

وتستخدم لهذا الغرض أجزاء من الجذور ، والسيقان ، والأوراق .. ويتوقف الاختيار على قدرة العضو النباتي على تكوين براعم عرضية .

يحدث التكاثر الدقيق في المزارع بوحدة من ثلاث طرق ، وهي :

١- من خلال الكالس :

إن القدرة الفائقة للخلايا النباتية على التكاثر في المزارع وإنتاج نسيج كالس .. تعطى فرصة كبيرة لإنتاج أعداد كبيرة من النباتات من هذه الخلايا لدى حدوث التمييز النباتي بها . ويحدث التمييز إما بتكوين الجذور والنموات الخضرية مباشرة ، وإما من خلال تكون الأجنة الجسمية ، ويعد الإكثار من خلال نسيج الكالس أسرع طرق الإكثار الدقيق ، إلا أن

جدول (١٧-١٤) : تركيب بعض البينات التي استخدمت ، من قبل باحثين مختلفين في مزارع القمح

الخصرية البرستينية ، لانواع مختلفة من النباتات .

الكومات	البيات (مجم / لتر)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
NH ₄ NO ₃	—	125	125	200	125	60	60	—
KNO ₃	125	—	125	—	1000	—	—	125
(NH ₄) ₂ SO ₄	—	—	—	—	1000	80	80	—
KCl	—	500	500	—	—	—	—	—
CaCl ₂ ·2H ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—
Ca(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	500	—	—	800	500	170	170	500
MgSO ₄ ·7H ₂ O	125	125	125	200	125	240	240	125
KH ₂ PO ₄	125	125	125	200	125	40	40	125
FeCl ₃ ·6H ₂ O	—	—	—	—	1	—	—	—
Fe-citrate	—	—	—	—	5	5	—	—
Fe(SO ₄) ₃	—	25	—	—	—	—	27.8	25
Na ₂ -EDTA	—	—	—	—	—	—	37.3	—
MnSO ₄ ·4H ₂ O	—	0.8	—	—	0.1	—	22.3	1
ZnSO ₄ ·H ₂ O	—	0.04	—	0.2	1	0.05	8.6	0.05
NiCl ₂ ·6H ₂ O	—	0.025	—	0.3	—	—	—	0.025
MnCl ₂ ·H ₂ O	—	—	—	1.8	—	0.4	—	—
CoCl ₂ ·6H ₂ O	—	—	—	—	—	—	0.025	0.025
CuSO ₄ ·5H ₂ O	—	—	—	0.08	0.03	0.05	0.025	0.025
AlCl ₃	—	—	—	—	0.03	—	—	—
H ₂ MoO ₄ ·H ₂ O	—	—	—	0.02	—	0.02	—	—
Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	—	—	—	—	—	—	0.025	—
KI	—	0.25	—	—	0.01	—	0.83	0.25
H ₂ BO ₃	—	0.025	—	2.8	1	0.6	6.2	0.025
Myo-inositol	0.1	0.001	0.1	—	100	0.1	0.1	—
Ca-pantothenate	10	—	10	—	1	10	10	—
Nicotinic acid	1	—	1	5	1	1	1	—
Pyridoxine-HCl	1	—	1	1	1	1	1	—
Thiamine-HCl	—	0.001	—	1	1	1	1	1
Biotin	0.1	0.001	0.01	—	0.01	0.01	0.01	—
Cytsein	—	0.001	10	—	1	10	10	—
Adenine	—	—	—	—	0.1	5	5	—
AdSO ₄	—	—	—	—	—	—	—	8
Casein hydrolysate	—	—	1	—	—	1	1	—
Sucrose	20 000	—	20 000	30 000	20 000	—	—	—
Glucose	—	40 000	—	—	—	10 000	30 000	40 000

هذه الطريقة غير مفضلة ؛ لما هو معروف عن الكالس من عدم ثباته الوراثى ؛ حيث تظهر به حالات مختلفة من التضاعف الكروموسومى ، كما أن الكالس لم يتميز به نموات نباتية فى عديد من المحاصيل الهامة إلى الآن ؛ وتعد هذه الطريقة هى الوحيدة المستخدمة لإكثار أنواع مهمة مثل الموالح ، والنخيل ، والقهوة .

٢- من خلال تكوين البراعم العرضية :

على الرغم من أن النباتات التى تتميز من أنسجة الكالس تعد عرضية المنشأ .. إلا أنه يعنى بالبراعم العرضية .. تلك التى تتكون من العضو النباتى مباشرة ، دون أن يفصل بينهما نسيج كالس . وتتكاثر أعداد كبيرة جداً من النباتات الاقتصادية بهذه الطريقة .

٣- من خلال تحفيز التفرع الجانبى :

يتم تحفيز النمو الجانبى فى المزارع بتوفير السيتوكينين بها بتركيز معين ، إما مع الأوكسين ، وإما بدون . ويؤدى استمرار توفر السيتوكينين فى المزرعة إلى نمو البراعم الجانبية التى تتكون فى القمة الميرستيمية التى تنمو من البراعم المزروعة (أى من ال nodal segments) ، ثم تنمو البراعم الجانبية التى تتكون فى القمم الميرستيمية الجديدة .. وهكذا يؤدى استمرار هذه العملية - لعدة مرات - إلى تكون كتلة من النموات الجديدة . ورغم توقف تكاثر المزرعة الواحدة بهذه الطريقة بعد فترة .. إلا أنه يمكن استمرار التكاثر - فى هذه المرحلة - بنقل أجزاء من المزرعة إلى مزارع أخرى جديدة ؛ وبذلك .. يمكن استمرار التكاثر إلى ما لانهاية ، إلى درجة أنه يمكن - على سبيل المثال - إنتاج من ١٥-٢٥ مليون نبات شليك من نبات واحد فى العام ؛ لأن كل نبات يكون قادراً على إنتاج ١٠ نباتات جديدة كل أسبوعين .

تعد عملية التجذير ضرورية فى الحالات التى لا تنمو فيها النباتات من الأجنة الجسمية ، بينما توجد الجنور- طبيعياً - فى حالة التمييز من الجنين الجسمى الذى يحتوى - بطبيعته - على جذير . ولإحداث التجذير .. يلزم نقل النموات المتكونة إلى بيئة أخرى ، تختلف فى مكوناتها الهرمونية عن بيئة التكاثر . ويكون نقل النموات الخضرية - عادة - إلى هذه البيئات وهى بطول حولى ١ سم ، ثم تنقل النباتات بعد أن تتكون جنورها إلى أصص معقمة بحرص تام ، وتتعهد بالرعاية إلى أن تكبر ؛

حيث تنقل بعد ذلك إلى البيوت المحمية .

ويبين جدول (١٧-١٥) ، و (١٦-١٧) تركيب بيانات الإكثار الدقيق لكل من نخيل التمر ، والشليك على التوالي -كمثاليين- علما بأن البيئات المناسبة تختلف كثيراً من نبات إلى آخر .

ولزيد من التفاصيل عن أساسيات مزارع الإكثار الدقيق .. يراجع Hussey (١٩٨٠) ، (١٩٨٣) ، و Wetherell (١٩٨٢) ، و Hartmann & Kester (١٩٨٣) .

جدول (١٧ - ١٥) : بيانات الإكثار الدقيق لنخيل التمر .

المكونات	البيئة (مجم / لتر)	
	من خلال الكالس	من خلال الأجنة الجسمية
مركبات غير عضوية		
NH_4NO_3	1650	1650
KNO_3	1900	1900
$CaCl_2$	322	322
$MgSO_4 \cdot 7 H_2O$	181	181
KH_2PO_4	170	170
$NaH_2PO_4 \cdot 2 H_2O$	170	170
KI	0.83	0.83
H_3BO_3	6.2	6.2
$MnSO_4 \cdot H_2O$	16.9	16.9
$ZnSO_4 \cdot H_2O$	8.6	8.6
$Na_2MoO_4 \cdot 2 H_2O$	0.25	0.25
$CuSO_4$	0.016	0.016
$CoCl_2 \cdot 6 H_2O$	0.025	0.025
FeNa · EDTA	36.7	36.7
مركبات عضوية		
Inositol	100	100
Thiamine HCl	0.4	0.4
منظمات نمو		
2,4-D	100	—
2-ip	3	—
فحم مُنَشَّط		
neutralized charcoal	3000	3000
أجار	0.8%	0.8%
سكروز	3%	3%

جدول (١٧ - ١٦) : بيانات الإكثار الدقيق للشليك .

المكونات	البيئات (مجم / لتر)		
	التهيئة	التكاثر	التجدير
مركبات غير عضوية			
KNO ₃	250	250	250
MgSO ₄ ·7 H ₂ O	250	250	250
KH ₂ PO ₄	250	250	250
Ca(NO ₃) ₂ ·4 H ₂ O	1000	1000	1000
KI	0.83	0.83	0.83
H ₃ BO ₃	6.2	6.2	6.2
MnSO ₄ ·4 H ₂ O	16.9	16.9	16.9
ZnSO ₄ ·7 H ₂ O	8.6	8.6	8.6
Na ₂ MoO ₄ ·2 H ₂ O	0.25	0.25	0.25
CuSO ₄ ·5 H ₂ O	0.025	0.025	0.025
CoCl ₂ ·6 H ₂ O	0.025	0.025	0.025
FeSO ₄ ·7 H ₂ O	27.8	27.8	27.8
Na ₂ ·EDTA	37.3	37.3	37.3
مركبات عضوية			
Inositol	100	100	100
Nicotinic acid	0.5	0.5	0.5
Pyridoxine HCl	0.5	0.5	0.5
Thiamine HCl	0.1	0.1	0.1
Glycine	2	2	2
منظمات نمو			
BAP	0.1	1	—
IBA	1	1	1
GA ₃	0.1	0.1	—
جلوكوز			
جلوكوز	4%	4%	4%
أجار	0.8%	0.8%	0.8%

مصادر إضافية

لمزيد من التفاصيل عن أساسيات مزارع الأنسجة .. يمكن الرجوع إلى المصادر التالية التي تتناول الموضوع بشكل عام : Paul (١٩٧٠) ، و Murashige (١٩٧٤) ، و Ingram & Butcher (١٩٧٦) ، و Amer . Soc . Hort . Sci (١٩٧٧) ، و Helgeson (١٩٨٠) ، و Sala وآخرون (١٩٨٠) ، و Vasil (١٩٨٠) ، و Thorpe (١٩٨١) ، و Reinert & Yeoman (١٩٨٢) ، و Bhojwani & Razdan (١٩٨٣) ، و Mamteli & Smith (١٩٨٣) ، و Dixon (١٩٨٥ أ ، ١٩٨٥ ب) .

الفصل الثامن عشر

أوجه الاستفادة من مزارع الأنسجة فى تربية النبات

أصبحت مزارع الأنسجة بأنواعها المختلفة (الخلايا والأنسجة ، والأعضاء) من الأدوات المهمة التى يستفيد منها مربي النبات فى تحقيق أهداف برامج التربية . وقد درج المربي على الاعتماد على كثير من العلوم : مثل الوراثة ، وفسولوجيا النباتات ، وأمراض النبات ... إلخ (يراجع لذلك الفصل الأول) ، ويعد علما زراعة الأنسجة ، والهندسة الوراثية أحدث علمين فى هذه السلسلة من العلوم ، التى تعتمد عليها تربية النبات . ويعد هذا الفصل مكملاً للفصل السابق من حيث كونه يتناول الجوانب التطبيقية لمختلف أنواع المزارع التى جاء ذكرها من قبل .

مزارع الأنسجة كمصدر للاختلافات الوراثية

نتناول تحت هذا العنوان الاختلافات الوراثية بمفهومها الواسع ، الذى يتضمن الطفرات العاملة ، والتحورات الكروموسومية ، وحالات التعدد الكروموسومى التام وغير التام ، التى قد تنشأ بصورة طبيعية أو بعد تعريض المزارع للعوامل المطفرة .

١- الطفرات العاملة والتحورات الكروموسومية :

تتميز مزارع الخلايا بأن كل خلية فيها يكون لها القدرة على أن تصبح فرداً جديداً ،

ويعنى ذلك وجود احتمالات كبيرة للغاية ؛ لظهور الطفرات فى النباتات التى تتميز من هذه المزارع نظراً للأعداد الهائلة من الخلايا التى توجد بها ، فعلى سبيل المثال يحتوى كل ١٠٠ مل من مزرعة معلق خلايا الدخان على أكثر من 1×10^6 خلية . ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من تطوير طريقة مناسبة لتقييم هذه الخلايا للصفة أو الصفات المرغوب فيها ، بحيث لاتبقى فى المزرعة سوى الخلايا المحتوية على الطفرات المرغوبة ثم توفير الظروف التى تساعد على تميز الأجنة من هذه الخلايا المطفرة .

تحدث التغيرات الوراثية - تلقائياً - فى جميع أنواع المزارع تقريباً ، وتعرف باسم Somaclonal Variation . وقد أمكن التعرف على اختلافات وراثية فى صفات المقاومة للأمراض ، وعدد الأيام إلى الإزهار ، والمحصول ، وحجم النبات ، وشكل الجزء الاقتصادى من النبات ... إلخ ، ولوحظت هذه التباينات فى مزارع محاصيل متنوعة ؛ مثل قصب السكر ، والبطاطس ، والدخان ، والأرز ، والذرة ، والشعير ، والبرسيم ، والجزر ، والأناناس ، والخس ، والثوم ، والصليبيات ، والقرنفل ... إلخ (عن Carlson وآخرين ١٩٨٤ ، و Daub ١٩٨٤) ولمزيد من التفاصيل عن الطفرات الوراثية التى تظهر طبيعياً فى مزارع الأنسجة .. يراجع Ledoux (١٩٧٥) ، و Maliga وآخرين (١٩٨٢) ، و Scowcroft (١٩٨٢) ، و Carlson وآخرين (١٩٨٤) ، و Duncan & Widholm (١٩٨٦) . أما بخصوص استخدامات مزارع الأنسجة فى مجال الدراسات الوراثية .. فيراجع Griesbach (١٩٨٤) .

وقد انتخبت سلالات طفرية كثيرة من مزارع الخلايا mutant cell lines سواء أكان ذلك بعد تعريض المزارع للعوامل المطفرة ، أم بدون ذلك التعريض . وكانت أبسط طرق الانتخاب وأكثرها شيوعاً هى الانتخاب المباشر بتعريض مزرعة الخلايا لمستويات عالية - إلى درجة السمية - من مركبات معينة ، بحيث لاتبقى فى المزرعة سوى الخلايا المقاومة لهذه المركبات ؛ لتتكاثر ، وتصبح سلالات طفرية جديدة . ويمكن التأكد من مستوى المقاومة فى هذه الطفرات بإعادة زراعة السلالات الطفرية فى مستويات أعلى من هذه المركبات . وقد أمكن - باتباع هذه الطريقة - انتخاب طفرات مقاومة لمشابهات الأحماض الأمينية ، ومضادات الحيوية ، ومبيدات الحشائش ، وسموم الفطريات ، والبكتيريا المرضية ، وكلوريد الصوديوم ... إلخ ، وكذلك سلالات أعلى فى القيمة الغذائية . ويعيب

هذه الطريقة عدم صلاحيتها للانتخاب لعدد من الصفات المحصولية المهمة .

وتجدر الإشارة إلى كثرة ظهور الطفرات فى مزارع الخلايا والكالس ، دون الحاجة إلى تعريضها للعوامل المطفرة . كما لم يمكن - فى بعض الحالات - زيادة معدل حدوث الطفرات بمعاملة مزارع الأنسجة بالعوامل المطفرة . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Gonzales & Widholm (١٩٨٥) .

وبرغم أن مزارع البروتوبلازم تعد أكثر من مزارع الخلايا والكالس ثباتاً من الوجهة الوراثية .. إلا أنه تظهر بها أيضاً بعض التغيرات الوراثية التى تعطى عند إكثارها سلالات جديدة ، يطلق عليها اسم Protoclones . وقد انتج بهذه الطريقة سلالات جديدة من صنف البطاطس رست بريانك Russet Burbank تميزت باختلافات نوعية وكمية عن الصنف الأصيل . وتكمن المشكلة الحقيقية لمزارع البروتوبلازم فى قلة الأنواع النباتية ، التى أمكن تمييز نباتات كاملة منها (عن Sink ١٩٨٤) . ولمزارع البروتوبلازم أهميتها الكبيرة فى إحداث التباينات الوراثية بالنسبة للنباتات العقيمة التى تكثر خضرياً ، والنباتات ذات ثورات الحياة الطويلة جداً ؛ لأن التغيرات الوراثية التى تظهر فى هذه المزارع تكون طفيفة ؛ مما يسمح بالاستفادة منها فى تطوير المحصول بصورة تدريجية (Power & Chapman ١٩٨٥) . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Bright وآخرون (١٩٨٣) .

هذا .. ولمزارع حبوب اللقاح أهمية خاصة فى هذا الشأن ؛ ويرجع ذلك إلى أنها أحادية المجموعة الكروموسومية ، وهو ما يعنى ظهور الطفرات المتنحية بمجرد حدوثها ، ويلزم فى هذه الحالة تعريض حبوب اللقاح للعامل المطفّر ، ثم زراعتها لإنتاج النباتات الأحادية التى تقيّم بدورها لتمييز النباتات الحاملة للطفرات المرغوب فيها ، وهى التى تضاعف - بعد ذلك - بالكواشيسين ؛ لإكثارها والمحافظة عليها . وتزداد أهمية النباتات الأحادية عند وجود أكثر من طفرة متنحية فى النبات الواحد ؛ حيث تظهر جميعها فى أن واحد ، دونما حاجة إلى إجراء التلقيح الذاتى ، وزراعة أعداد كبيرة من نباتات الجيل الطفرى الثانى ؛ للتعرف على النباتات التى تحمل جميع الطفرات المتنحية بحالة أصيلة مثلما يتطلب الأمر فى النباتات الثنائية .

ومن المزايا الأخرى لمزارع حبوب اللقاح .. أن الطفرات المتكونة تظهر في جميع خلايا النبات الأحادي ، ولا تكون على صنورة كيميائية ، كما يحدث في النباتات الثنائية المجموعة الكروموسومية . ويمكن إنتاج الطفرات إما بتعريض المتوك للعوامل المطفرة قبل زراعتها ، وإما بإنتاج نباتات أحادية من مزارع متوك غير معاملة ، ثم تحضير مزارع خلايا أوبروتوبلازم منها ، ومعاملتها بالعوامل المطفرة ؛ لإحداث الطفرات المقاومة لمركبات كيميائية معينة ، أو التي تتحمل ظروفًا بيئية خاصة ، ثم إنتاج نباتات كاملة منها .

وقد تعددت محاولات استخدام مختلف أنواع المزارع من قبل مربى النبات لانتخاب سلالات مقاومة للآفات ، أو لظروف بيئية معينة ، وعلى سبيل المثال .. تمكن Bourgeois (١٩٨٧) من زيادة القدرة على تحمل الملوحة في مزارع صنف الطماطم St - Pierre بتكرار زراعتها أربع مرات في بيئات تحتوي على تركيزات متزايدة من كلوريد الصوديوم ، وصلت إلى ١٠٠ مللي مول ، واستخدم في هذه المزارع إما القمة الطرفية للسيقان ، وإما كالس حصل عليه من جنور وسيقان النباتات . ويذكر Stavarek & Rains (١٩٨٤) أنه أمكن انتخاب سلالات خلايا Cell Lines مقاومة للملوحة من مزارع الخلايا لعدة محاصيل زراعية ، منها الفلفل ، والبرتقال ، وقصب السكر ، والبن ، والأرز ، والقلقاس ، والبرسيم الحجازي ، والدخان . وتكمن المشكلة - في برامج التربية التي من هذا النوع - في صعوبة الحصول على نباتات كاملة من سلالات الخلايا المنتخبة لمقاومة الملوحة (أو غيرها من العوامل البيئية) ؛ ففي البرسيم الحجازي .. كانت المزرعة التي أجرى فيها الانتخاب قديمة ، وحدث فيها تغيرات وراثية في صفات كثيرة إلى درجة لم تسمح بنمو النباتات التي تميزت منها لاختبار مقاومتها للملوحة وإكثارها ، وفي الأرز .. كانت النباتات المقاومة للملوحة الناتجة من سلالات الخلايا عقيمة بدرجة عالية ، ولكن أمكن الحصول على نباتات من مزارع الدخان كانت قادرة على النمو في محلول مغذٍ يحتوي على ٢,٦٢ ٪ كلوريد صوديوم .

وفي مجال التربية لمقاومة التركيزات المرتفعة من عنصر الألومنيوم (حيث يصل العنصر لتركيزات عالية إلى درجة السمية في الأراضي الحامضية) .. أمكن انتخاب عدة سلالات خلايا Cell Lines من صنف الطماطم مارجلوب Marglobe عند زراعتها في بيئة مغذية ، تحتوي على ألومنيوم في صورة Al - EDTA بتركيز ٢٠٠ ميكرومول ، لكن لم

يمكن إنتاج نباتات من هذه المزرعة لأن الكالس كان مستناً . وأمكن فى دراسة أخرى انتخاب سلالات خلايا من الجزر مقاومة للتركيزات المرتفعة من الألومونيوم ، وهو على صورة كلوريد الألومونيوم ، وأمكن إنتاج نباتات كاملة منها . وقد لقحت هذه النباتات ذاتياً ، واختبرت بادراتها فى محلول مغذ ، يحتوى على تركيز مرتفع من كلوريد الألومونيوم ، ووجد أنها كانت على درجة عالية من المقاومة .

ولزيد من التفاصيل عن استخدامات مزارع الأنسجة فى التربية للظروف البيئية القاسية .. يراجع Dix (١٩٨٠) ، و Stavarek & Rains (١٩٨٤) .

وقد أمكن كذلك الاستفادة من مزارع الخلايا فى إنتاج سلالات دخان مقاومة لفيرس التبرقش . وقد تحقق ذلك بعدوى أوراق نبات دخان أحادى المجموعة الكروموسومية بشكل متجانس تماماً بإحدى سلالات الفيرس ، ثم تعريضها لأشعة جاما . وأخذت بعد ذلك أجزاء من نسيج هذه الأوراق ، وزرعت فى بيئة مغذية ، تحتوى على تركيز مرتفع من السيتوكينين ، وعرضت لإضاءة قوية . سمحت هذه الظروف بحدوث نمو غيرمتساو للخلايا المحتوية على الفيرس (القابلة للإصابة) والخالية منه (المقاومة التى حدثت بها الطفرات) بحيث أمكن التمييز بين الكالس الأصفر البطئ النمو (المصاب) ، والأخضر السريع النمو (المقاوم) ، وأمكن من بين ٣٢١٠ calli (جمع كالس) الحصول على سبعة نباتات كانت مقاومة للفيرس ، هذا .. بينما لم يحصل على أية نباتات مقاومة للفيرس من الأوراق التى لم تعرض للأشعة . وقد استمرت المقاومة فى نسل هذه النباتات ، وظهرت على شكل نقص فى تركيز الفيرس ، وضعف حركته فى النبات مما أدى إلى تأخير ظهور الأعراض لمدة ٣ - ٨ أسابيع ، مقارنة بالنباتات غير المقاومة (عن Daub ١٩٨٤) .

كما استخدمت سموم المسببات المرضية فى انتخاب سلالات خلايا Cell Lines مقاومة لهذه المسببات وقد جذبت هذه الطريقة الانتباه إليها لسهولة استخدامها ، ولأن جميع الخلايا تعرض لمستوى واحد من سموم المسببات المرضية ، ولكن يعيبها أن نسبة بسيطة فقط من المسببات المرضية هى التى تنتج سموماً ، وأن قليلاً من هذه السموم هو الذى أمكن عزله وتنقيته ، لاستخدامه فى الانتخاب للمقاومة ، كما أن بعض السموم تكون خاصة بعوائل معينة hos-specific ، وتحدث بها نفس الأعراض التى تحدثها المسببات المرضية ذاتها ، بينما تكون سموم أخرى ذات تأثير عام non-host-specific على عدد كبير من الأنواع

النباتية ، ويكون دورها فى إحداث الأعراض المرضية أقل من سابقتها . ومن أمثلة سلالات الخلايا التى انتخبت لمقاومتها لسموم المسببات المرضية أو راشح بيئاتها Culture Filtrates ، والتى تميزت نباتات كاملة منها ما يلى :

أ- المقاومة للبكتريا *Pseudomonas syringe* فى الدخان .

ب- المقاومة لفطرى *Phytophthora infestans* ، و *Fusarium oxysporum* فى البطاطس .

ج- المقاومة لفطر *Phoma lingam* فى *Brassica napus* (عن Daub ١٩٨٤) .

د- أمكن كذلك عزل سلالات من الذرة ، تحتوى على صفة العقم الذكري الستوبلازمى مع المقاومة لسموم السلالة T من الفطر *Helminthosporium maydis* المسبب لمرض لفحة الأوراق الجنوبية ؛ بواسطة تعريض مزارع أنسجة من سلالات ذرة ، تحمل سيتوبلازم تكساس الخاص بالعقم الذكري ، لسموم الفطر ، ووجد أن صفة المقاومة هذه تورث عن طريق الستوبلازم ، وأن النباتات المنتخبة كانت مقاومة لدى اختبارها تحت ظروف الحقل ، وجدير بالذكر ، أن جميع أصناف الذرة التى تحتوى على سيتوبلازم تكساس العقيم الذكر *Texas Male Sterile Cytoplasm* تصاب بهذا الفطر بدرجة أكبر بكثير من الأصناف الأخرى . ويبدو أن سم هذا الفطر يؤثر فى المتيوكوندريا (عن Cooking & Riley ١٩٨١) ولزيد من التفاصيل عن دور مزارع الأنسجة فى الانتخاب لمقاومة الأمراض .. يراجع Earle & Gracen (١٩٨١) ، Daub (١٩٨٤) .

٢- حالات التعدد الكروموسومى غير التام :

على الرغم من أن حالات التعدد الكروموسومى غير التام *aneuploidy* نادراً ما تظهر فى الطبيعة إلا فى النباتات المتضاعفة بطبيعتها .. إلا أنها كثيرة الشيع فى مزارع الأنسجة ، وظهرت فى مزارع عديد من النباتات ؛ مثل البسلة ، والدخان ، والجزر ، والفاول . كما تنشأ حالات كثيرة من التعدد الكروموسومى غير التام ، والتام فى مزارع متوك بعض النباتات مثل الداتورة ، والشعير ، والأرز ، والبيتونيا .

٣- حالات التضاعف الذاتى :

أمكن إحداث التضاعف الذاتى بسهولة فى مزارع الخلايا ؛ بإضافة الكولشيسين إليها

مباشرة . فأمكن - على سبيل المثال - إنتاج ٤٨٠ نباتاً متضاعفاً بانتظام من مزرعة خلايا لأحد الهجن النوعية فى الجنس *Saccharum* كان قد أضيف إليها الكولشيسين بتركيز ٥٠ مجم / لتر لمدة ٤ أيام ويحدث التضاعف الكروموسومى الطبيعى بانتظام كذلك فى كثير من مزارع الخلايا ، وكثيرا ما وجدت حالات تضاعفت فيها الخلايا الثنائية إلى ٤ ن ، و ٨ ن ، وأحيانا إلى ١٦ ن .

أهمية تمييز الأجنة العرضية

تتحقق الاستفادة من مزارع الأنسجة والخلايا فى الحصول على اختلافات وراثية جديدة ، حتى إن تميزت النموات الخضرية من أنسجة الكالس مباشرة ، إلا أن الفائدة من الاختلافات الوراثية تتضاعف إذا تميزت الأجنة العرضية *Adventitious Embryos* فى هذه المزارع ؛ وذلك للأسباب التالية :

- ١- تزداد فرصة العثور على الاختلافات الوراثية المرغوبة ؛ نظراً لأن كل خلية فى المزرعة يمكن أن تميز إلى جنين يعطى فرداً جديداً .
- ٢- ولنفس السبب السابق .. فإن جميع خلايا الأفراد المتكونة الحاملة للطفرات تكون بها هذه الطفرات ، ولاتكون الطفرات على شكل كيميرا ، مثلما يحدث فى حالة تمييز النموات الجديدة من نسيج الكالس مباشرة .
- ٣- يصعب - كثيراً - فى الحمضيات إنتاج نباتات خالية من الفيروسات ، عن طريق مزارع القمة النامية الميرستيمية ، ولكنها تنتج بشكل روتينى من الأجنة اللإخصائية التى تكون خالية تماماً من الإصابات الفيروسية (تكون الأجنة الجنسية خالية - هى الأخرى - من الإصابات الفيروسية ، ولكنها لاتصلح للإكثار التجارى) ، إلا أن بعض أصناف الحمضيات تكون خالية من البذور ؛ مثل البرتقال أبو سره ، والأصناف اللابذرية من اليوسفى والجريب فروت . وفى أصناف كهذه .. لايمكن إنتاج نباتات خالية من الفيروسات إلا بطريق الأجنة العرضية ، التى تتكون فى مزارع الأنسجة والخلايا .
- ٤- يحد تمييز الأجنة العرضية من التغيرات الوراثية ، التى تظهر عادة عند الإكثار الدقيق للأغراض التجارية ، وهى التغيرات التى يزداد ظهورها عند تمييز الأفراد الجديدة من نسيج الكالس مباشرة .
- ٥- يفيد إنتاج الأجنة العرضية فى تقصير فترة برنامج التربية فى بعض الحالات ،

عندما تتجه النباتات التي تنمو من هذه الأجنة نحو الإزهار المبكر ، ففي نبات الجنس ginseng .. أعطت الأجنة العرضية التي انتجت في مزارع كالس الجنور نباتات اتجهت مباشرة نحو الإزهار ، وهو ما يعنى توفير ثلاث سنوات في كل جيل من أجيال التربية بالنسبة لهذا النبات .

أهمية مزارع المتوك وحبوب اللقاح

تنتج النباتات الأحادية بسهولة من مزارع المتوك وحبوب اللقاح ، وقد سبق أن بينا في الفصل الرابع عشر أن من أهم فوائد النباتات الأحادية استخدامها في إنتاج نباتات ثنائية أصيلة من المحاصيل الخلطية التلقيح في خطوة واحدة بمضاعفتها بالكولشييسين (بدلاً من التربية الداخلية لستة أو ثمانية أجيال) . كما تفيد النباتات الأحادية في إنتاج مختلف حالات التعدد الكروموسومى غير التامة aneuploids . وذكرنا - من قبل - أهمية مزارع المتوك وحبوب اللقاح بالنسبة للتربية بالطفرات ؛ حيث تفيد في التعرف على الطفرات المتنحية بسهولة . وإلى جانب ذلك .. فإن مزارع المتوك تعد وسيلة سهلة لإنتاج النباتات ذات الأصول الوراثية المتشابهة Isogenic Lines ، كما أمكن إنتاج أصناف جديدة محسنة في وقت قياسي من كل من الدخان ، والقمح ، والأرز ، والشعير ، وغيرها من المحاصيل باستخدام مزارع المتوك . واستخدمت مزارع حبوب اللقاح في إنتاج أصناف هجين من الهليون كانت جميع نباتاتها مذكورة فقط ؛ وذلك بإنتاج نباتات مذكورة أحادية (Y) من حبوب اللقاح ، ثم مضاعفتها بالكولشييسين لإنتاج نباتات فائقة الذكورة (YY) ، ثم تلقحها بالإناث (XX) لإنتاج هجن ذكور خليطة (XY) .

وقد أمكن إنتاج نباتات أحادية من مزارع حبوب اللقاح في عدد كبير من الأنواع النباتية ، نذكر منها - على سبيل المثال - ما يلى (عن Chu ١٩٨٢) :

Brassica oleracea

B. chinensis

B. napus

B. campestris

C. annuum

C. frutescens

Solanum tuberosum

S. melongena

Lycopersicon esculentum

L. pimpinellofolium

Ipomea batatas

ولزيد من التفاصيل عن استخدامات مزارع المتوك وحبوب اللقاح فى تربية النبات ..
يراجع Sink & Padmanabhan (١٩٧٧) ، و Nitsch (١٩٧٥) و Sunderland (١٩٨٠) ،
و Chu (١٩٨٢) .

أهمية مزارع الإندوسيرم

إن الهدف الرئيسى من إنتاج مزارع الإندوسيرم - بالنسبة لمرىى النبات - هو الحصول على النباتات الثلاثية التى تكون لها أهمية خاصة فى عديد من المحاصيل الإقتصادية الهامة ؛ مثل التفاح ، والموز ، وبنجر السكر ، والشاي ، وأصناف البطيخ اللابذرى ، وتعد مزارع الإندوسيرم بديلاً سهلاً للطريقة الأخرى المتبعة فى إنتاج النباتات الثلاثية وهى تلقيح نباتات رباعية مع أخرى ثنائية المجموعة الكروموسومية ، وتبرز أهمية مزارع الإندوسيرم فى الحالات التى لا يكون فيها هذا التهجين ناجحاً دائماً كما فى الحمضيات . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع .. يراجع Johri وآخرون (١٩٨٠) .

أهمية مزارع المبايض والبويضات

يستفاد من مزارع المبايض والبويضات فى الجوانب التالية :

- ١- إنتاج النباتات الأحادية ، من خلال عملية التوالد الذاتى .
- ٢- التغلب على حالات عدم التوافق (سواء أكان ذاتياً ، أم خلطياً) فى مزارع البويضات نظراً لأنه تتم إزالة أنسجة المبيض الأمية المسئولة عن حالة عدم التوافق .
- ٣- التغلب على مشاكل العقم فى بعض الهجن النوعية البعيدة (بين أنواع من أجناس مختلفة من نفس العائلة (intergeneric crosses) ، أو من عائلات مختلفة (interfamily crosses) . وقد أمكن بالفعل إنتاج لاقحات zygotes تحتوى على هيئات كروموسومية لأنواع بعيدة ، ونمت هذه اللاقحات إلى درجات مختلفة من التطور نحو تكوين الأجنة .

ومن أمثلة الهجن النوعية الصعبة التى أمكن إنتاجها بكل من مزارع المبايض ، ومزارع البويضات الهجين $B. napus \times B. juncea$ (والهجين العكسى كذلك) . وقد أظهرت نباتات الجيل الثانى تباينا واسعا فى الصفات (Bajaj وآخرون ١٩٨٦) .

أهمية مزارع الأجنة

يستفاد من مزارع الأجنة فى الأمور التالية :

١- إمكانية الحصول على الهجن البعيدة التى يستحيل إنتاجها بالطرق العادية . ويتحقق ذلك فى الحالات التى يبدأ فيها الجنين الهجين فى التكوين بصورة طبيعية بعد التلقيح والإخصاب ، إلا أنه يتدهور بعد فترة ، ويختفى نظراً لعدم التوافق بين الجنين النامى ، والإندروسبرم . وقد أمكن - عن طريق مزارع الأجنة - إنتاج هجن نوعية هامة فى كل من الأجناس : *Phaseolus* ، و *Brassica* ، و *Lycopersicon* ، و *Oryza* ، وغيرها ، كما أمكن - عن طريقها كذلك - الحصول على هجن جنسية مثل *Hordeum* $\times$ *Secale* ، و *Hordeum* $\times$ *Agropyron* ، و *Triticum* $\times$ *Triticum* ، و *Secale* .

٢- إنتاج النباتات الأحادية بسبب الاستبعاد الكروموسومى الذى يحدث أحياناً بعد التهجينات البعيدة كما فى الهجين $H. bulbosum \times H. vulgare$ ؛ حيث تفقد كروموسومات *H. bulbosum* خلال الإنقسامات القليلة الأولى للأقحة ، وبمضاعفة النباتات التى تنمو من الأجنة الأحادية بالكولشييسين .. يتجمع لدى المربى عدد كبير من النباتات الأصلية المختلفة عن بعضها وراثياً ، ويمكن انتخاب أفضلها ؛ لتصبح أصنافاً جديدة .

٣- تقصير دورة التربية بالتخلص من حالات سكون البذور التى قد تمتد إلى عدة شهور ، وربما إلى سنتين أو ثلاث سنوات كما فى الجنس *Iris* .

٤- إكثار بعض النباتات التى لاتنبت بنورها ، برغم احتوائها على جنين جنسى ، كما فى النوع *Musa balbisiana* الذى يمكن إنتاج بادرته بسهولة بزراعة أجنة بنوره فى بيئات صناعية .

وقد أمكن الاستفادة من مزارع الأجنة فى إنتاج هجن نوعية صعبة فى عدد من

الأجناس لنقل صفات هامة من الأنواع البرية إلى الأنواع المزروعة : ففي الجنس *Cucumis* تتوفر المقاومة لنيماطودا تعقد الجذور في عدة أنواع مثل : *C. metuliferus* ، و *C. anguria* ، ولكنها لا توجد في أى من القارون *C. melo* أو الخيار *C. sativus* . وأمكن الحصول على أجنة من التهجين *C. metuliferus* x *C. melo* إلا أنه لم يمكن زراعتها لإنتاج نباتات تصلح للشتل ، وأعطت التهجينات *C. anguria* x *C. melo* و *C. metuliferus* x *C. anguria* ثماراً كانت خالية من البنور الحية ، إلا أنه أمكن عزل أجنة حية من هذه الثمار قبل اكتمال تكوينها ، وتمكن Fassuliotis & Nelson (١٩٨٨) من الحصول على النباتات الهجين من هذه الأجنة ، بزراعتها بعد ٣٤ - ٩٩ يوماً من التلقيح . وفي الجنس *Brassica* .. أمكن إجراء التهجين النوعي : *B. napus* x *B. juncea* ، باستخدام مزارع الأجنة (Bajaj ١٩٨٦) . أما الهجين النوعي *B. napus* X *B. oleracea* ، والذي تنتج بنوره بنسبة نجاح تتراوح من ٥٠٪ - ٣٠٪ من التلقيحات .. فقد أمكن إنتاجه ، بمعدلات وصلت إلى ٢٦٤٪ باستخدام مزارع الأجنة (Ayotte وآخرون ١٩٨٧) . ولزيد من التفاصيل عن استخدامات مزارع الأجنة في تربية النبات .. يراجع Raghavan (١٩٨٠) .

أهمية مزارع البروتوبلازم

يستفاد من مزارع البروتوبلازم فى النواحي التالية :

- ١- تعد مزارع البروتوبلازم أفضل من مزارع الخلايا الكاملة ، ويجب استعمالها كبداية فى عمليات الإكثار وعزل السلالات الطفرية .
- ٢- دمج بروتوبلازم الأنواع النباتية البعيدة عن بعضها معاً ، وهو ما يعد وسيلة فعالة لإجراء التهجينات البعيدة .
- ٣- إدخال تراكيب مجهرية حية أو غير حية فى الخلايا النباتية ، ويستفاد من ذلك فى دراسات الهندسة الوراثية وتجري محاولات فى هذا الخصوص ؛ لنقل الجزء الكروموسومى الخاص بالقدرة على المعيشة التعاونية مع بكتيريا العقد الجذرية من الجنس *Rhizobium* إلى نباتات غير بقولية ، علماً بأن هذه الظاهرة لا توجد إلا فى البقوليات ، ونبات *Trema canabino* .
- ٤- إجراء الدراسات الفسيولوجية الخاصة بتمثيل الجدار الخلوى

وخصائص الغشاء البلازمى .

٥- إحداث الإصابة بالفيروسات بإدخالها فى البروتوبلازم مباشرة .

٦- زراعة كلوروبلاستيدات نباتات عالية الكفاءة فى عملية البناء الضوئى فى بروتوبلازم نباتات منخفضة الكفاءة ، ونقل الصفات المرتبطة بالكلوروبلاستيدات (مثل المقاومة لمبيد الحشائش اترازين atrazine فى اللفت) من نوع إلى آخر .

٧- إدخال صفة العقم الذكري الستوبلازمى فى النباتات (Bajaj ١٩٧٤ ، و Vasil ١٩٧٦) ، وقد أمكن - على سبيل المثال - إدخال صفة العقم الذكري السيتوبلازمى بواسطة مزارع البروتوبلازم من النوع *Nicotiana tabacum* إلى *N. sylvestris* ، ومن *Petunia hybrida* إلى *P. axillaris* (عن Sink ١٩٨٤) .

٨- الحصول على تباينات وراثية يمكن الاستفادة منها فى تحسين النباتات ، خاصة الأنواع العقيمة منها التى لا تنتج بذوراً .


اندماج البروتوبلازم وإنتاج الهجن

يحدث اندماج البروتوبلازم Protoplasm Fusion بصورة تلقائية وطبيعية فى مزارع البروتوبلازم المجهزة من خلايا نشطة فى الانقسام . ويحدث الاندماج باتساع الأغشية البروتوبلازمية المتجاورة والتحام الروابط البلازمية بينها ؛ لتتكون بذلك وحدات بروتوبلازمية جديدة بكل منها من ٢ - ٤٠ نواة . ويمكن تقليل حالات اندماج البروتوبلازم بوضع الخلايا المستخدمة فى إعداد مزارع البروتوبلازم فى سائل ذى ضغط أسموزى مرتفع ، ليلزمتها بغرض قطع الروابط البروتوبلازمية .


أما إنتاج الهجن .. فيتطلب اندماج بروتوبلازم الأنواع التى يراد تهجينها ، ويستلزم ذلك توفر عامل ، أو وسيلة مناسبة لتحقيق الاندماج (fusogen) . وقد جريت لذلك معاملات كثيرة أثبت بعضها نجاحاً كبيراً فى تحفيز اندماج بروتوبلازم الأنواع البعيدة ، مثل معاملات نترات الصوديوم ، والـ pH المرتفع ، والتركيز المرتفع لأيون الكالسيوم ، والبوايثيلين جليكول ، والمعاملة بتيار كهربائى ذى فولت مرتفع لفترة قصيرة .

ويحدث اندماج البروتوبلازم بالطريقة المبينة فى شكل (١٨-١) ، وينتج عنه إنتاج بروتوبلازم ذى نواتين مختلفتين Binucleate Heterokaryon . يعقب الاندماج اختلاط بروتوبلازم الأنواع المندمجة خلال ساعات قليلة ، وتكون جداراً خلوياً حول البروتوبلازم

المندمج ، ثم تدخل الخلية الهجين فى انقسامات ينشأ عنها تكون هجين جسمى Somatic Hybrid ، وقد تنقسم كل نواة فى البروتوبلازم ذى النواتين منفصلة عن الأخرى ، دون أن تشترك كروموسوماتهما معا فى خيوط مغزل واحدة ، وتنشأ عن ذلك حالات من الكيميرا . وقد تستمر الخلايا ذات النواتين المختلفتين فى إنتاج خلايا معاملة لعدة أجيال ، دون أن تندمج النواتان معاً . وقد يحدث اندماج للنواتين فى الطور البيني Interphase بين الانقسامات ، ولكن هذا الاندماج لا يترتب عليه إنتاج خلية هجين قادرة على الاستمرار فى الانقسام . ولا يكون اندماج النواتين مفيداً فى إنتاج خلايا هجين hybrids إلا إذا حدث أثناء الانقسام الميوزى . وحتى إذا تكونت الخلايا الهجين فى أثناء الانقسام الميوزى .. فإن اندماج النواتين لا يكون تاماً فى أغلب الحالات ، وكثيراً ما تستبعد الكروموسومات الخاصة بأحد النوعين المندمجين من الخلايا الهجين بعد عدة أشهر من الانقسام . كما يحدث الشئ نفسه - غالباً - بالنسبة لعضيات الخلية ، مثل البلاستيدات الخضراء . وقد تستبعد كروموسومات أحد النوعين ، بينما تستبعد بلاستيدات النوع الآخر ، ويعطى ذلك الفرصة لإنتاج خلايا لأحد النوعين المهجنين ، وهى تحتوى على بلاستيدات النوع الآخر ، ولنقل عوامل سيتوبلازمية (مثل العقم الذكري) من نوع أو جنس إلى آخر . وتعرف الهجن التى تحتوى على نواة من أحد الأنواع وسيتوبلازم من النوع الآخر ، أو منهما معاً باسم سيبرد Cybrids (شكل ١٨ - ٢) .



شكل (١٨ - ١) : خطوات عملية اندماج البروتوبلازم لنوعين مختلفين . يبدأ الاندماج بتقارب البروتوبلازم كما فى الشكل (ب) ، ثم اندماج الأغشية البروتوبلازمية فى مناطق محددة (كما فى الشكل جـ) ، وينتهى بتكوين الخلية ذات النواتين المختلفتين binucleate heterokaryon .




شكل (١٨ - ٧) : مقارنة بين الهجين الجنسي ، والهجين الجسمي والسيرد cybrid .

وقد استخدمت تقنية اندماج البروتوبلازم فى إنتاج هجن كثيرة ، نذكر منها - على سبيل المثال - مايلى :

- 1 - *Daucus carota* ($2n = 18$) + *D. capillifolius* ($2n = 18$) .
- 2 - *Nicotiana tabacum* ($2n = 48$) + *N. glauca* ($2n = 24$) .
- 3 - *Petunia parodii* ($2n = 14$) + *P. hybrida* ($2n = 14$) .
- 4 - *Solanum tuberosum* ($2n = 24$) + *S. chacoense* ($2n = 24$) .
- 5 - *Datura innoxia* ($2n = 24$) + *D. discolor* ($2n = 24$) .
- 6 - *Nicotiana tabacum* ($2n = 24$) + *Lycopersicon sp.* ($2n = 24$) .
- 7 - *Solanum tuberosum* ($2n = 24$) + *Lycopersicon esculentum* ($2n = 24$) .
- 8 - *Daucus carota* ($2n = 18$) + *Petroselinum hortense* ($2n = 22$) .
- 9 - *Lycopersicon esculentum* + *Solanum nigrum* .

وقد اختلف عدد كروموسومات الهجن الناتجة عن إجمالى عدد كروموسومات الأبوين المهجنين فى معظم الحالات ؛ فعلى سبيل المثال .. كان عدد كروموسومات نباتات الهجين الثانى - أعلاه - من ٥٠ - ٨٠ كروموسوماً ، والهجين الثالث من ٢٤ - ٢٨ كروموسوماً ، والهجين السابع من ٥٠ - ٧٠ كروموسوماً ، والهجين الثامن ١٩ كروموسوماً . تعقب المعاملة بالعامل المحفز للاندماج fusogen تواجد خليط من الطرز الأبوية ، والخلايا المتعددة الأنوية المتماثلة homokaryons ، والخلايا المتعددة الأنوية الهجين heterokaryons ، مع طرز متعددة تحتوى على توافق مختلف من المحتويات النووية والاستوبلازمية للنوعين المندمجين . ولاتشكل الخلايا المتعددة الأنوية الهجين سوى نحو ٥٠ ٪ - ١٠٠ ٪ من هذا الخليط ؛ لذا .. فإنه من الضرورى التعرف على هذه الخلايا فى مرحلة مبكرة من تكوينها وانتخابها ؛ لكى تطور إلى الهجن المرغوب فيها . وقد طورت عدة طرق لتحقيق ذلك ؛ مثل الطريقة المبينة فى شكل (١٨ - ٣) ، وطريقة الطرد المركزى مع فصل الهجن على أساس الكثافة النوعية . هذا .. وتتميز النباتات الهجين من نسيج الكالس الذى ينمو من الخلايا المتعددة الأنوية المنتخبة . ويتطلب تكوين الكالس وتميز النباتات منه توفر ظروف خاصة مختلفة فى بيئة الزراعة فى كل من الحالتين .

ويتلخص الوضع الحالى لاستخدام مزارع البروتوبلازم فى إنتاج الهجن البعيدة فى أن



شكل (١٨ - ٣) : طريقة انتخاب الخلايا الهجين بين النوع *Petunia parodii* وأى من الأنواع *P. inflata* ، أو *P. parviflora* ، أو *P. hybrida* باستعمال مزارع البروتوبلازم .

غالبية المحاولات فى هذا الاتجاه كانت على الأجناس التى يسهل الحصول فيها على نباتات من مزارع البروتوبلازم ، وهى : *Nicotiana* ، و *Petunia* ، و *Daucus* ، و *Solanum* ، و *Datura* . ويلزم تطوير تقنية إنتاج النباتات من مزارع البروتوبلازم فى أجناس أخرى مهمة لكى يمكن أن تشملها محاولات الهجن البعيدة . وقد أمكن - عن طريق دمج بروتوبلازم الأنواع البعيدة - معاً - فى مزارع البروتوبلازم - إنتاج أربعة أنواع من الهجن هى :

١- هجن تحتوى على العدد الكامل لكروموسومات الأبوين (أى متعددة المجموعات الكروموسومية شبيهة بالثنائية Amphidiploids مثل الهجين : *Datura innoxia* + *D. stramonium* ، و *D. innoxia* + *D. discolor* .

- ٢- هجن خليطة وعقيمة أنتجت بإضافة هيئات كروموسومية من أنواع برية إلى النوع المزروع ، وتكثر خضرياً كما في جنس البطاطس *Solanum* .
- ٣- هجن تحتوى على جزء فقط من الهيئة الكروموسومية لأنواع أخرى ، مثل غالبية الهجن التى أنتجت حتى الآن .
- ٤- هجن تحتوى على نواة أحد الأنواع ، وسيتوبلازم النوع الآخر ، أو كلا النوعين المهجنين سيبرد Cybrids (عن Schieder ١٩٨٢) .

وعلى صعيد تربية النباتات .. أجرى Tang & Punja (١٩٨٩) دراسات مزارع البروتوبلازم اللازمة لزراعة ، ودمج بروتوبلازم الخيار مع بروتوبلازم السلالة P. I. 292190 من النوع البرى *Cucumis metuliferus* المقاومة لكل من نيماتودا تعقد الجنور ، وفيرس تبرقش الزوكينى الأصفر ، وفيرس تبرقش البطيخ رقم (١) . كما أمكن نقل صفة المقاومة لمبيد الحشائش أترازين atrazine من محصول الـ rapeseed إلى القنبيط ؛ عن طريق دمج بروتوبلازم المحصولين معاً ، ثم تعريض البروتوبلازم المندمج للأترازين . وقد أنتجت الخلايا التى أمكنها البقاء نباتات قنبيط مقاومة للمبيد (HortScience ١٩٨٨ - المجلد ٢٣ - العدد ٢) . وقد أجرى الشئ نفسه بالنسبة للطماطم ؛ حيث هجنت مع النوع *Solanum nigrum* المقاوم للأترازين ، مع التخلص من نواة النوع الأخير وسيتوبلازم الطماطم ، وأمکن بذلك إنتاج سيبرد Cybrid يحتوى على الطماطم وسيتوبلازم *S. nigrum* الذى توجد به المقاومة للأترازين (عن Fobes ١٩٨٧) .

أما هجين الطماطم مع البطاطس .. فقد ظهرت به بعض صفات الأبوين ، رغم أنه كان أقرب دائماً إلى أحدهما . ولذا .. فقد أطلق على الهجين اسم pomato ، أو topato حسبما تكون صفاته ، أقرب إلى الطماطم ، أو إلى البطاطس ، على التوالى . وقد تكونت لبعض النباتات الهجين درنات صغيرة بيضاء اللون ، وأزهار ، وثمار ، صفراء اللون ، لها نكهة الطماطم ، إلا أن جميع الأزهار كانت عقيمة ، وكانت الثمار خالية من البذور (عن Gaynor & Kaur-Shawney ١٩٨٥) .

ولزيد من التفاصيل عن استخدامات مزارع البروتوبلازم فى إنتاج الهجن البعيدة .. يراجع Cooking (١٩٧٥ ، ١٩٨٢) ، و Schieder & Vasil (١٩٨٠) ، و Galun

(١٩٨٢) ، و Schieder (٩٨٢) ، و Sink (١٩٨٤) ، و Gaynor & Kaur - Sawhney (١٩٨٥) ، و Power & Chapman (١٩٨٥) .

أهمية الإكثار الدقيق و مزارع القمة الميرستيمية

يتم إكثار السلالات الجديدة من المحاصيل التى لا تتكاثر جنسياً ، إما خضرياً Vegetatively وإما لا إخصابياً Apomictically ، وتفيد كلتا الطريقتين فى إنتاج سلالات متجانسة تماماً ومماثلة للأصل الذى توصل إليه المربي ، والذي استخدم فى الإكثار . ويعطى الإكثار الخضري سلالات خضرية Clones ، بينما يعطى الإكثار اللاإخصابى سلالات لا إخصابية Apomictic Lines . ويعاب على التكاثر الخضري أن إنتاج أعداد كبيرة من نباتات الصنف الجديد تصلح للزراعة التجارية على نطاق واسع ، يستغرق عدة سنوات ، لا يستفاد خلالها من الصنف الجديد . كما قد تصاب النباتات خلال عملية الإكثار بالفيروسات ؛ مما يترتب عليه انتشار الإصابة الفيروسية بين نباتات الصنف الجديد . أما التكاثر اللاإخصابى .. فيعيبه قلة الأنواع النباتية التى تتكون بها الأجنة اللاإخصابية ، فضلاً على صعوبة التمييز بين البادرات التى تنمو من أجنة جنسية ، وتلك التى تنمو من أجنة لا إخصابية فى حالة التكاثر اللاإخصابى الاختيارى . ومن العيوب الأخرى للتكاثر اللاإخصابى - مقارناً بالتكاثر الخضري - طول فترة سكون البذور فى بعض الأنواع ، ووجود مرحلة حدائة Juvenile Phase طويلة فى أنواع كثيرة عند إكثارها بالبذور ؛ أما الإكثار الجنسى .. فلا يصلح لهذه الأنواع التى تكثر تجارياً بوسائل غير جنسية لأنه يؤدي إلى إنتاج نباتات مخالفة للصنف الأصلي ، فضلاً على أن كثيراً من الأنواع النباتية لا تنتج بنوراً بالمرّة ؛ مثل الموز ، والعنب البناتى ، والتين .

تتضح من المناقشة السابقة أهمية الإكثار الدقيق فى إكثار الأصناف الجديدة وإنتاج آلاف أو ملايين النباتات الصالحة للزراعة من قطعة مجهرية الحجم من النسيج النباتى فى وقت قصير للغاية . وقد بدأ استخدام هذه الطريقة مع نبات الأوركيد Orchid ثم انتشر استخدامها فى معظم النباتات الاقتصادية المهمة ، التى لا تكثر جنسياً مثل نخيل البلح (شكل ١٨-٤) والموز ونخيل الزيت وعديد من الفواكه الأخرى ، ونباتات الزينة مثل الجريبيرا ؛ وبذلك .. أمكن تقليل الفترة ما بين إنتاج الأصناف الجديدة ، وانتشار زراعتها . كما أفادت هذه الطريقة فى التوسع فى زراعة الأصناف الجديدة خارج حدود

الدول التي أنتجت فيها ؛ نظراً لسهولة إجراءات الحبر الزراعى على النباتات النامية فى أنابيب الاختبار . وكان من المزايا الأخرى للإكثار الدقيق المحافظة على النباتات خالية من جميع الإصابات المرضية ، واستمرار عملية الإكثار على مدار العام ، دون التقيد بالمواسم الزراعية .

ويعد إنتاج نباتات من الجنس المطلوب من أكبر مزايا الإكثار الدقيق بالنسبة للأنواع الوحيدة الجنس الثنائية المسكن ؛ حيث تنتج - مثلاً - نباتات مذكرة فقط من الهليون ، ونباتات مؤنثة فقط من نخيل البلح ، كما يطمح الباحثون فى إنتاج نباتات مؤنثة فقط من الباباؤ . ولاشك فى أن المحافظة على عشرات الآلاف من نباتات المشاتل فى أوعية زجاجية صغيرة فى مساحة من المختبر لاتتعدى عشرة أمتار مربعة يعد أمراً بالغ الأهمية من الوجهة الاقتصادية . وإلى جانب ما تقدم .. فإن مزارع الإكثار الدقيق يمكن الاستفادة منها فى إكثار هجن بعض الأنواع الجنسية التكاثر المرتفعة الثمن ؛ كهجن القنبيط ، والسلالات العقيمة الذكر المستخدمة كأمهات ، بدلاً من اتباع طريقة التهجين الرجعى كما فى البصل .



شكل (١٨ - ٤) : بادرات نخيل بلح منتجة بطريقة مزارع الإكثار الدقيق .

وفي مجال إكثار الهجن الجنسية .. تجرى محاولات لإنتاج بذور صناعية artificial seeds من هذه الهجن باتباع طرق الإكثار الدقيق . ويعمد العلماء - في هذه الحالة - إلى إنتاج أجنة جسمية من خلايا الهجين الجنسي مباشرة بزرعة أنسجته (مثل نسيج الأوراق الفلقية) في البيئات المناسبة ؛ وبذا ... يمكن الحصول على عدد كبير من الأجنة الجسمية من كل نبات هجين جنسى . تغلف هذه الأجنة بعد ذلك بأغلفة مناسبة - وهي العملية التي تعرف باسم encapsulation - ثم تزرع كالبذور العادية .

وللإكثار الدقيق دوره المباشر في مجال تربية بعض الأنواع الحولية التي يتطلب تقييمها للصفات المرغوبة أن تحصد وتزال من الحقل (كما في الخس ، والكرنب ، والكرفس) وهو ما يؤدي إلى فقدان قدرتها على النمو . ومن أمثلة ذلك صفات الصلاحية للتخزين ، والقدرة على تحمل عمليات التداول والشحن ، والمقاومة للعيوب الفسيولوجية والأمراض التالية للحصاد . وبرغم أنه يمكن أحياناً الإبقاء على جزء من النبات في الحقل لحين إجراء التقييم .. إلا أن هذه الطريقة مكلفة . وتتطلب جهداً إضافياً . وتقدم مزارع الإكثار الدقيق حلاً جيداً لهذه المشكلة ؛ بإكثار النباتات التي يتم انتخابها - بعد التقييم المختبرى - من القمم النامية ، أو البراعم الإبطية لهذه النباتات . وتحقيقاً لهذا الهدف .. قام Bloksberg & Saltveit (١٩٨٦) بتطوير تقنية إكثار نباتات الخس من البراعم الإبطية التي توجد في الرؤوس .

ويفيد الإكثار الدقيق كذلك في التغلب على مشاكل تقييم النباتات التي عمّرت سنوات كثيرة ، خاصة أشجار الغابات ؛ ففي هذه الأنواع .. تميل النباتات الجديدة إلى مشابهة النمو النباتي في الجزء الذي استخدم في الإكثار الخضرى من النبات الأم ، مما يؤدي إلى حدوث تباين واضح في النمو النباتي بين نباتات السلالة الخضرية الواحدة . ويمكن التغلب على هذه المشكلة بالإكثار الدقيق لهذه الأشجار ؛ لأنه يؤدي إلى استعادة مرحلة الحداثة Juvenility في جميع النباتات الجديدة المكثرة (عن Jensen ١٩٨١) .

وليزيد من التفاصيل عن تطبيقات الإكثار الدقيق لمختلف المحاصيل الزراعية .. يراجع Yang (١٩٧٧) بالنسبة للهلين ، و Hussey (١٩٨٠ ، ١٩٨٣) بالنسبة للمحاصيل الإقتصادية عامة ، و Science and Education Administration (١٩٨٠) بالنسبة للفاكهة ، و Bottino (١٩٨١) بالنسبة للخضر ، و Congor (١٩٨١) بالنسبة للمحاصيل

الاقتصادية عامة ، و Evans وآخرين (١٩٨١) ، و Hartmann & Kester (١٩٨٣) بالنسبة للمحاصيل البستانية ، و George (١٩٨٦) ، و Wooster & Dixon (١٩٨٧) بالنسبة للبطاطس .

أما مزارع القمة الميرستيمية .. فإن لها أهميتها البالغة فى ثلاثة جوانب تتعلق بإكثار النباتات الاقتصادية هى كما يلى :

١- الاستفادة من ظاهرة خلو القمم الميرستيمية من الإصابات الفيروسية فى عملية الإكثار الدقيق ذاتها ؛ لضمان خلو آلاف النباتات المنتجة بهذه الطريقة من أية إصابة فيروسية أو ميكوبلازمية .

٢- عمل إكثار أولى للنباتات الخضرية التكاثر التى تصاب بشدة بالأمراض الفيروسية ؛ لإنتاج تقاوى من الفئات الممتازة التى تكثر بعد ذلك خضرياً ، لإنتاج التقاوى التى يستخدمها المزارعون ؛ وتلك هى الطريقة التى تتبع فى إكثار تقاوى البطاطس والشليك الذى يصاب بنحو ٦٢ مرضاً تسببها فيروسات وميكروبلازومات .

٣- إعادة إنتاج نباتات خالية من الفيروس من الأصناف القديمة للمحاصيل الخضرية التكاثر التى لم يعد فيها نبات واحد خال من الإصابات الفيروسية ، كما حدث بالنسبة لبعض أصناف البطاطس . ولزيد من التفاصيل عن تطبيقات مزارع القمة الميرستيمية يراجع Ingram & Helgeson (١٩٨٠) .

حفظ الجيرمبلازم

تسهل المحافظة على جيرمبلازم الأنواع التى تتكاثر جنسياً على صورة بذور ، وقد سبقت مناقشة هذا الموضوع فى الفصل الخامس ، أما حفظ جيرمبلازم الأنواع التى تتكاثر خضرياً .. فهو أمر باهظ التكاليف ؛ نظراً لأنه يتطلب تواجد الجيرمبلازم نامياً على الدوام فى حالة الأنواع المعمرة ؛ كالتفاح والكمثرى ، أو تجديد زراعتها سنوياً فى حالة الأنواع الحولية منها كالبطاطس . هذا فضلاً على صعوبة المحافظة عليها خالية دائماً من الإصابات الفيروسية . أما حفظ هذه الأنواع على صورة بذور .. فإنه يؤدى إلى تغيرات وراثية كبيرة فى السلالات المحتفظ بها ، ولايفيد سوى فى المحافظة على "الجينات" المهمة التى توجد بكل من هذه السلالات ؛ لأجل ذلك .. اتجه تفكير مربى النبات نحو مزارع

الأنسجة لحفظ سلالات وأصناف الأنواع الخضرية التكاثر ، وهو ما يحقق المزايا التالية :

- ١- حفظ أعداد كبيرة من السلالات فى مساحة صغيرة للغاية بالمختبر ، مع توفير النفقات التى تتطلبها زراعة وخدمة هذه السلالات فى الحقول .
- ٢- بقاء السلالات المخزنة خالية من جميع الإصابات المرضية ، خاصة الفيروسية منها .
- ٣- يمكن استخدام المزارع المحفوظة كتقاوى نواة لإكثارها وإنتاج أعداد كبيرة منها فى أى وقت حسب الحاجة .
- ٤- سهولة نقل مزارع السلالات من دولة إلى أخرى ، نظراً لخلوها من الإصابات المرضية .

إن أهم الأمور التى تجب مراعاتها عند حفظ الجيرمبلازم على صورة مزارع أنسجة هو تجنب تكرار زراعتها على فترات قصيرة ، حتى لا تتعرض للإصابات الميكروبية ، أو للأخطاء البشرية . ويتحقق هذا الهدف بحفظ المزارع إما مجمدة وإما مبردة .

حفظ المزارع بالتجميد

تحفظ مزارع الجيرمبلازم لفترات طويلة وهى مجمدة فى النيتروجين السائل على درجة -١٩٦°م ، التى تفقد عندها الخلايا كل مظاهر نشاطها ، ونظرياً .. فإن تطوير الطرق المناسبة لتجميد النسيج النباتى فى النيتروجين السائل ثم تفكيكه (إذابته) دون أن تحدث له أية أضرار ؛ يعنى إمكان حفظه بهذه الطريقة إلى ما لا نهاية وكما هو معلوم .. فإن السائل المنوى للحيوانات الزراعية يحفظ فى النيتروجين السائل بشكل روتينى لأغراض التلقيح الصناعى .

تعتبر مزارع الأعضاء النباتية مثل مزارع القمة النامية ، ومزارع الأجنة ، ومزارع الإكثار الدقيق هى أنسب المزارع لحفظها بالتجميد للأسباب التالية .

- ١- تجنب وجود أية اختلافات وراثية عند بدء التخزين ، وهو الأمر الذى قد يحدث فى مزارع الكالس ومعلقات الخلايا .
- ٢- تجنب التغيرات الوراثية الكثيرة ، التى يمكن حدوثها فى مزارع الكالس ، ومزارع معلقات الخلايا خلال فترة التخزين الطويلة .

٣- تحتفظ مزارع الأعضاء بقدرتها على استمرار النمو لتكوين نباتات جديدة خلال فترة التخزين ، بينما تفقد الخلايا فى مزارع الخلايا قدرتها على إنتاج النباتات الجديدة (أى تفقد خاصية الـ totipotency) خلال فترات التخزين الطويلة . هذا .. فضلاً على أن مزارع الخلايا لم يمكن دفعها لإنتاج النموات الخضرية فى عديد من الأنواع النباتية .

٤- يمكن المحافظة على الحالة الأحادية فى النباتات الأحادية بسهولة وهى على صورة مزارع القمم الميرستيمية والبراعم الإبطية ، بينما لاتبقى السلالات على الحالة الأحادية فى مزارع الكالس .

٥- تكون خلايا القمم النامية والأجنة (وهى خلايا ميرستيمية) أكثر قدرة على تحمل عمليتى التجميد والتفكك .

وقد استخدمت طريقة التجميد فى حفظ الجيرمبلازم لفترات تجريبية قصيرة نسبياً (تراوحت من خمس دقائق إلى شهرين) فى عدة أنواع نباتية ، وكان منها الجزر ، والشليك ، والطماطم ، والدخان والبسلة ، والبطاطس ، والذرة ، ويلاحظ أن معظم هذه الأنواع تتكاثر جنسياً ، ولكنها تتميز بأن تقنيات مزارع القمم الميرستيمية أو مزارع الأجنة قد تقدمت فيها بدرجة كبيرة ، إلى درجة سمحت بتجربة استخدامها فى تطوير تقنيات حفظها بالتجميد .

حفظ المزارع بالتبريد

يمكن حفظ المزارع فى درجات حرارة منخفضة ، تتراوح من ١ - ٩° م . يعمل هذا المجال الحرارى على إبطاء تدهور النسيج النباتى ، ولكنه لايمنعه ، ويعنى ذلك ضرورة إعادة زراعة النسيج على فترات متباعدة نسبياً . وتستخدم هذه الطريقة - حالياً - فى تخزين جيرمبلازم الشليك ، وعديد من نباتات الفاكهة مثل التفاح والعنب .

وليزيد من التفاصيل عن استخدامات مزارع الأنسجة فى حفظ الجيرمبلازم .. يراجع Morel (١٩٧٥) ، و Henshaw وآخرون (١٩٨٠ ، ١٩٨٣) ، و Withers (١٩٨٠ ، ١٩٨٣) .

مصادر إضافية لأوجه الاستفادة من مزارع الأنسجة فى تربية النبات

لمزيد من التفاصيل عن تطبيقات مختلف أنواع مزارع الأنسجة فى شتى مجالات تربية النبات يراجع كل مما يلى : Morel (١٩٧٢) ، و Ledoux (١٩٧٥) ، و Street (١٩٧٥) Murashige (١٩٧٧) ، و Day (١٩٨٠) ، و Cooking & Riley (١٩٨١) ، و Jensen (١٩٨١) ، و Thorpe (١٩٨١) ، و Vasil وآخرون (١٩٨٢) ، و Bhojwani & Razdan (١٩٨٣) ، و Mantell & Smith (١٩٨٣) ، و Bliss (١٩٨٤) ، و Cailloux (١٩٨٤) ، و Chin (١٩٨٥) ، والمرضى (١٩٨٦) ، و Fobes (١٩٨٧) و Hermsen (١٩٨٧) .

الهندسة الوراثية

يستعمل مصطلح الهندسة الوراثية Genetic Engineering - أحياناً - كمرادف لمصطلح التقنية البيولوجية Biotechnology ، إلا أن المصطلح الأخير أوسع وأشمل ، ويدخل ضمنه كل تقنيات الهندسة الوراثية . وتتضمن التقنيات البيولوجية - إلى جانب الهندسة الوراثية - كل تقنيات مزارع الخلايا ، والأنسجة ، والبروتوبلازم ، واندماج البروتوبلازم ، وتقنيات أخرى تهتم بالصناعات التى تعتمد على نظم حيوية معينة . أما الهندسة الوراثية .. فيعنى بها عزل وتنقية جينات معينة ، وإدخالها بتقنيات خاصة فى الكائنات الحية لتغييرها وراثياً .

يعود الفضل فى دراسات الهندسة الوراثية إلى البكتريا *Agrobacterium tumefaciens* التى تصيب معظم النباتات ذات الفلقتين (تتوزع العوائل فى أكثر من ٩٠ عائلة نباتية) وتحدث تدرنات بها . توجد فى نواة هذه البكتريا قطعة كروموسومية تعتبر كبيرة نسبياً ، تعرف باسم Tuber - inducing plasmid (تكتب اختصاراً T-i plasmid) تتميز بخاصية الانفصال عن البكتريا ، والدخول إلى خلية العائل حاملة معها بعض الجينات ، التى تتسلط على جينات العائل وتجعلها تكثر من الانقسام فيحدث التدرن ، وتتكون بروتينات لاستعمال البكتريا فقط .

يتميز النسيج الذى تحدثه البكتريا *A. tumefaciens* بقدرته على النمو فى البيئات الصناعية البسيطة نون إضافة أية أوكسينات ، أو سيتوكينينات ، وقدرته على تمثيل واحد

أو أكثر من مشتقات الأحماض الأمينية الأساسية ، يطلق عليها اسم أوبيينات Opines .
ولا توجد هذه الأوبيينات فى الأنسجة السليمة ، وتستفيد منها البكتريا فى الأنسجة .
المصابة . ويتحكم فى ذلك كله الـ T-i plasmid الذى تدخله البكتريا فى خلايا العائل .
ويعد ذلك تحولاً وراثياً genetic transformation ؛ مثل التحولات الوراثية التى عرفت فى
الكائنات الدقيقة (عن Schell وآخرين ١٩٨٢) .

تعتمد الهندسة الوراثية على التعرف على الجينات المرغوبة - أولاً - وتحديد مكانها
على كروموسومات الأنواع التى توجد فيها ، ثم فصلها عنها بطرق متقدمة ، يمكن الرجوع
إلى تفاصيلها فى Flavell (١٩٨٢) .

ويلى ذلك إدخال الجين المرغوب فى الـ T-i plasmid للبكتريا *A. tumefaciens* قبل
إصابتها للعائل . وعندما تحدث الإصابة تقوم البكتريا بنقل الـ T-i plasmid المحتوى
على الجين المرغوب إلى نواة العائل ، ويتعرف على هذه الخلايا بقدرتها على النمو فى
البيئات البسيطة التى لاتحوى هرمونات . ومن الطبيعى أن تكون الخطوة التالية هى إنتاج
نباتات غير متدربة من هذه الخلايا المتحولة وراثياً . وإذا تحقق ذلك يصبح بالإمكان
تحسين جميع النباتات ذات الفلقتين التى تصاب بالبكتريا *A. tumefaciens* بإضافة أية
صفات مرغوبة إليها من أى نوع نباتى توجد به هذه الصفات .

وقد استخدمت البكتريا *A. tumefaciens* - على سبيل المثال - فى نقل جينات من
مصادر مختلفة إلى الطماطم ، منها جينات من أصناف أخرى من الطماطم ، ومن
البكتريا والفيروسات ، والبقوليات ، والذرة ، ومن نباتات أخرى من العائلة الباذنجانية .
ومع ذلك .. فلم يمكن - إلى الآن - إنتاج صنف جديد من الطماطم استفيد فى عملية
إنتاجه من تقنيات الهندسة الوراثية (عن Fobes ١٩٨٧) . ولزيد من التفاصيل عن
استخدامات الـ T-i plasmids فى مجال الهندسة الوراثية .. يراجع Chiltom
(١٩٨٠) ، و Schell (١٩٨٢) ، و Schroder وآخرين (١٩٨٣) .

تتميز الفيروسات - كذلك - بقدرتها على إصابة النباتات ونقل أحماضها النووية إلى
عائلها ، لذا .. فإنها تستخدم فى الأخرى لأغراض الهندسة الوراثية ، ويستفاد فى هذا
الشأن من الفيروسات التى يكون حامضها النووى من نوع دى إن إيه DNA سواء أكانت

مزبوجة الخيط double - stranded (مجموعة Caulimovirus التي يعرف منها ١٢ فيروساً ؛ مثل فيروس تبرقش القرنبيط Cauliflower Mosaic Virus الذي يتكون من دى إن إيه مزبوج الخيط double - stranded DNA ويصيب نباتات العائلة الصليبية بصفة أساسية) أو مفردة الخيط Single - stranded DNA (مثل فيروسات مجموعة الجمنى geminii viruses ، التي يوجد منها أكثر من ١٢ فيروساً ، منها فيروس تبرقش الفاصوليا الذهبى ، وفيروس تخطيط الذره) .

ولكن يعاب على استخدام الفيروسات فى مجال الهندسة الوراثية أنه لم يمكن إضافة قطعة دى إن إيه كبيرة إلى الحامض النووى الخاص بالفيروس دون التأثير فى قدرته على إصابة العائل ، وهى الخطوة الضرورية لإحداث التحول المطلوب . كما أن الجينات الصغيرة المضافة تبطل حركة الفيروس من خلية إلى أخرى ، ويرجع ذلك إلى أن الحامض النووى الخاص بالفيروس صغير بطبيعته فهو لايتعدى واحداً من ثلاثين جزءاً من الـ T - i plasmid (Kado ١٩٨٢) .

وقد تبين أن دى إن إيه فيروس تبرقش القرنبيط يحمل ستة جينات ، ليس لأحدها (وهو الجين رقم II) ضرورة بالنسبة لتكاثر الفيروس ، أو تمثيل بروتين الفيروس ، أو حركة الفيروس من خلية إلى أخرى ، ولكنه يؤثر فى عملية الانتقال الحشرى الفيروسى فى الطبيعة ، وبعد هذا الجين موقعاً مناسباً لإضافة الجينات المرغوبة إلى دى إن إيه الفيروس . كما وجدت منطقة كروموسومية أخرى عن دى إن إيه الفيروس (هى الجين رقم VI) تتحكم فى شدة أعراض المرض ، حيث يؤثر أى تغيير فى هذه المنطقة كثيراً على شدة الأعراض . ووجد أن أعراض الإصابة بالفيروس ، قد تلاشت تقريباً حينما أضيفت ١٢ نيكليوتيدة فى هذا الموقع الجينى ، ونمت النباتات التى تمت عدواها بهذه الطفرة من الفيروس بصورة طبيعية (Shepherd وآخرون ١٩٨٢) . ولزيد من التفاصيل عن استخدامات الفيروسات فى مجال الهندسة الوراثية .. يراجع Hull (١٩٨٣) .

وقد تبين من الدراسات التى أجريت على التحولات الوراثية فى الفطريات والخلايا الحيوانية أن عدم وجود الجدر الخلوية أو التخلص منها ، وتحضين البروتوبلازم مع الـ DNA المرغوب فيه فى ظروف مهيئة للاندماج البروتوبلازمى يعد ضرورياً لزيادة كفاءة عملية التحول الوراثى ، ويستفاد من ذلك فى النباتات بتحضين البروتوبلازم مع ناقل

أومَّجه الـ دي إن إيه DNA vector الذى يحمل الجين المرغوب . يظهر تأثير الجين بعد أن يكتسب البروتوبلازم الجدر الخلوية من جديد ، ثم تتميز منه النباتات التى نقل إليها هذا الجين . يقتصر اتباع هذه الطريقة فى الوقت الحاضر على النباتات التى تنجح فيها زراعة البروتوبلازم وتتميز منها النباتات ، وأغلبها من العائلة الباذنجانية .

ويتجه البعض إلى الحقن المباشر للـ دي إن إيه المرغوب فيه - بعد تنقيته - فى جاميطات النبات الذى يُراد تحويله وراثياً ، وبذلك تصل الجينات المرغوبة إلى حبوب اللقاح أو البويضات مباشرة . يبدو أن لهذه الطريقة أهميتها فى نباتات الحبوب ، والبقول التى لم ينجح فيها إنتاج النباتات من مزارع البروتوبلازم ، بالإضافة إلى أن نباتات الحبوب هى من نوات الفلقة الواحدة التى لاتصاب بالبكتيريا *A. tumefaciens* .

وقد كانت آخر محاولات الهندسة الوراثية هى قذف النسيج النباتى الذى يراد تحويله وراثياً (مثل قطعة من نسيج ورقى أو مزرعة خلايا) بالجين المرغوب (الـ دي إن إيه النقى) وهو محمل على كريات صغيرة جداً beads ، ويستخدم لذلك جهاز خاص لقذف الجينات بقوة كبيرة تحت تفريغ ، يعرف باسم micro injector ؛ تخترق الكريات المحملة بالجينات خلايا النسيج النباتى الذى يعطى - عند وضعه فى بيئة مناسبة - نسيجاً من الكالس تكون بعض أجزائه من الخلايا التى حدث بها التحول الوراثى .

لقد فكر العلماء فى نقل الجينات *nif* المسئولة عن تثبيت النيتروجين الجوى (Nitrogen Fixation) من إحدى سلالات بكتيريا تثبتت أزوت الهواء الجوى من النوع *Rhizobium japonicum* التى تعيش معيشة تعاونية مع جذور فول الصويا - إلى المحاصيل الزراعية الهامة ؛ مثل القمح أو الذرة . وقد نجح العلماء فى عزل كروموسوم البكتيريا *R. japonicum* وتنقيته لإدخاله فى البكتيريا *Escherici coli* . وقدر أن إدخال الكروموسوم الكامل للبكتيريا *Rhizobium* فى البكتيريا *E. coli* يتطلب نحو ٢٠٠٠ - ٤٠٠٠ تحول وراثى مستقل *independent transformations* ، ووجد لدى فحص ٣٣٢٥ من هذه التحويلات الوراثية فى *E. coli* أن ٢١ منها احتوت على قطعة من دي إن إيه البكتيريا *R. japonicum* يوجد بها الجينات *nif* . وقد مكّن ذلك العلماء من دراسة تأثير هذه الجينات عند زراعة البكتيريا *E. coli* - التى نقلت إليها الجينات - فى بيئات صناعية . هذا .. ويتطلب تثبيت أزوت الهواء الجوى - بواسطة بكتيريا العقد الجذرية فى

جنور البقوليات - بذل طاقة كبيرة من جانب النبات ، وقد قدر أحد الباحثين أن الطاقة التي تفقد لهذا الغرض في حقول فول الصويا بالولايات المتحدة تعادل كل الطاقة التي تستخدمها بريطانيا لمدة ثلاثة شهور .

وقد تبين أن بعض سلالات البكتيريا *R. japonicum* تحتوى على جينات لاستقبال الأيدروجين hup genes ، وهو ما يعنى أن نباتات فول الصويا التي تحتوى عقدها الجذرية nodules على هذه البكتيريا تكون أكثر كفاءة من النباتات الأخرى . كما تبين أن هذه الجينات توجد على plasmids ، وهو ما يعنى إمكانية انتقالها من خلية بكتيرية إلى أخرى في حالات التزاوج البكتيرى Conjugation ، وإذا أمكن نقل هذه الجينات إلى البكتيريا *R. japonicum* التي تفتقر إليها .. فإن ذلك يوفر على النبات كثيراً من الطاقة التي تنعكس إيجابياً على المحصول (عن Valentine ١٩٨٢) .

إن الأهمية الكبرى للهندسة الوراثية تكمن في أنه أصبح في الإمكان فصل جينات مرغوب فيها بصورة نقية ، وإدخالها في نباتات من نفس النوع ، أو من أنواع أخرى . تماثل هذه الخطوة في نتائجها برنامجاً كاملاً للتربية بطريقة التهجين الرجعى ، دون الدخول في أى من مشاكل التربية ، خاصة ارتباط الصفات المرغوب فيها بصفات أخرى غير مرغوب فيها . كما أن تأثير الجين يتحدد - جزئياً - بموقعه من الجينات الأخرى على الكروموسوم ؛ وعليه .. فإن إدخال جين ما إلى مواقع مختلفة من الكروموسومات يعنى الحصول على تباينات وراثية ، لا تتوفر في الظروف الطبيعية ؛ نظراً لأن الجين يحتل موقعاً ثابتاً على الكروموسوم . ومن المؤكد أن النباتات الجديدة المتحولة وراثياً .. سوف تختلف في عدد نسخ الجين التي تنتقل إليها ، والموقع (أو المواقع) الكروموسومية التي تستقر بها هذه النسخ الجينية وينتج عن ذلك كله .. تباينات لا حصر لها ، قد يكون بعضها مرغوباً فيه ؛ ويعنى ذلك أن خطوة انتخاب النباتات المرغوب فيها بعد إحداث التحول الوراثى لا تقل أهمية عن عملية التحول الوراثى ذاتها ، كما يعنى - كذلك - ضرورة إنتاج تحولات وراثية كثيرة ؛ لكى تزيد فرصة الحصول على تغيرات مرغوب فيها (عن Flavell ١٩٨٢) .

تبقى كلمة أخيرة في هذا الموضوع ، وهى أن تربية النبات ليست مجرد نقل جين مرغوب فيه من نوع نباتى إلى آخر ، بل إنها تتضمن خطوات كثيرة ، وتقييماً مستمراً لكى ينتهى البرنامج بصنف يقبله المزارعون ، والمستهلكون ، ويكون له مستقبل في الزراعة

التجارية ، ولايتحقق ذلك بالهندسة الوراثية وحدها ؛ فلا بد من التعاون الوثيق بين علماء الهندسة الوراثية ، ومربي النبات ، لكي تعطى الهندسة الوراثية ثمارها ؛ فهي ليست أكثر من أداة لزيادة الاختلافات الوراثية ، أما تطوير الجيرمبلازم الجديد إلى أن يصبح صنفاً مقبولاً .. فإنه يبقى من مهام مربي النبات (عن Moore ١٩٨٨) .

وينبغي أن نتذكر أن الهندسة الوراثية لم تثمر - حتى الآن - صنفاً واحداً جديداً من الطماطم - مثلاً - التي تعد من أكثر المحاصيل ، التي أجريت عليها دراسات الهندسة الوراثية ، وأكثرها مناسبة لهذه النوعية من الدراسات (Fobes ١٩٨٧) ولا يمكننا عمل توقعات بشأن ما يمكن أن تضيفه الهندسة الوراثية إلى تربية النبات ، إلى أن تظهر فعلاً بعض هذه الإضافات إلى حيز الوجود (Ryder ١٩٨٤) ، مثلما ظهرت بالنسبة لحقل الطب ؛ حيث كان أول نشاط عملي للهندسة الوراثية تحديد وتنقية الجين المسئول عن إنتاج هرمون الأنسولين وإدخاله في البكتريا *E. coli* بواسطة الـ T-i plasmid لتصبح بنورها قادرة على إنتاج الأنسولين عوضاً عن استخراجة من غدد الحيوانات المذبوحة (عن نجار ١٩٨٦) .

وليزيد من التفاصيل عن الهندسة الوراثية واستخداماتها في مجال تحسين النباتات .. يراجع McDaniel (١٩٨١) ، و Panopoulos (١٩٨١) ، و Rachie & Lyman (١٩٨١) ، و Univ . Calif . (١٩٨٢) ، و Flavell (١٩٨٢) ، و Bliss (١٩٨٤) .

القسم الرابع

الجوانب العملية والإجرائية فى تربية النبات

الفصل التاسع عشر

أساسيات وطرق إجراء التلقيحات فى النباتات

لايكاد يخلو أى برنامج لتربية النباتات من إجراء التلقيحات ، سواء أكانت ذاتية ، أم خليطة بين النباتات المنتخبة ؛ لذا .. فإن الإلمام بطبيعة الإزهار فى المحصول ، والعوامل التى تتحكم فيه ، وطرق إجراء التلقيحات الذاتية والخلطية به .. تعد من الأمور المهمة بالنسبة للمربي ، وهى التى نتناولها بالدراسة فى هذا الفصل . وتجنباً للتكرار .. فإن على المربي أن يكون ملماً بكافة الحقائق النباتية والوراثية التى تتعلق بالمحصول ، والتى سبق بيانها فى القسم الأول من هذا الكتاب ، خاصة .. تلك التى تتعلق بطرق تكاثر المحصول ، التى وردت فى الفصل الثانى .

دفع النباتات إلى الإزهار

تنبغى زراعة المحصول الذى يُراد تربيته فى الموعد المناسب لإزهاره ؛ نظراً لأن الإزهار يتأثر نوعياً (أى يحدث أو لا يحدث) ، وكمياً (أى بالنسبة لموعده وكثافته) بالعوامل البيئية ، خاصة : درجة الحرارة ، والفترة الضوئية . وتعد دراسة الإزهار والعوامل المتحكمة فيه من الأمور الفسيولوجية التى يمكن الرجوع إلى تفاصيلها فى المراجع التى تتناول هذا الموضوع ؛ مثل Devlin (١٩٧٥) ، Leopold & Kriedmann (١٩٧٥) ، و Vince ، و Prue - (١٩٧٥) ، و Salisbury (١٩٨٢) ، وحسن (١٩٨٨) .

ويلجأ المربي - أحيانا - إلى طرق خاصة لدفع النباتات نحو الإزهار ؛ لتحقيق أحد هدفين كما يلي :

١- تقصير فترة برنامج التربية ؛ بدفع النباتات نحو الإزهار فى وقت مبكر عما يحدث فى الظروف الطبيعية ، ويتم ذلك بالتحكم فى درجات الحرارة ، والفترة الضوئية ، مع زراعة النباتات فى بيوت محمية .

٢- الحصول على بنور من محاصيل تتكاثر خضريا فى الطبيعية ، ونادراً ما تزهر فى الظروف الطبيعية ، ومن أمثلتها .. البطاطا التى لاتزهر عادة ، ولكن أمكن دفعها للإزهار بالطرق التالية :

أ- تربية النباتات على أسلاك ، مع تحليقها جزئياً ؛ لتقليل تدفق الغذاء المجهز إلى الجذور الدرنية ، بغرض زيادة المواد الكربوهيدراتية فى النموات الخضرية .

ب- تطعيم الأصناف الصعبة الإزهار على الأصناف السهلة الإزهار ، ويؤدى ذلك إلى التبركير فى الإزهار ، مع زيادة نسبة النباتات المزهرة ، وعدد الأزهار المنتجة يومياً .

العوامل التى يجب مراعاتها عند إجراء التلقيحات

يجب مراعاة العوامل التالية عند إجراء التلقيحات :

١- مدى تركيز الصفات المرغوب فيها فى الآباء المستخدمة فى التلقيحات :

يتطلب الأمر - أحيانا - إخضاع الآباء المستخدمة فى التلقيحات للتربية الداخلية قبل إجراء التلقيحات ؛ بغرض زيادة تركيز الصفات المرغوبة بها ، وجعلها فى حالة أصيلة ، ولاتكون هذه الخطوة ضرورية إذا وجدت الصفات المرغوبة بحالة أصيلة ، بمعنى أنه ليس ضرورياً ولا مرغوباً - فى المحاصيل الخليفة بطبيعتها - أن تكون الآباء المستخدمة فى التلقيحات أصيلة فى غير الصفات المرغوبة . وقد يتطلب الأمر فى حالات أخرى تلقيح صنفين متوسطين فى درجة ظهور الصفة المرغوبة ؛ بغرض الحصول على انعزالات فائقة الحنود ، تحتوى على الصفات المرغوبة بدرجة أكثر تركيزاً لاستعمالها كآباء فى التلقيحات .

٢- عدد التلقيحات التى ينبغى عملها للحصول على البذور المطلوبة ، ويتوقف ذلك على عدد البذور التى تنتج من كل تلقيح ، وعلى استخدامات هذه البذور ، أهى لبرامج التربية أم أنها للهجن التجارية .

٣- العوامل المؤثرة على عقد البنور ، التى منها ما يلى :

أ- العوامل البيئية ؛ خاصة درجة الحرارة ، والرطوبة الجوية ، والرياح .

ب- حالة النبات الفسيولوجية ، وهى التى تتأثر بقوة النمو النباتى ، وكثافة العقد السابقة ، وكون الثمار التى سبق تكوينها طبيعياً - قبل التلقيحات - قد خفت أم تركت لتنمو .

ج- درجة إتقان عملية التلقيح اليدوى ، ومدى إتلاف الزهرة عند تناولها ، ومدى خدش المياسم ، ونوع الغطاء المستعمل فى حماية الزهرة من التلوث بحبوب لقاح غريبة قبل إجراء التلقيحات وبعد إجرائها ، وكمية حبوب اللقاح المستخدمة فى التلقيح .

٤- طرق حماية الأزهار من التلوث بحبوب اللقاح الغريبة :

تجب مراعاة ما يلى :

أ- تكييس أزهار النباتات المستخدمة كأباء قبل تفتحها بيوم ، لمنع تلوثها بحبوب لقاح غريبة ، وبعد هذا الإجراء ضرورة حتمية بالنسبة للمحاصيل الخلطية التلقيح .

ب- تكييس الأزهار الأنثوية للنباتات المستخدمة كأمهات (عندما تكون وحيدة الجنس) ، قبل تفتحها بيوم ؛ لمنع تلوثها - كذلك - بحبوب لقاح غريبة .

ج- خصى الأزهار الخنثى للنباتات المستخدمة كأمهات قبل تفتحها بيوم ، ثم تكييسها لمنع تلوث مياسمها بحبوب لقاح من نفس الزهرة ، أو من أزهار أخرى . ولا تكون عملية الخصى ضرورية عندما تكون الأزهار عقيمة ذاتياً بدرجة عالية ؛ بسبب وجود ظاهرة عدم التوافق الذاتى ، أو العقم الذكورى ، أو اختلاف موعد نضج أعضاء الزهرة الجنسية .

د- تكييس الأزهار بعد إجراء التلقيحات ، وبعد هذا الإجراء ضرورة حتمية بالنسبة للمحاصيل الخلطية التلقيح ، ولكنه ربما لا يكون ضرورياً فى حالة المحاصيل الذاتية التلقيح ، خاصة عند ضعف النشاط الحشرى .

هـ- تعقيم الأصابع والأدوات التى تلامس حبوب اللقاح قبل كل تلقيح ، بغمسها فى الكحول .

ويمكن الحماية من التلوث بحبوب اللقاح الغريبة بعدة طرق ، منها ما يلى : زراعة النباتات فى معزل داخل حجرات زجاجية (عندما يكون التلقيح خلطياً بالهواء) ، أو

حجرات سلكية (عندما يكون التلقيح خلطياً بالحشرات) ، أو بتغطية النورات ، أو الأزهار باكياس قماشية ، أو ورقية : ويمكن غلق الأزهار المتوسطة والكبيرة الحجم بكبسولات خاصة ، كما يمكن غلق الأزهار الصغيرة والمتوسطة الحجم بكبسولات جيلاتينية فارغة ، أو بلف قطعة صغيرة من القطن حولها .

يراعى عند استخدام كبسولات الجيلاتين اختيار كبسولة بحجم يناسب زهرة النبات الذى يراد تلقيحه . يعمل بأحد جزأى الكبسولة قطع صغير على شكل حرف V وتدفع الزهرة داخل هذا الجزء ، مع جعل عنقها فى الفتحة التى على شكل حرف V ، ثم يغلق على الزهرة بالجزء الثانى من الكبسولة ، بحيث يبرز عنق الزهرة من الفتحة ، ويمكن لف قطعة قطن مبللة بالماء حول عنق الزهرة ، لإحكام غلق الكبسولة ، كما يمكن استبدال الماء المستخدم فى بل قطعة القطن بمحلول لأحد منظّمات النمو المناسبة ، التى يمكن أن تساعد على العقد ، وتمنع تساقط الأزهار فى التلقيحات البعيدة (McArdle & Bouwkamp ١٩٨٠) . ويمكن فتح الكبسولة - بسهولة - بعد التأكد من نجاح التلقيح بإعادة بلك قطعة القطن بالماء . ويكتفى - أحيانا - بتغطية الزهرة الملقحة بنصف كبسولة مع لف قطعة من القطن حول عنق الزهرة .

وقد وجدت Ng (١٩٨٨) أن تغطية خطوط نباتات القاوون فى الحقل بأغطية البوليستر المحمولة على النباتات Spun - bonded Polyster Covers - مع ردم حواف الغطاء بالتربة - كان بديلاً جيداً للأقفاس ، أو الحجرات السلكية wire mesh cages ؛ إذ أدى الغطاء إلى منع الحشرات من عمل تلقيحات غير مرغوب فيها ، وظلت النباتات المغطاة ، دون عقد إلى حين الرغبة فى إجراء التلقيحات اليدوية بها ، كما أمكن تلقيحها - ذاتياً - بسهولة بإدخال النحل تحت الغطاء ، ويتوقع نجاح هذه الطريقة مع بعض المحاصيل الأخرى مثل : الخيار والكوسة .

٥- طرق إجراء عملية الخصى :

تتبع فى خصى الأزهار إحدى الطرق التالية :

أ- إزالة المتوك أو الأسدية بأكملها بالمלקط ، أو ظفر الإبهام ، أو مجرد قطع النورة المذكورة كما فى النورة .

ب- التخلص من حبوب اللقاح بغمس الزهرة فى كحول إيثيلى ٨٥٪ لمدة ١٠ دقائق كما فى حالة البرسيم الحجازى .

ج- قتل حبوب اللقاح بالمعاملة بالماء البارد ، أو الساخن ؛ فينجح التبريد - إلى درجة الصفر - مع القمح والأرز ؛ كما يمكن التخلص من حبوب اللقاح فى الذرة الرفيعة ، والأرز ، وبعض النجيليات الأخرى ؛ بغمس أزهارها مدة تتراوح من دقيقة إلى عشر دقائق فى ماء تتراوح درجة حرارته من ٤٥ - ٤٨ °م . وتجرى المعاملة بالماء البارد ، أو الساخن ؛ بغمس الأزهار فى ترموس ذى فوهة واسعة مملوء بالماء إلى الدرجة المطلوبة .

د- شطف حبوب اللقاح بجهاز يحدث تفريغاً .

٦- موعد عملية التلقيح وطبيعة الإزهار :

قد يجرى التلقيح فى نفس وقت إجراء عملية الخصى كما فى الطماطم ، أو فى صباح اليوم التالى كما فى القرعيات ، أو بعد ١ - ٥ أيام من عملية الخصى كما فى محاصيل الحبوب .

يتطلب نجاح التلقيحات معرفة موعد تفتح الأزهار ، وموعد نثر حبوب اللقاح ، وموعد استعداد المياسم للتلقيح .

٧- توافق موعد الإزهار فى الآباء :

غنى عن البيان أن الصنفين الملقحين يجب أن يزهرا -معاً- فى وقت واحد . ويمكن تأمين ذلك باختيار الموعد المناسب للزراعة إذا عرف - سلفاً - موعد إزهار الآباء ، أو بزراعة أحد الصنفين فى ٣ - ٤ مواعيد على فترات كل أسبوعين ؛ حتى يتوافق الإزهار فى إحدى هذه الزراعات مع الإزهار فى الصنف الآخر .

٨- طرق تجميع حبوب اللقاح ومعاملة المياسم بها :

يكفى - فى حالات العقم الذكري - ضم نورات الآباء الخصبة الذكر ، ونورات الأمهات العقيم الذكر - معاً - فى كيس قماش cage واحد ، مع إدخال بعض الذباب الخالى من حبوب اللقاح الغريبة داخل الكيس ، لإتمام عملية التلقيح كما فى الخس . ويمكن فى محاصيل أخرى هز الأزهار ، أو النورات المكيسة - معاً - على فترات ؛ لإتمام عملية

التلقيح . وقد تجمع حبوب اللقاح من الآباء داخل أكياس ورقية كما فى الذرة ؛ أو تجمع يدوياً ، أو بواسطة آلة يدوية صغيرة ، تعمل بالبطارية وتولد ذبذبات تساعد على انتشار حبوب اللقاح من المتوك كما فى الطماطم . وتضاف حبوب اللقاح إلى المياسم ، إما بواسطة فرشاة من شعر الجمل ، وإما بإمرار الميسم برفق على ظفر الإبهام بعد تجميع حبوب اللقاح عليه ، وإما بقطف زهرة الأب ، وجعل متكها يلامس ميسم زهرة الأم كما فى القرعيات .

٩- حيوية حبوب اللقاح :

تفقد حبوب اللقاح حيويتها فى خلال دقائق معدودة من انتشارها من المتوك فى بعض المحاصيل كما فى كثير من الحبوب . ويلزم - فى هذه الحالة - جمع حبوب اللقاح من زهرة حديثة التفتح فى نفس الموقع الذى تجرى فيه عملية التلقيح . هذا .. بينما يمكن تجميع وحفظ حبوب لقاح بعض أنواع الفاكهة لعدة أشهر ، أو سنوات ، دون أن تفقد حيويتها . كما يمكن - فى كثير من الأشجار الخشبية - حفظ أفرع صغيرة منها تحتوى على براعم زهرية فى حرارة منخفضة إلى حين الوقت المناسب للتلقيح .

١٠- تسجيل بيانات التلقيح :

تسجل البيانات الخاصة بكل تلقيح على لافتة ورقية label ، تثبت على عنق الزهرة الملقحة . ويوضح على اللافتة أسماء الأصناف أو السلالات المستخدمة فى التلقيح ، مع كتابة الأم أولاً ؛ وقد يتطلب الأمر - فى بعض الحالات - توضيح أرقام النباتات المستخدمة فى التلقيح من كل من صنفى الآباء ، كما يفيد تسجيل تاريخ إجراء التلقيح ، والأحرف الأولى لاسم القائم بالعمل .

طرق إجراء التلقيحات

تختلف تفاصيل طريقة إجراء التلقيحات من محصول إلى آخر . وسوف نتناول بالدراسة فى هذا الجزء بعض المحاصيل كأمثلة ، أما تفاصيل طرق التلقيحات فى شتى

النباتات .. فيمكن الاطلاع عليها فى المراجع التالية :

المراجع	المحاصيل التى يتناول المراجع طرق إجراء التلقيحات فيها
U . S . D . A (١٩٣٧)	أنواع محصولية كثيرة ومتنوعة
Hayes وآخرون (١٩٥٥)	محاصيل الحقل
عبد العال (١٩٦٤)	محاصيل الخضر
Darrow (١٩٦٦)	الشليك
Bhandari (١٩٧٩)	محاصيل الحقل خاصة
Poehlman (١٩٧٩)	محاصيل الحقل
Fehr & Hadley (١٩٨٠)	أنواع محصولية كثيرة ومتنوعة
Janic & Moore (١٩٨٣)	محاصيل الفاكهة
Layne (١٩٨٣)	محاصيل الفاكهة
إلياس ومحمد (١٩٨٥)	محاصيل الحقل والخضر
Bassett (١٩٨٦)	محاصيل الخضر

ونبين - فيما يلى - الطرق الشائعة لإجراء التلقيحات فى عدد من محاصيل الحقل والخضر ، والفاكهة ، ونباتات الزينة .

التلقيحات فى بعض محاصيل الحقل

١- القمح والشعير :

تخصى أزهار الآباء قبل تفتح المتوك ، ويستدل على صلاحيتها للخصى بخروج مسن ٢ - ٣ من السفا من قمة الغمد . تزال السنبيلات المحملة على الثلث العلوى لمحور السنبلة بالمقص ، وتلك المحملة على الثلث السفلى بالملقط ، ويحتفظ فقط بنحو ١٠ - ١٤ سنبيلة وسطية . تخصى الزهرة الوحيدة الموجودة بكل سنبيلة فى الشعير ، وزهرتان فقط من تلك التى توجد بكل من سنبيلات القمح ، وتزال بقية الأزهار . يجرى الخصى بعمل شق فى جانب العصيفة بسن الملقط ، ثم سحب المتوك إلى الخارج . تكيس الزهرة بعد ذلك بكيس من الجلاسين مقاس ٧ × ١٥ سم ، ويكون إجراء عملية الخصى فى أى وقت من النهار .

يجرى التلقيح بعد ٢ - ٣ أيام من الخصى ، ويستدل على صلاحية الأزهار للتلقيح من انفتاح الميسم الريشى . تجمع حبوب اللقاح من سنابل سبق تكيسها قبل تفتح أزهارها .

تؤخذ المتوك الصفراء الناضجة التي لم تنتثر حبوب لقاحها بعد ، فيما بين العاشرة صباحاً والثانية عشرة ظهراً ، وتوضع فى وعاء زجاجى صغير ذى غطاء مع تعريض الوعاء للشمس ؛ حتى تنتثر حبوب اللقاح من المتوك . يؤخذ متك واحد ، ويغمس فى حبوب اللقاح بواسطة ملقط ، ثم يوضح على ميسم الزهرة المخصبة . وبعد الانتهاء من تلقيح جميع أزهار السنبلة بهذه الطريقة .. يعاد تكييفها .

وقد وجد أن تبريد السنبال إلى درجة - ٢م إلى ٢م لمدة ١٥-٢٤ ساعة يؤدي إلى قتل نسبة كبيرة من حبوب اللقاح . وتعد تلك طريقة سهلة للخصى ، وهى تفيد عند الرغبة فى الحصول على كمية كبيرة من البنور المهجنة ، ويشتراط لنجاحها احتواء سلالة الأب على صفة سائدة واضحة ، لا توجد فى الأم ؛ ليتمكن تمييز الهجن عن النباتات التى تنتج من التلقيح الذاتى .

٢- القطن :

تحدث فى القطن نسبة من التلقيح الخلطى الطبيعى ، تصل إلى نحو ١٥٪ . ولتأكيد حدوث التلقيح الذاتى .. تمنع الأزهار من التفتح بسكب عدة نقاط من محلول خلات السيليلوز فى الأسيتون على قمة تويج البرعم الزهرى قبل تفتحه بيوم ، علماً بأن الأوراق التوجيهية تكون ملتفة على بعضها - حينئذ - بارتفاع ٣ - ٤ سم . يتبخر الأسيتون بسرعة ، ويترك وراءه مادة صمغية تلتصق الأوراق التوجيهية معاً ، وتمنع تفتحها . تسقط الأوراق التوجيهية مع الأنبوبة السدائية بعد المعاملة بنحو ٢ - ٣ أيام ، وهى الفترة التى يحدث خلالها التلقيح الذاتى الطبيعى .

ولإجراء الخصى .. تختار البراعم الزهرية التى يمكن أن تفتح فى اليوم التالى ، ويعمل شق فى الكأس والتويج بسن الملقط ، مع مراعاة عدم ملامسة المبيض ، ثم تزال الأوراق التوجيهية مع الأنبوبة السدائية . تغطى الزهرة - بعد ذلك - بكيس ورقى بحجم مناسب ، أو ينكس على قلم الزهرة قطعة صغيرة من ماصة شراب أغلقت إحدى نهايتيها .

يجرى التلقيح - فى صباح اليوم التالى - فيما بين الساعة ٩ - ١٢ ظهراً . تمرر أنبوبة سدائية ، مغطاة بحبوب اللقاح على ميسم الزهرة ، ثم ينكس على القلم قطعة صغيرة من ماصة شراب ، ويضغط عليها إلى أن تصل نهايتها السفلى إلى المبيض ، ثم تغلق نهايتها

العلوية . ويفضل التبكير بإجراء التلقيح فى بداية موسم الإزهار كلما كان ذلك ممكناً .

٣- الكتان :

تتراوح نسبة التلقيح الخلطى الطبيعى فى الكتان من ١ - ٦٪ . تجرى عملية الخصى بعد الظهر على البراعم الزهرية التى يتوقع تفتحها فى اليوم التالى ، وهى التى يبدو فيها التويج على شكل مخروط . ينزع التويج بالملقط وتزال المتوك ، ثم يغطى البرعم بكيس من الجلاسين .

يجرى التلقيح فى صباح اليوم التالى بإمرار منك زهرة الأب على مياسم أزهار الأمهات التى سبق خصيها ، أو بإضافة حبوب اللقاح بفرشاة صغيرة بعد جمعها من نباتات الآباء ، ويعاد بعد ذلك تكييس الأزهار الملقحة .

٤- الذرة :

تنضج الأعضاء الذكرية (النورة الذكرية) فى الذرة قبل الأعضاء الأنثوية (النورة المؤنثة) ، وتستمر النورة الذكرية للنبات الواحد فى إنتاج حبوب اللقاح لمدة ٤ - ١٤ يوما ، وتحافظ حبوب اللقاح على حيويتها لمدة ٢٤ ساعة بعد إنتاجها . ولإجراء التلقيح الذاتى .. تغطى النورة الأنثوية بكيس ورقى قبل ظهور الحريرة من قمة الكوز بيوم أو يومين ، وتغطى النورة الذكرية بكيس آخر فى اليوم نفسه . وعند ظهور الحريرة .. تقطع قمة الغلاف المحيط بالنورة الأنثوية بمقص حاد ، ثم تعاد تغطيتها . تظهر خيوط الحريرة فى اليوم التالى ، وحينئذ .. تجمع حبوب اللقاح فى نفس الكيس المغلف للنورة المذكرة ، ثم تقطع قمة الكيس الورقى للنورة المؤنثة وتسكب عليها حبوب اللقاح ، ثم تغطى بنفس الكيس الذى توجد به حبوب اللقاح .

ولا يختلف التهجين عن التلقيح الذاتى سوى فى نقل حبوب اللقاح من صنف إلى آخر . ويفضل قرط من ١ - ٢ سم من أغلفة النورة المؤنثة عند ظهور الحريرة ، وإعادة تغطيتها ، ثم إجراء التلقيح فى اليوم التالى ؛ حيث تكون جميع المياسم حديثة ومتماثلة فى الطول .

يفضل إجراء عملية التلقيح بعد الظهر ، لأن انتشار حبوب اللقاح يستمر حتى الساعة الواحدة بعد الظهر . تجمع حبوب اللقاح بثنى النورة المكيسة ، ثم الطرق عليها وعلى الكيس

باليدين عدة طرقات ، ثم تنقل حبوب اللقاح بالكيس ، وتسكب على النورة المؤنثة ، وتغطى بنفس الكيس الذى جُمعت فيه حبوب اللقاح .

٥- الأرز :

تتراوح نسبة التلقيح الخلطى الطبيعى فى الأرز من ٥٠ - ٤٠ ٪ . وتجرى عملية الخصى على ١٠ - ٢٠ سننبيلة فقط من كل نورة ، وتزال بقية السننبيلات (تحتوى نورة الأرز الدالية على ٥٠ - ٥٠٠ سننبيلة ، تحتوى كل منها على زهرة واحدة) تقطع قمة كل زهرة بالمقص ، لكى تظهر المتوك التى تزال بالملقط مع مراعاة التأكد من أن المتوك المزالة مازالت خضراء اللون ؛ لاحتمال حدوث التلقيح الذاتى فى الأزهار التى تحولت متوكها إلى اللون الأصفر ، يفضل إجراء عملية الخصى فى الصباح الباكر ، وتكيس النورات المخصية بعد ذلك .

ويمكن إجراء عملية الخصى بالماء الساخن ، وتختار لذلك النورات التى ظهر ثلثاها على الأقل من الغمد ، تغمس هذه النورات فى ترموس سعة لتر ، ذى فوهة واسعة ، يمتلئ بالماء على درجة ٤٠ - ٤٤°م ، وتترك النورات على هذا الوضع لمدة ١٠ دقائق . ويمكن الاستعانة بحامل ثلاثى الأرجل لوضع الترموس عليه ، ويلاحظ - عند رفع النورة من الماء الساخن انفتاح بعض الأزهار ، وهى التى تكون مستعدة للتلقيح ، وبقاء البعض الآخر مغلقا . وتزال جميع الأزهار ، التى تبقى مغلقة ، بينما تلقح الأزهار المتفتحة بنقل حبوب لقاح الآباء إلى مياسمها ، وتجرى عملية التلقيح بجمع حبوب اللقاح فيما بين العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر ، من الأزهار التى يتوقع تفتحها فى نفس اليوم - وهى التى تعرف بظهور المتوك من قمة أغلفتها الزهرية - وتوضع حبوب اللقاح فى وعاء زجاجى صغير لحين استعمالها . ويتم التلقيح بإدخال متك ناضج فى كل سننبيلة سبق خصيها ، ثم يعاد تغطية النورة (الخش وخضر ١٩٧٧ ، إلياس ومحمد ١٩٨٥) .

التلقيحات فى بعض محاصيل الخضر

١- الفول الرومى :

لإجراء عملية الخصى .. تختار البراعم الزهرية التى يبلغ طولها نحو سنتيمتر واحد ، وهى التى تغلف فيها أوراق الكأس والتويج أعضاء الزهرة الجنسية تماما . تزال أوراق

الكأس بالملقط ، ثم أوراق التويج ، فالمتوك ، وتترك الأزهار المخصية دون غطاء ، إذا أجرى التلقيح فى البيوت المحمية ، أو تغطى النورة - بعد إزالة بقية الأزهار غير المخصية منها - إذا أجرى التلقيح فى الحقل . ويجرى التلقيح بعد يوم إلى يومين من الخصى ، حينما تظهر على الميسم شعيرات دقيقة . وتنقل حبوب اللقاح من أزهار تفتحت فى نفس يوم التلقيح بواسطة الملقط إلى ميسم الأزهار المخصية .

٢- البامية :

تلتحم أسدية الزهرة لتكون أنبوبة سدائية تحيط بالمتاع ، وتحمل المتوك على امتداد طولها . يجرى الخصى بعد ظهر اليوم السابق لتفتح الأزهار بشق الأنبوبة السدائية بسن الملقط ، ثم إزالتها تماماً من حول المبيض والقلم ، مع الاحتراس ؛ حتى لا يخدش المبيض ، أو القلم ، وتكيس الأزهار المخصية ، وتكيس معها فى الوقت نفسه البراعم الزهرية لنباتات الآباء . ويجرى التلقيح فى صباح اليوم التالى بنقل حبوب اللقاح من زهرة الأب ، ووضعها على ميسم زهرة الأم ، ثم تكيس الأزهار الملقحة .

٣- الطماطم :

لاتكيس أزهار نباتات الآباء إلا فى حالات نادرة عند توفر الحشرات التى تزور أزهار الطماطم . ولإجراء عملية الخصى .. تختار البراعم الزهرية التى يتوقع تفتحها فى اليوم التالى ، وهى التى تكون بثلاثتها ملتفة تماماً حول بعضها ، وبطول حوالى سنتيمتر واحد . تزال سبلة واحدة من قاعدتها بالملقط ، ثم يدفع سن الملقط برفق خلال التويج والأنبوبة المتكئة التى تحيط بالمبيض والقلم ، ثم يزال التويج والطلع كاملين بالملقط فى عملية واحدة ، مع الاحتراس ، حتى لا يخدش المبيض . يجرى التلقيح بعد الخصى مباشرة ؛ بجمع حبوب اللقاح من أزهار نباتات الآباء ، ونقلها إلى ميسم الأزهار المخصية . وتجمع حبوب اللقاح بإمرار سن الملقط بين اثنين من المتوك الملتحمة ، ثم فتح الأنبوبة المتكئة وتكيسها - وهى مفتوحة - على ظفر الإبهام ، ثم الطرق عليها برفق لنثر حبوب اللقاح عليه . وتنقل حبوب اللقاح إلى الميسم بإمراره - برفق - على ظفر الإبهام الذى تتجمع عليه حبوب اللقاح .

٤- القرعيات (الخيار والكوسة ، والبطيخ ، والشمام ، والقاوون) :

تكيس ، أو تغلق البراعم الزهرية المذكورة لنباتات الآباء بكبسات بعد ظهر اليوم السابق

لتفتح الأزهار ، وبينما لا تحتاج النباتات الوحيدة الجنس الوحيدة المسكن إلى عملية الخصى (حيث يكتفى فيها كذلك بغلق البراعم الزهرية المؤنثة بعد ظهر اليوم السابق لتفتح الأزهار) .. فإن الأزهار الخنثى للنباتات الـ andromonecious (أى التى تحمل أزهاراً مذكرة ، وأزهاراً خنثى على نفس النبات) يلزم خصيها . وتجري عملية الخصى بعد ظهر اليوم السابق لتفتح الأزهار بإزالة أوراق التويج ، والمتوك بالملقط ، ثم تكيّس الأزهار المخصية . وفى صباح اليوم التالى .. يجرى التلقيح بنقل متك زهرة الأب ، وإمراره برفق على ميسم زهرة الأم ، ثم غلق الزهرة الملقحة .

٥- البصل :

تتفتح أزهار النورة الواحدة على مدى أسبوعين ، وتجمع حبوب اللقاح اللازمة للتلقيحات بتكيس النورة فى اليوم الذى تتفتح فيه أولى الأزهار بها ، ويطرق على النورة والكيس - يوماً - بعد الظهر ، للمساعدة على انتشار حبوب اللقاح داخل الكيس .

تجرى التلقيحات فى البصل بزراعة نباتات الأمهات ونباتات الآباء فى خطين متجاورين ، وتكيّس نورات الآباء عند تفتح أول زهرة بها ، أما نورات الأمهات .. فتزال منها الأزهار التى تتفتح بها يوماً (تحمل النورة الواحدة من ٥٠ - ٢٠٠٠ زهرة) ، أو مرتين يوماً فى الجو الحار ، وتستمر الحال على هذا النحو إلى أن يصبح النبات فى أوج إزهاره ؛ حيث يخصى أكبر عدد من البراعم الزهرية كبيرة السن ، وتزال بقية الأزهار المتفتحة والبراعم الزهرية التى لم تخص ، وتوضع النورة ذات الأزهار المخصية - بعد ذلك - داخل قفص من الشاش ، كما تقطع النورة المذكورة ، وتوضع داخل القفص نفسه فى زجاجة بها ماء ، مع وضع ذباب مترلئى نظيف معها لإتمام عملية التلقيح .

التلقيحات فى بعض محاصيل الفاكهة

١- التفاح والكمثرى :

تجرى عملية الخصى بإزالة المتوك من البراعم الزهرية قبل تفتحها بيوم ، أو يومين ، ويعد أفضل وقت لذلك عندما تكون البراعم على شكل بالون . تقطع قاعدة السبلات بسن الملقط ، ثم تنشى الأجزاء الزهرية على الجانب ، ويتخلص منها جميعاً فيما عدا المتاع . وتجري عملية التلقيح بعد الخصى مباشرة ، ويراعى عدم تلقيح أكثر من زهرتين بكل عنقود

زهري ، مع التخلص من بقية البراعم الزهرية والأزهار المتفتحة . تكيس النورات الملقة بعد ذلك مباشرة ، ويحصل على حبوب اللقاح اللازمة للتلقيح بقطف البراعم الزهرية لنباتات الآباء وهي على شكل بالون ، ووضعها في مكان دافئ جاف ، إلى أن تتفتح المتوك وتتفتح منها حبوب اللقاح ، ويحدث ذلك خلال فترة تتراوح من يوم إلى يومين . ويمكن - كذلك - قطع الأفرع التي تحتوى على البراعم الزهرية غير المتفتحة من نباتات الآباء ، ووضعها في غرفة ، أو بيت محمي (صوبة) ، مع غمر قاعدة الفرع في وعاء به ماء ، إلى أن تتفتح الأزهار . وتستخدم الأزهار المتفتحة هذه كمصدر لحبوب اللقاح اللازمة للتلقيح ، ويجرى التلقيح - عادة - بفرشاة من شعر الجمل . تزال الأكياس من على الأزهار الملقة عند تغير لون المياسم إلى اللون البنى ، ويمكن حصاد الثمار العاقدة قبل اكتمال نضجها ؛ حتى لا تفقد إذا سقطت مبكراً ، علماً بأن ذلك الإجراء لا يؤثر في حيوية البذور (Magness ١٩٣٧) .

٢- العنب :

تكيس العناقيد الزهرية لنباتات الآباء قبل تفتح البراعم ، لحمايتها من التلوث بحبوب اللقاح الغريبة . تتجمع حبوب اللقاح داخل الكيس ، ويمكن نقلها إلى أزهار نباتات الأمهات مباشرة . تخصي أزهار نباتات الأمهات قبل تفتحها وانتشار حبوب اللقاح منها ، ثم تكيس ، وتلقح بعد ذلك بنحو يومين ، ثم تكيس مرة أخرى (Snyder ١٩٣٧) .

٣- الخوخ والمشمش ، والبرقوق :

تجمع حبوب اللقاح اللازمة للتلقيحات ؛ بأخذ أفرع تحتوى على براعم زهرية غير متفتحة من نباتات الآباء وتركها في مكان دافئ نسبياً وجاف ، إلى أن تتفتح الأزهار تجمع متوك الأزهار - بعد ذلك - بإمرار مشط على الخيوط ، وتترك المتوك في وعاء في درجة حرارة الغرفة إلى أن تجف ؛ حيث تخرج منها حبوب اللقاح بسهولة حينئذ . وتخزن حبوب اللقاح في مكان بارد وجاف إلى حين استعمالها .

يسمح تركيب أزهار الفواكه ذات النواة الحجرية بإجراء عملية تخصي أزهار نباتات الأمهات بسهولة ، فنجد أن الطلع والمتاع يوجدان داخل البتلات المطوية ، ومع نمو البرعم .. يندفع الكأس إلى أعلى حاملاً التويج الذي يكون على شكل فنجان حول المبيض . هذا ..

بينما يستطيل القلم لأعلى من خلال الأسدية ، ويندفع - أحياناً - من خلال البتلات .
ويسهل - عند الخصى - قطع فنجان الكأس بالملقط ، ثم قطع التويج ، والطلع بعد ذلك .
ومن الطبيعى أن عملية الخصى لاتجرى على الأصناف العقيمة ذاتياً . تكيس الأزهار -
بعد ذلك - إلى أن يحين موعد تلقيحها .

تلقح الأزهار المخصية بفرشاة من شعر الجمل بها حبوب لقاح الأب ، وتكيس الأزهار
بعد التلقيح لحمايتها من حبوب اللقاح الغريبة ، وحينما يتغير لون المياسم إلى اللون البنى ..
يستبدل الكيس الورقى بكيس قماشى ، يثبت فى الفرع لحماية الثمرة النامية ، ولكى يكون
سقوط الثمرة فيه فى حالة سقوطها قبل قطفها .

٤- الموالح :

تجمع حبوب اللقاح اللازمة للتلقيحات من نباتات الآباء بتكيسها وهى ما زالت فى طور
البرعم ، وتترك إلى حين تفتح الأزهار وانتثار حبوب اللقاح منها ، وقد يستعمل اللقاح بعد
جمعه مباشرة ، أو يخزن لحين تفتح أزهار الأمهات . ويمكن تخزين حبوب اللقاح مدة
شهرين بتجفيفها جيداً فوق حامض الكبريتيك المركز ، ثم وضعها فى قنينة زجاجية تحت
تفريغ بخفض الضغط الجوى داخلها إلى ٠.٥ مم زئبقاً .

تخصى أزهار نباتات الأمهات بسهولة وهى فى طور البرعم ، ثم تكيس ، وتلقح الأزهار
المخصبة حينما تصبح مياسمها مستعدة لاستقبال اللقاح ، ثم تكيس مرة أخرى إلى أن تبدأ
الثمرة فى النمو ، ويوصى باستبدال الكيس الورقى بكيس آخر من القماش ، أو الشاش
لحماية الثمرة من الضياع فى حالة سقوطها قبل قطفها (Cullinan ١٩٣٧) .

التلقيحات فى بعض نباتات الزينة

١- الورد :

تخصى أزهار نباتات الأمهات وهى ما زالت فى طور البرعم ؛ بإمرار مشروط بحرص
- دائرياً - أسفل البتلات إلى أن تسقط جميعها وتظهر الأسدية ؛ حيث تزال جميعها بعناية
بالملقط مع الحرص حتى لاتصاب المياسم بضرر . تكيس الأزهار المخصية ، وتترك إلى أن
تصبح المياسم لزجة ومستعدة للتلقيح ، ويكون ذلك بعد يومين . أما أزهار الآباء .. فإنها

تكيس - هى الأخرى - وهى فى طور البرعمى ، لمنع تلوثها بحبوب لقاح غريبة ، ثم تجمع منها حبوب اللقاح بعد تمام تفتحها - فى زجاجة ساعة . يجرى التلقيح بفرشاة ، ثم تكيس الأزهار الملقحة مرة أخرى ، ويستدل على نجاح التلقيحات باستدارة الكأس وانتفاخه .

٢- بسلة الزهور :

تخصى أزهار نباتات الأمهات وهى ما زالت فى طور البرعم ؛ بإمرار إبرة بامتداد موضع اتصال حافتي العلم ، ثم يثنى العلم لأسفل ومعه أحد الجناحين ، فيظهر الزورق . يفتح نحو ٤ مم من قمة الزورق بالملقط ثم يضغط عليه لأسفل ، حتى تظهر الأسدية . تقطع المتوك مع جزء من الخيوط بواسطة ملقط . ويمكن إجراء التلقيح بعد الخصى مباشرة ، ولكن يفضل إجراؤه بعد نحو يوم ، ونصف يوم من الخصى حينما تكون المياسم مستعدة للتلقيح . ويحرى التلقيح بقطع ميسم زهرة حديثة التفتح ، محملا بحبوب اللقاح ، ووضعه على ميسم الزهرة المخصية .

٣- الأراولة :

تنتخب نورة متوسطة الانفراج (النورة رأس head) ، ويقص تويج أزهارها الشعاعية (الخارجية) من أعلى لإظهار الأقلام ، يختار عدد مناسب من الأزهار الشعاعية (وهى أزهار مؤنثة) ، وتزال بقية الأزهار الشعاعية ، وجميع الأزهار القرصية الداخلية (وهى أزهار خنثى) . تكيس النورة بعد ذلك ، وتترك إلى حين استطالة أقلام الأزهار المتبقية فيها ، ويكون ذلك فى ظرف أيام قليلة . ويجرى التلقيح - حينئذ - بفرشاة ، توجد بها حبوب لقاح ، جمعت من نورات متفتحة ، سبق تكييسها وهى فى طور البرعم .

٤- حنك السبع :

تجرى التلقيحات على نورة واحدة أو نورتين بكل نبات . تقصف القمة النامية لهذه النورات وتزال أزهارها الكبيرة ، ويترك بكل منها من ٧ - ١٠ براعم زهرية غير متفتحة . تخصى من ٢ - ٢ أزهار من كل نورة يومياً عندما تبلغ حجماً مناسباً للتلقيح ، وذلك بنزع الكأس والطلع - معاً - من أسفل بملقط ، ثم تغطى النورة بكيس من الجلاسين . ويجرى التلقيح بعد ٢ - ٣ أيام من الخصى حينما تكون الأزهار مستعدة للتلقيح ، ويمكن تلقيح الأزهار السفلى بالبذرة ، وخصى الأزهار العليا فى نفس اليوم ، ويتم التلقيح بإمرار متك

زهرة حديثة التفتح على ميسم الزهرة المخصية ثم يعاد تكيسها (Emsweller وآخرون ١٩٣٧).

تخزين حبوب اللقاح وحيويتها

يتطلب الوضع - أحياناً - تخزين حبوب اللقاح ؛ إما لغرض حفظ الجيرمبلازم ، وإما لى يمكن إجراء التهجينات اللازمة بين أصناف لاتزهر فى وقت واحد ، أو بين نباتات نامية فى مناطق جغرافية بعيدة عن بعضها ، وتسلك حبوب اللقاح مسلك البذور فى قدرتها على الاحتفاظ بحيويتها فى أثناء التخزين ، وطبيعة استجابتها لمختلف المؤثرات البيئية .

تقسم النباتات - من حيث قدرة حبوب لقاحها على الاحتفاظ بحيويتها فى أثناء التخزين - إلى ثلاث فئات كما يلى :

١- نباتات تحتفظ حبوب لقاحها بحيوتها فترات طويلة ؛ كما فى العائلتين : الوردية ، والبقولية .

٢- نباتات تحتفظ حبوب لقاحها بحيوتها فترات متوسطة ؛ كما فى العائلتين الزنبقية ، والنرجسية .

٣- نباتات تحتفظ حبوب لقاحها بحيوتها فترات قصيرة ؛ كما فى العائلة النجيلية .

تأثير العوامل البيئية فى حيوية حبوب اللقاح المخزنة

تتأثر حيوية حبوب اللقاح المخزنة بالعوامل البيئية التالية :

١- الرطوبة النسبية :

يؤدى نقص الرطوبة النسبية إلى زيادة فترة احتفاظ حبوب اللقاح المخزنة بحيويتها ، وتنطبق هذه القاعدة حتى حد أدنى معين للرطوبة النسبية ، يختلف باختلاف الأنواع النباتية ، ويتراوح من ٨ - ٢٥ ٪ . وتتسبب الرطوبة النسبية الأقل من الحد الأدنى المناسب للنوع النباتى إلى فقدان حيوية حبوب اللقاح ، وربما حدث ذلك نتيجة للأكسدة الذاتية للمواد الدهنية التى توجد بها . وتعرض الرطوبة النسبية الأعلى من ٦٠ ٪ حبوب اللقاح للإصابة بالنموات الفطرية والبكتيرية . ويزداد الضرر الواقع على حبوب اللقاح عند تذبذب الرطوبة النسبية بين الارتفاع والانخفاض عما لو كانت ثابتة . ويجب رفع رطوبة حبوب اللقاح التى

خزنت في رطوبة منخفضة من ١٠ - ٣٠٪ قبل استعمالها في التلقيحات بتركها في رطوبة نسبية تبلغ ٨٠٪ مدة يوم كامل .

٢- درجة الحرارة

تزداد فترة احتفاظ حبوب اللقاح المخزنة بحيويتها ، كلما كانت الحرارة أقرب إلى درجة التجمد . كما أمكن تخزين حبوب اللقاح في درجة حرارة تراوحت من -١٨٠ م إلى -١٩٠ م بون أن يحدث لها أى ضرر . وخزنت حبوب لقاح النوعين *Pyrus malus* و *P. communis* مدة ٣٢٨٧ يوماً في حرارة تراوحت من -١٧ م إلى -٣٧ م بون أن تفقد حيويتها . كذلك أمكن حفظ حبوب اللقاح بالتجفيد freeze drying .

٣- العوامل البيئية الأخرى :

تزداد فترة احتفاظ حبوب اللقاح المخزنة بحيويتها ؛ بخفض تركيز الأكسجين ، وزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في هواء المخزن . إلا أن التعرض للضوء - خاصة الأشعة فوق البنفسجية - يحدث أضراراً لحبوب اللقاح المخزنة (عن Johri & Vasil ١٩٦١ ، و Harrington ١٩٧٠ ، و Roberts ١٩٧٥) .

أسباب تدهور حيوية حبوب اللقاح عند التخزين

من الأسباب المحتملة لتدهور حيوية حبوب اللقاح عند التخزين ما يلي :

١- استنفاد المواد الغذائية التي توجد بحبة اللقاح في التنفس .

٢- توقف نشاط بعض الإنزيمات .

٣- الجفاف .

٤- تراكم نواتج أيضية ثانوية .

٥- حدوث تغيرات في المواد الدهنية بالأغشية الخلوية لحبة اللقاح .

وتبدو حبوب اللقاح المخزنة -أحياناً- كما لو كانت ميتة ، إلا أنها تستعيد حيويتها إذا وضعت في رطوبة مرتفعة لعدة أيام . وتتطلب حبوب اللقاح المخزنة تركيزات أعلى من السكريات ؛ لكي تنبت . وإذا كانت نسبة إنباتها ٣٥٪ بعد انتهاء فترة التخزين .. فإنها تنبت بصورة طبيعية في الحقل .

طرق اختبار حيوية حبوب اللقاح

تتبع الطرق التالية فى اختبار حيوية حبوب اللقاح .

١- استخدام اللقاح فى التلقيحات ، ثم حساب نسبة العقد .

٢- حساب نسبة الإنبات فى البيئات الصناعية .

٣- اتباع طرق الصبغ السريعة التى تعتمد -أساساً- على وجود السيتوبلازم من عدمه ؛ مثل اختبارات الصبغ بالأسيتوكارمين acetocarmine ، وأزرق القطن cotton blue ، وطرق أخرى نذكر منها ما يلى :

أ- اختبار أملاح التترازوليم Tetrazolium Salts :

فعلى سبيل المثال .. استخدم Norton (١٩٦٦) عدداً من أملاح التترازوليم ؛ لاختبار حيوية حبوب لقاح البرقوق ، ووجد أن أكثرها فاعلية هو :

2,5-diphenyl tetrazolium bromide (4,5-dimethyl thiazolyl 1-2) 3 ، الذى يعرف بالرمز MTT . وكان الارتباط عالياً ، وموجباً ($r = 0.99$) بين نسبة الإنبات فى البيئة الصناعية ، ونسبة حبوب اللقاح الملونة فى الاختبار .

ب - اختبار الصبغ بالـ malachite green :

توصل Alexander (١٩٦٩) إلى طريقة للتمييز بين حبوب اللقاح الحية والميتة بوضعها فى محلول يتكون من مركبات ، تضاف إلى بعضها بالترتيب والكميات التالية :

الكمية	المركب
١٠ مل	كحول إيثيلي
١ مل	صبغة malachite green ١٪ فى ٩٥٪ إيثانول .
٥٠ مل	ماء مقطر
٢٥ مل	جلسرين
٥ جم	فينول
٥ جم	كلورال هيدريت chloral hydrate
٥ مل	مركب acid fuchsin ١٪ فى الماء .
٥٠ مل	صبغة orange G ١٪ فى الماء .
٤-١ مل	حامض خليك ثلجى

يُرجَ المخلوط جيداً بعد كل إضافة ، ويخزن فى زجاجة ملونة . ويفيد وجود حامض الخليك الثلجى فى عمل حد فاصل واضح بين الجدر الخلوية التى تصبغ باللون الأخضر ، والبروتوبلازم الذى يصبغ باللون الأحمر . وتتوقف كمية الحامض التى يجب إضافتها على سمك جدر حبوب اللقاح التى يراد اختبار حيويتها : فتكون ١ ، و ٢ ، و ٣ مل فى حالة حبوب اللقاح الرقيقة ، والمتوسطة ، والسمكية الجدر ، على التوالى ، وتكون ٤ مل عند اختبار حبوب اللقاح ، وهى مازالت داخل المتوك . ويمكن إسراع عملية الصبغ بتدفئة الشريحة على اللهب بالنسبة لحبوب اللقاح ذات الجدر الرقيقة . أما حبوب اللقاح ذات الجدر السمكية .. فإنها تترك فى المحلول لمدة ٢٤-٤٨ ساعة على درجة حرارة ٥٠° م . تصبغ حبوب اللقاح الحية باللون الأحمر ، بينما تأخذ حبوب اللقاح الميتة لوناً أخضر ... ويمكن اتباع هذه الطريقة فى صبغ حبوب اللقاح ، وهى داخل المتوك إن كانت المتوك صغيرة الحجم .

ج - اختبار الصبغ بال Fluorescein Diacetate :

تتميز هذه الطريقة عن الطرق السابقة بأنها لاتعتمد على وجود أو غياب السيتوبلازم ؛ لأن وجوده لايعنى بالضرورة أن حبة اللقاح كاملة الخصوبة ، كما يتضح من اختبارات الإنبات فى البيئات الصناعية . وتعتمد هذه الطريقة على مدى سلامة الغشاء البلازمى الخارجى Plasmalemma ؛ حيث تسمح الأغشية غير السليمة بدخول صبغة الـ Fluorescein Diacetate ؛ لتحلل إلى Fluorescein فى السيتوبلازم ، وتتراكم -داخلياً - مما يسمح برؤيتها لقدرتها على الاستشعاع . وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح فى اختبار حيوية أكثر من ٣٠ نوعاً نباتياً ؛ منها البصل ، والطماطم .

تتميز الطريقة ببساطتها ؛ ففى الطماطم .. أذيب ٢ مجم من الصبغة فى ١٠٠ مل أسيتون ، ثم خلطت نقطة من محلول الصبغة مع نقطة من محلول ٠,٥ مولار سكروز على شريحة مجهرية ، ثم أضيفت إليها حبوب اللقاح . ويفضل ترك نقطة محلول الصبغة لمدة دقيقة واحدة ؛ لكى يتبخر الأسيتون قبل إضافة محلول السكر ، أو معلق حبوب اللقاح فى محلول السكر (Peterson & Taber ١٩٨٧) .

اختبارات استنبات حبوب اللقاح

تجرى اختبارات استنبات حبوب اللقاح إما فى البيئات الصناعية *in vitro* لتقدير حيويتها ، وإما على مياسم الأزهار *in vivo* لتقدير حيويتها ، وإما لدراسة حالات عدم التوافق .

١- اختبارات الاستنبات فى البيئات الصناعية :

يتأثر إنبات حبوب اللقاح فى البيئات الصناعية بعوامل كثيرة ، نذكر منها ما يلى :

أ- السكريات :

تعد السكريات مواد غذائية ضرورية لإنبات حبوب اللقاح ، ونمو الأنابيب اللقاحية . ويجب أن يكون تركيز السكريات فى البيئة الصناعية مقارباً لتركيزها فى حبة اللقاح ؛ لكى يكون الإنبات جيداً . ويتناسب الضغط الأسموزى للبيئة طردياً مع نسبة إنبات حبوب اللقاح وطول الأنابيب اللقاحية .

ب- البورون :

يؤثر البورون فى إنبات حبوب اللقاح ونموها أكثر من أى هرمون معروف ، أو فيتامين ، أو مركب كيميائى . يشجع البورون امتصاص السكريات ، وتمثيلها ، ويتحد معها ليكوّن sugar-borate complexes ، كما يزيد البورون استهلاك الأكسجين ، ويدخل فى تمثيل المواد البكتينية اللازمة لجدر الأنابيب اللقاحية النامية . يفضل أن يكون تركيز البورون فى البيئات الصناعية ١٥٠ جزءاً فى المليون ، ويستخدم حامض البوريك - غالباً - كمصدر للبورون . ويبدو أن حبوب لقاح معظم الأنواع النباتية تفتقر - طبيعياً - إلى البورون (Vasil ١٩٦٤) .

ج - المركبات الكيميائية الأخرى :

تساعد بعض الهرمونات ، والفيتامينات ، والكاروتينات ، ومضادات الحيوية ، والأملاح العضوية - فى كثير من الأحيان - على زيادة نسبة إنبات حبوب اللقاح فى البيئات الصناعية . ولحامض الجبريلليك تأثير كبير فى زيادة طول الأنبوبة اللقاحية . ومن المحتمل

أن حبوب اللقاح تحتوي بطبيعتها على كميات كافية من بعض الهرمونات ومنظمات النمو ؛ مما يجعل إضافتها إلى البيئات الصناعية غير مجدي .

د- التأثير الحيوى لحبوب اللقاح وأعضاء الزهرة الجنسية :

تؤدى المعاملة بمستخلصات حبوب اللقاح ، أو البويضات ، أو أقلام الأزهار ومياسمها إلى تشجيع إنبات حبوب اللقاح فى البيئات الصناعية . كما يؤدى تجمع حبوب اللقاح مع بعضها إلى زيادة طول الأنابيب اللقاحية . ويبدو أن ذلك مرده إلى إفراز بعض المواد المنشطة للنمو من حبوب اللقاح ذاتها .

هـ- درجة الحرارة :

تنمو حبوب لقاح معظم الأنواع النباتية فى درجة حرارة من ٢٠-٣٠ م° ، ويبلغ الـ Q_{10} حوالى ٢,٠ . تتسبب درجات الحرارة الأعلى من ٣٠ م° فى انفجار الأنابيب اللقاحية واتخاذها أشكالا غير طبيعية .

و- الـ pH :

تنمو حبوب اللقاح فى مدى واسع من الـ pH ، ويتراوح المجال المناسب من ٥,٥-٦,٥ . ولا يتغير pH البيئات كثيراً بعد نمو الأنابيب اللقاحية فيها لمدة ساعتين .

هذا .. ويكون منحنى نمو الأنابيب اللقاحية sigmoid (الشكل المعروف باسم حرف S) تماماً . ولا يتغير بتغير درجة الحرارة ، أو المواد الغذائية . وتظهر بالأنابيب اللقاحية لمغطة البنور حركة دورانية للسيتوبلازم cytoplasmic streaming تتناسب سرعتها وسرعة نمو الأنابيب اللقاحية . ولزيد من التفاصيل عن فسيولوجيا حبوب اللقاح بوجه عام .. يراجع Johri & Vasil (١٩٦١) ، و Linskens (١٩٦٤) .

٢- اختبارات الاستنبات فى مياسم الأزهار :

يستفاد من اختبارات استنبات حبوب اللقاح فى مياسم وأقلام الأزهار فى دراسات نسبة الإنبات ، وعدم التوافق . وقد توصل Martin (١٩٥٩) إلى طريقة سهلة وسريعة لفحص الأزهار الملقحة لمعرفة درجة نمو الأنابيب اللقاحية فى أقلام الأزهار بعد ١-٢ يوم

من التلقيح ، وهى كما يلى : تثبت أقلام ومياسم الأزهار فى مخلوط يتكون من الفورمالين ، وحامض الخليك ، والكحول الإيثيلى ٨٠٪ بنسبة ٨ : ٨ : ٨ ، على التوالى ، ثم تُلَيَّن فى محلول صودا كاوية قوى (٨ عيارى) ، ثم تصبغ فى محلول ٠,٨ / ٠ من صبغة أزرق الأنيلين aniline blue المذابة فى محلول ٠,٨ عيارى من بوز فو أ (K_3PO_4) . تهرس الأقلام والمياسم - بعد ذلك - بواسطة أغطية الشرائح المجهرية ، وتفحص باستعمال مجهر تعتمد إضاءته على الأشعة فوق البنفسجية بطول موجه ٢٥٠ مللى ميكرونأ ، ويجرى الفحص فى حجرة مظلمة . يظهر الكالوز calluse الذى يوجد بجدر حبوب اللقاح والأنابيب اللقاحية بلون أخضر زاهٍ مصفر ، بينما تظهر أنسجة القلم بلون أزرق رمادى ؛ وبذا .. يمكن دراسة نسية الإنبات ، ومدى نمو الأنابيب اللقاحية فى أنسجة القلم .

الفصل العشرون

تقييم وتسجيل الأصناف الجديدة

تتجه بعض دول العالم الآن (مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، وبعض دول غرب أوروبا) نحو قصر مهمة مربى النبات العاملين في المؤسسات الحكومية على تحسين وتنمية الجيرمبلازم Germplasm Enhancement إلى درجة ما - لم تحدد بعد - ثم تسليم هذا الجيرمبلازم المحسن إلى مربى القطاع الخاص ، ممثلاً في شركات إنتاج البنور ؛ للوصول به إلى مرحلة إنتاج الأصناف الجديدة . يرى Ryder (١٩٨٤) أن لهذا الاتجاه مساوئ عديدة ، لخصها فيما يلي :

١- احتياج مربى القطاع الخاص إلى سنة أو أكثر ؛ لكي يلموا بالجيرمبلازم الذي يكون جديداً عليهم في أغلب الحالات ، وهو ما يعنى تأخيراً بنفس القدر في إنتاج الأصناف الجديدة .

٢- قد يُفقدُ الجيرمبلازم الذي يوزع على مربى القطاع الخاص في مرحلة مبكرة قبل تحسينه بشكل واضح ، ما لم تكن به صفات واضحة تهم شركات إنتاج البنور بالدرجة الأولى .

٣- يؤدي توزيع الجيرمبلازم بعد وصوله إلى مرحلة متقدمة من التحسين على عدة شركات بنور في آن واحد إلى احتمال إنتاج عدة أصناف جديدة متقاربة كثيراً في

صفاتها ، وتحمل أسماء مختلفة ؛ مما يحدث بلبلة لدى المزارعين .

٤- ليس من العدل حرمان المربي الذي طوّر الجيرمبلازم من إكمال مهمته وإنتاج الأصناف الجديدة بنفسه .

تقييم الأصناف الجديدة

يُجرى عديد من الاختبارات الموسعة على الأصناف المنتجة من برامج التربية ؛ للتأكد من تميزها على الأصناف المنتشرة في الزراعة ، قبل الإذن بتسجيلها كأصناف جديدة . ويكتفى في هذه المرحلة بإعطاء هذه الأصناف رموزاً معينة ، وتستمر الحال على هذا الوضع إلى أن يقتنع المربي بأن السلالات الناتجة من برامج التربية يمكن أن تصبح أصنافاً جديدة مميزة . وهو بذلك يتجنب إعطاء اسم لسلالة ، ربما لا يكتب لها النجاح كصنف جديد .

تخضع اختبارات التقييم للقواعد الإحصائية ، وتجرى وفقاً للتصميمات الإحصائية المعروفة التي يمكن الرجوع إلى تفاصيلها في أى من مراجع الإحصاء ؛ مثل : Cochran & Cox (١٩٥٧) ، و Steel & Torrie (١٩٦٠) ، و LeClerg وآخرين (١٩٦٢) ، و Snedecor & Cochran (١٩٦٧) ، و Little & Hills (١٩٧٨) ، و Bender وآخرين (١٩٨٢) ، و Gomez & Gomez (١٩٨٤) . كما يمكن الرجوع إلى Harding (١٩٨٣) بشأن الأمور التي يجب أخذها في الحسبان عند تقييم الفاكهة ، على أساس أنها أشجار معمرة لها مشاكلها الخاصة التي تختلف عن مشاكل تقييم النباتات الحولية .

قواعد إعطاء الأسماء للأصناف الجديدة

يتعين عند وضع أسماء للأصناف الجديدة مراعاة القواعد الدولية في هذا الشأن ، ومن أهمها ما يلي :

١- عدم وضع اختصارات في الأسماء باستثناء ما جرى العرف عليه ، مثل : VFN التي تعنى المقاومة لأمراض ذبول فيرتسليم ، والذبول الفيوزارى ، ونيماطودا تعقد الجنور .

٢- عدم وضع أسماء على شكل عناوين .

٣- عدم وضع أسماء بها مبالغات فى وصف مميزات الصنف .

٥- عدم تكرار أسماء أصناف أخرى من نفس المحصول ، حتى لو كانت قديمة ، ولم تعد مستخدمة فى الزراعة .

٦- عدم وضع أسماء يمكن أن تختلط بأسماء أصناف أخرى معروفة من المحصول نفسه ؛ كأن تكون متقاربة كثيراً فى طريقة نطقها ، مع اختلاف الأحرف الهجائية التى تتكون منها .

٧- يجب ألا يشتمل الاسم على كلمة تلقيح cross ، أو هجين hybrid .

٨- يجب ألا يزيد الاسم على ثلاث كلمات ، ويفضل أن يكون من كلمة واحدة أو كلمتين .

٩- يجب ألا يشتمل على كلمات لاتينية .

١٠- يمكن أن يتضمن الاسم اسم شركة بنور . ويجب - فى هذه الحالة - استعمال اسم الصنف كاملاً - دائماً - بما فى ذلك اسم الشركة ، حتى لو سوق الصنف بواسطة شركة بنور أخرى . وعلى العكس من ذلك ، يجب عدم إضافة اسم الشركة المنتجة للبنور إلى اسم الصنف ، إن لم يكن اسمها جزءاً من الاسم المعتمد للصنف .

١١- عندما يكون الاسم بلغة مشتقة من اللاتينية (كاللغتين الإنجليزية والفرنسية) يكون الحرف الأول بكل كلمة من الكلمات - التى يتكون منها الاسم - حرفاً كبيراً capital ، إلا إذا تعارض ذلك مع قواعد اللغة .

تطبق القواعد السابقة نفسها على الهجن ؛ لأنها أصناف أيضاً . ومن المشاكل التى تبرز - أحياناً - بالنسبة للهجن فى هذا الخصوص أن الهجين الواحد قد ينتج بواسطة شركات بنور مختلفة تحت أسماء مختلفة . ويجب فى هذه الحالة الاحتفاظ باسم واحد للهجين ، يكون هو الاسم الذى أعطته إياه الجهة التى أنتجت سلالات أباء هذا الهجين ؛ فإن لم تكن الجهة المنتجة للأباء قد أعطت الهجين اسماً .. لزم الاحتفاظ بالاسم الذى أعطته أول جهة أنتجت الهجين .

وتختلف طريقة تسمية الأصناف الجديدة من برنامج تربية إلى آخر ، وغالباً ماتتضمن أسماء المدن ، أو المناطق التى أنتجت فيها الأصناف . وقد يطلق على الأصناف أسماء مربين سابقين ، أو علماء بارزين فى المجال الزراعى . وقد تستخدم الأرقام لتحديد هوية

الأصناف الجديدة ، على أن تأخذ الأصناف المختلفة سلسلة من الأرقام ، تأتي بعد اسم الولاية ، أو الشركة ، أو المنظمة المنتجة لهذه الأصناف . وقد تشير الأرقام إلى نسب الصنف في برنامج التربية ، كما قد تشير الرموز إلى مقاومة أمراض معينة ، أو القدرة على تحمل ظروف بيئية خاصة ؛ فمثلاً .. تشير الرموز UC إلى جامعة كاليفورنيا University of California ، و SR إلى المقاومة للملوحة Salt Tolerance ، و N إلى المقاومة لنيماتودا تعقد الجنور Nematodes ... إلخ .

ويبقى الصنف محتفظاً باسمه ، ولو لم يكتب له النجاح ، ولم تنتشر زراعته . ولايجوز إعطاء نفس الاسم لصنف آخر من نفس المحصول في أى وقت بعد ذلك .

هذا .. وتُنشر - في الولايات المتحدة الأمريكية - مواصفات أصناف المحاصيل الحقلية الجديدة في مجلة Crop Science ، ومواصفات المحاصيل البستانية الجديدة في مجلة HortScience .

قواعد تسجيل الأصناف الجديدة

يسبق تسجيل الأصناف الجديدة والإعلان عنها ضرورة تقييمها على نطاق واسع ، ثم تحديد هويتها بوضع أسماء لها كما سبق بيانه ، كما يتعين تحديد المناطق المناسبة لزراعة الأصناف الجديدة . وبرغم أن هذه الأمور تهم المربي بالدرجة الأولى .. إلا أنه نادراً ماينفرد بها وحده ، وإنما يتقرر ذلك بواسطة لجنة خاصة يطلق عليها اسم Naming and Release Committee يفترض وجودها في كل هيئة ، أو مؤسسة ذات نشاط في مجال تربية النبات . ويكون المربي - عادة - عضواً في هذه اللجنة .

يقدم المربي إلى اللجنة كافة البيانات الخاصة بالصنف الجديد ، التي جمعها خلال فترة التقييم الموسع . ويجب أن يتضمن ذلك بيانات عن المحصول ، وصفات الجودة ، والنضج ، والصفات المورفولوجية ، والمقاومة للأمراض ، والقدرة على تحمل ظروف بيئية معينة ... إلخ ، كما يجب على المربي تزويد اللجنة كذلك بكافة عيوب الصنف الجديد المقترح . وتُحدد المناطق التي تنتشر فيها زراعة الأصناف الجديدة من واقع البيانات المقدمة ، ومدى جودته في المناطق التي اختبر فيها . وتبدأ زراعة الأصناف الجديدة في مساحات صغيرة نسبياً ، ثم يترك للمزارعين أن يقرروا - بأنفسهم - مدى صلاحية هذه

الأصناف للزراعة (Resh ١٩٨١ ، Janick وأخرون ١٩٨٣) .

وفي مصر .. ينظم القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٦٠ قواعد تسجيل الأصناف الجديدة من الحاصلات الزراعية . ينص القانون على أن تقدم طلبات تسجيل الأصناف الجديدة إلى لجنة مختصة ، تُشكّل من وكيل وزارة الزراعة المختص ، وسبعة من الموظفين الفنيين بوزارة الزراعة . ويجب أن يشتمل كل طلب على البيانات التالية :

١- اسم الصنف الجديد ، وأصله ونشأته ، والخواص المميزة له .

٢- أنواع التجارب التي أجريت لاختباره ، ومدتها ، ونتائجها .

تفحص اللجنة طلبات التسجيل ، ولها في سبيل أداء مهمتها تكليف الطالب موافاتها بماتراه لازماً من البيانات ، وتقديم الكميات التي تحددها من تقاوى الصنف الجديد ؛ لإجراء التجارب عليها ، ولها أن تعهد إلى الهيئات والمصالح ، والأقسام الفنية المختصة بوزارة الزراعة ؛ باختبار أصناف الحاصلات الزراعية المستحدثة المطلوب تسجيلها . ولايجوز - في جميع الحالات - أن تقل مدة التجارب عن سنتين .


ولايجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الأصناف الأخرى في إحدى صفاته الزراعية ، أو ميزاته الاقتصادية .

النشر العلمى للأصناف الجديدة

يعد نشر الحقائق العلمية المتجمعة عن الصنف الجديد مكملاً لخطوة تسجيل الصنف في تحقيق الفائدة المرجوة منه ؛ فهو يحفظ للمربي حقوقه الأدبية في الصنف الجديد ، ويعرّف - كل من يهمه الأمر - بأصل الصنف ، ونَسَبِهِ ، وكيفية إنتاجه ، ومميزاته ، وعيوبه ، ونتائج تجارب التقييم التي أجريت عليه ، ومدتها . ويكون النشر في المجلات العلمية المتخصصة التي تخضع بحوثها للتحكيم . وتبين أشكال (٢٠-١) ، و (٢٠-٢) ، و (٢٠-٣) نَسَبُ ثلاثة من أصناف الخضر ؛ كأمثلة للكيفية التي تعرض بها نشأة ، وطريقة إنتاج الأصناف الجديدة عند نشرها علمياً .

حفظ حقوق المربي

يُمنح مربي النباتات ، والشركات المنتجة للأصناف الجديدة - في بعض دول العالم -



شكل (٢٠-٢): نَسَبُ سلالة القارون Ky-P7 كمثال لسجلات النسب (Knael ١٩٨٨).

براءة تسجيل الأصناف الجديدة بأسمائهم ؛ مما يحفظ لهم حقوقهم في إنتاج هذه الأصناف لحسابهم ، ويمكنهم من الحصول على عائد مادي ، مقابل ما بذلوه من وقت ، وجهد ، ومال في سبيل إنتاج هذه الأصناف . كما يسهم ذلك في إنكاء المنافسة بين شركات البنور ، وهو ما ينعكس - إيجابياً - على الأصناف الجديدة المنتجة . وتعرف القوانين التي تنظم هذه الحقوق ببراءة النباتات Plant Patents . ومن بين الدول التي توجد بها قوانين لحفظ حقوق المربي : الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ،

وهولندا ، وأستراليا ، ونيوزيلندا .

ونجد فى الولايات المتحدة -على سبيل المثال- أن حقوق المربي ينظمها قانونان ، صدر أحدهما فى عام ١٩٣٠ ، والثانى فى عام ١٩٧٠ . وقد اختص القانون الأول بأصناف المحاصيل الخضرية التكاثر ، بشرط ألا يكون الجزء المستعمل فى التكاثر هو نفسه الجزء المستعمل فى الغذاء ؛ وعليه .. فإن القانون لم يكن سارياً على الأصناف الجديدة المنتجة من محاصيل ؛ مثل البطاطس ، والبطاطا . كما لم يطبق القانون على النباتات التى وجدت نامية برياً ، واستئنست فى الزراعة . وقد أعطى القانون للمربي الحق فى إنتاج الصنف لحسابه لمدة ١٧ عاماً . أما القانون الثانى .. فقد عدل القانون الأول ؛ بحيث أصبح بإمكان المربي الحصول على براءة تسجيل الأصناف الجديدة من كافة المحاصيل الخضرية التكاثر ، والبذرية التكاثر على حد سواء . وقد تطلب القانون أن يتوفر فى الصنف الجديد شرطان ؛ هما :

١- أن يكون مميزاً ومختلفاً بوضوح عن أى صنف آخر فى صفة واحدة على الأقل ، ولايشترط أن تكون هذه الصفة اقتصادية .

٢- أن يكون على درجة معقولة من التجانس ، وأن تكون الاختلافات بين النباتات - فى أية صفة - فى حدود التباين العام للصنف فى هذه الصفة .

وتطبق قواعد براءة التسجيل على آباء الهجن ، وليس على الهجن ذاتها . ويرجع ذلك إلى أن الهجن ليست ثابتة وراثياً .

ويتعين أن يتقدم المربي بطلب البراءة فى خلال فترة زمنية وجيزة بعد إنتاج الصنف . ويعطى القانون المربي حق إكثار الصنف بنفسه ، أو بمعرفة من يختارهم لمدة ١٨ سنة ، ويحق له خلالها التحكم فى كمية البنور المعروضة للبيع . ويحق للمربي كذلك أن يشترط إن كانت بنور الصنف الجديد تعرض للبيع ، وهى غير معتمدة رسمياً ، أم بعد اعتمادها ، علماً بأن شرط اعتماد البنور يجعل من السهل ضبط حالات التوزيع غير القانونى لبنور الصنف الجديد .

هذا .. إلا أن أى مزارع يمكنه إنتاج احتياجاته من بنور أى صنف - ولو كان محمياً ببراءة تسجيل - مادام لايزاول نشاطاً تجارياً بهذه البنور . كما يمكن لأى مربٍ ، أو

شركة بنور أن تستخدم الأصناف المحمية كآباء للهجن ، أو فى برامج التربية العادية ، أو بالطفرة .

وسائل التمييز بين الأصناف والتعرف عليها

لما كان تحديد صفات الصنف الجديد ، والتمييز بينه وبين الأصناف القريبة منه يعد شرطاً أساسياً للحصول على براءة تسجيل لهذا الصنف ؛ لذا .. نشط البحث العلمى فى هذا المجال ؛ نظراً لأن الوصف المورفولوجى للأصناف الجديدة لم يعد كافياً ، واستخدمت عدة طرق جديدة ؛ للتمييز بين الأصناف ، نذكر منها مايلى :

١- التقسيم على أسس كيميائية Chemotaxonomy :

من أمثلة الطرق الكيميائية التى استخدمت بنجاح ما يلى :

أ- اختبار الفينول فى القمح .

ب- اختبار الاستشعاع fluorescence فى الزوان ryegrass .

ج- اختبارات الكروماتوجرافى للمواد الفلافونية flavonoid pattern فى الأغلفة البذرية للفاصوليا ، وفى بادرات الفاصوليا والبطيخ والخيار ، والقول الرومى والبسلة والسبانخ ، وأزهار القول الرومى . وكانت المحاولات ناجحة فى هذه المحاصيل ، إلا أن الطرز الفلافونية لم تستخدم - منفردة - فى تمييز أصناف هذه المحاصيل (George ١٩٨٥) .

٢- التقسيم على أسس سيروولوجية Serotaxonomy .

٣- التقسيم على أساس انفصال مركبات مميزة للصنف فى جل يسرى به تيار كهربائى (اختبارات الـ Electrophoresis) : ومن الأمثلة الناجحة لتمييز الأصناف بهذه الطريقة ما يلى :

أ- اختبار الـ starch gel electrophoresis فى القمح .

ب- استخدمت هذه الطريقة بنجاح كذلك فى تمييز أصناف الشليك ؛ ففى ولاية كاليفورنيا الأمريكية .. حصلت جميع الأصناف التى أنتجت منذ عام ١٩٦٨ على براءة تسجيل . وتمكن Bringham وأخرون (١٩٨١) من استخدام

ال starch-gel electrophoresis فى التمييز بين عدد كبير من هذه الأصناف ؛ حيث تبين اختلاف ١٤ صنفاً - من أصل ٢٢ صنفاً منها - فى ال isoenzyme pattern لثلاثة إنزيمات هى : PGI ، LAP ، و PGM .

ج- توصل Hussain وآخرون (١٩٨٦) إلى طريقة أمكن بواسطتها التمييز بين أصناف الفاصوليا . وتعتمد هذه الطريقة على فصل أنواع البروتينات التى توجد فى البنور بال electrophoresis ؛ حيث كانت ال Banding patterns ثابتة لكل صنف . وقد استخدم الباحثون جلاً خاصاً هو ال SDS polyacryl-amide gel .

استخدامات الطرز المتشابهة من الإنزيمات Isozymes

إن ال isozymes عبارة عن طرز جزيئية molecular forms مختلفة لإنزيم واحد ، يُحصل عليها من نسيج ما للكائن الحي . وتتفصل هذه الطرز عادة عن بعضها إذا تعرضت لتيار كهربائى وهى فى جل ؛ حيث ترحل خلال الجل بدرجات متفاوتة ، ثم يمكن تحديد مواقعها ، ورؤيتها ؛ بوضع الجل فى محلول مناسب للمادة التى يعمل عليها الإنزيم substrate ، ثم صبغ الناتج النهائى للتفاعل . وتؤدى هذه الطريقة إلى تكوين أحزمة bands مستقلة ؛ يتحدد موقعها فى الجل بكل من شحنة الإنزيم المشابه isozyme ، ووزنه الجزيئى . وغالبا ما يستعمل فى الاختبار العصير الخلوى الطبيعى الذى ينتج من عصر النسيج النباتى .

ونظراً لأن كل إنزيم يتحكم فى تكوينه جين معين بشكل مباشر ؛ لذا .. فإن هذه الطريقة تعطى الدليل المباشر على وجود الجين ، بدلا من دراسة تأثيره الظاهرى ، أو الفسيولوجى . وهى طريقة سهلة ، وسريعة ، ويمكن استخدامها فى تعرف وجود أى جين فى أطوار النمو المبكرة ، حتى فى البنور -ذاتها- أحياناً . ويعد تمييز الأصناف أحد الاستخدامات المهمة لاختبارات الإنزيمات الشبيهة isozymes .

ومن الاستخدامات المهمة الأخرى للإنزيمات الشبيهة أنها قد تكون شديدة الارتباط بجينات مهمة ، وتتعزل معها دائماً ؛ وبذا .. يمكن التعرف على النباتات الحاملة لهذه الصفات ؛ وذلك بالتعرف على الإنزيمات الشبيهة المرتبطة بها . ومن أمثلة ذلك الارتباط الشديد الذى وجد فى الطماطم بين الموقع الجينى الذى يتحكم فى الإنزيم acid phosphatase (الجين 1- Aps) ، وجين المقاومة لنيماتودا تعقد الجذور Mi .

وقد اكتشفت المقاومة للنيماتودا فى إحدى سلالات النوع البرى *Lycopersicon peruvianum* ، وكانت المقاومة مرتبطة - دائماً - بحزام الـ *acid phosphatase* . أما الهجن بين *L. peruvianum* ، و *L. esculentum* فقد احتوت على الأحزمة الأبوية ، وحزام آخر «هجين» يظهر دائماً فى موضع وسطى بينهما . ويمكن التعرف على التراكيب الوراثية الثلاثة (المقاوم الأصيل ، والقابل للإصابة الأصيل ، والهجين) بسهولة باختبار الإنزيمات الشبيهة للعصير الخلوى الذى يمكن الحصول عليه من أى نسيج نباتى (الجنور ، أو السيقان ، أو الأوراق) فى أى مرحلة للنمو (Rick ١٩٨٢) . ولزيد من التفاصيل عن الإنزيمات الشبيهة ، واختباراتها ، واستخداماتها فى مجال الدراسات الوراثية وتربية النبات .. يراجع Jacobs (١٩٧٥ ، ١ ١٩٧٥ ب) ، و Zamir وآخرون (١٩٨١) ، و Tanksley & Jones (١٩٨١) .

إكثار تقاوى الأصناف الجديدة

تمر البنور بأربع مراحل أثناء إكثارها قبل أن يقتنيها المزارعون ، وهى كما يلى :

١- بنور المربى Breeder Seed :

إن بنور المربى هى كمية صغيرة من البنور ، يشعر المربى أنها تمثل الصنف الجديد تمثيلاً صادقاً . وتتوقف الكمية المناسبة من بنور المربى على حجم بنور النوع المحصولى ، وتتراوح من كيلو جرام واحد ، أو أقل إلى عدة أجيولة ، وتبلغ فى حالة الحبوب الصغيرة - مثلاً - من ٤٠٠ - ٥٠٠ كجم . تسلم هذه البنور إلى هيئة خاصة لإكثارها . وتقع على المربى مسئولية المحافظة على بنور المربى مادام الصنف مستخدماً فى الزراعة .

٢- بنور الأساس Foundation Seed :

تزرع بنور المربى فى حقل لايتوقع أن تظهر به نباتات من نفس النوع Volunteer Plants ، ويحافظ عليه خالياً من الحشائش ، مع المرور فيه عدة مرات خلال الموسم ؛ للتخلص من النباتات غير المطابقة لصفات الصنف . ويطلق على البنور الناتجة اسم بنور الأساس . وقد تنتج بنور الأساس من بنور أساس مماثلة سبق إنتاجها ، أو تنتج - سنوياً - من بنور المربى . وقد تستعمل بنور الأساس فى إنتاج البنور المعتمدة مباشرة ، أو فى إنتاج البنور المسجلة .

٣- البذور المسجلة Registered Seed :

تنتج البذور المسجلة بالإكثار المباشر لبذور الأساس . ويقوم المزارعون -عادة- بعملية الإكثار بعد التعاقد مع شركات البذور . ويلزم إجراء بعض الفحوص والاختبارات الحقلية والمعملية ؛ للتأكد من نقاوة الصنف ، وخلوه من الأمراض الهامة . وقد تنتج البذور المسجلة من بذور مسجلة مماثلة منتجة في سنوات سابقة ، أو يتم إنتاجها -سنوياً- من بذور الأساس .

٤- البذور المعتمدة Certified Seed :

تنتج البذور المعتمدة بالإكثار المباشر لبذور الأساس ، أو البذور المعتمدة ، ويكون إنتاجها تحت ظروف خاصة من الزراعة والعزل ، وتخضع لاختبارات حقلية ومعملية خاصة ، وللقوانين المنظمة لإنتاج البذور .

هذا .. ويمكن إدخال الهجن كذلك في برنامج تصديق البذور ؛ بإبخال الآباء للاعتماد ، إلا أن معظم شركات البذور تقوم بهذه المهمة بمعرفتها .

يتبين من خطوات إكثار التقاوى أنه يمر حوالى ٤ سنوات بين إنتاج الصنف الجديد ، وإنتاج كميات من تقاويه ، تكفى للتوزيع على المزارعين .

مصادر الكتاب

إلياس ، زكى ، عبد ، ومحفوظ عبد القادر محمد (١٩٨٥) . أساسيات تربية المحاصيل الحقلية والبستانية . جامعة الموصل - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - الجمهورية العراقية - ٢٧٧ صفحة .

بغدادى ، حسن أحمد (١٩٥٥) . الفاكهة وطرق إنتاجها ، دار مصر للطباعة - القاهرة - ٧٨٩ صفحة .

حسن ، أحمد عبد المنعم (١٩٨٨) ، أساسيات إنتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة والمحمية (الصوبيات) . الدار العربية للنشر والتوزيع - القاهرة - ٩٢٠ صفحة .

الخشن ، على على ، وفؤاد حسن خضر (١٩٧٥) . قواعد تربية النباتات . دار المعارف - القاهرة - ٤٥٣ صفحة .

طنطاوى ، عبد العظيم ، وعلي حامد محمد (١٩٦٣) . أساسيات علم الوراثة . دار المعارف - القاهرة - ٧٠٨ صفحات .

عبد العال ، أحمد فاروق (١٩٧٧) . أساسيات بساتين الفاكهة ، دار المعارف - القاهرة - ٤٤٨ صفحة .

عبد العال ، زيدان السيد (١٩٦٤) . تربية الخضر . دار المعارف - القاهرة - ٥٥٩ صفحة .

عبد العزيز ، مصطفى ، وأحمد محمد مجاهد ، وأحمد البازيونس ، وعبد الرحمن أمين (١٩٧٦) . النبات العام . مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١١٠٠ صفحة .

عثمان ، إبراهيم (١٩٣٥) . تاريخ فلاحه البساتين بمصر . مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - ٤٦ صفحة .

المرضى ، مهدي عثمان (١٩٨٦) ، زراعة الأنسجة النباتية ، وإمكانات استخدامها في الوطن العربي . الزراعة والتنمية في الوطن العربي - العددان الخامس والسادس : ٦٢ - ٦٥ .

نجار ، حلیم (١٩٨٦) . دور الهندسة الوراثية في الزراعة ووقاية النبات . مجلة وقاية النبات العربية - المجلد ٤ : ٨٨ - ٩٤ .

Alexander , D . E . 1975 the identification of high-quality protein variants and their use in crop plant improvement . In O.H Frankel and J. G Hawkes (Eds) " Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp. 223 - 230 . Cambridge Univ. Press , Cambridge .

Alexander , M . P . 1969 . Differential staining of aborted and nonaborted pollen . Stain Technol . 44 : 117 - 122 .

Allard , R . W . 1964 . Principles of plant breeding . Wiley , N. Y . 485 p .

Allard , R . W . and A . D Bradshaw . 1964 . Implications of genetic - environmental interactions in applied plant breeding . Crop Sci 4 : 503 - 508 .

American Society for Horticultural Science . 1977 . Cell culture ; tissue culture . Proceedings of the symposia held at Louisiana State University , August 13, 1976 and Honolulu, Hawaii , September 13 , 1975 . HortScience 12 : 125-150 .

American Society for Horticultural Science . 1986 . Overcoming barriers to interspecific hybridization of perennial fruit crops . HortScience 21 : 39 - 64 .

American Society for Horticultural Science . 1988 . Genetic Considerations in the collection and maintenance of germplasm. Proceedings of a Symposium held in Davis , California 15 August 1986 . HortScience 23 : 77 - 97 .

Ammati , M., I . J . Thompson and H . E Mckinney . 1986 . Retention of resistance to *Meloidogyne incognita* in *Lycopersicon* genotypes at high soil temperature . J . Nematology 18 : 491 - 495 .

Asian Vegetable Research and Development Center .1987 . AVRDC progress report summaries 1986 Taiwan , Republic of China . 94 p .

Avery , G . S . , Jr . E . B . Joahnson , R . M . Addoms and B . F . Thompson . 1947 . Hormones and horticulture . McGraw - Hill Book Co . , N . Y . 326p .

Ayotte , R . , P . M . Harney and V . S . Machado . 1987 . The transfer of triazine resistance from *Brassica napus* L . to *B . oleracea* L . I . Production of F₁ hybrids through embryo rescue Euphytica . 36 : 615 - 624 .

Bajaj , Y . P . S . , S . K . Mahajan and K . S . Labana 1986. Interspecific hybridization of *Brassica napus* and *B . juncea* through ovary , ovule and embryo culture . Euphytica 35 : 103 - 109 .

Borker , W . G . and G . R . Johnston . 1980 . The longevity of seeds of the common potato , *Solanum tuberosum* . Amer . Potao J . 57 : 601 - 607 .

Basnitzki , Y . and D . Zohary . 1987 . A seed - planted cultivar of globe artichoke . HortScience 22 : 678 - 679 .

Bass , L . N . 1980 . Seed viability during long - term storage . Hort . Rev 2 : 117 - 141 .

Bassett , M . J . (Ed.) . 1986. Breeding vegetable crops . Avi Pub . Co . , Inc., Westport , Connecticut . 584 p .

Bender , F . E . , L . W . Douglass and A . Kramer . 1982 . Statistical methods for food and agriculture . Avi Pub . Co . , Inc . , Westport , Connecticut . 345p .

Benepal , P . S . and C . V . Hall . 1967 . The genetic basis of Varietal resistance of *Cucurbita pepo* L. to squash bug *Anasa tristis* DeGeer . Proc . Amer . Soc . Hort . Sci . 90 : 301 - 303 .

Bennett , E . 1970 . Tactics of plant exploration . In O . H . Frankel and E . Bennett (Eds) " Genetic Resources in Plants : Their Exploration and Conservation " , pp . 157 - 179 . Blackwell Sci. Pub., Oxford .

Bernard , R . L . and E . R . Jaycox , 1969 . A gene for increased natural crossing in soybean . Agron . Abstr, 1969 : p .3 (Abstr) . Cited from Plant Breed . Abstr . 4 / : 6523 . 1971 .

Bhandari , M . M . 1979 . Practicals in plant breeding . Oxford & I B H Pub . Co, New Delhi . 248 p .

Bhojwani , S . S . and M . K . Razdan . 1983 . Plant tissue culture : theory and practice . Elsevier , Amsterdam . 502 p .

Birkett , C . 1979 . Heredity development and evolution . MacMillan Education Lt d . , London . 202 p .

Bliss , F . A . 1981 , Utilization of vegetable germplasm . HortScience 16 : 129 - 132 .

Bliss , F . A . 1984 . The application of new plant biotechnology to crop improvement . HortScience . 19 : 43 - 48 .

Bloksberg, L. N. and M. E . Saltveit, Jr. 1986. Regeneration of plants from axillary buds of harvested and stored heads of field - grown Iceberg lettuce . HortScience 21 : 1201 - 1203.

Bos, I . 1987 . How to develop from three parents a new variety of a self-fertilizing crop ? Euphytica 36 : 455 - 466 .

Bottino , P . J . 1981 . Vegetable crops . In B . V . Conger (Ed.) " Cloning Agricultural Plants via *In Vitro* Techniques " , pp. 141 - 164 . C R C . Pr , . Inc . , Boca Raton , Florida .

Bourgeois , P . , G . Guerrier and D . G . Strullu . 1987 . Adaptation of *Lycopersicon esculentum* to Na Cl : a comparative study of cultures of callus or stem tips . Canad . J . Bot. 65 : 1989 - 1997 .

Brewbaker , J . L . 1964 . Agricultural genetics . Prentice - Hall , Inc . , Englewood Cliffs , N . Y . 156 p .

Brezhnev , D . D . 1975 . Plant exploration in the USSR . In O . H . Frankel and J . G . Hawkes (Eds) " Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp.147 - 150 Cambridge Univ Pr., Cambridge .

Briggs , F . N. and P . F . Knowles . 1967 . Introduction to plant breeding . Reinhold Pub . Co . , N . Y . 426P .

Bright , S . , V . Jarrett , R . Nelson, G . Grissen , A . Karp , J . Franklin, P . Norbury, J . Kueh . , S . Rognes and B . Miflin. 1983 . Modification of agronomic traits using in vitro technology. In S . H . Mantell and H . Smith (Eds) " Plant Biotechnology " pp . 2 51 - 265 . Cambridge Univ . Pr . , Cambridge .

Bringhurst . R . S . , S . Arulsekhar , J . F . Hancock, Jr and V . Voth . 1981 . Electrophoretic characterization of strawberry cultivars . J . Amer . Soc . Hort . Sci . 106 : 684 - 687 .

Brooks , H . J . and D . W . Barton . 1983 . Germplasm maintenance and preservation. In J . N . Moore and J . Janick (Eds) "Methods in Fruit Breeding" , pp . 11-20 . Purdue Univ. Pr . , West Lafayette , Indiana .

Burnham , C . R . 1966 . Cytogenetics in plant improvement. *In* K . J . Frey (Ed.) " plant Breeding " pp . 139 - 187 . Iowa State Univ . Pr . , Ames . Iowa .

Burns , G . W . 1983 . (5 th ed .) . The science of genetics : an introduction to heredity . Macmillan Pub. Co., Inc . , N . Y..515 p .

Burton , G. W. 1951 . Quantitative inheritance in pearl millet *Pennisetum glaucum* . *Agron . J.* 43 : 409 - 417 .

Burton , G . W . 1966 . Plant breeding - prospects for the future . *In* K . J . Frey (Ed) . " Plant Breeding " , pp . 391 - 407 . Iowa State Univ. Pr . , Ames , Iowa .

Burton . G . W . 1981 . Meeting human needs through plant breeding : past progress and prospects for the future . *In* . P . D Hebblethwaite (Ed.) " The Faba Bean (*Vicia faba* L .) : a Basis for Improvement " , pp . 433 - 465 . Butterworths , London .

Butcher . D . N . and D.S Ingram , 1976 . Plant tissue tissue culture . Arnold (Pub.) Limited , London . 68 p .

Cailloux , M . 1984 . Plant tissue culture : rapid propagation, induced mutations , and the potential role of protoplast techniques. *In* . P. B. Vose and S. G. Blixt (Ed .) " Crop Breeding: a Temporary Basis " , pp . 311-346. Pergamon Pr., N . Y.

Carlson , P . S . , B . F . Conrad and J . D . Lutz . 1984 . Sorting through the variability . *HortScience* 19 : 388 - 392 .

Castle , W . E . and S . Wright . 1921 . An improved method of estimating the number of genetic factors in cases of blending inheritance .

Chaudhari , H . K . 1971 . (2 nd ed.) . Elementary principles of plant breeding . Oxford & Ibh pub . Co, New Delhi . 327 p .

Chilton , M. - D. 1980. *Agrobacterium* TI plasmids as a tool for genetic engineering in plants . In . D . W . Rains and R. C . Valentine (Eds) " Genotypic Engineering of Osmoregulation " , pp 23 - 31 . plenum Pr . , N . Y .

Chin . C. - K . 1985 . Use . of plant tissue culture techniques in plant breeding . In C. A. Neyra (Ed.) " Biochemical Basis of Plant Breeding Vol . I . Carbon Metabolism " , pp . 25 - 33 . C R C pr . , Inc ., Boca Raton , Florida .

Chu , C. - c. 1982. Haploids in plant improvement . In . I . K . Vasil , W . R . Scowcroft and K . J . Frey (Eds) " Plant Improvement and Somatic Cell Genetics " , pp . 129 - 158 . Academic Pr . , N . Y .

Cooking , E . C . 1975 . Plant protoplasts as genetic systems. In . L . Ledoux (Ed.) " Genetic Manipulations with Plant Material " , pp . 311 - 327 . Plenum Pr., N . Y .

Cooking , E . C . 1983 . Genetic transformation through somatic hybridisation . In S . H . Mantell and H . Smith (Eds) "plant Biotechnology", pp . 241 - 250 . Cambridge Univ . Pr., Cambridge .

Cooking , E . C . and R . Riley . 1981 . Application of tissue culture and somatic hybridization to plant improvement . In K . J . Frey (E d.) . "Plant Breeding II " , pp . 85 -116 . The Iowa State Univ . Pr ., Ames . Iowa .

Cochran , W . G . and G . M . Cox . 1957 . Experimental designs . Wiley , N . Y . 611 p .

Conger , B . V . (Ed.) 1981 . Cloning agricultural plants via *in vitro* techniques . C R C Press , Inc . Raton , Florida . 273p.

Craig . R . 1968 . Implications of the new genetics in plant breeding . HortScience 3 : 243 - 249 .

Creech , J . L . and L . P . Reitz . 1971 Plant germ plasm now and for tomorrow , Adv . Agron . 23 : 1 - 49 .

Crehu , G du : 1968 . Early testing of pollen stigma compatibility relationships in *Brassica oleracea* by fluorescence . Brassica meeting of Eucarpia : Horticultural Section : 4 - 6 Sept . 1968 , Wellsbourne , England . p . 34-36 . cited from Plant Breed . Abstr . 40 : Abstr . 3944 . 1970 .

Cullinam , F . P . 1937. Improvement of stone fruits . In " Yearbook of Agriculture : Better Plants and Animals II " , pp. 665 - 748 . U . S . Dept . Agr . , Wash . , D . C .

Custers , J . B . M . and A . P . M . Den . Nijs . 1986 . Effects of aminoethoxyvinylglycine (AVG) , environment , and genotypes in overcoming hybridization barriers between *Cucumis* species . Euphytica 35 : 639 - 647 .

Darrow , G . M . 1966 . The strawberry : history , breeding and physiology . Holt , Rinehart and Winston , N . Y . 447 P .

Darwin , C . 1872 . (6 th ed .) . The origin of species . A 1958 reprint with introduction by Sir J . Huxley . The New American Library of World Literature , Inc . N . Y . 479 p .

Daub , M . E . 1984 . A cell culture approach for the development of disease resistance : studies on the phytotoxin cercosporin . HortScience 19 : 382 - 387 .

Day, P . R . 1980 . Tissue culture methods in plant breeding. In D. S . Ingram and J . P . Helgeson (Eds) " Tissue Culture Methods for Plant Pathologists " , pp . 223 - 231 . Blackwell Sci . Pub . , Oxford .

De Wilde , R . C . 1971 . Practical applications of (2 - chloroethyl) phosphonic acid in agricultural production . HortScience 6 : 364 - 370 .

Devlin , R . M . 1975 . Plant physiology . D . Van Nostrand Co . , N . Y . 600 p .

Dickson , M . H . and D . H . Wallace . 1986 . Cabbage breeding . In M . J . Bassett (Ed.) " Breeding Vegetable Crops " , pp . 395 - 432 . Avi Pub . Co . , Inc . , Westport . Connecticut .

Dix , P . J . 1980 . Environmental stress resistance in plant cell cultures In F . Sala , B. Parisi , R . Cella and O . Cifferri (Eds) " Plant Cell Cultures, Results and Perspectives " , pp . 183 - 186. Elsevier, Amsterdam .

Dixon , R . A . 1985 . Isolation and maintenance of callus and cell suspension cultures . In R . A . Dixon (Ed.) " Plant Cell Culture : a Practical Approach " , pp . 1-20 . IRL Pr., Oxford .

Dixon , R . A (Ed.) . 1985. Plant Cell culture : a practical approach . IRL . Pr . , Oxford . 236P.

Dabzhansky, T . , F . J . Ayala , G . L . Stebbins and J . W . Valentine . 1977 . Evolution . W . H . Freeman and Co., San Francisco . 572 p .

Doney , D . L . , J . C . Theuer and R . E . Wyse . 1975 . Absence of

a correlation between mitochondrial complementation and root weight heterosis in sugarbeets . *Euphytica* 24 : 387 - 392 .

Dowker , B . D . , L . Currah . F . J . Horobin , J . C . Jackson . and G . J . Faulkner . 1985 . Seed production of an F_1 hybrid onion in polyethylene tunnels . *J . Hort . Sci .* 60 : 251-256 .

Drake . J . W . 1969 Mutagenic mechanisms . *Ann. Rev . Genet .* 3 : 247 - 268 .

Duke . J . 1982 . Plant germplasm resources for breeding of crops adapted to marginal environments . *In* M . N . Christiansen and C . F . Lewis (Eds) " Breeding Plants for Less Favorable Environments " , pp . 391 - 433 . Wiley , N . Y .

Duncan , D . R . and J . Widholm . 1986 . Cell selection for crop improvement . *Plant Breed . Rev .* 4 : 153 - 173 .

Dunwell , J . M 1985 . Haploid cell cultures . *In* R . A . Dixon (Ed.) "Plant Cell Culture : a Practical Approach", pp . 21 - 36 . IRL Pr ., Oxford.

Duvick , D . N . 1966. Influence of morphology and sterility on breeding methodology . *In* K . J . Frey (Ed.) " Plant Breeding" ,pp . 85 - 138. Iowa State Univ . Pr ., Ames . Iowa .

Earle , E . D and V.E . Gracen . 1981 The role of protoplasts and cell cultures in plant disease research . *In* R . C . Staples and G.H . Toennissen (Eds) " Plant Disease Control : Resistance and Susceptibility " , pp . 285 - 297 . Wiley , N . Y .

Edmond , J . B ., T . L . Senn , F . S Andrews and R . G . Halfacre . 1975 . (4 th ed .) . Fundamentals of horticulture . McGraw - Hill Book

Co ., N . Y . 560p .

Edwards , A. W . F . 1977 . Fundamentals of mathematical genetics . Cambridge Univ . Pr., Cambridge 119 p .

Egisti , O . J . and P . Dustin , Jr . 1955 . Colchicine in agriculture , medicine , biology and chemistry . Iowa State College Pr ., Ames . Iowa . 470p .

Ehrlich, P. R., R . W. Holm and D . R . Parnell . 1974 . The process of evolution . McGraw - Hill Kogakusha , Ltd . , Tokyo. 378p .

Eisa, H. M . and D . H . wallace . 1969 . Morphological and anatomical aspects of petaloidy in the carrot . J . Amer . Soc . Hort . Sci . 94 : 545 - 548 .

Elliott , F . C . 1958 . Plant breeding and cytogenetics . McGraw , N . Y . 395 P .

Ellison , J . H . 1986 . Asparagus breeding . In M.J . Bassett (Ed.) " Breeding Vegetable Crops " , pp . 521 - 569 . Avi Pub. Co ., Inc., Westport , Connecticut .

Emery , G . C . and H . M . Munger . 1970a . Effects of inherited differences in growth habit on fruit size and soluble solids in tomato . J . Amer . Soc . Hort . Sci. 95 : 410 -412 .

Emery , G . C . and H . M . Munger . 1970b. Effects of inherited differences in growth habit on pattern of harvest in tomato . J . Amer . Soc . Hort . Sci . 95 : 407 - 410 .

Emsweller, S. L ., P . Brierley , D . V. Lumsden and F . L. Mulford . 1937. Improvement of flowers by breeding. In "Yearbook of Agriculture :

Better Plants and Animals " , pp . 890 - 998 . U . S . Dept . Agr . , wash . , D . C .

Esen , A . , R . W . Scora and R.K. Soost . 1975 . A simple and rapid screening procedure for identification of zygotic *Citrus* seedlings among crosses of certain taxa . J . Amer . Soc . Hort. Sci . 100 : 558 - 561 .

Estilai , A . , H . H . Naqvi and J . G . Waines . 1988 . Developing guayule as a domestic rubber crop . Calif . Agr. 42 (5) : 29 - 30 .

Evans, D. A., W. R . Sharp and C . E . Flick . 1981 . Plant regeneration from cell cultures . Hort . Rev . 3 : 214-314 .

Falconer, D. S. 1981 . (2nd ed.). Introduction to quantitative genetics . Longman , N . Y . 340 p .

Fangmeier , D. D . , D.D. Rubis, B.B. Taylor and K.E. Foster . 1984 . Guayule for rubber production in Arizona . Univ . Ariz . , College of Agr . , Agr . Exp . Sta., Tech . Bul . No. 252 .14p .

Fassuliotis , G . and B.V. Nelson . 1988 . Interspecific hybrids of *Cucumis metuliferus* x *C.anguria* obtained through embryo culture and somatic embryogenesis . Euphytica 37 : 53 - 60 .

Fehr , W . R . 1987 . Principles of cultivar development : Vol . 1. Theory and technique . Macmillan . Pub Co., N.Y. 536p.

Fehr , W . R . and H . H . Hadley . (Eds) . 1980 . Hybridization of crop plants . Amer . Soc . Agron . Madison , Wisc .

Flavell , R . B . 1982 . Recognition and modification of crop plant genotypes using techniques of molecular biology . In . I . K . Vasil , W . R . Scowcroft and K . J . Frey (Eds) " Plant Improvement and Somatic

Cell Genetics " , pp . 277 - 291 . Academic Pr., N . Y .

Fobes , J . F . 1987 . Progress in tomato biotechnology . Acta Hort . 200 : 91 - 95 .

Foldo , N . E . 1987 . Genetic resources : their preservation and utilization . In G.J. Jellis and D. E . Richardson (Eds) " The Production of New Potato Varieties : Technological Advances " , pp . 10 - 27 . Cambridge Univ . Pr., Cambridge .

Foster , J . A . 1988 . Regulatory actions to exclude pests during the international exchange of plant germplasm . HortScience 23 : 50 - 66 .

Frankel , O . H . and E. Bennett (Eds) 1970 . Genetic resources in plants : their exploration and conservation . Blackwell Sci . Pub . Oxford . 554 p .

Frankel , O . H . and J . G . Hawkes . (Eds) . 1975 Crop genetic resources for today and tomorrow . Cambridge Univ . Pr., Cambridge . 492p .

Frankel , R . and E . Galun . 1977 Pollination mehanisms , reproduction and plant breeding . Springer - Verlag , Berlin . 281 p .

Frey , K . J . 1972 . Self - and Cross-incompatibility systems in plants . Egypt . J . Genet . Cytol . 1 : 122-139 .

Frey , K . J . and T . Horner . 1957 . Heritability in standard units . Agron . J . 49 : 59 - 62 .

Fryxall . P . A . 1957 . Mode of reproduction of higher plants. Bot . Rev . 23 : 135 - 233 .

Galun , E. 1982 . Somatic cell fusion inducing cytoplasmic exchange : a new biological system for cytoplasmic genetics in higher plants . *In* . I . K . Vasil , W . R . Scowcroft and K . J Frey (Eds) " Plant Improvement and Somatic Cell Genetics " , pp . 205 - 219 . Academic Pr . , N . Y .

Gamble. E. E .1962.Gene effects in corn (*Zea mays* L .) I . Separation and relative importance of gene effects for yield. *Canad . J . Plant Sci.* 42 : 339 - 348 .

Gardner , E . J . and D . P . Sunstead . 1984 . Principles of genetics . John Wiley & Sons , N. Y . 580 p .

Gaynor , J . J . and R . Kaur -Shawhney . 1985 . Production of novel crops by somatic hybridization . *In* C.A . Neyra (Ed.) "Biochemical Basis of Plant Breeding. Vol . 1 Carbon . Metabolism" pp . 15 - 24 CRC Pr . , Inc . , Boca Raton , Florida .

George . R . A . T . 1985 . Vegetable seed production . Longman , London . 318 p .

George , R . A . T . (Ed.) 1986 . Technical guideline on seed potato micropropagation and multiplication . Food and Agriculture Organization of the United Nations , Rome . 55p .

Gomez , K . A . and A. A. Gomez . 1984 . Statistical procedures for agricultural research . John Wiley & Sons, N . Y . 680p .

Gonzales , R . A . and J.M . Widholm . 1985 . Selection of Plant cells for desirable characteristics : inhibitor resistance . *In* R . A . Dixon (Ed.) "Plant Cell Culture : a Practical Approach" , pp . 67 - 68 . IRL Pr . , Oxford .

Greenleaf , W . H . 1986 . Pepper breeding . *In* M . J . Bassett (Ed.) " Breeding Vegetable Crops " , pp . 67 - 134 . Avi Pub. Co ., Inc ., Westport , Connecticut .

Griesbach , R . J . 1984 . An introduction to somatic cell genetics . *HortScience* 19 : 367 - 371 .

Griffing , B. 1956 . Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems . *Aust . J . Biol. Sci .* 9 : 463 -493 .

Gritton . E . T . 1986 . Pea breeding . *In* M.J.Bassett (Ed.) "Breeding Vegetable Crops " , PP . 283 - 319 Avi Pub .Co., Inc . Westport , Connecticut .

Grosch , D . S . 1965 . Biological effects of radiations . Blaisdell Pub. Co., N . Y . 293 p .

Haglund . W . A . and W . C . Anderson . 1987 . Effect of single plant selection in commercial pea cultivars on bloom dates and on green pea yield for processing . *HortScience* 22 : 483 - 485 .

Hal , J . G .van and W . Verhoeven . 1968 . Identification of S - alleles in Brussels sprouts . Brassica meeting of Eucarpia . Horticultural Section : 4 - 6 Sept . 1968 , Wellesbourne , England . pp . 32 - 33 . Cited from *Plant Breed . Abstr .* 40 : Abstr . 3943 . 1970 .

Hanke, D . E . 1980 . The preparation , manipulation and culture of plant protoplasts . *In* D . S . Ingram and J . P . Helgeson (Eds) " Tissue Culture Methods for Plant Pathologists" , pp. 27 - 31 . Blackwell Sci . Pub ., Ixford .

Henson , W . D . and H . F . Robinson . (Eds) 1963 . Statistical

genetics and plant breeding . Nat . Acad . Sci ., Wash ., D . C . 623p .

Harberd , D . J . 1969 . A simple effective embryo culture technique for *Brassica* . *Euphytica* 18 : 425 - 429 .

Harding , P . H . 1983 . Testing and cultivar evaluation . In J.N. Moore and J . Janick (Eds) "Methods in Fruit Breeding" , pp . 371 - 382 . Purdue Univ . Pr ., West Lafayette , Indiana .

Harlan , J . R . 1966 . Plant introduction and biosystematics In K . J . Frey (Ed.) " Plant Breeding " , pp . 55 - 83 . Iowa State Univ . Pr ., Ames , Iowa .

Harlan . J . R . 1975 . Seed crops . In O . H . Frankel and J . G . Hawkes (Eds) " Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp . 111 - 115 . Cambridge Univ . Pr ., Cambridge.

Harrington , J . F . 1970 . Seed and pollen storage for conservation of plant genec resources . in O . H . Frankel and E . Bennett (Eds) "Genetic Resources in Plants" , pp . 501 - 521. Blackwell Sci . Pub . Oxford .

Hartmann , H. T. and D. E. Kester .1983 .(4th ed.). Plant propagation : principles and practices . Prentice / Hall International , Inc., Englewood Cliffs , New Jersey . 727 p .

Hassan , A. A., D. H. Wallace and R . E . wilkinson . 1971 . Genetics and heritability of resistance to *Fusarium soloni* f. *phaseoli* in beans. J . Amer . Soc . Hort . Sci . 96 : 623 - 627

Hawkes , J . G . 1975 . Vegetatively propagated crops . In O . H . Frankel and J . G . Hawkes (Eds) " Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp . 117 - 121 . Cambridge Univ , Pr ., Cambridge .

Hawkes , J . G . 1983 . The diversity of crop plants . Harvard Univ . Pr . , Cambridge Massachusetts . 184 p .

Hayes , H . K . , F . R . Immer and D . C . Smith . 1955 . Methods of plant breeding . McGraw , N . Y . 551 p .

Helgeson , J . P . 1980 . Plant tissue and cell suspension culture . *In* D . S . Ingram and J . P . Helgeson (Eds) " Tissue Culture Methods for Plant Pathologists " ; pp . 19-25. Blackwell Sci . Pub . , Oxford .

Henshaw , G . G . and J . F . O'hara . 1983 . In Vitro approaches to the conservation and utilisation of global genetic resources . *In* S . H . Mantell and H . Smith (Eds) " Plant Biotechnology " , pp . 219 - 238 . Cambridge Univ . Pr . , Cambridge .

Henshaw , G . G . , J . F . O'hara and R . J . Westcott . 1980. Tissue culture methods for the storage and utilization of potato germplasm . *In* . D . S . Ingram and J . P . Helgeson (Eds) "Tissue Culture Methods for Plant Pathologists " , pp . 71-76. Blackwell Sci . Pub. , Oxford .

Hermesen , J . G . Th . 1987 . Efficient utilization of wild and primitive species in potato breeding . *In* . G . J . Jellis and D . E. Richardson (Eds) " The Production of New Potato Varieties : Technological Advances " , pp . 172 - 185 . Cambridge Univ . Pr., Cambridge .

Herskowitz , I . H . 1965 . Genetics . Little . Brown & Co . , Boston . 554 p .

Hewitt , W . B . and L . Chiarappa . 1977 . Plant health and quarantine in international transfers of genetic resources . C R C Press , Inc., Cleveland , Ohio , 346p .

Hull . R . 1983 . The current status of plant viruses as potential DNA / RNA vector systems . *In* S . H . Mantell and H . Smith (Eds) " Plant Biotechnology " pp . 299 - 312 . Cambridge Univ . Pr ., Cambridge .

Hussain . A , H . Ramirez , W . Bushuk and W . Roca . 1986 . Field bean (*Phaseolus vulgaris* L .) cultivar identification by electrophoregrams of cotyledon storage proteins . *Euphytica* 35 : 729 - 732 .

Hussey , G. 1980 . In vitro propagation .*In* D . S . Ingram and J . P . Helgeson (Eds) " Tissue Culture Methods for Plant Pathologists " , pp . 51 - 91 . Blackwell Sci . Pub ., Oxford .

Hussey , G . 1983 . In vitro propagation of horticultural and agricultural crops . *In* S . H.Mantell and H . Smith (Eds) "Plant Biotechnology " , pp . 111 - 138 . Canbridge Univ . Pr., Cambridge .

Hutchinson , J . (Ed.) 1974 . Evolutoinary studies in world Crops Cambridge Univ. Pr., Cambridge , England .

Hyland , H. L. 1975 . Recent plant exploration in the U . S . A. *In* O . H . Frankel and J . G . Hawkes (Eds) " Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp . 139 - 146 . Cambridge Univ. Pr., Cambridge .

Imanishi , S . and L . Chen . 1989 . Hybridzation between the tomato cultivars and wild species *Lycopersicon peruvianum* by means of ovule culture . Tomato Genetics Cooperative Report No . 39 : 17 - 18 .

Ingram . D . S . and Helgeson , J . P . (Eds) . 1980 . Tissue culture methods for plant pathologists . Blackwell Scientific Publications , Oxford . 272 p .

International Atomic Energy Agency , Vienna . 1968 . Mutations in plant breeding . 311 p .

International Atomic Energy Agency , Vienna . 1973 . Induced mutations in vegetatively propagated plants . 222 p .

Jacobs , M . 1975a . Isozymes and a strategy for their utilization in plant genetics . I . Isozymes : genetic and epigenetic control . *In* L . Ledoux (Ed.) " Genetic Manipulations with Plant Material " , pp . 365 - 378 . Plenum pr., N . Y .

Jacobs , M. 1975b . Isozymes and a strategy for their utilization in plant genetics . *In* L . Ledoux (Ed.) " Genetic Manipulations with Plant Material " , pp . 379 . 389 . Plenum Pr . N . Y .

Jan , C . - C . , C. O . Qualset and J . Dovark . 1982 . Wheat - barley hybrids . Calif . Agr . 36 (8) : 23 - 24 .

Janick , J. and J . Moore . (Eds) . 1975 . Advances in fruit breeding . Purdue Univ . Pr . , West Lafayette , Indiana 623 p .

Janick , J . , R . E . Bagwill and J . R . Nesbitt . 1983 . Cultivar . release and protection . *In* J . N . Moore and J . Janick (Eds) "Methods in Fruit Breeding " , pp . 383 - 398 . Purdue Univ . Pr . , West Lafayette , Indiana .

Jensen . C . J . 1981 . Uses of Cell and tissue culture techniques in plant breeding and genetics . *In* . K . O . Rachie and J . M . Lyman (Eds) "Genetic Engineering for crop Improvement" , pp . 87 - 104 . The Rockefeller Foundation .

Johanson , A . G . 1971 . Factors affecting the degree of self-

incombiatility in inbred lines of brussels sprouts . Euphytica 20 : 561 - 573 .

Johri , B . M . and I . K . Vasil . 1961 . Physiology of pollen. Bot. Rev . 27 : 325 - 381 .

Johri , B . M ., P . S . Srivastava and A . P . Raste . 1980 . Endosperm culture . In I . K . Vasil (Ed.) " Prespectives in Plant Cell and Tissue Culture " , pp 157 - 182 . Academic Pr., N . Y .

Jones , R . W . 1968 . Hybridization of apricot x almond . Proc . Amer . Soc . Hort . Sci . 92 : 29 - 33 .

Justice , O . L . and L . N . Bass . 1979 . Principles and practices of seed storage . Castle House Pub . Ltd., London . 289 p .

Kado , C . I . 1982 . Crossing natural barriers to genetic manipulations . Calif . Agr . 36 (8) : 14 - 15 .

Kahn , R . P . 1970 . International plant quarantine . In . O . H . Frankel and E . Bennett (Eds) " Genetic Resources in Plants : Their Exploration and Conservation " , pp-403 - 411 . Blackwell Sci pub ., Oxford .

Knave . D . E . 1988 . Ky - P7 short internode muskmelon. HortSci-ence 23 : 224 .

Knight , R . L . , J . H . Parker and E . Keep . 1972 . Abstract Bibliography of fruit breeding and genetics : *Rubus* and *Ribes* : 1956 - 1969 . Commanwealth Bureau of Horticulture and Plantation Crops , East Malling . Tech . Communion No . 32 . 449 p .

Knott , D . R . and J . Dovrak . 1976 . Alien germplasn as a source of resistance to disesse . Ann . Rev . Phytopath . 14 : 211 - 235 .

Krull . C . F . and N . E Borlaug . 1970 . The utilization of collections in plant breeding and production . In O . H . Frankel and E . Bennett (Eds) " Genetic Resources in Plants " , pp. 427- 439 .

Blackwell Sci . Pub. , Oxford .

Kwon , S . H . and J . H . Torrie . 1964 . Heritability and interrelationships among traits of two soybean populations . Crop Sci : 4 : 196 - 198 .

Longhans , R.W., R . K . Horst and E . D Earle . 1977 . Disease - free plants via tissue culture propagation . HortScience 12 : 149 - 150 .

Lapins . K . O . 1983 . Mutation breeding . In J . N . Moore and J . Janick (Eds) " Methods in Fruit Breeding " , pp. 74-99 . Purdue Univ . Pr., West Lafayette , Indiana .

Larter , E . N . 1979 . Triticale . In N . W . Simmonds (Ed.) "Evaluation of Crop Plants" , pp. 117-120 . Longman . London.

Layne , R . E . C . 1983 . Hybridization . In J . N . Moore and J . Janick (Eds) " Methods in Fruit Breeding " , pp . 48-65 . Purdue Univ Pr., West Lafayette . Indiana .

LeClerc , E . L , W . H . Leonard and A . G . Clark . 1962 . Field plot technique . Burgess Pub . Co., Minneapolis . Minn . 373p.

Ledoux,L.(Ed.) 1975 . Genetic manipulations with plant material . Plenum Pr . , N . Y . 601 p .

Leon , J . (Ed.) 1974 . Handbook of plant introduction in tropical crops . Food and Agr . Org. of the U . N . , Rome.140p .

Leopold , A . C . and P . E . Kriedmann . 1975 . (2nd ed .). Plant growth and development . McGraw - Hill Book Co., N . Y . 545 p .

Leppik , E . E . 1970 . Gene centers of plants as sources of disease resistance . Ann . Rev . Phytopath . 8 : 323 - 344 .

Li , C . C . 1955 . Population genetics . The Univ . of Chicago Pr., Chicago . 366 p .

Lindhout , P . and C. Purimahua . 1988 . Use of *L.peruvianum* LA 1708 and LA 2172 as bridge between *L . esculentum* and *L.peruvianum* . Tomato Genetics Cooperative Report 38:29.

Linskens , H . F . (Ed.) . 1964 . Pollen physiology and fertilization . North - Holland Pub . Co . Amsterdam . 257 p .

Little , T . M. and F . J . Hills . 1978 . Agricultural experimentation . John Wiley & Sons, N . Y . 350p .

Lobo , M . and O . Marulanda . 1989 . Crossibility of LA 1708 and interspecific hybrids as genetic bridge between *L.peruvianum* and *L. esculentum* . Tomato Genetics . Cooperative Report 39:23-24 .

Lyons , M . E . , M . H . Dickson and J . E . Hunter. 1987 . Recurrent selection for resistance to white mold in *Phaseolus* species . J . Amer . Soc . Hort . Sci . 112:149 - 152 .

Magness , J . R . 1937 . Progress in apple improvement . In " Yearbook of Agriculture : Better Plants and Animals II " , pp. 575 - 614 . U . S . Dept . Agr ., Wash., D . C .

Maliga , P ., L . Menczel , V . Sidorov , L . Marton , A . Csepl, P . Medgyesy , T . M . Dung ., G . Lazar and F . Nagy . 1982 . Cell culture

mutants and their uses . *In* I . K . Vasil , W . R . Scowcroft and K.J. Frey (Eds) " Plant Improvement and Somatic Cell Genetics " , pp . 221 - 237 . Academic Press , N . Y .

Mantell , S . H . and H . Smith . (Eds) . 1983 . Plant biotechnology . Cambridge Univ . Pr . Cambridge . 334 p .

Martin , F . W . 1959 . Staining and observing pollen tubes in the style by means of fluorescence . *Stain Technol* . 34 : 125 - 127 .

Mather , K . 1949 . Biometrical genetics . Dover Pub., Inc., London . 158 p .

Mather , K . and J . L . Jinks 1971 . Biometrical genetics . Chapman and Hall Ltd , London . 382 p .

Mather, K . and J . L . Jinks 1977. Introduction to bionetrical genetics . Chapman and Hall , London . 231 p .

McArdle , R . N . and J . C . Bouwkamp . 1980 . The use of gelatin capsules in controlled pollinations . *Euphytica* 29 : 819 - 820 .

McDaniel , R . G . 1981 . Plant genetic engineering : Possibilites for organelle transfer . *In* K . O . Rachie and J . M . Lyman (Eds) " Genetic Engineering for crop Improvement " , pp 185 - 205 - The Rockefeller Foundation .

Merrell . D . J . 1975 . An introduction to genetics . W . W . Norton & Co., Inc ., N . Y . 822 p .

Mohr , H . C . 1986 . Watermelon breeding *In* M . J . Bassett (Ed) "Breeding Vegetable Crops" , pp. 37-66 . Avi Pub. Co., Inc ., Westport , Connecticut .

Monteiro , A . A . , W . H . Gabelman and P. H. Williams . 1988 . Use of sodium chloride solution to overcome self - incompatibility in *Brassica campestris* . HortScience 23 : 876 - 877 .

Moore , J . N . 1988 . Horticultural science in a changing world : Presidential Address . HortScience 23 : 799-803 .

Moore , J . N . and J . Janick . (Ed.) 1983. Methods in fruit breeding . Purdue Univ . Pr., West Lafayette , Indiana . 464 p .

Morel . G . 1972 The impact of plant tissue culture on plant breeding . In F.G.H. Lupton , G . Jenkins and R. Johnson (EdS) " The Way Ahead in Plant Breeding " , pp . 185-194. The Plant Breeding Institute , Cambridge .

Morel , G . 1975 . Meristem culture techniques for the long term storage of cultivated plants . In O . H . Frankel and J . G . Hawkes (Eds) : "Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp . 327 - 332 . Cambridge Univ Pr ., Cambridge .

Moseman , A . H . 1966 . International needs in Plant breeding research . In K . J . Frey (Ed) " Plant Breeding " , pp . 409 - 420 . Iowa State Univ . Pr., Ames . Iowa .

Murashige , T . 1974 . Plant propagation through tissue cultures. Ann . Rev. Plant Physiol. 25: 135 - 166 .

Murashige . T . 1977 . Current Status of plant cell and organ cultures . HortScience 12:127-130 .

Myers , J .R . and E . T : Gritton . 1988 . Genetic male sterility in the pea (*Pisum sativum* L .) : I . Inheritance , allelism and linkage .

Euphytica 38 : 165 - 174 .

Ng, T. J . 1988. Fabric Plant covers as an aid in muskmelon breeding . Hortscience 23 : 913 .

Nickell , L . G . 1982 . Plant growth regulators : agricultural uses . Springer Verlag, N . Y . 173p .

Nitsch , C . 1975 . Single cell culture of an haploid cell : The microspore . In L . Ledoux (Ed) " Genetic Manipulations with Plant Material " , pp . 297 - 310 . Plenum Pr ., N . Y .

North , C . 1979 . Plant breeding and genetics in horticulture. Macmillan Pr . Ltd ., London . 150p .

Norton . J . D . 1966 . Testing of plum pollen viability with tetrazolium salts . Proc . Amer . Soc . Hort . Sci . 89 : 132 - 134.

Nugent , P. E. 1987 . C 879 - J₁ and- J₂ virescent mutant muskmelon breeding lines . HortScience 22 : 333- 335 .

Nygren, A . 1954 . Apomixis in angiosperms . II . Bot . Rev . 20 : 577- 649 .

Ochoa, C . 1975 . Potato collecting expditions in Chile , Bolivia and Peru , and The genetic erosion of indigenous cultivars . In O . H . Frankel and J . G . Hawkes (EdS) " Crop Genetie Resources for Today and Tomorrow " , pp . 167 - 173 . Cambridge Univ . Pr., Cambridge .

Panopoulos , N . J . (Ed) . 1981 . Genetic engineering in plant sciences. Praeger Pub ., N . Y . 271 p .

Paul , J . 1970 (4 th ed .) . Cell and tissue culture . Churchill

Livingstone , London . 430 p .

Pearson , O . H . 1981 . Nature and mechanisms of cytoplasmic male sterility in plants : a review . HortScience 16 : 482 - 487 .

Peloquin , S . J . 1981 . Chromosomal and cytoplasmic manipulations . In K . J . Frey (Ed.) " Plant Breeding II " , pp . 117- 150 . The Iowa State Univ . Pr., Ames .

Peterson , C . E. 1975 . Plant introductions in the improvement of vegetable cultivars . HortScience 10 : 575 - 579 .

Peterson , R . H . and H . G . Taber . 1987 . Technique for vital staining of tomato pollen with fluorescein diacetate . HortScience 22 : 953 .

Pike , L . M . 1986 . Onion breeding . In M . J . Bassett (Ed.) " Breeding Vegetable Crops " , pp . 357 - 394 . Avi Pub. Co., Inc., Westport , Connecticut .

Poehlman , J . M . 1979 (2nd ed.) . Breeding field crops . Avi Pub . Co ., Inc ., Westport , Conn . 483p .

Postgate , J . 1975 . The Physiology and genetics of nitrogen fixation . In L . Ledoux (Ed.) " Genetic Manipulations with Plant Material " , pp 123-134 . Plenum Pr . N . Y .

Power . J . B . and J . V . chapman . 1985 . Isolation , culture and genetic manipulation of plant protoplasts . In R . A Dixon (Ed) " Plant Cell Culture : a Practical Approach " , pp 37-66 . IRL . Pr . , Oxford .

Powers , L . and C . B . Lyon . 1941 . Inheritance studies on duration of developmental stages in crosses within the genus *Lycopersicon* . J . Agr . Res . 63:129-148.

Powers , L., F. Locke and J . C . Garrett . 1950. Partitioning method of genetic analysis applied to quantitative characters of tomato cross . U . S . Dept . Agr . Tech . Bul. 998 .

Purseglove , J . W . 1972 . Tropical crops : monocotyledons. The English Language Book Society , London . 607 p.

Purseglove . J . W . 1974 . Tropical crops : dicotyledons . The English Language Book Society , London . 719 p .

Rachie , K . O . and J . M . Lyman . (Eds) . 1981 . Genetic engineering for crop improvement . The Rockefeller Foundation . 254 p .

Raghavan , V . 1980 . Embryo culture . *In* I. K . Vasil (Ed .) "Perspectives in plant Cell and Tissue Culture " , pp. 209-240. Academic Pr ., N . Y .

Reed . B . M . and H . B . Lagerstedt . 1987 . Freeze preservation of apical meristems of *Rubus* in liquid nitrogen . HortScience 22 : 302 - 303.

Reinert, J . and M . M . Yeoman ,. 1982 . Plant cell and tissue culture : a laboratory manual . Springer - Verlag , Berlin . 83 p .

Rick , C . M . 1970 . Genetics and breeding cooperatives for horticultural crops . HortScience 5 : 142-144 .

Rick , C . M . 1979 . Evaluation of interspecific barriers in *Lycopersicon* . *In* A.C. Zeven and A . M . Van Harten (Eds) "Broadening the genetic Base of Crops" pp . 283-286. Centre for Agr . Pub . & . Doc., Wageningen .

Rick . C . M . 1980 . Potential improvement of tomatoes by controlled introgression of genes from wild species . *In* A . C . Zeven and A . M .

Van Harten (Eds) " Broodening. The Genetic Base of Crops", pp. 167-173 Centre for Agr. Pub . & Doc., Wageningen.

Rick , C .M. 1982 . Isozymes in plant breeding . Calif . Agr . 36 (8) : 28 .

Rick , C . M : 1987 . Seedling traits of primary trisomics . Tomato Genetics Cooperative Repot 37 : 60-61.

Riggs , T . J . 1988 . Breeding F₁ hybrid varieties of vegetables . J . Hort . Sci . 63: 369-382.

Roberts , E . H . 1975 . Problems of long - term storage of seed and pollen for genetic resources conservation . In O . H . Frankel and J . G . Hawkes (Eds) " Crop Genetic Resourees for Today and Tomorrow " , pp . 269-295 . Cambridge Univ . Pr., Cambridge .

Robinson , R . W , H . M . Munger , T . W . Whitaker and G . W . Bohn . 1976. Genes of the Cucurbitaceae . HortScience 11 : 554-568.

Roggen , H . P . J . R . and A . J . Van Dijk . 1972 . Breaking incompatibility of *Brassica oleracea* L . by steel-brush pollination . Euphytica 21:424-425 .

Roggen , H . P . J . R . , A . J . Van Dijk and C . Dorsman . 1972 . 'Electric aided' pollination : a method of breaking incompatibity in *Brassica olercea* L . Euphytica 21:181-184 .

Roos , E . E . 1988 . Genetic changes in a collection over time . HortScience 23 : 86 - 90 .

Rost T . L . , M . G . Barbour , R .M Thornton , T . E Weier and C . R . Stocking 1984 . Botany .John Wiley & Sons , N. Y. 242 p .

Rowe , P . 1981. Breeding an ' intractable ' crop : bananas . *In* K . O . Rachie and J . M . Lyman (Eds) " Genetic Engineering for Crop Improvement " , pp ., 66-83. The Rockefeller Foundation .

Ryder , E . J . 1979 . Leafy salad vegetables . The Avi Pub . Co ., Inc ., Westport , Conn. 266p .

Ryder , E . J . 1984 . The art and science of plant breeding in the modern world of research management . *HortScience* 19:808-811 .

Sakai , A . and M . Noshiro. 1975 . Some factors contributing to the survival of crop seeds cooled to the temperature of liquid nitrogen . *In* O . H . Frankel and J . G . Hawkes (Eds) "Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp . 317-326. Cambridge Univ . Pr ., Cambridge .

Sala , F ., B . Parisi , R . Cella and O . Ciferri . 1980 . Plant cell cultures : results and perspectives. Elsevier, Amsterdam . 433p .

Salisbury , F . B . 1982 . Photoperiodism . *Hort . Rev .* 4 : 66-105 .

Savin , F ., V . Decombe , M . Le Couvieur and J . Hollard . 1988 . The x-ray detection of haploid embryos arisen in muskmelon (*Cucumis melo* L .) seeds , and resulting from a parthenogenetic development induced by irradiated pollen . *Cucurbit Genetics Cooperative Report* 11 : 39-42.

Schell , J . et al . 1982 . Plant cell transformations and genetic engineering . *In* I . K . Vasil , W . R . Scowcroft and K . J . Frey . (Eds) "Plant Improvement and somatic Cell Genetics" . Academic Pr., N . Y .

Schieder , O . 1982 . Somatic hybridization : a new method for plant improvement . *In* I . K . Vasil , W . R . Scowcroft and K . J . Frey (Eds)

" Plant Improvement and Somatic Cell Genetics" , pp 239-253 . Academic Pr., N . Y .

Schieder , O . and I . K . Vasil . 1980 . Protoplast fusion and somatic hybridization . *In* . I . K . Vasil (Ed.) " Pererspective in Plant Cell and Tissue Culture " , pp . 21-46 Academic Pr.,N. Y.

Schroder , J ., H . de Greve , J . P . Hernalsteens . J . Leemans , M . Van Montague , L . Aotten , G . Schroder . L . Willmitzer and S . Schell . 1983 . Ti Plasmid - mediated gene transfer to higher plant cells . *In* . S . H . Mantell and H . Smith (Eds) " Plant Biotechnology " , pp . 313-326 Cambridge Univ . Pr., Cambridge

Science and Education Administration - Agriculturat Research, U . S . Department of Agriculture . 1980 . Nursery production of fruit plants through tissue culture : applications and feasibility. 119 p .

Scowcroft , W . R . 1982 . Somatoclonal variation : a new option for plant improvement . *In* . I . K . Vasil , W . R . Scowcroft and K . J . Frey (Eds) " Plant Improvement and Somatic Cell Genetics " , pp . 159-179 . Academic Pr., N . Y .

Sagaravatti , E . and J . Beaney-Longhi . 1982 . World list of seed sources . Food and Agriculture Organization of the United Nations , Rome . 175 p .

Sharvelle , E . G . 1979 . Plant disease control . Avi Pub . Co., Inc ., Westport , Connecticut . 331 p .

Shepherd . R . J ., S . D . Daubert and R . C . Gardner . 1982. DNA plant viruses. Calif Agr. 36(8) : 16.

Sheppard , R . A . 1973 . Practical genetics . Blackwell Sci . Pub .,

Oxford . 337 p .

Shull , A.F. 1951 (2nd ed.) . Evolution . McGraw-Hill Book Co., Inc ., N . Y . 322 p .

Simmonds. N. W. 1979 . Principles of crop improvement . Longman , London . 408 p .

Singh . R . K . and B . D . Chaudhary . 1979. Biometrical methods in quantitative genetic analysis . Kalyani Pub ., New Delhi. 304 p .

Sinha . S . K . and R . Khanna . 1975 . Physiological , biochemical and genetic basis of heterosis . Adv . Agron . 27 : 123-174 .

Sink , K . C . 1984 . Protoplast fusion for plant improvement . HortScience 19 : 33 - 37 .

Sink, K.C. Jr., and V. Padmanabhan. 1977. Anther and pollen culture to produce haploids: progress and application for the plant breeder. Hort-Science 12:143-148.

Simmonds, N.W. (Ed.). 1976. Evaluation of crop plants. Longman, London. 339p.

Skrdla, W.H. 1972. New crops - food for the future ? HortScience 7:156-159.

Skrdla, W.H. 1975. The U.S. plant introduction system. HortScience 10 : 570 - 574.

Smith , D . C . 1966 . Plant breeding - development and success . In K . J . Frey (Ed) " Plant Breeding " , pp . 3-54. Iowa State Univ . Pr ., Ames , Iowa .

Snedecor , G . W . 1956 . Statistical methods. The Iowa State College Pr ., Ames . Iowa .534 p .

Snedecor , G . W . and W . G . Cochran . 1967 (6th ed.) . Statistical methods . Oxford & IBH Pub . Co ., New Delhi . 593 p .

Sneep , J . and A . J . T . Hendriksen (Eds) and O. Holbek (Coed.) . 1979 . Plant breeding prespectives . Centre for Agr . Pub . and Doc ., Wageningen . 435 p .

Snyder , E . 1937 . Grape development and improvement . *In* "Yearbook of Agriculture : Better Plants and Animals II ", pp. 631 - 664 . U . S . Dep t . Agr ., Wash ., D . C .

Splitstoeser , W . E . 1979 . Vegetable growing handbook . AVI Pub . Co ., Inc., Westport , Connecticut . 298 p .

Sprague , G . F . 1966 . Quantitative genetics in Plant improvement . *In* . K . G . Frey (Ed.) " Plant Breeding ", pp . 315 - 354 . Iowa State Univ. Pr., Ames . Iowa .

Sprague , G . F . 1967 . Plant breeding . Ann . Rev. Genet . 1 : 269-294 .

Staba , E . J . 1980 . Plant tissue culture as a source of biochemicals . CRC Press , Inc ., Boca Raton, Florida . 285 p .

Stakman , E . C ., R . Bradfield and P . C . Mangelsdorf . 1967. Campaigns against hunger . The Belknap Press of Harvard University Press , Cambridge . Mass . 328p

Stanwood , P . C . and E . E . Roos . 1979 . Seed storage of several

horticultural species in liquid nitrogen (- 1960 C) . HortScience 14:624-630 .

Stavark , S . T . and D . W . Rains , 1984 . The development of tolerance to mineral stress . HortScience 19:377- 384 .

Steel , R . G . D . and J . H . Torrie . 1960 . Principles and procedures of statistics . McGraw , N . Y . 481 p .

Street , H . E . 1975 . Plant cell cultures : present and projected applications for studies in genetics . In L . Ledoux (Ed .) " Genetic Manipulations with Plant Material " , pp . 231 -244.Plenum Pr., N . Y .

Sunderland , N . 1980 . Guidelines in the culture of pollen *in vitro* . In D . S . Ingran and J . P . Helgeson (Eds) " Tissue Culture Methods for Plant Pathologists" , pp . 33-40 . Blackwell Scientific Pub ., Oxford .

Swamy , B . G . L . and K . V . krishnamurthy . 1980 . From flower to fruit . Tata McGraw - Hill Pub . Co . Ltd , New Delhi . 162 p .

Swanson , C . P ., T.Merz and W . J . Young . 1967 . Cytogenetics . Prentice - Hall . Englewood Cliffs , N . J . 194P .

Sykes , J . T . 1975 . Tree crops . In O . H . Frankel and J . G . Hawkes (Eds) " Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp . 123-137 . Cambridge Univ . Pr ., Cambridge .

Tang , F . A . and Z . K . Punja . 1989 . Isolation and Culture of protoplasts of *Cucumis sativus* and *Cucumis metuliferus* and methods for their fusion . Cucurbit genetics Cooperative Report 12:29-34 .

Tanksley . S . D . and R . A . Jones . 1981 . Effects of O₂ stress on tomato alcohol dehydrogenase activity : description of a second ADH coding gene . Biochem . Genetics 19:398-409 .

The Rockefeller Foundation 1966 . Progress Report : Toward the conquest of hunger 1965-1966 , N . Y . 231 p .

Thomas . B . R . and D . Pratt . 1982 . Embryo callus hybrids . Calif . Agr . 36(8) : 27 .

Thompson . A . E . 1972 . Introduction and establishment of improved crop cultivars in developing countries . HortScience 7: 162-164 .

Thorpe . T . A . (Ed.) . 1981 . Plant tissue culture : methods and application in agriculture . Academic Pr . , N . Y . 379 p .

Tisserat , B . 1985 . Embryogenesis , organogenesis and plant regeneration . In R . A . Dixon (Ed.) " Plant Cell Culture : a Practical Approach " , pp 79-105 . IRL Pr., Oxford .

Tisserat , B . , E . B . Esan and T . Murashige . 1979 . Somatic embryogenesis in angiosperms . Hort . Rev . : 1-78 .

Toenniessen , G . H . 1984. Review of the world food situation and the role of salt -tolerant plants . In R . C Staples and G . H . Toenniessen (Eds) " Salinity Tolerance in Plants : Strategies for Crop Improvement " , pp . 399 - 413 . Wiley - Interscience, N. Y .

Towill , L . E . 1988 . Genetic considerations for germplasm preservation of clonal materials . HortScience 23 : 91-95.

Turk . K . L . 1964 Can a hungry world be fed ? Cornell Univ . Agr . Dev . Bul . 8 .23P .

Uhlinger , R . D . 1982 . wide crosses in herbaceous perennials . HortScience 17 : 570 - 574 .

United States Department of Agriculture . 1937 . Yearbook of Agriculture : better plants and animals II. 1497 p .

University of Arizona , Tucson . 1980 . Report on research at the University of Arizona . 1979-1980,39 p.

University of California , Division of Agricultural Sciences . 1982.Genetic engineering of plants . Calif . Agr . 36(no . 8).35 p .

Valentine , R . C . 1982 . "Nif" and "hup" genes . Calif . Agr . 36(8) : 10 .

Van Der Meer , Q . P . and J . L . Van Bennekom . 1973 . Gibberellic acid as a gametocide for the common onion (*Allium cepa* L .) . Euphytica 22 : 239-243.

Vasil , I . K . 1964. Effect of boron on pollen germination and pollen tube growth . In H . F . Linskens (Ed .) " Pollen Physiology and Fertilization " pp. 107-119 .North Holland Pub. Co ., Amsterdam .

Vasil , I . K . 1976 . The progress , Problems , and prospects of plant protoplast research . Adv . Agron . 28:119-160.

Vasil , I . K . (Ed.) 1980 . Prespective in plant cell and tissue culture . Academic Pr., N . Y . 257 p .

Vasil . I . K and V . Vasil . 1980 . Isolation and culture of protoplasts . In I . K . Vasil (Ed.) " Perspective in Plant Cell and Tissue Culture " pp . 1-19 Academic Pr., N . Y .

Vasil . I . K . W . R . Scowcroft and K . J . Frey . (Eds) . 1982 . Plant improvement and somatic cell genetics . Academic Pr., N . Y . 300 p .

Vaughn . K . C . 1983 . Chimeras and Variegation : Problems in propagation . HortScience 18:845 - 848 .

Vavilov , N . I . 1951. The origin , variation , immunity and breeding of cultivated plants . Translated by K . S . Chester . The Ronald Press Co., N . Y . 364 p .

Villiers , T . A . 1975 . Genetic maintenance of seeds in imbibed storage . In O . H . Frankel and J . G . Howkes (Eds) "Crop Genetic Resources for Today and Tomorrow " , pp .297-315 . Cambridge Univ . Pr ., Cambridge .

Vince - Prue , D . 1975 . Photoperiodism in plants . McGraw - Hill Book Co ., London . 444 p .

Visser , T . and J . J . Verhaegh . 1978 . Inheritance and selection of some fruit characters of apple . II . The relation between leaf and fruit pH as a basis for pre-selection . Euphytica 27:761-765 .

Wallace , B . and A . M . Srb . 1964 . Adaptation . Prentice - Hall , Enlewood Cliffs , N . J . 115 p .

Wallace , D . H . and M . E . Nasrallah . 1968 . Pollination and Serological procedures for isolating incompatibility genotypes in the crucifers . Cornell Univ . , Agr . Exp . Sta ., N . Y. State College of Agr., Ithaca . Memoir 406.23 p .

Warner , J . N . 1952 . A method for estimating heritability . Agron . J . 44: 427-430.

Watts , L . 1980. Flower and vegetable plant breeding - Grower Books , London . 182 p .

Way , R . D . 1971 . Hastening the fruiting of apple seedlings . J . Amer . Soc . Hort . Sci . 96:384-389.

Weier. T. E., C . R . Stocking. and M . G . Barbour . 1974. (5th ed) . Botany : an introduction to plant biology . John Wiley & Sons , N . Y . 693 p .

Welsh , J . R . 1981 . Fundamentals of plant genetics and breeding . John Wiley & Sons , N . Y . 290 p .

Westergaard , M . 1958 . The mechanism of sex determination in dioecious flowering plants . Adv . Genet . 9:217-281 .

Wetherell , D . F . 1982 . Introduction to *in vitro* propagation . Avery Pub . Group Inc ., Wayne , N . J . 87 p .

Whittaker , T . W and R . W . Robinson . 1986 . Squash breeding . In M . J . Bassett (E d.) "Breeding Vegetable Crops " , PP . 209-242 . Avi Pub . Co ., Inc . Westport , Connecticut .

Whitehouse , H . L . K . 1973 . Towards an understanding of the mechanism of heredity . Edward Arnold (Pub.) Ltd . 528 p .

Wilkins , E . and E . H . Beyer . 1988 . Use of sodium chloride to overcome self-incompatibility in an inbred broccoli (*Brassica oleracea* var . italica) line. (Abstr .) HortScience 23 : 783 p .

Williams , W . 1964 . Genetical principles and plant breeding . Blackwell Scientific Pub, Oxford. 504 p .

Wilsie , C . P . 1962 . Crop adaptation and distribution . W . H . Freeman and Co., San Francisco. 448 p .

Withers . L . A . 1980 . Cryopreservation of plant cell and tissue cultures . In D . S . Ingram and J . P . Helgeson (Eds) "Tissue Culture Methods for Plant Pathologists " , pp . Blackwell Sci, Pub ., Oxford .

Withers , L . A . 1983 . Germplasm storage in plant biotechnology . In . S . H . Mantell and H . Smith (Eds) " Plant Biotechnology", pp . 187-218. Cambridge Univ. Pr ., Cambridge.

Withers , L . A . 1985 . Crytopreservation and storage of germplasm . In . R . A . Dixon (Ed.) " Plant cell Culture : a Practical Approach " , pp . 169 - 191 . IRL Pr ., Oxford .

Wittwer . S . H . and S . Honma . 1979 . Greenhouse tomatoes , lettuce and cucumbers . Michigan State Univ . Press , East Lansing . 225 p .

Wooster , P . and T . J . Dixon . 1987 . Micropagation - an aid in the production of new varieties . In G . J . Jellis and D . E. Richardson (Eds) "The Production of New Potato Varieties" , pp. 142 - 145 . Cambridge Univ . Pr ., Cambridge .

Wricke , G . and W . E . Weber . 1986 . Quantitative genetics and selection in plant breeding . Walter de Gruyter , Berlin. 406P .

Yang . H . - J . 1977. Tissue Culture technique developed for asparagus propagation . HortScience 12:140-141 .

Zamir , D . , S . D . Tanksley and R . A . Jones . 1981 . Genetic analysis of the origin of plant regenerated from anther tissues of *Lycopersicon esculentum* Mill . Plant Science Letters 21:223-227 .

Zenkteler , M . 1980 . Intraovarian and *in vitro* pollination . In . I . K .

Vasil (Ed.) " Perspective in Plant Cell and Tissue Culture" , pp . 137-156.
Academic Pr., N . Y .

Zeven . A . C . and A . M . van Harten (Eds) . 1979 . Brodening the
genetic base of crops . Centre for Agr . Pub . & Doc ., Wageningen .
347 p .

Zeven , A . C and P . M . Zhukovsky . 1975 . Dictionary of cultivated
plants and their centres of diversity . Centre for Agr . Pub & Doc .
Wageningen . 219 p .

Zink , F . W . 1973 . Inheritance of resistance to downy mildew
(*Bremia lactucae* Reg.) in lettuce . J . Amer Soc . Hort . Sci . 98 : 293-
296.

Inv:327/2014

Date:15/5/2014

